



Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.



Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TS, TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV



Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.



Ordonnance de sortie

Codoliprane 500

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

Augmentin ou générique

1 gramme matin et soir pendant 8 jours.

NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA PENICILLINE, dans ce cas
contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.



Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH : 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention
1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH : 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.