



## Ordonnance

**Bétadine Scrub 1%**  
1 flacon

*Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.*



## Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes  
VS  
TS, TC, TCK, TP  
Groupe rhésus + Agglutinines  
Glycémie  
Urée  
Ionogramme sanguin  
Sérologie hépatite B et C  
HIV



## Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.



### **Ordonnance de sortie**

Fer, vitamines, anticoagulants  
(APRÈS LIPOASPIRATION ET CHIRURGIE DU VENTRE)

#### **FUMAFER**

3 comprimés par jour /15 jours

#### **SPÉCIAFOLDINE**

3 comprimés par jour/15 jours

#### **Vitamine B12**

3 comprimés par jour/15 jours.

#### **LOVENOX 40**

Une injection par jour tous les jours à la même heure par une infirmière diplômée à domicile pendant 15 jours.

Modifiez votre alimentation pour y inclure des aliments plus riches en fer, comme les viandes rouges et blanches, le poisson, les palourdes, les huîtres, les légumes-feuilles vert foncé, les grains entiers, les légumineuses et les pains et céréales enrichis de fer. Un supplément de vitamine C : 1 GRAMME PAR JOUR LE MATIN peut favoriser l'absorption du fer.



## Ordonnance

Pansements à refaire tous les deux jours pendant deux semaines par une infirmière diplômée.

Produits en quantité suffisante :

1-Nettoyer la cicatrice avec un compresse non tissée stérile et de la CHLOREXIDINE.

2-S'il existe des croûtes laisser imbiber une compresse stérile avec de l'eau oxygénée sur la cicatrice pendant 3 minutes.

3-Passer une compresse stérile largement imbibée de Bétadine jaune, laisser sécher une minute.

4-Appliquer une feuille de tulle gras pliée en deux tout au long de la cicatrice.

5-Poser une compresse stérile pliée en deux puis une bande d'Hypafix.



## Ordonnance de sortie

### **Codoliprane 500**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

### **Lamaline**

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours  
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

### **Augmentin ou générique**

1 gramme matin et soir pendant 8 jours.

**NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA PENICILLINE**, dans ce cas  
contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.



## **Ordonnance pour infirmière**

Pansements à refaire à domicile tous les deux jours pendant deux semaines par une infirmière diplômée (y compris les samedis, dimanches et jours fériés).



## Ordonnance pour traitement homéopathique

### **GELSEMIUM 15 CH : 2 doses**

1 dose 8 jours avant l'intervention  
1 dose la veille de l'intervention

### **ARNICA 9 CH : 3 tubes**

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention  
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

### **STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes**

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

*Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.*