

Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode

Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Ordonnance de sortie

Fer, vitamines, anticoagulants
(APRÈS LIPOASPIRATION ET CHIRURGIE DU VENTRE)

FUMAFER

3 comprimés par jour /15 jours

SPÉCIAFOLDINE

3 comprimés par jour/15 jours

Vitamine B12

3 comprimés par jour/15 jours.

LOVENOX 0.4

Une injection par jour tous les jours à la même heure par une infirmière diplômée à domicile pendant 15 jours.

Modifiez votre alimentation pour y inclure des aliments plus riches en fer, comme les viandes rouges et blanches, le poisson, les palourdes, les huîtres, les légumes-feuilles vert foncé, les grains entiers, les légumineuses et les pains et céréales enrichis de fer. Un supplément de vitamine C : 1 GRAMME PAR JOUR LE MATIN peut favoriser l'absorption du fer.

Faire pratiquer au laboratoire d'analyse une numération des plaquettes une semaine après la sortie de la clinique.

Ordonnance de sortie

Paracetamol 500

2 comprimés 4 fois par jour

Codoliprane 500 – si douleurs persistentes

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

ORDONNANCE POUR L'INFIRMIERE DIPLOMEE D'ETAT

Faire pratiquer tous les jours à la même heure pendant 15 jours à domicile une injection de Lovenox 0,4 en sous cutanée par une infirmière diplômée d'état.