



## Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV



## Ordonnance de sortie

Eviter de prendre de l'aspirine ou de prendre des médicaments en contenant les 15 jours qui précèdent l'intervention.

### **Dicynone 500**

Prendre 2 comprimés matin et soir en commençant 5 jours avant l'intervention. (1 boîte)

### **Ery 500**

Prendre 1 comprimé 3 fois par jour pendant 5 jours en commençant le jour de l'intervention. (1 boîte)

### **Célestène 2mg**

Prendre 2 comprimés par jour en une seule prise pendant 3 jours, au petit déjeuner ou au déjeuner. Commencer le jour de l'intervention et les 2 jours suivants. (1 boîte)

### **Codoliprane**

1 à 2 comprimés en cas de douleur après l'intervention. (1 boîte)



## Ordonnance pour traitement homéopathique

### **GELSEMIUM 15 CH : 2 doses**

1 dose 8 jours avant l'intervention  
1 dose la veille de l'intervention

### **ARNICA 9 CH : 3 tubes**

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention  
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

### **STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes**

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

*Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.*