

Exercícios de aplicação (págs. 244 a 285)

1. Seja C o capital acumulado.

$$1.1. C = 2500 \left(1 + \frac{0,5}{100}\right) = 2500 \times 1,005 = 2512,50 \text{ euros}$$


$$1.2. C = 2500 \left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^5 \approx 2563,13 \text{ euros}$$

$$1.3. \frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{2500 \left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^{n+1}}{2500 \left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^n} = \frac{\left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^n \times \left(1 + \frac{0,5}{100}\right)}{\left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^n} = 1,005$$

Logo, a sucessão de capitais acumulados em cada um dos anos, a partir do primeiro, é uma progressão geométrica de razão 1,005.

$$1.4. C_n = 2500 \left(1 + \frac{0,5}{100}\right)^n = 2500 \times 1,005^n$$

1.5. Ao fim de 37 anos.



$$1.6. 2500 \left(1 + \frac{0,4}{100 \times 12}\right)^5 \approx 2504,17 \text{ euros}$$

Ao optarmos por esta segunda modalidade, o capital acumulado será inferior ao da opção inicial.

2.

$$2.1. 9^{x^2+x} - 27^{-2x-2} = 0 \Leftrightarrow 9^{x^2+x} = 27^{-2x-2}$$

$$\Leftrightarrow (3^2)^{x^2+x} = (3^3)^{-2x-2}$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x^2+2x} = 3^{-6x-6}$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2x = -6x - 6$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2x + 6x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 8x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-8 \pm \sqrt{64-48}}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-8 \pm 4}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \vee x = -3$$

Assim, C. S. = $\{-3, -1\}$.

$$2.2. 2^{2x-1} - 2^{x-1} = 1 \Leftrightarrow 2^{2x} \times 2^{-1} - 2^x \times 2^{-1} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(2^x)^2 - \frac{1}{2} \times 2^x - 1 = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente, obtemos:

$$\Leftrightarrow 2^x = 2 \vee \underbrace{2^x = -1}_{\text{Equação impossível}}$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

Assim, C. S. = $\{1\}$.

$$\mathbf{2.3.} \quad 5^{x+1} + 5^{1-x} - 1 = 25 \Leftrightarrow 5^{x+1} + 5^{1-x} - 26 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5^x \times 5 + 5 \times 5^{-x} - 26 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5 \times (5^x)^2 - 26 \times 5^x + 5 = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente, obtemos:

$$\Leftrightarrow 5^x = 5 \vee 5^x = 5^{-1}$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = -1$$

Assim, C. S. = $\{-1, 1\}$.

3.

$$\mathbf{3.1.} \quad D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$3^{\frac{1}{x}} > 9 \Leftrightarrow 3^{\frac{1}{x}} > 3^2 \Leftrightarrow \frac{1}{x} > 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} - 2 > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-2x}{x} > 0$$

x	$-\infty$	0		$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$-2x + 1$	+	+	+	0	-
x	-	0	+	+	+
$\frac{-2x + 1}{x}$	-	n. d.	+	0	-

$$\text{Logo, } x \in \left]0, \frac{1}{2}\right[.$$

$$\mathbf{3.2.} \quad D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\frac{6^x - 2^x}{3^x - 3} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{3^x \times 2^x - 2^x}{3^x - 3} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2^x(3^x - 1)}{3^x - 3} \geq 0$$

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$2^x(3^x - 1)$	-	0	+	+	+
$3^x - 3$	-	-	-	0	+
$\frac{2^x(3^x - 1)}{3^x - 3}$	+	0	-	n. d.	+

$$\text{C. S.} =]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[$$

$$\begin{aligned}
3.3. -9^x + 4 \times 3^x \geq 3 &\Leftrightarrow -9^x + 4 \times 3^x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow -(3^2)^x + 4 \times 3^x - 3 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow -(3^x)^2 + 4 \times 3^x - 3 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow 3^x \geq 1 \wedge 3^x \leq 3 \\
&\Leftrightarrow 3^x \geq 3^0 \wedge 3^x \leq 3 \\
&\Leftrightarrow x \geq 0 \wedge x \leq 1
\end{aligned}$$

$$\text{C. S.} = [0, 1]$$

$$\begin{aligned}
3.4. 2^{x-1} + 2^{2-x} - 3 > 0 &\Leftrightarrow 2^x \times 2^{-1} + 2^2 \times 2^{-x} - 3 > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \times 2^x + 4 \times 2^{-x} - 3 > 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{2} \times (2^x)^2 - 3 \times 2^x + 4 > 0 \\
&\Leftrightarrow 2^x < 2 \vee 2^x > 4 \\
&\Leftrightarrow x < 1 \vee x > 2
\end{aligned}$$

$$\text{C. S.} =]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$$

4. A função f é contínua em \mathbb{R} , por se tratar do quociente entre duas funções contínuas (uma função afim e uma função que resulta da soma de uma função exponencial com uma função constante). Em particular, f é contínua em $[0, 2]$.

$$f(0) = \frac{0-1}{e^0+1} = -\frac{1}{2} \quad f(2) = \frac{2-1}{e^2+1} = \frac{1}{e^2+1}$$

Portanto, $f(0) < 0 < f(2)$.

Assim, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, concluímos que $\exists c \in]0, 2[: f(c) = 0$, ou seja, a função f tem pelo menos um zero pertencente a $]0, 2[$.

5.

$$5.1. D = \{x \in \mathbb{R} : x - 4 > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x > 4\} =]4, +\infty[$$

$$\begin{aligned}
\log_3(x-4) - 1 &= 0 \Leftrightarrow \log_3(x-4) = 1 \\
&\Leftrightarrow x-4 = 3 \\
&\Leftrightarrow x = 7
\end{aligned}$$

$$\text{C. S.} = \{7\}$$

$$5.2. D = \{x \in \mathbb{R} : x - 1 > 0 \wedge x + 2 > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x > 1 \wedge x > -2\} =]1, +\infty[$$

$$\begin{aligned}
1 - \log(x-1) &= \log(x+2) \Leftrightarrow 1 = \log(x-1) + \log(x+2) \\
&\Leftrightarrow 1 = \log[(x-1)(x+2)] \\
&\Leftrightarrow 10 = (x-1)(x+2) \\
&\Leftrightarrow 10 = x^2 + 2x - x - 2 \\
&\Leftrightarrow x^2 + x - 12 = 0 \\
&\Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+48}}{2} \\
&\Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm 7}{2}
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{6}{2} \vee x = -\frac{8}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \vee x = -4$$

$$\{-4, 3\} \cap]1, +\infty[= \{3\}$$

$$C.S. = \{3\}$$

$$5.3. D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - x > 0 \wedge x > 0\} =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[\cap]0, +\infty[=]1, +\infty[$$

$$x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$$

$$\log_9(x^2 - x) - \log_3(x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\log_3(x^2 - x)}{\log_3 9} - \log_3(x) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_3(x^2 - x)}{2} - \log_3(x) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_3(x^2 - x) - 2\log_3(x)}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x^2 - x) - 2\log_3(x) = -1$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x^2 - x) - \log_3(x^2) = -1$$

$$\Leftrightarrow \log_3\left(\frac{x^2 - x}{x^2}\right) = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - x}{x^2} = 3^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - x}{x^2} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - x}{x^2} - \frac{1}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x^2 - 3x - x^2}{3x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^2 - 3x}{3x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 3x = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x(2x - 3) = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x = 0 \vee x = \frac{3}{2}\right) \wedge x \neq 0$$

$$C.S. = \left\{\frac{3}{2}\right\}$$

$$5.4. D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 > 0\} = x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\ln(x^2) = 2\ln(5) \Leftrightarrow \ln(x^2) = \ln(5^2) \Leftrightarrow x^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x = -5 \vee x = 5$$

$$C.S. = \{-5, 5\}$$

6.

$$6.1. D = \{x \in \mathbb{R}: 3x > 0\} = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$\log(3x) < \log(12) \Leftrightarrow 3x < 12 \Leftrightarrow x < 4$$

$$C.S. =]0, 4[$$

$$6.2. D = \{x \in \mathbb{R}: 1 - x > 0\} = \{x \in \mathbb{R}: x < 1\} =]-\infty, 1[$$

$$\ln(1 - x) \geq -2 \Leftrightarrow \ln(1 - x) \geq \ln(e^{-2}) \Leftrightarrow 1 - x \geq e^{-2}$$

$$\Leftrightarrow -x \geq e^{-2} - 1 \Leftrightarrow x \leq 1 - \frac{1}{e^2}$$

$$C.S. = \left] -\infty, 1 - \frac{1}{e^2} \right]$$

$$6.3. D = \{x \in \mathbb{R}: x - 1 > 0\} = \{x \in \mathbb{R}: x > 1\} =]1, +\infty[$$

$$\log_{0,1}(x - 1) < 10 \Leftrightarrow x - 1 > 0,1^{10} \Leftrightarrow x > \frac{1}{10^{10}} + 1$$

$$C.S. = \left] \frac{1}{10^{10}} + 1, +\infty \right[$$

$$6.4. D = \{x \in \mathbb{R}: 3 - x > 0 \wedge x + 4 > 0\} = \{x \in \mathbb{R}: x < 3 \wedge x > -4\} =]-4, 3[$$

$$\log_3(3 - x) \leq 9 - \log_3(4 + x) \Leftrightarrow \log_3(3 - x) \leq \log_3(3^9) - \log_3(4 + x)$$

$$\Leftrightarrow \log_3(3 - x) \leq \log_3\left(\frac{3^9}{4+x}\right)$$

$$\Leftrightarrow 3 - x \leq \frac{3^9}{4+x}$$

$$\Leftrightarrow 3 - x - \frac{3^9}{4+x} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(3-x)(4+x) - 19\,683}{4+x} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{12 + 3x - 4x - x^2 - 19\,683}{4+x} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x^2 - x - 19\,671}{4+x} \leq 0$$

x	-4		3
$-x^2 - x - 19\,671$	n. d.	–	n. d.
$4 + x$	n. d.	+	n. d.
$\frac{-x^2 - x - 19\,671}{4+x}$	n. d.	–	n. d.

$$C.S. =]-4, 3[$$

$$6.5. D = \{x \in \mathbb{R}: -x^2 + x > 0 \wedge x > 0\} =]0, 1[\cap]0, +\infty[=]0, 1[$$

$$\log_2(-x^2 + x) - \log_2(x) > -1 \Leftrightarrow \log_2\left(\frac{-x^2+x}{x}\right) > -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x^2+x}{x} > 2^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x^2+x}{x} - \frac{1}{2} > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2x^2+2x-x}{2x} > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2x^2+x}{2x} > 0$$

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$-2x^2 + x$	n. d.	+	0	–	n. d.
$2x$	n. d.	+	+	+	n. d.
$\frac{-2x^2 + x}{2x}$	n. d.	+	0	–	n. d.

$$C.S. = \left]0, \frac{1}{2}\right[$$

7.

$$7.1. D_f = \mathbb{R} = D'_{f^{-1}} \text{ e } D'_f =]-2, +\infty[= D_{f^{-1}}$$

$$y = 3^{-x} - 2 \Leftrightarrow y + 2 = 3^{-x} \Leftrightarrow \log_3(y + 2) = -x$$

$$\Leftrightarrow -\log_3(y + 2) = x$$

$$\Leftrightarrow \log_3\left(\frac{1}{y+2}\right) = x$$

$$f^{-1}:]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \log_3\left(\frac{1}{x+2}\right)$$

$$7.2. D_g =]2, +\infty[= D'_{g^{-1}} \text{ e } D'_g = \mathbb{R} = D_{g^{-1}}$$

$$y = \log(3x - 6) - 1 \Leftrightarrow y + 1 = \log(3x - 6) \Leftrightarrow 10^{y+1} = 3x - 6$$

$$\Leftrightarrow 10^{y+1} + 6 = 3x$$

$$\Leftrightarrow \frac{10^{y+1}+6}{3} = x$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{10^{y+1}}{3} + 2$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{10^{y+1}+6}{3}$$

$$g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow]2, +\infty[$$

$$x \mapsto \frac{10^{x+1}+6}{3}$$

$$7.3. D_h = \mathbb{R} = D'_{h^{-1}} \text{ e } D'_h =]-\infty, -1[= D_{h^{-1}}$$

$$y = -2e^x - 1 \Leftrightarrow y + 1 = -2e^x \Leftrightarrow -y - 1 = 2e^x$$

$$\Leftrightarrow \frac{-y-1}{2} = e^x$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{-y-1}{2}\right) = x$$

$$h^{-1}:]-\infty, -1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \ln\left(\frac{-x-1}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
8. \frac{f(t+2)}{f(t)} = 1,22 &\Leftrightarrow \frac{\frac{200}{1+2^{-0,5(t+2)}}}{\frac{200}{1+2^{-0,5t}}} = 1,22 \\
&\Leftrightarrow \frac{200(1+2^{-0,5t})}{200(1+2^{-0,5(t+2)})} = 1,22 \\
&\Leftrightarrow \frac{(1+2^{-0,5t})}{(1+2^{-0,5(t+2)})} = 1,22 \\
&\Leftrightarrow 1 + 2^{-0,5t} = 1,22(1 + 2^{-0,5(t+2)}) \\
&\Leftrightarrow 1 + 2^{-0,5t} = 1,22 + 1,22 \times 2^{-0,5t-1} \\
&\Leftrightarrow 1 + 2^{-0,5t} = 1,22 + 1,22 \times 2^{-0,5t} \times 2^{-1} \\
&\Leftrightarrow 1 + 2^{-0,5t} = 1,22 + 0,61 \times 2^{-0,5t} \\
&\Leftrightarrow 2^{-0,5t} - 0,61 \times 2^{-0,5t} = 1,22 - 1 \\
&\Leftrightarrow (1 - 0,61) \times 2^{-0,5t} = 0,22 \\
&\Leftrightarrow 2^{-0,5t} = \frac{0,22}{0,39} \\
&\Leftrightarrow -0,5t = \log_2\left(\frac{22}{39}\right) \\
&\Leftrightarrow t = \frac{\log_2\left(\frac{22}{39}\right)}{-0,5} \\
&\Leftrightarrow t \approx 1,652
\end{aligned}$$

Cálculo auxiliar

$$0,652 \times 12 \approx 8$$

Um ano e oito meses, aproximadamente.

9.

$$9.1. a'(x) = (e^{-2x})' = -2e^{-2x}$$

$$9.2. b'(x) = \left(e^{\frac{1}{x}}\right)' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$$

$$9.3. c'(x) = (3^x)' = \ln(3) \times 3^x$$

$$9.4. d'(x) = (5^{x^2})' = \ln(5) \times 2x \times 5^{x^2}$$

$$9.5. e'(x) = (5^{\ln(x)})' = \ln(5) \times 5^{\ln(x)} \times \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned}
9.6. f'(x) &= (e^x(-x^3 + 3x - 1))' = e^x(-x^3 + 3x - 1) + e^x \times (-3x^2 + 3) = \\
&= e^x(-x^3 - 3x^2 + 3x + 2)
\end{aligned}$$

$$9.7. g'(x) = \left(\frac{e^x}{\ln(x)}\right)' = \frac{e^x \times \ln(x) - e^x \times \frac{1}{x}}{\ln^2(x)} = \frac{e^x(\ln(x) - \frac{1}{x})}{\ln^2(x)}$$

$$\begin{aligned}
9.8. h'(x) &= \left(-\frac{2^x}{x^2}\right)' = -\frac{2^x \times \ln 2 \times x^2 - 2^x \times 2x}{x^4} = -\frac{2^x(\ln 2 \times x^2 - 2x)}{x^4} = \\
&= \frac{2^x(2 - x \ln(2))}{x^3}
\end{aligned}$$

$$9.9. i'(x) = (\ln(x^2 + 3x))' = \frac{2x+3}{x^2+3x}$$

10. Determinar $f'(x)$ para $x > 0$: $f'(x) = e^x$

Determinar $f'(x)$ para $x < 0$: $f'(x) = 3x^2 + 2x$

Determinar $f'(x)$ para $x = 0$:

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x^2 + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + x) = 0$$

Como $f'(0^+) \neq f'(0^-)$, então f não é diferenciável em $x = 0$.

$$f': \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{se } x > 0 \\ 3x^2 + 2x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

11. $D = \{x \in \mathbb{R}: 2x - 1 > 0\} = \left\{x \in \mathbb{R}: x > \frac{1}{2}\right\} = \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$

$$f(x) = 2 - x + \ln(2x - 1)$$

$$f'(x) = -1 + \frac{2}{2x-1}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -1 + \frac{2}{2x-1} = 0 \Leftrightarrow \frac{-(2x-1)+2}{2x-1} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2x+1+2}{2x-1} = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x + 3 = 0 \wedge 2x - 1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \wedge x \neq \frac{1}{2}$$

x	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Sinal de f'	n. d.	+	0	-
Variação de f	n. d.	\nearrow	Máx. $\frac{1}{2} + \ln(2)$	\searrow

Cálculo auxiliar

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 - \frac{3}{2} + \ln\left(2 \times \frac{3}{2} - 1\right) = 2 - \frac{3}{2} + \ln(2) = \frac{1}{2} + \ln(2)$$

$$\text{Logo, } D_f' = \left]-\infty, \frac{1}{2} + \ln(2)\right].$$

12.

$$12.1. \mathcal{C}(t) = 2 \Leftrightarrow 12(e^{-t} - e^{-2t}) = 2 \Leftrightarrow e^{-t} - e^{-2t} = \frac{1}{6}$$

$$\Leftrightarrow -(e^{-t})^2 + e^{-t} - \frac{1}{6} = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente, obtemos:

$$\Leftrightarrow e^{-t} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} \quad \vee \quad e^{-t} = \frac{3-\sqrt{3}}{6}$$

$$\Leftrightarrow -t = \ln\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right) \vee -t = \ln\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)$$

$$\Leftrightarrow t = -\ln\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right) \vee t = -\ln\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)$$

$$\begin{aligned} -\ln\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right) - \ln\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right) &= -\left(\ln\left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right) + \ln\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)\right) = \\ &= -\left(\ln\left(\frac{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})}{6 \times 6}\right)\right) = \\ &= -\ln\left(\frac{9-3}{6 \times 6}\right) = \\ &= -\ln\left(\frac{6}{6 \times 6}\right) = \\ &= -\ln\left(\frac{1}{6}\right) = \\ &= -\ln(6^{-1}) = \\ &= -(-\ln(6)) = \\ &= \ln(6) \quad \text{c. q. m.} \end{aligned}$$

$$12.2. \lim_{t \rightarrow +\infty} 12(e^{-t} - e^{-2t}) = 12(e^{-\infty} - e^{-\infty}) = 12 \times 0 = 0$$

Com o passar do tempo, a concentração de medicamento no sangue do paciente tende para zero.

$$12.3. C'(t) = 12(-e^{-t} + 2e^{-2t})$$

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 12(-e^{-t} + 2e^{-2t}) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2e^{-2t} - e^{-t} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-t}(2e^{-t} - 1) = 0$$



$$\Leftrightarrow e^{-t} = 0 \vee 2e^{-t} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow -t = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow t = -\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow t = -(\ln(1) - \ln(2))$$

$$\Leftrightarrow t = \ln(2)$$

t	0		$\ln(2)$	$+\infty$
Sinal de C'	n. d.	+	0	-
Variação de C	n. d.		Máx.	

Cálculo auxiliar

$$60 \times \ln(2) \approx 42$$

Às 10 horas e 42 minutos, aproximadamente, a concentração de medicamento no sangue do paciente foi máxima.

$$\begin{aligned}
 13. f''(x) &= \frac{2}{3} + \frac{\frac{1}{3}(3-e^x)^{-\frac{2}{3}} \times (-e^x)}{(3-e^x)^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{3} + \frac{-\frac{1}{3}e^x}{(3-e^x)^{\frac{1}{3}}(3-e^x)^{\frac{2}{3}}} = \\
 &= \frac{2}{3} + \frac{-\frac{1}{3}e^x}{3-e^x} = \frac{2(3-e^x)-e^x}{3(3-e^x)} = \\
 &= \frac{6-2e^x-e^x}{3(3-e^x)} = \\
 &= \frac{6-3e^x}{3(3-e^x)} = \\
 &= \frac{3(2-e^x)}{3(3-e^x)} = \\
 &= \frac{e^x-2}{e^x-3} \quad \text{c. q. m.}
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x-2}{e^x-3} = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = 0 \wedge e^x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x = \ln(2) \wedge x \neq \ln(3)$$

x	$-\infty$	$\ln(2)$		$\ln(3)$
Sinal de f''	+	0	–	n. d.
Sentido das concavidades do gráfico de f	U	P. I.	∩	n. d.

O gráfico da função f tem a concavidade voltada para cima em $]-\infty, \ln(2)]$ e tem a concavidade voltada para baixo em $[\ln(2), \ln(3)[$. O gráfico da função tem um ponto de inflexão de abscissa $\ln(2)$.

14.



$$\begin{aligned}
 14.1. R'(t) &= \frac{\frac{1}{t+1} \times (t+1) - \ln(t+1)}{(t+1)^2} = \\
 &= \frac{1 - \ln(t+1)}{(t+1)^2}
 \end{aligned}$$

$$\frac{1 - \ln(t+1)}{(t+1)^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln(t+1) = 0 \wedge (t+1)^2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow 1 = \ln(t+1) \wedge t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow t+1 = e \wedge t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow t = e - 1$$

t	0		$e - 1$		5
Sinal de R'	$R'(0)$	+	0	–	$R'(5)$
Variação de R	$R(0)$		Máx.		$R(5)$

$$e - 1 \approx 2 \text{ anos (0 c.d.)}$$

Uma criança atinge a capacidade máxima de aprendizagem por volta dos dois anos.

$$\begin{aligned}
 14.2. R''(t) &= \frac{-\frac{1}{t+1} \times (t+1)^2 - [(1 - \ln(t+1)) \times 2(t+1)]}{(t+1)^4} = \frac{-(t+1) - (1 - \ln(t+1)) \times 2(t+1)}{(t+1)^4} = \\
 &= \frac{(t+1)[-1 - 2(1 - \ln(t+1))]}{(t+1)^4} = \\
 &= \frac{-1 - 2 + 2 \ln(t+1)}{(t+1)^3} = \\
 &= \frac{-3 + 2 \ln(t+1)}{(t+1)^3}
 \end{aligned}$$



$$\frac{-3 + 2 \ln(t+1)}{(t+1)^3} = 0 \Leftrightarrow -3 + 2 \ln(t+1) = 0 \quad \wedge \quad t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow \ln(t+1) = \frac{3}{2} \quad \wedge \quad t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow t+1 = e^{\frac{3}{2}} \quad \wedge \quad t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow t = e^{1,5} - 1 \quad \wedge \quad t \neq -1$$

$$\Leftrightarrow t \approx 3,48$$

t	0		$e^{1,5} - 1$		5
Sinal de R''	$R''(0)$	–	0	+	$R''(5)$
Variação de R'	Máx. 1		Mín. –0,025		Máx. –0,022

A capacidade de aprendizagem está a aumentar mais rapidamente logo após o nascimento.

$$15. f(x) = x^2(1 - \ln(x))$$

$$D_f = \mathbb{R}^+$$

$$\text{Zeros: } f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(1 - \ln(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 0 \quad \vee \quad 1 - \ln(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad \ln(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x = e$$

Atendendo ao domínio, $x = e$ é o único zero da função.

Continuidade: f é contínua por resultar de operações entre funções contínuas.

$$f'(x) = 2x(1 - \ln(x)) + x^2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = 2x(1 - \ln(x)) - x$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(1 - \ln(x)) - x = 0 \Leftrightarrow x(2(1 - \ln(x)) - 1) = 0$$



$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad 2(1 - \ln(x)) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad 1 - \ln(x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad -\ln(x) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad \ln(x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x = e^{\frac{1}{2}}$$

x	0		\sqrt{e}	$+\infty$
Sinal de f'	n. d.	+	0	–
Variação de f	n. d.		Máx. $\frac{e}{2}$	

Cálculo auxiliar

$$f(\sqrt{e}) = \frac{e}{2}$$

f é crescente em $]0, \sqrt{e}]$ e é decrescente em $[\sqrt{e}, +\infty[$; $\frac{e}{2}$ é máximo absoluto para $x = \sqrt{e}$.

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2(1 - \ln(x)) + 2x\left(-\frac{1}{x}\right) - 1 = 2(1 - \ln(x)) - 2 - 1 = \\ &= 2(1 - \ln(x)) - 3 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - \ln(x)) - 3 = 0 \Leftrightarrow 2 - 2\ln(x) - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2\ln(x) = 1 \Leftrightarrow \ln(x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$$


$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{e}} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{e}}{e}$$

x	0		$\frac{\sqrt{e}}{e}$	$+\infty$
Sinal de f''	n. d.	+	0	–
Variação de f	n. d.	∪	P. I.	∩

Cálculo auxiliar

$$f\left(\frac{\sqrt{e}}{e}\right) = \frac{3}{2e}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $]0, \frac{\sqrt{e}}{e}]$ e tem a concavidade voltada para baixo em $[\frac{\sqrt{e}}{e}, +\infty[$; o ponto de coordenadas $\left(\frac{\sqrt{e}}{e}, \frac{3}{2e}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .

**16.**

$$16.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(e^x-1)}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} = -\frac{1}{2}$$

$$16.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^x-3}{5x} = \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} = \frac{3}{5}$$

$$16.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(e^{3x}-1)}{3x} = 3 \lim_{3x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-1}{3x} = 3$$

$$16.4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x - 2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y+2} - e^2}{y+2-2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y+2} - e^2}{y} =$$

Considerando a mudança de variável $x - 2 = y \Leftrightarrow x = y + 2$: se $x \rightarrow 2$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y \times e^2 - e^2}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^2(e^y - 1)}{y} \\ &= e^2 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = e^2 \end{aligned}$$

$$16.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x)^5 - 1}{15x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{3 \times 5x} = \frac{1}{3} \lim_{5x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{5x} = \frac{1}{3}$$

$$16.6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{ex - e} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{e(x-1)} = \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{x-1}$$

Seja f a função de domínio \mathbb{R} definida por $f(x) = e^x$. Sabemos que $f(1) = e$ e que $f'(x) = e^x$ e, consequentemente, $f' = e$. Então:

$$\frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{x-1} = \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{1}{e} \times f'(1) = \frac{1}{e} \times e = 1$$

$$16.7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x - e}{3x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x - e}{3(x-1)} = \frac{1}{3} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x - e}{x-1} = \frac{1}{3} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y+1)e^{y+1} - e}{y} =$$

Considerando a mudança de variável $x - 1 = y \Leftrightarrow x = y + 1$: se $x \rightarrow 1$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ye^{y+1} + e^{y+1} - e}{y} = \\ &= \frac{1}{3} \times \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{ye^{y+1}}{y} + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y+1} - e}{y} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \times \left(\lim_{y \rightarrow 0} e^{y+1} + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e(e^y - 1)}{y} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \times \left(e + e \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}} \right) = \\ &= \frac{1}{3} (e + e) = \\ &= \frac{2}{3} e \end{aligned}$$

$$16.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(2^x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2) \times (e^{x \ln(2)} - 1)}{x \ln(2)} = \ln(2) \times \lim_{x \ln(2) \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(2)} - 1}{x \ln(2)} = \ln(2)$$

$$16.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{2x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{2(e^y - 1)} = \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{e^y - 1}}{\frac{e^y - 1}{y}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = \frac{1}{2}$$

$$16.10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x+1)}{x-2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y + 1 - 2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} =$$

Considerando a mudança de variável $\ln(x - 1) = y \Leftrightarrow x = e^y + 1$: se $x \rightarrow 2$, então $y \rightarrow 0$.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{e^y - 1}}{\frac{e^y - 1}{y}} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = 1$$

$$16.11. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - e^x}{-x^{10}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2}{-x^{10}} - \frac{e^x}{-x^{10}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{x^8} + \frac{e^x}{x^{10}} \right) = 0 + (+\infty) = +\infty$$

$$16.12. \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (-ye^{-y}) = -\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = -\frac{1}{\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y}} = -\frac{1}{+\infty} = 0$$

$$16.13. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 3^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(1 - \frac{3^x}{e^x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - \left(\frac{3}{e}\right)^x\right] = +\infty \times (-\infty) = -\infty$$

$$\begin{aligned} 16.14. \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(e^x - 2x) - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(e^x \left(1 - \frac{2x}{e^x}\right)\right) - x \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{2x}{e^x}\right) - x \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \ln\left(1 - \frac{2x}{e^x}\right) - x \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 - \frac{2x}{e^x}\right) \right] = \\ &= \ln\left(1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{2x}{e^x}}{x}\right)\right) = \\ &= \ln\left(\frac{2}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}}\right) = \\ &= \ln\left(1 - \frac{2}{+\infty}\right) = \\ &= \ln(1) = 0 \end{aligned}$$

$$16.15. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{x^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\ln(5^x)}}{x^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x \ln(5)}}{x^5} =$$

Considerando a mudança de variável $y = x \ln(5) \Leftrightarrow x = \frac{y}{\ln(5)}$; se $x \rightarrow +\infty$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{\left(\frac{y}{\ln(5)}\right)^5} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{\frac{y^5}{(\ln(5))^5}} = \\ &= (\ln(5))^5 \times \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y^5} = +\infty \end{aligned}$$

$$16.16. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_5(x)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(x)}{\ln 5}}{x^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln 5 \times x^5} = \frac{1}{\ln 5} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^5} = \frac{1}{\ln 5} \times 0 = 0$$

$$16.17. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^3 - 1 + \ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^3}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty - 0 + 0 = -\infty$$

$$\begin{aligned} 17. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x+2}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(\left(\frac{x^2}{x+2}\right)^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \ln\left(\frac{x^2}{x+2}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} (\ln(x^2) - \ln(x+2))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(x^2) - \ln(x+2)}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2) - \ln(x+2)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x} = \\ &= e^{2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+2)}{x}} = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $x + 2 = y \Leftrightarrow x = y - 2$: se $x \rightarrow +\infty$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned}
 &= e^{2 \times 0 - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y-2}} = \\
 &= e^{-\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(y)}{y}}{1-\frac{2}{y}}} = \\
 &= e^{\frac{\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y}}{\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1-\frac{2}{y}\right)}} = \\
 &= e^{\frac{0}{1}} = \\
 &= e^0 = \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

18. Para que a função h seja contínua em $x = 2$, tem que existir $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$. Para que $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$ exista,

temos que ter $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = h(2)$.

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+2) = 4$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{x+k} + \ln(x-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^{x+k}}{x} + \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln(x-1)}{x} = \frac{e^{2+k}}{2} + \frac{\ln(2-1)}{2} = \frac{e^{2+k}}{2} + 0 = \frac{e^{2+k}}{2}$
- $h(0) = \frac{e^{2+k}}{2}$

Assim, h é contínua em $x = 2$ se e só se:

$$\frac{e^{2+k}}{2} = 4 \Leftrightarrow e^{2+k} = 8 \Leftrightarrow 2+k = \ln(8) \Leftrightarrow k = \ln(8) - 2$$

19.

- Para $x > 0$, a função é contínua, por se tratar da diferença entre duas funções contínuas (uma que é a composta da função raiz quadrada com uma função polinomial e outra que é uma função afim).
- Para $x < 0$, a função é contínua, por se tratar do quociente entre duas funções contínuas (uma que é a diferença entre a composta de uma função exponencial com uma função afim e uma função constante e outra que é uma função afim, que não se anula no intervalo considerado).
- Para $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x^2 + 9} - x) = \sqrt{0 + 9} - 0 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3(e^{3x} - 1)}{3x} = 3 \lim_{3x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3$$

$$h(0) = 3$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0)$, a função h é contínua no ponto de abcissa 0.

Concluimos, assim, que a função h é contínua em IR.

$$20. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + 2}{e^{x-1}} = \frac{e^0 + 2}{e^{0^+ - 1}} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x + 2}{e^{x-1}} = \frac{e^0 + 2}{e^{0^- - 1}} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

Assim, $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de f .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2}{e^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(1 + \frac{2}{e^x}\right)}{e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)} = \frac{1 + \frac{2}{+\infty}}{1 - \frac{1}{+\infty}} = 1$$

Assim, $y = 1$ é assíntota horizontal ao gráfico de f , quando $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 2}{e^{x-1}} = \frac{e^{-\infty} + 2}{e^{-\infty - 1}} = \frac{2}{-1} = -2$$

Assim, $y = -2$ é assíntota horizontal ao gráfico de f , quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\begin{aligned} 21. m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x-1) - x \ln(x) + 2x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x-1) - \ln(x) + 2] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + 2 \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{x}\right) + 2 \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + 2 \right] = \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln(x-1) - x \ln(x) + 2x - 2x] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln(x-1) - x \ln(x)] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) \right] = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $\ln\left(\frac{x-1}{x}\right) = y \Leftrightarrow \frac{x-1}{x} = e^y \Leftrightarrow x-1 = xe^y \Leftrightarrow x - xe^y = 1$

$\Leftrightarrow x(1 - e^y) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{1-e^y}$: se $x \rightarrow +\infty$, então $y \rightarrow$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{1-e^y} \times y =$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{1-e^y} =$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{e^y - 1} =$$

$$= -\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^y - 1}{y}} =$$

$$= -\frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} =$$

$$= -1$$

$y = 2x - 1$ é assíntota oblíqua ao gráfico de g quando $x \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned}
 m &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^{4x} - 2x}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(e^{4x} - 2)}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{4x} - 2) = \\
 &= e^{-\infty} - 2 = \\
 &= 0 - 2 = \\
 &= -2
 \end{aligned}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^{4+x} - 2x - (-2)x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^{4+x} - 2x + 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^{4+x})$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^{4+x}) = \lim_{y \rightarrow 0^+} (-4 + \ln(y))y =$$

Considerando a mudança de variável $e^{4+x} = y \Leftrightarrow 4 + x = \ln(y) \Leftrightarrow x = -4 + \ln(y)$: se $x \rightarrow -\infty$, então $y \rightarrow 0^+$.

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{y \rightarrow 0^+} (-4y + y \ln(y)) = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0^+} (-4y) + \lim_{y \rightarrow 0^+} (y \ln(y))
 \end{aligned}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} (y \ln(y)) = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{1}{z} \ln(z^{-1}) = - \lim_{z \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{\ln(z)}{z}}_{\text{limite notável}} = 0$$

Considerando a mudança de variável $z = \frac{1}{y} \Leftrightarrow zy = 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{z}$: se $y \rightarrow 0^+$, então $z \rightarrow +\infty$.

$y = -2x$ é assíntota oblíqua do gráfico de g quando $x \rightarrow -\infty$.

22. Sabemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 2$, logo $y = x + 2$ é assíntota oblíqua ao gráfico de f .

Vamos determinar a assíntota oblíqua ao gráfico de g .

$$\begin{aligned}
 m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(x)}{x} + f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} + 1 = \\
 &= 0 \times 0 + 1 = \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(x)}{x} + f(x) - x \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \\
 &= 0 + 2 = \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Assim, a reta de equação $y = x + 2$ é a única assíntota oblíqua ao gráfico de g .

23.

$$\begin{aligned} 23.1. \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1-e^{x+1}}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(e^{x+1}-1)}{(x-1)(x+1)} = -\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x-1} \times \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{x+1}-1}{x+1} = \\ &= -\frac{1}{-1-1} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{x+1}-1}{x+1} = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $x+1=y \Leftrightarrow x=y-1$: se $x \rightarrow -1^-$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y-1}{y} = \\ &= \frac{1}{2} \times 1 = \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-e^{x+1}}{x^2-1} = \frac{1-e^{-\infty+1}}{(-\infty)^2-1} = \frac{1-0}{+\infty} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

A reta de equação $y=0$ é assíntota horizontal ao gráfico de g .

23.2. Para $x > -1$, $g(x) = x + \ln(1+x^2)$

$$g'(x) = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= \frac{2 \times (1+x^2) - 2x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2+2x^2-4}{(1+x^2)^2} = \\ &= \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$g''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2-2x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1, \text{ uma vez que estamos a estudar } g \text{ em }]-1, +\infty[.$$

x	-1		1	$+\infty$
g''		+	0	-
g		∪	P.I.	∩

O gráfico de g tem a concavidade voltada para cima em $]-1,1]$ e tem a concavidade voltada para baixo em $[1, +\infty[$.

$$g(1) = 1 + \ln(1+1^2) = 1 + \ln(2)$$

O ponto de coordenadas $(1, 1 + \ln(2))$ é ponto de inflexão do gráfico de g .

24. Modelo matemático relativo ao decaimento radioativo: $m(t) = m_0 e^{-kt}$, $k \in \mathbb{R}^+$

$$\begin{aligned} m(11,7) = 20 &\Leftrightarrow 30e^{-11,7k} = 20 \Leftrightarrow e^{-11,7k} = \frac{2}{3} \\ &\Leftrightarrow -11,7k = \ln\left(\frac{2}{3}\right) \\ &\Leftrightarrow k = \frac{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}{-11,7} \\ &\Leftrightarrow k \approx 0,035 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 m(t) = 15 &\Leftrightarrow 30e^{-0,035t} = 15 \Leftrightarrow e^{-0,035t} = \frac{1}{2} \\
 &\Leftrightarrow -0,035t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &\Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{-0,035} \\
 &\Leftrightarrow t \approx 7,4 \text{ dias}
 \end{aligned}$$

25.

25.1. Como a taxa de variação $P'(t)$, da população $P(t)$, existente ao fim de t anos, é diretamente proporcional a $P(t)$, sendo a constante de proporcionalidade igual a $-0,0013$, então $P'(t) = -0,0013P(t)$. Além disso, sabemos que toda e qualquer solução desta equação é do tipo $P(t) = ce^{-0,0013t}$, onde $c = P(0) = P_0$. Logo, $P(t) = P_0e^{-0,0013t}$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{25.2.} \quad P(t) = 0,6P_0 &\Leftrightarrow P_0e^{-0,0013t} = 0,6P_0 \Leftrightarrow e^{-0,0013t} = 0,6 \\
 &\Leftrightarrow -0,0013t = \ln(0,6) \\
 &\Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,6)}{-0,0013} \\
 &\Leftrightarrow t \approx 393 \text{ anos}
 \end{aligned}$$

Ao fim de 393 anos, aproximadamente.

Exercícios propostos (págs. 286 a 308)

Itens de seleção (págs. 286 a 289)

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.} \quad 200 \times 2^{0,4t} &= 204\,800 \Leftrightarrow 2^{0,4t} = \frac{204\,800}{200} \Leftrightarrow 2^{0,4t} = 1024 \\
 &\Leftrightarrow 0,4t = \log_2(1024) \\
 &\Leftrightarrow t = \frac{10}{0,4} \\
 &\Leftrightarrow t = 25
 \end{aligned}$$

Opção (C)

$$\mathbf{2.} \quad 2 \ln(e^6) = 2 \times 6 \ln(e) = 2 \times 6 = 12$$

Opção (C)

$$\mathbf{3.} \quad \ln(x) = -10 \Leftrightarrow x = e^{-10} \wedge x > 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e^{10}} \wedge x > 0 \Leftrightarrow x = \left(\frac{1}{e}\right)^{10}$$

$$\text{C. S.} = \left\{ \left(\frac{1}{e}\right)^{10} \right\}$$

Opção (D)

$$4. g(x) = e \Leftrightarrow g(x) - e = 0 \Leftrightarrow 2^x + \log(x) - e = 0$$

$$\text{Seja } h(x) = 2^x + \log(x) - e.$$

$$h(1) = 2 + \log(1) - e = 2 - e < 0$$

$$h(2) = 2^2 + \log(2) - e = 4 + \log(2) - e > 0$$

Como h é contínua em todo o seu domínio (por se tratar da adição e da diferença de funções contínuas), em particular, é contínua no intervalo $[1,2]$ e, como $h(1) < 0 < h(2)$, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, $\exists c \in]1,2[: h(c) = 0$.

Provar a existência de pelo menos um zero da função h , no referido intervalo, é o mesmo que provar que a equação do enunciado tem pelo menos uma solução no intervalo $]1,2[$, conforme solicitado.

Opção (A)

$$5. e^{-\ln(k)-1} = e^{\ln(k^{-1})} \times e^{-1} = k^{-1} \times \frac{1}{e} = \frac{1}{ke}$$

Opção (D)

$$6. g(-4) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow f(-4+k) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow 2^{-4+k} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2^{-4+k} = -\frac{3}{2} + 2$$

$$\Leftrightarrow 2^{-4+k} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2^{-4+k} = 2^{-1}$$

$$\Leftrightarrow -4 + k = -1$$

$$\Leftrightarrow k = -1 + 4$$

$$\Leftrightarrow k = 3$$

Opção (A)

$$7. f(x) = \log_4(16\sqrt[3]{x}) = \log_4(16) + \log_4\left(x^{\frac{1}{3}}\right) = 2 + \frac{1}{3}\log_4(x) = 2 + \frac{\log_4(x)}{3} = \frac{6+\log_4(x)}{3}$$

Opção (C)

$$8. \log(u) = -\log(v) \Leftrightarrow \log(u) = \log(v^{-1}) \Leftrightarrow u = v^{-1} \quad \wedge \quad u, v \in \mathbb{R}^+$$

$$u = \frac{1}{v} \quad \wedge \quad u, v \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow u \times v = 1 \quad \wedge \quad u, v \in \mathbb{R}^+$$

Opção (B)

$$9. 3y = \log_2(x) \Leftrightarrow 2^{3y} = x \Leftrightarrow (2^3)^y = x \Leftrightarrow x = 8^y$$

Opção (B)

$$\begin{aligned}
 10. \log\left(\sqrt{\frac{a^3\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a^4}\sqrt{a}}}\right) &= \log\left(\sqrt{\frac{a^3a^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{a^{\frac{1}{3}}}\frac{1}{a^{\frac{1}{4}}}}}\right) = \log\left(\sqrt{\frac{a^{\frac{7}{2}}}{a^{\frac{1}{12}}}}\right) = \\
 &= \log\left(\sqrt{a^{\frac{7}{2} - \frac{1}{12}}}\right) = \log\left(\sqrt{a^{\frac{35}{12}}}\right) = \\
 &= \log(a)^{\frac{35}{24}} = \frac{35}{24}\log(a) = \frac{35}{24}m
 \end{aligned}$$

Opção (D)

$$11. \ln(x) = y\ln(3) \Leftrightarrow \ln(x) = \ln(3^y) \Leftrightarrow x = 3^y \Leftrightarrow \log_3(x) = y$$

Opção (A)

$$12. D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 > 0 \wedge x > 0\} = \mathbb{R}^+$$

Opção (C)

$$13. D_f = \{x \in \mathbb{R}: x - 2 > 0 \wedge e^{x-5} - 1 \neq 0\} =]2, +\infty[\setminus \{5\}$$

Cálculo auxiliar

$$\begin{aligned}
 e^{x-5} - 1 = 0 &\Leftrightarrow e^{x-5} = 1 \Leftrightarrow e^{x-5} = e^0 \\
 &\Leftrightarrow x - 5 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = 5
 \end{aligned}$$

Opção (C)

$$14. 4^x = 5^x \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{C. S.} = \{0\}$$

Opção (B)

$$15. \log_{\sqrt{x}}(3) = 1 \Leftrightarrow 3 = \sqrt{x} \wedge x > 0 \Rightarrow x = 9$$

$$\text{C. S.} = \{9\}$$

Opção (B)

$$16. P(1) = 3^{4 \times 1} = 3^4 = 81$$

Opção (B)

$$17. \text{Se } \lim f(x_n) = -\infty, \text{ então } x_n \rightarrow 1^-.$$

$$\lim \left[\ln \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right] \right] = 1^-$$

Opção (A)

$$18. \lim \left[1 + \frac{(-1)^n}{n} \right] = 1$$

$$\lim \left(1 + \frac{2}{n} \right)^n = e^2$$

$$\lim \left(\frac{1}{n} \right) = 0$$

$$\lim \left(\frac{n^2 - n + 2}{n} \right) = \lim \frac{n(n-1+\frac{2}{n})}{n} = +\infty$$

$$f(e^2) = \ln(e^2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Opção (B)

$$19. f(a) = e^a + 5$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = e^a + 5$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (\ln(x) + e^x) = \ln(a) + e^a$$

$$\ln(a) + e^a = e^a + 5 \Leftrightarrow \ln(a) = 5$$

$$\Leftrightarrow a = e^5$$

Opção (B)

$$20. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3^{\frac{1}{x}} \right) = 3^{\frac{1}{+\infty}} = 3^{0^+} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3^{\frac{1}{x}} \right) = 3^{\frac{1}{0^+}} = 3^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(3^{\frac{1}{x}} \right) = 3^{\frac{1}{0^-}} = 3^{-\infty} = 0$$

Opção (D)

$$21. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3e^x + 3}{x} = \frac{-3 \times e^{-\infty} + 3}{-\infty} = \frac{-3 \times 0 + 3}{-\infty} = \frac{3}{-\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3e^x + 3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3(e^x - 1)}{x} = -3 \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x}}_{\text{limite notável}} = -3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln(2x+1)]^2 - \ln(2x+1)^3}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln(2x+1)]^2 - 3\ln(2x+1)}{2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(2x+1)[\ln(2x+1) - 3]}{2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(2x+1)}{2x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(2x+1) - 3] = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{2 \times \frac{e^y - 1}{2}} \times (-3) = \\ &= \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} \times (-3) = \\ &= -3 \end{aligned}$$

Opção (B)

$$\begin{aligned}
 22. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^2 + kx + 1)e^x - 1}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 e^x + kx e^x + e^x - 1}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 e^x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx e^x}{x} + \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x}}_{\text{limite notável}} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x e^x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} (k e^x) + 1 = \\
 &= k + 1
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(kx + e) - 1}{x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(kx + e) - 1 \Leftrightarrow y + 1 = \ln(kx + e)$

$$\Leftrightarrow e^{y+1} = kx + e \Leftrightarrow \frac{e^{y+1} - e}{k} = x: \text{ se } x \rightarrow 0^+, \text{ então } y \rightarrow 0^+.$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\frac{y}{e^{y+1} - e}}{\frac{1}{k}} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{ky}{e^{y+1} - e} = \\
 &= k \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{e^{y+1} - e} = \\
 &= k \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{e(e^{y-1})} = \\
 &= \frac{k}{e} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{e^{y-1}} = \\
 &= \frac{k}{e} \times \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{e^{y-1}}{y}} = \\
 &= \frac{k}{e}
 \end{aligned}$$

$$k + 1 = \frac{k}{e} \Leftrightarrow k - \frac{k}{e} = -1 \Leftrightarrow k \left(1 - \frac{1}{e}\right) = -1$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-1}{1 - \frac{1}{e}}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-1}{\frac{e-1}{e}}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-e}{e-1}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{e}{1-e}$$

Opção (A)

$$23. m_t = \operatorname{tg}(135^\circ) \Leftrightarrow m_t = -1$$

$$g'(x) = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$$

$$g'(a) = \frac{1}{a}$$

$$g'(a) = -1 \Leftrightarrow \frac{1}{a} = -1 \Leftrightarrow a = -1$$

Opção (A)

$$24. i'(x) = \frac{e^x \times x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$$i'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x(x-1)}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x(x-1) = 0 \wedge x^2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{e^x = 0}_{\text{equação impossível}} \vee x-1 = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

$$i(1) = \frac{e}{1} = e \quad (1, e)$$

Logo, a reta de equação $y = e$ é tangente ao gráfico de i .

Opção (D)

$$\begin{aligned} 25. \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 &= \frac{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} - (e^{2x} - 2e^x e^{-x} + e^{-2x})}{4} = \\ &= \frac{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} - e^{2x} + 2e^x e^{-x} - e^{-2x}}{4} = \\ &= \frac{4}{4} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

Opção (B)

$$26. a^{\frac{\log_b(c)}{\log_b(a)}} = a^{\log_a(c)} = c$$

Opção (A)

$$27. D_f = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x-2}{x-3} > 0 \wedge x-3 \neq 0\right\}$$

x	$-\infty$	2		3	$+\infty$
$x-2$	-	0	+	+	+
$x-3$	-	-	-	0	+
$\frac{x-2}{x-3}$	+	0	-	n.d.	+

$$D_f =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$$

Opção (B)

$$\begin{aligned} 28. g(a) &= \ln[(e \times a^3)^5] = \ln(e^5 \times a^{15}) = \\ &= \ln(e^5) + \ln(a^{15}) = \\ &= 5 + 15 \ln(a) = \\ &= 5 + 15k = \\ &= 15k + 5, \text{ uma vez que } \ln(a) = k. \end{aligned}$$

Opção (A)

29. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(x-5)^2 + \log(x+5)^2 - \log(25) = \\ &= \log \left[\frac{(x-5)^2 \times (x+5)^2}{25} \right] \\ \log \left[\frac{(x-5)^2 \times (x+5)^2}{25} \right] &= 0 \Leftrightarrow \frac{(x-5)^2 \times (x+5)^2}{25} = 10^0 \\ &\Leftrightarrow (x-5)^2 \times (x+5)^2 = 25 \\ &\Leftrightarrow (x-5)^2 \times (x+5)^2 - 25 = 0 \\ &\Leftrightarrow [(x-5)(x+5)]^2 - 5^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-5)(x+5) - 5 = 0 \vee (x-5)(x+5) + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 25 - 5 = 0 \vee x^2 - 25 + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 30 = 0 \vee x^2 - 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \pm\sqrt{30} \vee x = \pm\sqrt{20} \end{aligned}$$

Opção (D)

$$\begin{aligned} 30. \log_b \left(\frac{a^4}{\sqrt[4]{b}} \right) &= \log_b(a^4) - \log_b \left(b^{\frac{1}{4}} \right) = \\ &= 4 \log_b(a) - \frac{1}{4} \log_b(b) = \\ &= 4 \times \frac{\log_a(a)}{\log_a(b)} - \frac{1}{4} = \\ &= 4 \times \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \\ &= \frac{13}{12} \end{aligned}$$

Opção (A)

$$\begin{aligned} 31. e^{2x} &= a \Leftrightarrow 2x = \ln(a) \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\ln(a)}{2} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln(a) \\ &\Leftrightarrow x = \ln \left(a^{\frac{1}{2}} \right) \\ &\Leftrightarrow x = \ln(\sqrt{a}) \\ f(\ln(\sqrt{a})) &= e^{2 \ln(\sqrt{a})} = \\ &= e^{\ln(a)} = \\ &= a \end{aligned}$$

Assim, o gráfico da função f intersesta a reta de equação $y = a$ no ponto de coordenadas $(\ln(\sqrt{a}), a)$.

Opção (C)

32. $g(x) = \log_2(x)$

$$g'(x) = \frac{1}{x \ln(2)}$$

$$f'(2) = \ln(2)$$

$$g'(4) = \frac{1}{4 \ln(2)}$$

$$g(4) = \log_2(4) = 2$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(4) &= g'(4) \times f'(g(4)) = \frac{1}{4 \ln(2)} \times f'(2) = \\ &= \frac{\ln(2)}{4 \ln(2)} = \\ &= \frac{\ln(2)}{\ln(2^4)} = \\ &= \frac{\ln(2)}{\ln(16)} \end{aligned}$$

Opção (A)

33. $D_h = \mathbb{R}^+$

$$h'(x) = f'(x) + \frac{1}{x}$$

Como f é uma função quadrática, então f' é uma função afim.

$$h''(x) = f''(x) - \frac{1}{x^2}$$

Como f' é uma função afim, então é uma função constante. Além disso, o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em \mathbb{R} , logo $f''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Assim, o gráfico de h'' obtém-se do gráfico da função cuja expressão analítica é $y = -\frac{1}{x^2}$ através de uma translação de vetor $(0, k)$, com $k \in \mathbb{R}^+$.

Opção (C)

Itens de construção (págs. 290 a 308)

1.

1.1. $(27)^{\frac{2}{3}} = (3^3)^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$

1.2. $\left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{1}{3^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{(3^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$

1.3. $8^{\frac{2}{3}} + 16^{\frac{3}{4}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} + (2^4)^{\frac{3}{4}} = 2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$

1.4. $3^3 \times 3^{-2} = 3$

1.5. $4^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{2}{3}} = (4 \times 2)^{\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$

1.6. $(3^2)^{\frac{5}{2}} = 3^5 = 243$

$$1.7. \left(e^2 \times e^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(e^{2+\frac{3}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(e^{\frac{7}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} = e^{\frac{14}{3}}$$

$$1.8. \left(\frac{\pi^2}{\sqrt{\pi}}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(\frac{\pi^2}{\pi^{\frac{1}{2}}}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(\pi^{2-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(\pi^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{4}{3}} = \pi^2$$

$$1.9. \left(\frac{27}{64}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{64}{25}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{(3^3)^{\frac{2}{3}}}{(2^6)^{\frac{2}{3}}} \times \frac{(2^6)^{\frac{3}{2}}}{(5^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3^2}{2^4} \times \frac{2^9}{5^3} = \frac{288}{125}$$

$$1.10. \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{125}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{5^3}{2^3}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \times \frac{(2^3)^{\frac{2}{3}}}{(5^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{2}{3} \times \frac{2^2}{5^2} = \frac{8}{75}$$

2.

$$2.1. \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$$

$$2.2. \left(x^{\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{3}{4}} = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$2.3. \left(x^{-\frac{7}{8}}\right)^{-\frac{8}{7}} = x$$

$$2.4. \left(x^{\frac{5}{6}}\right)^{-\frac{6}{5}} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$2.5. (27x^6)^{\frac{2}{3}} = 27^{\frac{2}{3}} \times (x^6)^{\frac{2}{3}} = (3^3)^{\frac{2}{3}} \times x^{6 \times \frac{2}{3}} = 3^2 \times x^4 = 9x^4$$

$$2.6. (8x^2y^3)^{\frac{1}{3}} = 8^{\frac{1}{3}} \times x^{2 \times \frac{1}{3}} \times y^{3 \times \frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} \times x^{\frac{2}{3}} \times y = 2\sqrt[3]{x^2y}$$

$$2.7. \left(\frac{x^2y^3}{x^0}\right)^{\frac{1}{6}} = (x^2)^{\frac{1}{6}} \times (y^3)^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{3}} \times y^{\frac{1}{2}} = \sqrt[3]{x}\sqrt{y}$$

$$2.8. (z^{2012})^{\frac{1}{1006}} \times (x^{10} + y^{20})^0 = z^{\frac{2012}{1006}} \times 1 = z^2$$

3.

$$\begin{aligned} 3.1. \log_2(12) + \log_2(20) - \log_2(15) &= \log_2(12 \times 20) - \log_2(15) = \\ &= \log_2(240) - \log_2(15) = \\ &= \log_2\left(\frac{240}{15}\right) = \\ &= \log_2(16) = \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.2. \log_5(12) - \log_5(15) - 2\log_5(2) &= \log_5\left(\frac{12}{15}\right) - \log_5(2^2) = \\ &= \log_5\left(\frac{4}{5}\right) - \log_5 4 = \\ &= \log_5\left(\frac{1}{5}\right) = \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3.3. \log_5 \left(\frac{25}{2} \right) + \frac{1}{2} \log_5(4) &= \log_5 \left(\frac{25}{2} \right) + \log_5 \left(4^{\frac{1}{2}} \right) = \\
 &= \log_5 \left(\frac{25}{2} \right) + \log_5(2) = \\
 &= \log_5(25) = \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3.4. \log_3 \left(\frac{2}{27} \right) + \log_3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) &= \log_3 \left(\frac{2}{27} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \\
 &= \log_3 \left(\frac{\sqrt{3}}{27} \right) = \\
 &= \log_3 \left(\frac{3^{\frac{1}{2}}}{3^3} \right) = \\
 &= \log_3(3^{-\frac{5}{2}}) = \\
 &= -\frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3.5. \log_2 \frac{16^{31} \times 256^2 \times \sqrt{128}}{4^{70} \times \sqrt[4]{8}} &= \log_2 \left(\frac{(2^4)^{31} \times (2^8)^2 \times 2^{\frac{3}{2}}}{(2^2)^{70} \times \sqrt[4]{2^3}} \right) = \\
 &= \log_2 \left(\frac{2^{143} \times \sqrt{2}}{2^{140} \times 2^{\frac{3}{4}}} \right) = \\
 &= \log_2 \left(2^3 \times \frac{2^{\frac{2}{2}}}{2^{\frac{3}{4}}} \right) = \\
 &= \log_2 \left(2^3 \times 2^{-\frac{1}{4}} \right) = \\
 &= \log_2 \left(2^{\frac{11}{4}} \right) = \\
 &= \frac{11}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3.6. \log(\sqrt{10} + 3) + \log(\sqrt{10} - 3) &= \log((\sqrt{10} + 3)(\sqrt{10} - 3)) = \\
 &= \log(10 - 9) = \\
 &= \log(1) = \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 4.1. 3^x - 3 &= 0 \Leftrightarrow 3^x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \\
 x &\in \{1\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4.2. 3^x - 3 &> 0 \Leftrightarrow 3^x > 3 \Leftrightarrow x > 1 \\
 x &\in]1, +\infty[
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4.3. 3^x - 3 &< 0 \Leftrightarrow 3^x < 3 \Leftrightarrow x < 1 \\
 x &\in]-\infty, 1[
 \end{aligned}$$

5.

$$5.1. \log_5(x+6) = 0 \wedge x > -6 \Leftrightarrow x+6 = 5^0 \wedge x > -6$$

$$\Leftrightarrow x = -5 \wedge x > -6$$

$$x \in \{-5\}$$

$$5.2. \log_5(x+6) > 0 \wedge x > -6 \Leftrightarrow \log_5(x+6) > \log_5 1 \wedge x > -6$$

$$\Leftrightarrow x+6 > 1 \wedge x > -6$$

$$\Leftrightarrow x > -5 \wedge x > -6$$

$$C.S. =]-5, +\infty[$$

$$5.3. \log_5(x+6) < 0 \wedge x > -6 \Leftrightarrow \log_5(x+6) < \log_5 1 \wedge x > -6$$

$$\Leftrightarrow x+6 < 1 \wedge x > -6$$

$$\Leftrightarrow x < -5 \wedge x > -6$$

$$C.S. =]-6, -5[$$

6.

$$6.1. 3^{1+\log_3(x)} = 3^{\log_3(3)+\log_3(x)} = 3^{\log_3(3x)} = 3x$$

$$6.2. 4^{3\log_4(x)} = 4^{\log_4(x^3)} = x^3$$

$$6.3. 5^{6\log_5(x)-2\log_5(x)} = 5^{\log_5(x^6)-\log_5(x^2)} = 5^{\log_5\left(\frac{x^6}{x^2}\right)} = x^4$$

7.

$$7.1. 3^{5x-1} = 3^{2-x} \Leftrightarrow 5x-1 = 2-x \Leftrightarrow 6x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$C.S. = \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

$$7.2. 2^x = 64 \Leftrightarrow 2^x = 2^6 \Leftrightarrow x = 6$$

$$C.S. = \{6\}$$

$$7.3. 8^x = \frac{1}{32} \Leftrightarrow 2^{3x} = 2^{-5} \Leftrightarrow 3x = -5 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{3}$$

$$C.S. = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$$

$$7.4. (\sqrt{5})^x = \sqrt[4]{125} \Leftrightarrow \left(5^{\frac{1}{2}}\right)^x = (5^3)^{\frac{1}{4}}$$

$$\Leftrightarrow 5^{\frac{1}{2}x} = 5^{\frac{3}{4}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}x = \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{6}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$C.S. = \left\{\frac{3}{2}\right\}$$

8.

$$8.1. 2^{3x-1} \leq 32 \Leftrightarrow 2^{3x-1} \leq 2^5 \Leftrightarrow 3x - 1 \leq 5$$

$$\Leftrightarrow 3x \leq 6$$

$$\Leftrightarrow x \leq 2$$

$$C.S. =]-\infty, 2]$$

$$8.2. e^{-0,1x+3} \geq 1 \Leftrightarrow -0,1x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow -0,1x \geq -3$$

$$\Leftrightarrow 0,1x \leq 3$$

$$\Leftrightarrow x \leq \frac{3}{0,1}$$

$$\Leftrightarrow x \leq 30$$

$$C.S. =]-\infty, 30]$$

$$8.3. 7^{3x+4} < 49^{2x-3} \Leftrightarrow 7^{3x+4} < (7^2)^{2x-3} \Leftrightarrow 7^{3x+4} < 7^{4x-6}$$

$$\Leftrightarrow 3x + 4 < 4x - 6$$

$$\Leftrightarrow -x < -10$$

$$\Leftrightarrow x > 10$$

$$C.S. =]10, +\infty[$$

$$8.4. 5^{2x^2+3x-2} > 1 \Leftrightarrow 5^{2x^2+3x-2} > 5^0 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 2 > 0$$

Cálculo auxiliar

$$2x^2 + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 2 \times (-2)}}{2 \times 2} \Leftrightarrow x = -2 \vee x = \frac{1}{2}$$

$$C.S. =]-\infty, -2[\cup]\frac{1}{2}, +\infty[$$

9.

$$9.1. D = \{x \in \mathbb{R}: x + 1 > 0\} =]-1, +\infty[$$

$$\log(x + 1) = 1 \Leftrightarrow x + 1 = 10 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 9 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{9\}$$

$$9.2. \log_a \left(\frac{625}{16} \right) = \log_a a^4 \Leftrightarrow \frac{625}{16} = a^4 \Leftrightarrow a = \pm \sqrt[4]{\frac{625}{16}} \wedge a > 0$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{5}{2}$$

$$C.S. = \left\{ \frac{5}{2} \right\}$$

$$9.3. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$\ln(x) - \ln(4) = 1 \Leftrightarrow \ln(x) = \ln(e) + \ln(4) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = \ln(4e) \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{4e\}$$

$$9.4. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$3\log_3(2) + \log_3(x) = -1 \Leftrightarrow \log_3(8) + \log_3(x) = \log_3(3^{-1}) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_3(8x) = \log_3\left(\frac{1}{3}\right) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 8x = \frac{1}{3} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{24} \wedge x \in D$$

$$C.S. = \left\{\frac{1}{24}\right\}$$

$$9.5. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \wedge 2 - x > 0\} =]0, 2[$$

$$\ln(x) + \ln(2 - x) = \ln(5) \Leftrightarrow \ln(2x - x^2) = \ln(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2x - x^2 = 5 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 2x - 5 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{-2} \wedge x \in D$$

condição impossível em \mathbb{R}

$$C.S. = \{\emptyset\}$$

$$9.6. D = \{x \in \mathbb{R}: 2x > 0 \wedge -3x + 5 > 0\} = \left]0, \frac{5}{3}\right[$$

Cálculo auxiliar

$$2x > 0 \wedge -3x + 5 > 0 \Leftrightarrow x > 0 \wedge -3x > -5$$

$$\Leftrightarrow x > 0 \wedge 3x < 5$$

$$\Leftrightarrow x > 0 \wedge x < \frac{5}{3}$$

$$\log_5(2x) = \log_5(-3x + 5) \Leftrightarrow 2x = -3x + 5 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 5x = 5 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{1\}$$

$$9.7. D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - 4 > 0 \wedge 2 - x > 0\} = (]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[) \cap]-\infty, 2[=]-\infty, -2[$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 4 > 0 \wedge 2 - x > 0 \Leftrightarrow x^2 > 4 \wedge x < 2$$

$$\Leftrightarrow x < -2 \wedge x > 2 \wedge x < 2$$

$$\log_4(x^2 - 4) = \log_4(2 - x) \Leftrightarrow x^2 - 4 = 2 - x \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - 6 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \vee x = -3 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{-3\}$$

$$9.8. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$5 = \log_4(x) \Leftrightarrow x = 4^5 \wedge x \in D \Leftrightarrow x = 1024 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{1024\}$$

$$9.9. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$\log_2(x) = 16 \Leftrightarrow x = 2^{16} \wedge x \in D \Leftrightarrow x = 65\,536 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{65\,536\}$$

$$9.10. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \wedge x \neq 1\} =]0, +\infty[\setminus\{1\}$$

$$\log_x(16) = 2 \Leftrightarrow x^2 = 16 \wedge x \in D \Leftrightarrow (x = 4 \vee x = -4 \wedge x \in D)$$

$$C.S. = \{4\}$$

$$9.11. D = \mathbb{R}^+$$

$$\ln(2x) = \ln(x + 10) \Leftrightarrow 2x = x + 10 \wedge x \in D \Leftrightarrow x = 10 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{10\}$$

$$9.12. D = \{x \in \mathbb{R}: 1 - x > 0 \wedge x^2 - 4x + 3 > 0\} =]-\infty, 1[\cap (]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[) =]-\infty, 1[$$

Cálculo auxiliar

$$1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

$$x \in]-\infty, 1[$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \pm 2}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \vee x = 1$$

$$x^2 - 4x + 3 > 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$$

$$\log(1 - x) = \log(x^2 - 4x + 3) \Leftrightarrow 1 - x = x^2 - 4x + 3 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = 2 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \emptyset$$

10.

$$10.1. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} =]0, +\infty[$$

$$\ln(x) < 3 \Leftrightarrow x < e^3 \wedge x \in D$$

$$C.S. =]0, e^3[$$

$$10.2. D = \{x \in \mathbb{R}: x + 3 > 0\} =]-3, +\infty[$$

$$\ln(x + 3) < 0 \Leftrightarrow x + 3 < 1 \wedge x \in D \Leftrightarrow x < -2 \wedge x \in D$$

$$C.S. =]-3, -2[$$

11.

$$11.1. H(100) = 2^{21-0,2 \times 100} = 2 \text{ horas}$$

$$11.2. H(d) = 8 \Leftrightarrow 2^{21-0,2d} = 8 \Leftrightarrow 2^{21-0,2d} = 2^3$$

$$\Leftrightarrow 21 - 0,2d = 3$$

$$\Leftrightarrow d = 90 \text{ decibéis}$$

12.

$$12.1. H(0) = \frac{3}{2} + \log_3(0 + 1) = 1,5 \text{ metros}$$

$$12.2. H(t) = 3,5 \wedge t > 0$$


$$\frac{3}{2} + \log_3(t + 1) = 3,5 \Leftrightarrow \log_3(t + 1) = 2$$

$$\Leftrightarrow t + 1 = 3^2$$

$$\Leftrightarrow t + 1 = 9$$

$$\Leftrightarrow t = 8 \text{ anos}$$

12.3. 46 anos



13.

13.1. Para $x < 1$, f é contínua, pois resulta de operações entre funções contínuas;Para $x > 1$, f é contínua, pois resulta de operações entre funções contínuas;Para $x = 1$:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} [\ln(2 - x) + x] = \ln(2 - 1) + 1 = \ln(1) + 1 = 1$$


$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} (e^{1-x}) = e^{1-1} = e^0 = 1$$

$$\bullet f(1) = e^{1-1} = e^0 = 1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, f é contínua para $x = 1$.Logo, f é contínua em todo o seu domínio.13.2. Na alínea anterior, vimos que f é contínua em todo o seu domínio. Em particular, f é contínua em $[-2, -1]$.

$$f(-2) = \ln(2 - (-2)) + (-2) = \ln(4) - 2 < 0$$

$$f(-1) = \ln(2 - (-1)) + (-1) = \ln(3) - 1 > 0$$

Como f é contínua em $[-2, -1]$ e, como $f(-2) < 0 < f(-1)$, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, $\exists c \in]-2, -1[: f(c) = 0$.13.3. $x = -1,15$ 

13.4. Como f é contínua em todo o seu domínio, não existem assíntotas verticais ao seu gráfico.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [\ln(2-x) + x] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{1-x}) = e^{1-(+\infty)} = e^{-\infty} = 0$$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.

14. $g'(x) = -2x + a + \frac{b}{x+1}$

$$\begin{aligned} \begin{cases} g'(0) = 0 \\ g'\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -2 \times 0 + a + \frac{b}{0+1} = 0 \\ -2 \times \frac{3}{2} + a + \frac{b}{\frac{3}{2}+1} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0 \\ -3 + a + \frac{2}{5}b = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = -b \\ -3 - b + \frac{2}{5}b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{3}{5}b = 3 \\ b = \frac{3}{-\frac{3}{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -5 \\ a = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

15.

15.1. $M(0) = 30$ $M(30) = 30e^{-0,01 \times 30}$

$$M(30) - M(0) = 30 - 30e^{-0,3} \approx 8 \text{ gramas}$$

15.2. $M'(t) = 30 \times (-0,01) \times e^{-0,01t} = -0,3e^{-0,01t}$

Como $M'(t) < 0, \forall t \geq 0$, M é uma função estritamente decrescente em todo o seu domínio.

Como $\lim_{t \rightarrow +\infty} (30e^{-0,01t}) = 0$, então $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de M .

Logo, a quantidade de sal presente no recipiente tende a ser completamente dissolvida.

16.

16.1. C é uma função contínua em todo o seu domínio, por resultar de operações entre funções contínuas. Em particular, C é contínua em $[0,5; 1]$.

$$C(0,5) = 3 \times 0,5 \times e^{-0,2 \times 0,5} \approx 1,357$$

$$C(1) = 3 \times 1 \times e^{-0,2 \times 1} \approx 2,456$$

Como C é contínua em $[0,5; 1]$ e, como $C(0,5) < 2 < C(1)$, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, $\exists c \in]0,5; 1[: f(c) = 2$.

16.2. $C'(t) = 3 \times e^{-0,2t} + 3t \times (-0,2) \times e^{-0,2t} = 3e^{-0,2t}(1 - 0,2t)$

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 3e^{-0,2t}(1 - 0,2t) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{3e^{-0,2t} = 0}_{\text{equação impossível}} \vee 1 - 0,2t = 0 \Leftrightarrow t = 5 \text{ horas}$$

t	0		5	$+\infty$
Sinal de C'	+	+	0	—
Variação de C	mín.	—	Máx.	+

$t = 0$ corresponde às 6 horas da manhã.

$t = 5$ corresponde às 11 horas da manhã.

Logo, a concentração de analgésico foi máxima às 11 horas da manhã.

17.

17.1. $E(0) = 27$ eucaliptos

$$E(10) = 27 \times 1,3^{\frac{10}{2}} \approx 100 \text{ eucaliptos}$$

17.2. $E(t) = 81 \Leftrightarrow 27 \times 1,3^{\frac{t}{2}} = 81 \Leftrightarrow 1,3^{\frac{t}{2}} = 3 \Leftrightarrow \frac{t}{2} = \log_{1,3}(3) \Leftrightarrow t \approx 8,375$

São necessários 8 anos e 4 meses e meio, aproximadamente.

17.3. $E'(t) = 27 \times 1,3^{\frac{t}{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{27}{2} \times \ln(1,3) = \frac{27 \ln(1,3)}{2} \times 1,3^{\frac{t}{2}}$

$$E'(1) = \frac{27 \ln(1,3)}{2} \times 1,3^{\frac{1}{2}} = 4 \text{ eucaliptos/ano}$$

$$E'(10) = \frac{27 \ln(1,3)}{2} \times 1,3^5 = 13 \text{ eucaliptos/ano}$$

Significa que, um ano depois do início da contagem, o número de eucaliptos está a aumentar à taxa de 4 eucaliptos por ano, enquanto que, 10 anos após o início da contagem, o crescimento é mais rápido, visto o número de eucaliptos estar a aumentar à taxa de 13 eucaliptos por ano.

18.

18.1. $64^{\log_2(x)} = (2^6)^{\log_2(x)} = 2^{\log_2(x^6)} = x^6$

18.2. $\log_3(9^x) = \log_3(3^2)^x = \log_3(3^{2x}) = 2x$

18.3. $10^{3 \log(x^2) - 5 \log(x)} = 10^{\log(x^6) - \log(x^5)} = 10^{\log(x)} = x$

19.

19.1. $D_f = D'_{f^{-1}} = \mathbb{R}$

$$f(x) = y \Leftrightarrow 3^{x+1} = y \Leftrightarrow x + 1 = \log_3(y) \Leftrightarrow x = -1 + \log_3(y)$$

$$\text{Logo, } f^{-1}(x) = -1 + \log_3(x).$$

$$D_{f^{-1}} = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -1 + \log_3(x)$$

19.2. $D_g = D'_{g^{-1}} = \{x \in \mathbb{R}: x + 4 > 0\} =]-4, +\infty[$

$$g(x) = y \Leftrightarrow 2 + \log(x + 4) = y \Leftrightarrow \log(x + 4) = y - 2$$

$$\Leftrightarrow x + 4 = 10^{y-2}$$

$$\Leftrightarrow x = -4 + 10^{y-2}$$

$$\text{Logo, } g^{-1}(x) = -4 + 10^{x-2}.$$

$$D_{g^{-1}} = \mathbb{R}$$

$$g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow]-4, +\infty[$$

$$x \mapsto -4 + 10^{x-2}$$

$$19.3. D_h = D'_{h^{-1}} = \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} h(x) = y &\Leftrightarrow 1 - 6 \times 4^{2x+3} = y \Leftrightarrow 6 \times 4^{2x+3} = 1 - y \Leftrightarrow 4^{2x+3} = \frac{1-y}{6} \\ &\Leftrightarrow 2x + 3 = \log_4 \left(\frac{1-y}{6} \right) \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-3 + \log_4 \left(\frac{1-y}{6} \right)}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Logo, } h^{-1}(x) = \frac{-3 + \log_4 \left(\frac{1-x}{6} \right)}{2}.$$

$$D_{h^{-1}} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1-x}{6} > 0 \right\} =]-\infty, 1[$$

$$h^{-1}:]-\infty, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{-3 + \log_4 \left(\frac{1-x}{6} \right)}{2}$$

$$19.4. D_i = D'_{i^{-1}} = \{x \in \mathbb{R} : x - 2 > 0\} =]2, +\infty[$$

$$i(x) = y \Leftrightarrow 6 + 3\log_5(x-2) = y \Leftrightarrow \log_5(x-2) = \frac{y-6}{3} \Leftrightarrow x-2 = 5^{\frac{y-6}{3}} \Leftrightarrow x = 2 + 5^{\frac{y-6}{3}}$$

$$\text{Logo, } i^{-1}(x) = 2 + 5^{\frac{x-6}{3}}.$$

$$D_{i^{-1}} = \mathbb{R}$$

$$i^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow]2, +\infty[$$

$$x \mapsto 2 + 5^{\frac{x-6}{3}}$$

$$20. 27 - 5^{7-2x} > 2 \wedge 27 - 5^{7-2x} < 22 \Leftrightarrow -5^{7-2x} > -25 \wedge -5^{7-2x} < -5$$

$$\Leftrightarrow 5^{7-2x} < 25 \wedge 5^{7-2x} > 5$$

$$\Leftrightarrow 5^{7-2x} < 5^2 \wedge 5^{7-2x} > 5$$

$$\Leftrightarrow 7 - 2x < 2 \wedge 7 - 2x > 1$$

$$\Leftrightarrow -2x < -5 \wedge -2x > -6$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{5}{2} \wedge x < 3$$

$$\text{C.S.} = \left] \frac{5}{2}, 3 \right[$$

21.

$$21.1. 2^{x+5} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 2^{x+5} = 2^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x+5 = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -5 - \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{11}{2}$$

$$\text{C.S.} = \left\{ -\frac{11}{2} \right\}$$

$$21.2. 25^{x^2-2x} = 5^{x^2-3} \Leftrightarrow 5^{2x^2-4x} = 5^{x^2-3} \Leftrightarrow 2x^2 - 4x = x^2 - 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$$

$$\text{C.S.} = \{1, 3\}$$

$$\begin{aligned}
 21.3. \quad 4 \times 5^{3x+1} &= 20 \times 25^{x+4} \Leftrightarrow 5^{3x+1} = 5 \times 5^{2x+8} \\
 &\Leftrightarrow 5^{3x+1} = 5^{2x+9} \\
 &\Leftrightarrow 3x+1 = 2x+9 \\
 &\Leftrightarrow x = 8
 \end{aligned}$$

$$C. S. = \{8\}$$

$$\begin{aligned}
 21.4. \quad x^3 \times 3^x &= 3^{x+3} \Leftrightarrow x^3 \times 3^x - 3^x \times 3^3 = 0 \\
 &\Leftrightarrow 3^x(x^3 - 3^3) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \underbrace{3^x = 0}_{\text{condição impossível}} \vee x^3 - 3^3 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x^3 = 3^3 \\
 &\Leftrightarrow x = 3
 \end{aligned}$$

$$C. S. = \{3\}$$

$$\begin{aligned}
 21.5. \quad 2x \times 5^x &= 5^{x-1} \Leftrightarrow 2x \times 5^x - 5^x \times 5^{-1} = 0 \\
 &\Leftrightarrow 5^x(2x - 5^{-1}) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \underbrace{5^x = 0}_{\text{condição impossível}} \vee 2x - \frac{1}{5} = 0 \\
 &\Leftrightarrow 2x = \frac{1}{5} \\
 &\Leftrightarrow x = \frac{1}{10}
 \end{aligned}$$

$$C. S. = \left\{\frac{1}{10}\right\}$$

$$\begin{aligned}
 21.6. \quad -3^{2x-1} + 28 \times 3^{x-2} &= 1 \Leftrightarrow -3^{2x} \times 3^{-1} + 28 \times 3^x \times 3^{-2} - 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow -3^{2x} \times 3 + 28 \times 3^x - 9 = 0 \\
 &\Leftrightarrow 3^x = \frac{-28 \pm \sqrt{28^2 - 4 \times 3 \times 9}}{-6} = 0 \\
 &\Leftrightarrow 3^x = \frac{28 \pm 26}{6} \\
 &\Leftrightarrow 3^x = 9 \vee 3^x = \frac{1}{3} \\
 &\Leftrightarrow x = 2 \vee x = -1
 \end{aligned}$$

$$C. S. = \{-1, 2\}$$

$$\begin{aligned}
 21.7. \quad \frac{3^x(x^2-x)+4}{3^{x+1}+2} &= 2 \Leftrightarrow 3^x(x^2-x) + 4 = 2 \times 3^{x+1} + 4 \\
 &\Leftrightarrow 3^x(x^2-x) - 6 \times 3^x = 0 \\
 &\Leftrightarrow 3^x(x^2-x-6) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \underbrace{3^x = 0}_{\text{condição impossível}} \vee x^2 - x - 6 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \\
 &\Leftrightarrow x = -2 \vee x = 3
 \end{aligned}$$

$$C. S. = \{-2, 3\}$$

$$21.8. \frac{50}{25^{x^2}+25} = \frac{2}{1+125^{x^2+x}} \Leftrightarrow 50 \times (1 + 125^{x^2+x}) = 2 \times (25^{x^2} + 25)$$

$$\Leftrightarrow 50 + 50 \times 125^{x^2+x} = 2 \times 25^{x^2} + 50$$

$$\Leftrightarrow 2 \times 25 \times 5^{3x^2+3x} = 2 \times 5^{2x^2}$$

$$\Leftrightarrow 5^2 \times 5^{3x^2+3x} = 5^{2x^2}$$

$$\Leftrightarrow 5^{3x^2+3x+2} = 5^{2x^2}$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 3x + 2 = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \vee x = -1$$

$$C. S. = \{-2, -1\}$$

$$21.9. 2^x - 2^{1-x} - 1 = 0 \Leftrightarrow 2^x - \frac{2}{2^x} - 1 = 0 \Leftrightarrow 2^{2x} - 2 - 2^x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} - 2^x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{2^x = -1}_{\text{condição impossível}} \vee 2^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

$$C. S. = \{1\}$$

$$21.10. 3^x + 1 = 10 \times 3^{2-x} \Leftrightarrow 3^x + 1 - 10 \times \frac{9}{3^x} = 0 \Leftrightarrow 3^{2x} + 3^x - 90 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3^x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+360}}{2}$$

$$\Leftrightarrow 3^x = \frac{-1 \pm 19}{2}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{3^x = -10}_{\text{condição impossível}} \vee 3^x = 9$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

$$C. S. = \{2\}$$

22.

$$22.1. e^{2x} - 10 = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = 10 \Leftrightarrow 2x = \ln(10) \Leftrightarrow x = \frac{\ln(10)}{2}$$

$$C. S. = \left\{ \frac{\ln(10)}{2} \right\}$$

$$22.2. (e^x + 1)(e^x - 2) = 0 \Leftrightarrow e^x + 1 = 0 \vee e^x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{e^x = -1}_{\text{equação impossível}} \vee e^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(2)$$

$$C. S. = \{\ln(2)\}$$

$$22.3. (e^x)^2 - 4e^x + 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1} \Leftrightarrow e^x = 1 \vee e^x = 3$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(1) \vee x = \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = \ln(3)$$

$$C.S. = \{0, \ln(3)\}$$

$$22.4. e^x - 3 + 2e^{-x} = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - 3e^x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 1 \vee e^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(1) \vee x = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = \ln(2)$$

$$C.S. = \{0, \ln(2)\}$$

$$22.5. e^2 \times e^{x-2} = 4 \times e^{-x} + 4 \Leftrightarrow e^x - 4 - 4e^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow (e^x)^2 - 4e^x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 2 + 2\sqrt{2} \vee e^x = 2 - 2\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(2 + 2\sqrt{2})$$

$$C.S. = \{\ln(2 + 2\sqrt{2})\}$$

$$22.6. 2e^x - 10 + 12e^{-x} = 0 \Leftrightarrow 2(e^x)^2 - 10e^x + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 3 \vee e^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(3) \vee x = \ln(2)$$

$$C.S. = \{\ln(2), \ln(3)\}$$

23.

$$23.1. \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} < 9^{2-x} \Leftrightarrow 3^{-x+1} < 3^{4-2x} \Leftrightarrow -x+1 < 4-2x \Leftrightarrow x < 3$$

$$C.S. =]-\infty, 3[$$

$$23.2. (0,1)^{x-x^2} \leq 0,01 \Leftrightarrow 10^{-x+x^2} \leq 10^{-2} \Leftrightarrow -x+x^2 \leq -2 \Leftrightarrow x^2 - x + 2 \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1-8}}{2}$$

condição impossível em \mathbb{R}

$$C.S. = \emptyset$$

$$23.3. 3^{x^2} > 9 \Leftrightarrow 3^{x^2} > 3^2 \Leftrightarrow x^2 > 2 \Leftrightarrow x^2 - 2 > 0$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2} \vee x = \sqrt{2}$$

$$C.S. =]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[$$

$$23.4. 5^{-x^2} \leq 125 \Leftrightarrow 5^{-x^2} \leq 5^3 \Leftrightarrow -x^2 \leq 3 \Leftrightarrow -x^2 - 3 \leq 0$$

$$C.S. = \mathbb{R}$$

$$23.5. 3^x \geq 2^x \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^x \geq 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^x \geq \left(\frac{3}{2}\right)^0 \Leftrightarrow x \geq 0$$

$$C. S. = \mathbb{R}_0^+$$

$$23.6. 6^x \geq 7^x \Leftrightarrow \left(\frac{6}{7}\right)^x \geq 1 \Leftrightarrow \left(\frac{6}{7}\right)^x \geq \left(\frac{6}{7}\right)^0 \Leftrightarrow x \leq 0$$

$$C. S. = \mathbb{R}_0^-$$

$$23.7. (5 - x^2) \underbrace{\pi^x \leq 0}_{>0, \forall x \in \mathbb{R}} \Leftrightarrow 5 - x^2 \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$5 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{5} \vee x = \sqrt{5}$$

$$C. S. =]-\infty, -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}, +\infty[$$

$$23.8. 5^{x+1} < x^2 \times 5^x \Leftrightarrow 5^x \times 5 - x^2 \times 5^x < 0 \Leftrightarrow \underbrace{5^x}_{>0, \forall x \in \mathbb{R}} (5 - x^2) < 0 \Leftrightarrow 5 - x^2 \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$5 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{5} \vee x = \sqrt{5}$$

$$C. S. =]-\infty, -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}, +\infty[$$

$$23.9. x^2 \times 3^x < 3^{x+3} \Leftrightarrow x^2 \times 3^x - 3^x \times 3^3 < 0 \Leftrightarrow \underbrace{3^x}_{>0, \forall x \in \mathbb{R}} (x^2 - 27) < 0 \Leftrightarrow x^2 - 27 < 0$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 27 = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{27} \vee x = \sqrt{27}$$

$$\Leftrightarrow x = -3\sqrt{3} \vee x = 3\sqrt{3}$$

$$C. S. =]-3\sqrt{3}, 3\sqrt{3}[$$

$$23.10. e^{\frac{4-x^2}{x^2+1}} > 1 \Leftrightarrow e^{\frac{4-x^2}{x^2+1}} > e^0 \Leftrightarrow \frac{4-x^2}{x^2+1} > 0 \Leftrightarrow 4 - x^2 > 0 \text{ (já que } x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R})$$

Cálculo auxiliar

$$4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 2$$

$$C. S. =]-2, 2[$$

$$23.11. 4^x < \sqrt[3]{2^{3x+6}} \Leftrightarrow 2^{2x} \leq 2^{x+2} \Leftrightarrow 2x \leq x+2 \Leftrightarrow x \leq 2$$

$$C. S. =]-\infty, 2]$$

$$23.12. 4^x + 2 \leq 9 \times 2^{x-1} \Leftrightarrow 2^{2x} + 2 - \frac{9}{2} \times 2^x \leq 0 \Leftrightarrow 2 \times 2^{2x} - 9 \times 2^x + 4 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 - 9y + 4 \leq 0 \wedge y = 2^x$$

$$\Leftrightarrow y \geq \frac{1}{2} \wedge y \leq 4 \wedge y = 2^x$$

$$\Leftrightarrow 2^x \geq \frac{1}{2} \wedge 2^x \leq 4$$

$$\Leftrightarrow x \geq -1 \wedge x \leq 2$$

Cálculo auxiliar

$$2y^2 - 9y + 4 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{9 \pm \sqrt{81-32}}{4} \Leftrightarrow y = 4 \vee y = \frac{1}{2}$$

$$C. S. = [-1, 2]$$

23.13. $3^x \leq 27^{\frac{1}{x}} \Leftrightarrow 3^x \leq 3^{\frac{3}{x}} \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{x} \Leftrightarrow x - \frac{3}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2-3}{x} \leq 0$

Cálculo auxiliar							
$x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3}$							
x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$		0		$\sqrt{3}$	$+\infty$
$x^2 - 3$	+	0	-	-	-	0	+
x	-	-	-	0	+	+	+
$\frac{x^2-3}{x}$	-	0	+	n.d.	-	0	+

C. S. = $]-\infty, -\sqrt{3}] \cup]0, \sqrt{3}]$

23.14. $81 \times 3^{2x-3} \leq \frac{9^x}{x} \Leftrightarrow 3^4 \times 3^{2x-3} - \frac{3^{2x}}{x} \leq 0 \Leftrightarrow 3^{2x+1} - \frac{3^{2x}}{x} \leq 0$

$$\Leftrightarrow \underbrace{3^{2x}}_{>0, \forall x \in \mathbb{R}} \left(3 - \frac{1}{x}\right) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x} \leq 0$$

x	$-\infty$	0		$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x - 1$	-	-	-	0	+
x	-	0	+	+	+
$\frac{3x-1}{x}$	+	n.d.	-	0	+

C. S. = $\left]0, \frac{1}{3}\right]$

24.

24.1. $1 - 2e^x > 0 \Leftrightarrow -2e^x > -1 \Leftrightarrow e^x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x < \ln\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow x < -\ln(2)$

C. S. = $]-\infty, -\ln(2)[$

24.2. $(4x - 5)(e^x - 2) \leq 0$

Cálculos auxiliares					
$4x - 5 = 0 \Leftrightarrow 4x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}$			$e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln(2)$		

x	$-\infty$	$\ln(2)$		$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$4x - 5$	-	-	-	0	+
$e^x - 2$	-	0	+	+	+
$(4x - 5)(e^x - 2)$	+	0	-	0	+

C. S. = $\left[\ln(2), \frac{5}{4}\right]$

$$24.3. e^{2x} - 5e^x + 6 > 0 \Leftrightarrow y^2 - 5y + 6 > 0 \wedge y = e^x$$

Cálculo auxiliar

Seja $y = e^x$.

$$y^2 - 5y + 6 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \Leftrightarrow y = 3 \vee y = 2$$

$$\Leftrightarrow (y < 2 \vee y > 3) \wedge y = e^x$$

$$\Leftrightarrow e^x < 2 \vee e^x > 3$$

$$\Leftrightarrow x < \ln(2) \vee x > \ln(3)$$

$$C. S. =]-\infty, \ln(2)[\cup]\ln(3), +\infty[$$

$$24.4. e^x + e^{-x} > 2 \Leftrightarrow e^x + \frac{1}{e^x} - 2 > 0 \Leftrightarrow e^{2x} + 1 - 2e^x > 0$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 2y + 1 > 0 \wedge y = e^x$$

$$\Leftrightarrow (y - 1)^2 > 0 \wedge y = e^x$$

$$\Leftrightarrow (y - 1 > 0 \vee y - 1 < 0) \wedge y = e^x$$

$$\Leftrightarrow (y > 1 \vee y < 1) \wedge y = e^x$$

$$\Leftrightarrow e^x > 1 \vee e^x < 1$$

$$\Leftrightarrow x > 0 \vee x < 0$$

$$C. S. = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

25.

$$25.1. D = \mathbb{R}^+$$

$$3^{-2+\log_3(x)} = \log_2(\sqrt{2}) \Leftrightarrow 3^{-2+\log_3(x)} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -2 + \log_3(x) = \log_3\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x) = \log_3\left(\frac{1}{2}\right) + 2$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x) = \log_3\left(\frac{1}{2}\right) + \log_3(9)$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x) = \log_3\left(\frac{9}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{9}{2}$$

$$C. S. = \left\{\frac{9}{2}\right\}$$

$$25.2. D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$10^{1+\log(x^2)} = \log(20) + \log(25) - \log(5) \Leftrightarrow 10^{1+\log(x^2)} = \log(500) - \log(5)$$

$$\Leftrightarrow 10^{1+\log(x^2)} = \log(100)$$

$$\Leftrightarrow 10^{1+\log(x^2)} = 2$$

$$\Leftrightarrow 1 + \log(x^2) = \log(2)$$

$$\Leftrightarrow \log(x^2) = \log(2) - 1$$

$$\Leftrightarrow \log(x^2) = \log(2) - \log(10)$$

$$\Leftrightarrow \log(x^2) = \log\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$C.S. = \left\{ -\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5} \right\}$$

25.3. $D = \mathbb{R}^+$

$$2^{1+\log_2(3x)} = \log_2(2^{36}) \Leftrightarrow 2^{1+\log_2(3x)} = 36$$

$$\Leftrightarrow 1 + \log_2(3x) = \log_2(36)$$

$$\Leftrightarrow \log_2(3x) = \log_2(36) - 1$$

$$\Leftrightarrow \log_2(3x) = \log_2(36) - \log_2(2)$$

$$\Leftrightarrow \log_2(3x) = \log_2(18)$$

$$\Leftrightarrow 3x = 18$$

$$\Leftrightarrow x = 6$$

$$C.S. = \{6\}$$

25.4. $D = \mathbb{R}^+$

$$4^{4\log_4(x) - \log_4(x^2)} = 5 \Leftrightarrow 4^{\log_4(x^4) - \log_4(x^2)} = 5 \Leftrightarrow 4^{\log_4(x^2)} = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 5$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{5}, \text{ uma vez que } D = \mathbb{R}^+.$$

$$C.S. = \{\sqrt{5}\}$$

26.

26.1. $D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - 1 > 0 \wedge x - 1 > 0\} = (]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[) \cap]1, +\infty[=]1, +\infty[$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 1 > 0 \wedge x - 1 > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \vee x > 1) \wedge x > 1$$

$$\ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 - 1) = \ln(x - 1) \Leftrightarrow x^2 - 1 = x - 1 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{ \}$$

26.2. $D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 > 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\log(x^2) = 2 \log(5) \Leftrightarrow \log(x^2) = \log(5^2) \Leftrightarrow x^2 = 5^2 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = \pm 5 \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{-5, 5\}$$

26.3. $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} = \mathbb{R}^+$

$$(\ln(x))^2 - 2\ln(x) - 3 = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente (e não efetuando qualquer mudança de variável), obtemos:

$$\ln(x) = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1} \Leftrightarrow \ln(x) = -1 \vee \ln(x) = 3 \Leftrightarrow x = e^{-1} \vee x = e^3$$

$$\text{C. S.} = \left\{\frac{1}{e}, e^3\right\}$$

26.4. $D = \mathbb{R}^+$

$$4(\ln(x))^2 - 3\ln(x) = 7 \Leftrightarrow 4(\ln(x))^2 - 3\ln(x) - 7 = 0$$

Utilizando o mesmo processo da alínea anterior, concluímos que:

$$\Leftrightarrow \ln(x) = \frac{7}{4} \vee \ln(x) = -1$$

$$\Leftrightarrow x = e^{\frac{7}{4}} \vee x = e^{-1}$$

$$\text{C. S.} = \left\{\frac{1}{e}, e^{\frac{7}{4}}\right\}$$

26.5. $D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - 4 > 0 \wedge x + 22 > 0 \wedge x + 2 > 0\} =$

$$= (]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[) \cap (]-22, +\infty[) \cap (]-2, +\infty[) =]2, +\infty[$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 4 > 0 \wedge x + 22 > 0 \wedge x + 2 > 0 \Leftrightarrow (x > -2 \vee x < 2) \wedge x < -22 \wedge x > -2$$

$$\log(x^2 - 4) + \log(x + 22) = 3 \log(x + 2)$$

$$\Leftrightarrow \log[(x^2 - 4)(x + 22)] = \log(x + 2)^3$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 4)(x + 22) = (x + 2)^3 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x + 2)(x + 22) - (x + 2)^3 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)[(x - 2)(x + 22) - (x + 2)^2] = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)[x^2 + 22x - 2x - 44 - (x^2 + 4x + 4)] = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(x^2 + 22x - 2x - 44 - x^2 - 4x - 4) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(16x - 48) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \vee x = 3 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 3$$

$$\text{C. S.} = \{3\}$$

26.6. $D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 + 2 > 0 \wedge 2x - 1 > 0\} = \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$

$$\log_3(x^2 + 2) - \log_3(2x - 1) = 1 \Leftrightarrow \log_3\left(\frac{x^2 + 2}{2x - 1}\right) = \log_3(3)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2}{2x - 1} = 3 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2}{2x - 1} - 3 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2 - 3(2x - 1)}{2x - 1} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2+2-6x+3}{2x-1} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2-6x+5}{2x-1} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 6x + 5 = 0 \wedge 2x - 1 \neq 0) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = 5$$

$$C.S. = \{1, 5\}$$

$$26.7. D = \{x \in \mathbb{R}: x^5 > 0 \wedge x > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$\log_3(x^5) - x \log_3(x) = 0 \Leftrightarrow 5 \log_3(x) - x \log_3(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_3(x))(5 - x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x) = 0 \vee 5 - x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = 5$$

$$C.S. = \{1, 5\}$$

$$26.8. D = \{x \in \mathbb{R}: 3x + 5 > 0\} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{3}\right\}$$

$$3 + \log_7(3x + 5)^2 = 5 \Leftrightarrow \log_7(3x + 5)^2 = 2 \Leftrightarrow (3x + 5)^2 = 7^2$$

$$\Leftrightarrow 3x + 5 = 7 \vee 3x + 5 = -7$$

$$\Leftrightarrow 3x = 2 \vee 3x = -12$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \vee x = -4$$

$$C.S. = \left\{-4, \frac{2}{3}\right\}$$

$$26.9. D = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - 4x > 0 \wedge 10 + 4 \log_2(x^2 - 4x) \neq 0\} =$$

$$= \{x \in \mathbb{R}: x < 0 \vee x > 4\} \wedge x \notin \{-0,044; 4,044\}$$

$$= (]-\infty, 0[\cup]4, +\infty[) \setminus \{-0,044; 4,044\}$$

$$\frac{10}{10+4\log_2(x^2-4x)} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 10 + 4 \log_2(x^2 - 4x) = 30 \Leftrightarrow \log_2(x^2 - 4x) = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x = 2^5$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x - 32 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -4 \vee x = 8$$

$$C.S. = \{-4, 8\}$$

$$26.10. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$\log_2(x) + 3 \log_4(x) = 5 \Leftrightarrow \log_2(x) + 3 \times \frac{\log_2(x)}{\log_2(4)} = 5 \Leftrightarrow \log_2(x) + \frac{3}{2} \log_2(x) = \log_2(32)$$

$$\Leftrightarrow \log_2(x) + \log_2\left(x^{\frac{3}{2}}\right) = \log_2(32)$$

$$\Leftrightarrow x \times x^{\frac{3}{2}} = 32$$

$$\Leftrightarrow x^{\frac{5}{2}} = 32$$

$$\Leftrightarrow \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^5 = 2^5$$

$$\Leftrightarrow x^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} = 2$$

$$\Leftrightarrow x = 4$$

$$C.S. = \{4\}$$

$$26.11. D = \{x \in \mathbb{R}: 2x + 1 > 0 \wedge x^2 > 0\} = \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[\cap \mathbb{R} \setminus \{0\} = \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[\setminus \{0\}$$

Cálculo auxiliar

$$2x + 1 > 0 \wedge x^2 > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2} \wedge x > 0$$

$$2 \ln(2x + 1) = \ln(x^2) \Leftrightarrow \ln(2x + 1)^2 = \ln(x^2)$$

$$\Leftrightarrow (2x + 1)^2 = x^2 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = x^2 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 4x + 1 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{3} \vee x = -1 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

$$C.S. = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$$

$$26.12. D = \left\{x \in \mathbb{R}: (x + 3)(x - 8) > 0 \wedge \frac{x+3}{x-8} > 0 \wedge x - 8 \neq 0\right\} =]-\infty, -3[\cup]8, +\infty[$$

$$\log((x + 3)(x - 8)) + \log\left(\frac{x+3}{x-8}\right) = 2 \Leftrightarrow \log\left[(x + 3)(x - 8) \times \frac{(x+3)}{(x-8)}\right] = 2$$

$$\Leftrightarrow \log[(x + 3)^2] = \log(100)$$

$$\Leftrightarrow (x + 3)^2 = 100 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x + 3 = 10 \vee x + 3 = -10) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x = 7 \vee x = -13) \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{-13\}$$

$$26.13. D = \{x \in \mathbb{R}: (x + 1)^2 > 0 \wedge (x + 9)^2 > 0\} = \mathbb{R} \setminus \{-9, -1\}$$

$$\log((x + 1)^2) + \log((x + 9)^2) = 2\log(9)$$

$$\Leftrightarrow \log[(x + 1)^2 \times (x + 9)^2] = \log(81)$$

$$\Leftrightarrow [(x + 1)(x + 9)]^2 = 9^2 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow [(x + 1)(x + 9)]^2 - 9^2 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow [(x + 1)(x + 9) - 9][(x + 1)(x + 9) + 9] = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 9x + x + 9 - 9)(x^2 + 9x + x + 9 + 9) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 10x)(x^2 + 10x + 18) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x(x + 10)\left(x - (-5 + \sqrt{7})\right)\left(x - (-5 - \sqrt{7})\right) = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = -10 \vee x = -5 + \sqrt{7} \vee x = -5 - \sqrt{7} \wedge x \in D$$

$$C.S. = \{-10, -5 - \sqrt{7}, -5 + \sqrt{7}, 0\}$$

$$26.14. D = \{x \in \mathbb{R}: x - 1 > 0 \wedge \sqrt{10x - 4} \geq 0 \wedge x + 2 > 0\} =]1, +\infty[$$

$$\log_{25}(x - 1) = \log_5(\sqrt{10x - 4}) - \log_5(x + 2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_5(x-1)}{\log_5 25} = \log_5\left(\frac{\sqrt{10x-4}}{x+2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_5(x - 1) = \log_5\left(\frac{\sqrt{10x-4}}{x+2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log_5(\sqrt{x-1}) = \log_5\left(\frac{\sqrt{10x-4}}{x+2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x-1} = \frac{\sqrt{10x-4}}{x+2} \wedge x \in D$$

$$\Rightarrow x - 1 = \frac{10x-4}{(x+2)^2} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)(x+2)^2 - 10x + 4}{(x+2)^2} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)(x^2+4x+4) - 10x + 4}{(x+2)^2} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3 + 4x^2 + 4x - x^2 - 4x - 4 - 10x + 4}{(x+2)^2} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3 + 3x^2 - 10x}{(x+2)^2} = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x(x^2 + 3x - 10) = 0 \wedge x \neq -2) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x = 0 \vee x = 2 \vee x = -5) \wedge x \in D$$

$$C. S. = \{2\}$$

27.

$$27.1. D = \{x \in \mathbb{R}: 3x - 1 > 0 \wedge 2x + 3 > 0\} = \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[\cap \left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[= \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$$

$$\forall x \in \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[, \log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) \geq \log_{\frac{1}{2}}(2x + 3) \Leftrightarrow 3x - 1 \geq 2x + 3 \Leftrightarrow x \leq 4$$

$$C. S. = \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[\cap]-\infty, 4] = \left]\frac{1}{3}, 4\right]$$

$$27.2. D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \wedge x^2 > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$(\ln(x))^2 - \ln(x^2) > 0 \Leftrightarrow (\ln(x))^2 - 2\ln(x) > 0 \wedge x \in D \Leftrightarrow \ln(x)(\ln(x) - 2) > 0 \wedge x \in D$$

x	0		1		e^2	$+\infty$
$\ln(x)$	n.d.	-	0	+	+	+
$\ln(x) - 2$	n.d.	-	-	-	0	+
$\ln(x)(\ln(x) - 2)$	n.d.	+	0	-	0	+

Cálculo auxiliar

$$\ln(x) - 2 = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = 2 \Leftrightarrow x = e^2$$

$$C. S. =]0, 1[\cup]e^2, +\infty[$$

27.3. $D = \{x \in \mathbb{R}: x + 5 > 0\} =]-5, +\infty[$

$$\forall x \in]-5, +\infty[, \log_{\frac{1}{2}}(x+5) > 0 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}}(x+5) > \log_{\frac{1}{2}}1 \Leftrightarrow x+5 < 1 \Leftrightarrow x < -4$$

$$C.S. =]-5, +\infty[\cap]-\infty, -4[=]-5, -4[$$

27.4. $D = \{x \in \mathbb{R}: 3x^2 - x > 0 \wedge x + 1 > 0\} = (]-\infty, 0[\cup]\frac{1}{3}, +\infty[) \cap]-1, +\infty[=$
 $=]-1, 0[\cup]\frac{1}{3}, +\infty[$

Cálculo auxiliar

$$3x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(3x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \frac{1}{3}$$

$$\forall x \in]-1, 0[\cup]\frac{1}{3}, +\infty[, \ln(3x^2 - x) \leq \ln(x + 1) \Leftrightarrow 3x^2 - x \leq x + 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$3x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{6} \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -\frac{1}{3}$$

$$C.S. = (]-1, 0[\cup]\frac{1}{3}, +\infty[) \cap [-\frac{1}{3}, 1] = [-\frac{1}{3}, 0[\cup]\frac{1}{3}, 1]$$

27.5. $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \wedge 3^x - 27 \neq 0\} = \mathbb{R}^+ \setminus \{3\}$

Cálculo auxiliar

$$3^x - 27 = 0 \Leftrightarrow 3^x = 3^3 \Leftrightarrow x = 3$$

x	0		3		e^2	$+\infty$
$\ln(x) - 2$	n.d.	—	—	—	0	+
$3^x - 27$	—	—	0	+	+	+
$\frac{\ln(x) - 2}{3^x - 27}$	n.d.	+	n.d.	—	0	+

$$C.S. =]0, 3[\cup [e^2, +\infty[$$

27.6. $D = \left\{x \in \mathbb{R}: x^2 - x - \frac{3}{4} > 0\right\} =]-\infty, -\frac{1}{2}[\cup]\frac{3}{2}, +\infty[$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - x - \frac{3}{4} = 0 \Leftrightarrow 4x^2 - 4x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \times 4 \times (-3)}}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \pm 8}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \vee x = -\frac{1}{2}$$

$$\log_{0.5}\left(x^2 - x - \frac{3}{4}\right) > 2 - \log_2(5) \Leftrightarrow \frac{\log_2\left(x^2 - x - \frac{3}{4}\right)}{\log_2(5)} > 2 - \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow -\log_2\left(x^2 - x - \frac{3}{4}\right) > 2 - \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_2\left(x^2 - x - \frac{3}{4}\right) < -2 - \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_2 \left(x^2 - x - \frac{3}{4} \right) + 2 < \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_2 \left(x^2 - x - \frac{3}{4} \right) + \log_2(4) < \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_2(4x^2 - 4x - 3) < \log_2(5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x - 3 < 5 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x - 8 < 0 \wedge x \in D$$

Cálculo auxiliar

$$4x^2 - 4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \times 4 \times (-8)}}{8} \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm 12}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \vee x = -1$$

$$4x^2 - 4x - 8 < 0 \Leftrightarrow x \in]-1, 2[$$

$$\Leftrightarrow -1 < x < 2 \wedge x \in D$$

$$\text{C.S.} = \left] -1, -\frac{1}{2} \right[\cup \left] \frac{3}{2}, 2 \right[$$

27.7. $D = \mathbb{R}^+$

$$|2 + \log_2(x)| \geq 3 \Leftrightarrow (2 + \log_2(x) \geq 3 \vee 2 + \log_2(x) \leq -3) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (\log_2(x) \geq 1 \vee \log_2(x) \leq -5) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x \geq 2 \vee x \leq 2^{-5}) \wedge x \in D$$

$$\text{C.S.} = \left] 0, \frac{1}{32} \right] \cup [2, +\infty[$$

27.8. $D = \mathbb{R}^+$

$$-3(\log_3(x))^2 - 5\log_3(x) + 2 \geq 0 \Leftrightarrow -3y^2 - 5y + 2 \geq 0 \wedge y = \log_3(x) \wedge x \in D$$

Cálculo auxiliar

$$-3y^2 - 5y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{-6} \Leftrightarrow y = \frac{5 \pm 7}{-6}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{3} \vee y = -2$$

$$-3y^2 - 5y + 2 \geq 0 \Leftrightarrow y \in \left[-2, \frac{1}{3} \right]$$

$$\Leftrightarrow \left(y \geq -2 \wedge y \leq \frac{1}{3} \right) \wedge y = \log_3(x) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x) \geq -2 \wedge \log_3(x) \leq \frac{1}{3} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x \geq 3^{-2} \wedge x \leq 3^{\frac{1}{3}} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{9} \wedge x \leq \sqrt[3]{3} \wedge x \in D$$

$$\text{C.S.} = \left[\frac{1}{9}, \sqrt[3]{3} \right]$$

28.**28.1.**

a) Aplicando a Regra de Ruffini, obtemos:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -1 & -14 & 24 \\ 2 & & 2 & 2 & -24 \\ \hline & 1 & 1 & -12 & 0 \end{array}$$

$$x^2 + x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = -4 \vee x = 3$$

$$\text{Assim, } P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 4).$$

$$\text{b) } P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - 3)(x + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee x = 3 \vee x = -4$$

$$\text{C. S.} = \{-4, 2, 3\}$$

28.2.

$$\text{a) } D = \left] \frac{12}{7}, +\infty \right[$$

$$2 \ln(x) + \ln(x - 1) = \ln(14x - 24) \Leftrightarrow \ln(x^2) + \ln(x - 1) = \ln(14x - 24)$$

$$\Leftrightarrow \ln(x^3 - x^2) = \ln(14x - 24)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x^2 = 14x - 24 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \vee x = 3$$

$$\text{C. S.} = \{2, 3\}$$

$$\text{b) } e^{2x} - e^x + 24e^{-x} - 14 = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - e^x + 24e^{-x} - 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow (e^x)^3 - (e^x)^2 - 14e^x + 24 = 0$$

Através do trabalho desenvolvido em 28.1., concluímos que:

$$\Leftrightarrow e^x = 2 \vee e^x = 3 \vee \underbrace{e^x = -4}_{\text{equação impossível}}$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(2) \vee x = \ln(3)$$

$$\text{C. S.} = \{\ln(2), \ln(3)\}$$

29.

$$\text{29.1. } h: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 8^x - 2$$

29.2. Eixo das abcissas:

$$0 = \frac{8^{2x} - 4 \times 8^x + 4}{8^x - 2} \Leftrightarrow 8^{2x} - 4 \times 8^x + 4 = 0 \wedge 8^x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow (8^x)^2 - 4 \times 8^x + 4 = 0 \wedge x \neq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 8^x = 2 \wedge x \neq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \wedge x \neq \frac{1}{3}$$

Não há interseção com o eixo das abcissas.

Eixo das ordenadas:

$$h(0) = \frac{8^0 - 4 \times 8^0 + 4}{8^0 - 2} = -1$$

O ponto de interseção com o eixo das ordenadas é o ponto $(0, -1)$.

$$29.3. 8^{2x} - 4 \times 8^x + 4 > 4(8^x - 2) \Leftrightarrow 8^{2x} - 4 \times 8^x + 4 > 4 \times 8^x - 8$$

$$\Leftrightarrow 8^{2x} - 8 \times 8^x + 12 > 0$$

$$\Leftrightarrow (8^x)^2 - 8 \times 8^x + 12 > 0$$

$$\Leftrightarrow 8^x < 2 \vee 8^x > 6$$

$$\Leftrightarrow x < \log_8(2) \vee x > \log_8(6)$$

$$\Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \vee x > \log_8(6)$$

Cálculo auxiliar

$$(8^x)^2 - 8 \times 8^x + 12 = 0 \Leftrightarrow 8^x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \times 1 \times 12}}{2 \times 1} \Leftrightarrow 8^x = 2 \vee 8^x = 6$$

$$C. S. = \left] -\infty, \frac{1}{3} \right[\cup] \log_8(6), +\infty[$$

30.

$$30.1. f(0) = -5 \ln(0^2 + 1) + 5 = -5 \ln(1) + 5 = 5$$

O ponto de interseção do gráfico da função f com o eixo Oy é o ponto $(0, 5)$.

$$30.2. f(-x) = -5 \ln[(-x)^2 + 1] + 5 = -5 \ln(x^2 + 1) + 5 = f(x), \forall x \in D$$

Como $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$, f é uma função par, ou seja, o gráfico de f é simétrico relativamente ao eixo Oy .

$$30.3. P(x, -5 \ln(x^2 + 1) + 5)$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -5 \ln(x^2 + 1) + 5 = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1) = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = e^1$$

$$\Leftrightarrow x^2 = e - 1$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{e - 1}$$

$$A(x) = \frac{2x + 2\sqrt{e-1}}{2} \times |-5 \ln(x^2 + 1) + 5| = (x + \sqrt{e-1}) \times (5 \ln(x^2 + 1) - 5)$$

$$g:]\sqrt{e-1}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto (x + \sqrt{e-1}) \times (5 \ln(x^2 + 1) - 5)$$

31.

$$31.1. P(0) = 2000e^0 = 2000$$

$$31.2. P(7) = 2000e^{0,25 \times 7} \approx 11\,509$$

$$31.3. P(t) = 4000 \Leftrightarrow 2000e^{0,25t} = 4000 \Leftrightarrow e^{0,25t} = 2$$

$$\Leftrightarrow 0,25t = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\ln(2)}{0,25}$$

$$t \approx 2,7726 \text{ dias}$$

O número de indivíduos desta colónia de leveduras atinge os 4 milhares ao fim de 2 dias e 19 horas.

$$31.4. \frac{P(t+1)}{P(t)} = \frac{2000e^{0,25(t+1)}}{2000e^{0,25t}} = \frac{e^{0,25t+0,25}}{e^{0,25t}} = \frac{e^{0,25t} \times e^{0,25}}{e^{0,25t}} = e^{0,25} \approx 1,28$$

A cada dia que passa, a população aumenta a uma taxa de, aproximadamente, 28%.

32.

32.1. Ao fim um ano:

$$500 \times \left(1 + \frac{4}{100}\right)^1 = 520 \text{ euros}$$

Ao fim de dois anos:

$$500 \times \left(1 + \frac{4}{100}\right)^2 = 540,8 \text{ euros}$$

$$32.2. f(x) = 500 \times \left(1 + \frac{4}{100}\right)^x \Leftrightarrow f(x) = 500 \times 1,04^x$$

$$D_f = \mathbb{R}_0^+$$

$$32.3. 146 \text{ dias correspondem a } \frac{146}{365} = 0,4 \text{ anos.}$$

$$f(5,4) = 500 \times 1,04^{5,4} \approx 617,95 \text{ euros}$$

$$32.4. f(x) = 2000 \Leftrightarrow 500 \times 1,04^x = 2000$$

$$\Leftrightarrow 1,04^x = 4$$

$$\Leftrightarrow \log_{1,04}(4)$$

Logo, $x \approx 35,346$ anos.

$$0,346 \times 365 = 126,29$$

Demora 35 anos e 126 dias para acumular 2000 euros.

$$32.5. \frac{f(x+1)}{f(x)} = \frac{500 \times 1,04^{x+1}}{500 \times 1,04^x} = 1,04^{x+1-x} = 1,04$$

O capital acumulado cresce à taxa de 4% ao ano.

$$32.6. \frac{f(18)}{f(0)} = \frac{500 \times 1,04^{18}}{500} = 1,04^{18} \approx 2,03$$

$$f(18) = 2,03 \times f(0) \Leftrightarrow f(18) = f(0) + 1,03f(0)$$

O capital cresceu 103%, aproximadamente.

$$32.7. f(x) = 500e^{bx} \Leftrightarrow 500 \times 1,04^x = 500 \times e^{bx}$$

$$\Leftrightarrow 1,04^x = (e^b)^x$$

$$\Leftrightarrow 1,04 = e^b$$

$$\Leftrightarrow b = \ln(1,04)$$

Logo, $b \approx 0,039$. Então, $f(x) = 500 \times e^{0,039x}$.

33.

$$33.1. R(0) = 1 \Leftrightarrow \frac{k}{1+50e^{-0,1 \times 0}} = 1 \Leftrightarrow \frac{k}{1+50} = 1 \Leftrightarrow k = 51$$

$$33.2. R(t) > 10 \Leftrightarrow \frac{51}{1+50e^{-0,1t}} > 10 \Leftrightarrow 51 > 10(1+50e^{-0,1t})$$

$$\Leftrightarrow 5,1 > 1 + 50e^{-0,1t}$$

$$\Leftrightarrow 4,1 > 50e^{-0,1t}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4,1}{50} > e^{-0,1t}$$

$$\Leftrightarrow -0,1t < \ln\left(\frac{4,1}{50}\right)$$

$$\Leftrightarrow t > -10\ln\left(\frac{4,1}{50}\right)$$

$$-10\ln\left(\frac{4,1}{50}\right) = 25,0104$$

Ao fim de 26 dias.

$$33.3. \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{51}{1+50e^{-0,1 \times t}} = 51$$

Com o decorrer do tempo, o número de rãs no lago tende para 51 000.

34.

$$34.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5^x - 2^x}{x^2 + 2x + 3} = \frac{5-2}{1+2+3} = \frac{1}{2}$$

$$34.2. \lim_{x \rightarrow 0} [3^x(5x - 2) + 8] = 3^0(0 - 2) + 8 = 6$$

$$34.3. \lim_{x \rightarrow 3} 2^{x^2-5} = 2^{9-5} = 16$$

$$34.4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{3} = \frac{+\infty}{3} = +\infty$$

$$34.5. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 5}{x} = \frac{5}{-\infty} = 0$$

$$34.6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{20}{10^x + 5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$34.7. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{5^{-x} + 1} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

$$34.8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{7x - 15} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$34.9. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{8^{-x} - 3} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$34.10. \lim_{x \rightarrow +\infty} [(3 - 4x) \times 2^x] = -\infty \times (+\infty) = -\infty$$

$$34.11. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6+3^x}{4^x-2} = \frac{6}{-2} = -3$$

$$34.12. \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{x^2-3x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)} = 2^{+\infty} = +\infty$$

$$34.13. \lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{-x^2+x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{-x^2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)} = 3^{-\infty} = 0$$

$$34.14. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4^x - 4}{2^x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2^x - 2)(2^x + 2)}{2^x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} (2^x + 2) = 4$$

35.

$$35.1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \times 5^x}{3 \times 10^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{3 \times 2^x + \frac{1}{5^x}} = \frac{2}{+\infty + 0} = 0$$

$$35.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (7^x - 3^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(7^x \left(1 - \left(\frac{3}{7} \right)^x \right) \right) = +\infty(1 - 0) = +\infty$$

$$35.3. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x - 2^x}{5^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^x \right)}{5^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{5} \right)^x \times \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(1 - \left(\frac{2}{5} \right)^x \right) \right] = +\infty \times (-\infty) = -\infty$$

$$35.4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 2^x}{5^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5} \right)^x + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^x = 0 + 0 = 0$$

$$35.5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^{2013}} = +\infty$$

$$35.6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^{2013}} = \frac{0}{-\infty} = 0$$

$$35.7. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2013}}{e^x} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$35.8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^5 - 2^x}{x^5} = 3 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^5} = 3 - (+\infty) = -\infty$$

$$35.9. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x - 2^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^x \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^x \right) = +\infty \times (1 - 0) = +\infty$$

$$35.10. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x - 5^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x \left(\left(\frac{3}{5} \right)^x - 1 \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{x^2} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{3}{5} \right)^x - 1 \right) = +\infty \times (0 - 1) = -\infty$$

$$35.11. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x + 10}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{x^2} = +\infty + 0 + 0 = +\infty$$

$$35.12. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + x + 10}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 10}{x^2} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \frac{0 + 10}{-\infty} + \frac{1}{-\infty} = 0 + 0 = 0$$

$$35.13. \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x x^4 =$$

Considerando a mudança de variável $y = -x$: se $x \rightarrow -\infty$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} (e^{-y} (-y)^4) =$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^4}{e^y} =$$

$$= \frac{1}{+\infty} =$$

$$= 0$$

$$35.14. \lim_{x \rightarrow -\infty} x \times e^{\frac{1}{x}} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x}$: se $x \rightarrow 0^+$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{y} e^y \right) =$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y} =$$

$$= +\infty$$

36.

$$36.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{5x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-5(e^{5x}-1)}{5x} = -5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x}-1}{5x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = 5x$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= -5 \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^y-1}{y}}_{\text{limite notável}} = \\ &= -5 \times 1 = \\ &= -5 \end{aligned}$$

$$36.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \times e^x - 1}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(e^x-1)}{3x} = \frac{4}{3} \times \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^x-1}{x}}_{\text{limite notável}} = \frac{4}{3}$$

$$36.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{5x} = \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^{2x}-1)}{2x} = \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{2x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = 2x$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{5} \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^y-1}{y}}_{\text{limite notável}} = \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$36.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1-e^{4x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{4x}}{\frac{-(e^{4x}-1)}{4x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2}\right)}{-\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{4x}-1}{4x}\right)} =$$

Considerando a mudança de variável $y = 4x$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2}}{-\lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\left(\frac{e^y-1}{y}\right)}_{\text{limite notável}}} = \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{-1} = \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$36.5. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2}-1}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2}-1}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2}-1}{x+2} \times \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x-2} =$$

Considerando a mudança de variável $y = x + 2 \Leftrightarrow x = y - 2$: se $x \rightarrow -2$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\left(\frac{e^y-1}{y}\right)}_{\text{limite notável}} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$36.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{e^{5x}-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x}-1}{x}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5(e^{5x}-1)}{5x}} =$$

Considerando a mudança de variável $y = 5x$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{5 \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^y-1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$36.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+5} - e^5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^5(e^x - 1)}{x} = e^5 \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}}_{\text{limite notável}} = e^5$$

$$36.8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e(e^{x-1} - 1)}{x - 1} =$$

Considerando a mudança de variável $y = x - 1 \Leftrightarrow x = y + 1$: se $x \rightarrow 1$, então $y \rightarrow 0$.

$$= e \times \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}} = e$$

$$36.9. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^2(e^{x-2} - 1)}{x - 2} =$$

Considerando a mudança de variável $y = x - 2 \Leftrightarrow x = y + 2$: se $x \rightarrow 2$, então $y \rightarrow 0$.

$$= e^2 \times \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}} = e^2$$

$$36.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}(e^{2x} - 1)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \times \underbrace{\lim_{2x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x}}_{\text{limite notável}} = e^0 \times 1 = 1$$

$$36.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(a^x) - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x \ln(a) - 1}) \times \ln(a)}{x \times \ln(a)} =$$

$$= \ln(a) \times \underbrace{\lim_{x \ln(a) \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(a) - 1}}{x \ln(a)}}_{\text{limite notável}} = \ln(a)$$

$$36.12. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{y}$: se $x \rightarrow -\infty$, então $y \rightarrow 0$.

$$= \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}} = 1$$

37.

$$37.1. \lim_{x \rightarrow 8} (2 - 3 \log_2(x)) = 2 - 3 \log_2(8) = 2 - 3 \times 3 = -7$$

$$37.2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \ln(x)}{x + 2} = \frac{1 + 0}{1 + 2} = \frac{1}{3}$$

$$37.3. \lim_{x \rightarrow 0^+} (\log_3(x))^2 = (-\infty)^2 = +\infty$$

$$37.4. \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x - 1) \ln(x)] = -1 \times (-\infty) = +\infty$$

$$37.5. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{x^2 - x} = \frac{-\infty}{0^-} = +\infty$$

$$37.6. \lim_{x \rightarrow +\infty} [(1 - x) \ln(x)] = -\infty \times (+\infty) = -\infty$$

$$37.7. \lim_{x \rightarrow 1} \log_2(3x + 1) = \log_2(4) = 2$$

$$37.8. \lim_{x \rightarrow -3^+} \ln(9 - x^2) = \ln(0^+) = -\infty$$

$$37.9. \lim_{x \rightarrow -\infty} \log(1 - e^x) = \log(1) = 0$$

$$37.10. \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(5^x - 7^x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(5^x \left(1 - \left(\frac{7}{5} \right)^x \right) \right) = \ln(0^+) = -\infty$$

$$37.11. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(3x - 1) - \ln(2x + 4)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{3x-1}{2x+4} \right) = \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$37.12. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x+1) - x \ln(x) + 4}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = \ln(1) + 0 = 0$$

$$37.13. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x+1) - x \ln(x^2+3) + 4}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x^2+3} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1+\frac{1}{x}}{x+\frac{3}{x}} \right) + 0 = \ln(0^+) = -\infty$$

$$37.14. \lim_{x \rightarrow 0^+} \log(1 - \log_2(x)) = \log(1 - (-\infty)) = +\infty$$

$$37.15. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \ln(x)}{3 \ln(x) + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{\ln(x)} - 1}{3 + \frac{1}{\ln(x)}} = -\frac{1}{3}$$

$$37.16. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 + \log_4(x)}{\log_2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 + \frac{\log_2(x)}{\log_2(4)}}{\log_2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6}{\log_2(x)} + \frac{1}{2} \right) = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

38.

$$38.1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 1 + \ln(x)}{-x} = -5 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = -5 + 0 + 0 = -5$$

$$38.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x)}{x^2 + 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(x)}{x}}{1 + \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{0}{1 + 0 + 0} = 0$$

$$38.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^3)}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \ln(x)}{2x} = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{3}{2} \times 0 = 0$$

$$38.4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(4x^3)}{5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(4) + \ln(x^3)}{5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(4)}{5x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \ln(x)}{5x} = 0 + \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{3}{5} \times 0 = 0$$

$$38.5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \times \frac{1}{+\infty} = 0 \times 0 = 0$$

$$38.6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(5-x)}{2-x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = 5 - x \Leftrightarrow x = 5 - y$: se $x \rightarrow -\infty$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(5+y)}{2+y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(5+y)+3}{2+y+3} = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(y+5)}{y+5} + \frac{3}{y+5} \right] = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y+5)}{y+5} + \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{3}{y+5} = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $z = y + 5 \Leftrightarrow y = z - 5$: se $y \rightarrow +\infty$, então $z \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} &= \underbrace{\lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\ln(z)}{z}}_{\text{limite notável}} + \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{3}{y+5} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$38.7. \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{1}{x} \right) =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x}$: se $x \rightarrow 0^+$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{y} \ln(y) \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$38.8. \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln(x)) =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x}$: se $x \rightarrow 0^+$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{y} \ln \left(\frac{1}{y} \right) \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y^{-1})}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(y)}{y} = \\ &= - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

39.

$$39.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x+1)}{3x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x+1)}{x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+1) \Leftrightarrow x+1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 1$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}} = \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)^2}{3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(x+1)}{3x} = \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+1) \Leftrightarrow x+1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$39.3. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\ln(x+5)}{x+4} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+5) \Leftrightarrow x+5 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 5$: se $x \rightarrow -4$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 5 + 4} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$39.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\ln(8x+1)} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(8x+1) \Leftrightarrow 8x+1 = e^y \Leftrightarrow 8x = e^y - 1$

$\Leftrightarrow 4 \times 2x = e^y - 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{e^y - 1}{4}$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{e^y - 1}{4}}{y} = \\ &= \frac{1}{4} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$39.5. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x) \Leftrightarrow x = e^y$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$39.6. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x+2)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x+2)}{(x-1)(x+1)} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+2) \Leftrightarrow x+2 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 2$: se $x \rightarrow -1$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{(e^y - 2 - 1)(e^y - 2 + 1)} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{(e^y - 3)(e^y - 1)} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{e^y - 3} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= \frac{1}{-2} \times \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$39.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{x+1})}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)^{\frac{1}{2}}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}\ln(x+1)}{3x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+1) \Leftrightarrow x+1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$39.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(1-x) \Leftrightarrow 1-x = e^y \Leftrightarrow -x = e^y - 1$
 $\Leftrightarrow x = 1 - e^y$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{1 - e^y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-(e^y - 1)} = \\ &= - \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[(1-x)(1+x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + \ln(1+x)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \end{aligned}$$

Considerando as mudanças de variável $y = \ln(1-x) \Leftrightarrow 1-x = e^y \Leftrightarrow -x = e^y - 1$
 $\Leftrightarrow x = -(e^y - 1)$ e $y = \ln(1+x) \Leftrightarrow 1+x = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-(e^y - 1)} + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\ &= - \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} + \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = \\ &= -1 + 1 = \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(x+1)]^2 - \ln(x+1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(x+1)]^2 - 2\ln(x+1)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(x+1)][\ln(x+1) - 2]}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x+1) - 2] = \end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x+1) \Leftrightarrow x+1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} \times \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x+1) - 2] =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} \times \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x + 1) - 2] = \\
 &= 1 \times (-2) = \\
 &= -2
 \end{aligned}$$

$$39.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(x+1)}{\ln(a)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x+1)}{x} \times \frac{1}{\ln(a)} \right] =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x + 1) \Leftrightarrow x + 1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\ln(a)} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = \\
 &= \frac{1}{\ln(a)} \times \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} = \\
 &= \frac{1}{\ln(a)}
 \end{aligned}$$

$$39.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(x+1)}{x}}{\frac{e^x - 1}{x}} =$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x + 1) \Leftrightarrow x + 1 = e^y \Leftrightarrow x = e^y - 1$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}} = \\
 &= \frac{\frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}} = \\
 &= \frac{1}{1} = \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

40.

$$40.1. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3(e^{3x} - 1)}{3x} = 3 \underbrace{\lim_{3x \rightarrow 0^-} \frac{e^{3x} - 1}{3x}}_{\text{limite notável}} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(x + 1) + 3] = 3$$

$$f(0) = \ln(0 + 1) + 3 = 3$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, então f é contínua no ponto de abscissa $x = 0$.

$$40.2. \lim_{x \rightarrow 0^-} (3^x) = 3^0 = 1$$

$$g(0) = 3$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) \neq g(0)$, então g não é contínua no ponto de abscissa $x = 0$.

41. Para $x < 1$, g é contínua em todos os pontos do domínio, por se tratar do quociente entre duas funções contínuas.

Para $x > 1$, g é contínua em todos os pontos do domínio, por se tratar do quociente entre duas funções contínuas.

Para $x = 1$:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-e^x}{-4x} &= \frac{1-e}{-4} = \frac{e-1}{4} \\ \bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$, então g não é contínua no ponto de abscissa $x = 1$.

Assim, g é contínua em todos os pontos do seu domínio, $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

42.

42.1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Para $x < 0$, f é contínua por ser o resultado de operações entre funções contínuas.

Para $x > 0$, f é contínua por ser o resultado de operações entre funções contínuas.

Assim, f é contínua no seu domínio.

42.2.

$$\begin{cases} \frac{1-e^{-x}}{2x} & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{\ln(x+1)}{2x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

43. Seja h a função definida por $h(x) = e^x - x^3$.

$$h(1) = e^1 - 1^3 = e - 1 > 0$$

$$h(2) = e^2 - 2^3 < 0$$

Como h é contínua em todo o seu domínio (por se tratar da diferença entre duas funções contínuas), em particular é contínua no intervalo, e, como $h(2) < 0 < h(1)$, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, $\exists c \in]1, 2[: h(c) = 0$. Provar a existência de pelo menos um zero da função h no referido intervalo é o mesmo que provar que a equação do enunciado tem pelo menos uma solução no intervalo $]1, 2[$, conforme solicitado.

44.

44.1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = +\infty + 2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x} = \frac{0}{-\infty} + 2 = 2$$

Logo, $y = 2$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = \frac{1}{0^+} + 2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x + 2x}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Logo, $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

44.2. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ex}{1-x} = \frac{e}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ex}{1-x} = \frac{e}{0^+} = +\infty$$

Logo, $x = 1$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ex}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ex}{x(\frac{1}{x}-1)} = \frac{e}{\frac{1}{+\infty}-1} = -e$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ex}{1-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ex}{x(\frac{1}{x}-1)} = \frac{e}{\frac{1}{-\infty}-1} = -e$$

Logo, $y = -e$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow -\infty$ e quando $x \rightarrow +\infty$.

44.3. $D_h = \mathbb{R} \setminus \{5\}$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{2}{2^x - 32} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2}{2^x - 32} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Logo, $x = 5$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{2^x - 32} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{2^x - 32} = \frac{2}{-32} = -\frac{1}{16}$$

Logo, $y = -\frac{1}{16}$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow -\infty$.

44.4. $D_f = \mathbb{R}^+$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [2 - 3\ln(x)] = 2 - 3\ln(+\infty) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [2 - 3\ln(x)] = 2 - 3\ln(0^+) = 2 - 3 \times (-\infty) = +\infty$$

Logo, $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em \mathbb{R}^+ .

44.5. $D_f = \mathbb{R}$ e a função é contínua em todo o seu domínio. Assim, o gráfico da função não tem assíntotas verticais.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \times e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow +\infty$.

45.**45.1.** $D_f = \mathbb{R}$ e a função é contínua em todo o seu domínio. Assim, o gráfico da função não tem assíntotas verticais.

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\frac{x}{2}+x-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 + 1 - 0 = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-\frac{x}{2}} + x - 1 - x) = -1$$

Logo, $y = x - 1$ é assíntota oblíqua ao gráfico da função quando $x \rightarrow +\infty$.

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{x}{2}+x-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = -\infty + 1 - 0 = -\infty$$

45.2. $D_g = \mathbb{R}^+$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + \ln(x)) = e^{0^+} + \ln(0^+) = 1 + (-\infty) = -\infty$$

Logo, $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em \mathbb{R}^+ .

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + \ln(x)}{x} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}}_{\text{limite notável}} + \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}}_{\text{limite notável}} = +\infty + 0 = +\infty$$

45.3. $D_h = \mathbb{R}^+ \setminus \{e\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{1 - \ln(x)} = \frac{2}{1 - \ln(0^+)} = \frac{2}{1 - (-\infty)} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} \frac{2}{1 - \ln(x)} = \frac{2}{1 - \ln(e^+)} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow e^-} \frac{2}{1 - \ln(x)} = \frac{2}{1 - \ln(e^-)} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Logo, $x = e$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em $\mathbb{R}^+ \setminus \{e\}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1 - \ln(x)} = \frac{2}{1 - (+\infty)} = \frac{2}{-\infty} = 0$$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow +\infty$.

45.4. $D_f = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x - \frac{x}{\ln(x)} \right) = 1 - \frac{1}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(x - \frac{x}{\ln(x)} \right) = 1 - \frac{1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - \frac{x}{\ln(x)} \right) = 0 - \frac{0}{\ln(0^+)} = 0 - \frac{0}{-\infty} = 0$$

Logo, $x = 1$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

Não existem mais assíntotas verticais ao gráfico da função, uma vez que a função é contínua em $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$.

46.

46.1.

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{2x-2}-1}{x-1} =$

Considerando a mudança de variável $y = x - 1 \Leftrightarrow -x = -1 - y \Leftrightarrow x = 1 + y$: se $x \rightarrow 1^-$, então $y \rightarrow 0^-$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^{2y}-1}{y} = \\ &= 2 \lim_{2y \rightarrow 0^-} \frac{e^{2y}-1}{2y} = \\ &= 2 \end{aligned}$$

- $f(1) = 2$

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x}+1) = 2$

A função é contínua em $x = 1$.

46.2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x-2}-1}{x-1} = \frac{e^{-\infty}-1}{-\infty} = \frac{0-1}{-\infty} = 0$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow -\infty$.

47.

47.1. Para $0 < x < 1$, f é contínua por se tratar do quociente entre funções contínuas.

Para $x > 1$, f é contínua por ser o resultado de operações entre funções contínuas.

Para $x = 1$:

$$f(1) = 1 \times e^{2-1} = 1 \times e = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4x}{\ln(x)} = \frac{4 \times 1}{\ln(1^-)} = \frac{4}{0^-} = -\infty$$

Para $x = 1$, f não é contínua, uma vez que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq f(1)$.

Logo, f é contínua em $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

$$\begin{aligned} 47.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{2-x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^2 e^{-x}) = e^2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \\ &= e^2 \times \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}} = \\ &= e^2 \times \frac{1}{+\infty} = \\ &= e^2 \times 0 = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Logo, $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico da função quando $x \rightarrow +\infty$.

$x = 1$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x}{\ln(x)} = \frac{4 \times 0}{\ln(0^+)} = \frac{0}{-\infty} = 0$$

Não existem mais assíntotas verticais.

48.

48.1. Para $x < 0$, f é contínua por resultar de operações entre funções contínuas.

Para $0 < x < e$, f é contínua por resultar de operações entre funções contínuas.

$$48.2. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{1-\ln(x)} = \frac{3}{1-\ln(0^+)} = \frac{3}{1-(-\infty)} = \frac{3}{+\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(e^{-\frac{1}{x}} + 4x \right) = +\infty$$

Logo, $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

$$\lim_{x \rightarrow e^-} \frac{3}{1-\ln(x)} = \frac{3}{1-\ln(e^-)} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

Logo, $x = e$ é assíntota vertical ao gráfico da função.

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}} + 4x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{x} = \frac{e^0}{-\infty} + 4 = 4$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{-\frac{1}{x}} + 4x - 4x \right) = e^{-\frac{1}{-\infty}} = e^0 = 1$$

Logo, $y = 4x + 1$ é assíntota oblíqua ao gráfico da função quando $x \rightarrow -\infty$.

48.3. Seja h a função definida por $h(x) = e^{-\frac{1}{x}} + 4x + 5$.


$$h(-2) \approx -1,35$$

$$h(-1) \approx 3,718$$

Como h é contínua em todo o seu domínio (por se tratar da adição de funções contínuas), em particular é contínua no intervalo $[-2, -1]$ e, como $h(-2) < 0 < h(-1)$, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, $\exists c \in]-2, -1[: h(c) = 0$.

Provar a existência de pelo menos um zero da função h , no referido intervalo, é o mesmo que provar que a equação do enunciado tem pelo menos uma solução no intervalo $]-2, -1[$, conforme solicitado.

48.4. $x \approx -1,7$



49.

$$49.1. f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+5)}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 5) = 6$$

$$49.2. g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x - 0} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}}_{\text{limite notável}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 - 1 = 0$$

$$\begin{aligned} 49.3. h'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) + x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} + 1 = \\ &= \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{limite notável}}} + 1 = \\ &= \frac{1}{1} + 1 = \\ &= 2 \end{aligned}$$

50.

$$50.1. f'(x) = (e^{2x})' = 2e^{2x}$$

$$\begin{aligned} f': \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2e^{2x} \end{aligned}$$

$$50.2. g'(x) = (e^x(x+3))' = e^x(x+3) + e^x = e^x(x+4)$$

$$\begin{aligned} g': \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^x(x+4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50.3. h'(x) &= \left(\frac{e^{2x} + e^x - 1}{e^x + 3} \right)' = \frac{(2e^{2x} + e^x)(e^x + 3) - (e^{2x} + e^x - 1)e^x}{(e^x + 3)^2} = \frac{2e^{3x} + 6e^{2x} + e^{2x} + 3e^x - e^{3x} - e^{2x} + e^x}{(e^x + 3)^2} = \\ &= \frac{e^{3x} + 6e^{2x} + 4e^x}{(e^x + 3)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h': \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^{3x} + 6e^{2x} + 4e^x}{(e^x + 3)^2} \end{aligned}$$

$$50.4. i'(x) = (\sqrt{e^x + x^2})' = \frac{1}{2}(e^x + x^2)^{-\frac{1}{2}} \times (e^x + 2x) = \frac{e^x + 2x}{2\sqrt{e^x + x^2}}$$

$$i': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{e^x + 2x}{2\sqrt{e^x + x^2}}$$

$$50.5. j'(x) = (e^x \ln(x))' = e^x \times \ln(x) + e^x \times \frac{1}{x} = e^x \left[\ln(x) + \frac{1}{x} \right]$$

$$j': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto e^x \left(\ln(x) + \frac{1}{x} \right)$$

$$50.6. k'(x) = \left(\frac{1}{e^x} \right)' = \frac{0 \times e^x - 1 \times e^x}{(e^x)^2} = \frac{-e^x}{e^x \times e^x} = -\frac{1}{e^x}$$

$$k': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{e^x}$$

$$50.7. l'(x) = \left(e^{\frac{1}{x}} \right)' = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} = -\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$$

$$l': \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$$

$$50.8. m'(x) = \left(\frac{1}{x} + \ln(x) \right)' = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-x + x^2}{x^3} = \frac{-1 + x}{x^2}$$

$$m': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x-1}{x^2}$$

$$50.9. n'(x) = (x \ln(x))' = \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$$

$$n': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \ln(x) + 1$$

$$50.10. o'(x) = \left(\frac{x}{\ln(x)} \right)' = \frac{1 \times \ln(x) - x \times \frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{\ln(x) - 1}{(\ln(x))^2}$$

$$o': \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{\ln(x) - 1}{(\ln(x))^2}$$

$$50.11. p'(x) = \left(\sqrt{\ln(x)} \right)' = \frac{1}{2}(\ln(x))^{-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln(x)}}$$

$$p':]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{2x\sqrt{\ln(x)}}$$

$$50.12. q'(x) = (\ln(\ln(x)))' = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} = \frac{1}{x \ln(x)}$$

$$q':]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$$

51.

$$51.1. f'(x) = (10^x)' = 1 \times 10^x \times \ln(10) = \ln(10) \times 10^x$$

$$f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \ln(10) \times 10^x$$

$$51.2. g'(x) = (2^{x^3})' = 3x^2 \times 2^{x^3} \times \ln(2)$$

$$g': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 3x^2 \times 2^{x^3} \times \ln(2)$$

$$51.3. h'(x) = (3^{\ln(x)})' = \frac{1}{x} \times 3^{\ln(x)} \times \ln(3) = \frac{3^{\ln(x)} \ln(3)}{x}$$

$$h': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{3^{\ln(x)} \ln(3)}{x}$$

$$51.4. i'(x) = (\log(5x+1))' = \frac{5}{\ln(10)(5x+1)}$$

$$i':]-\frac{1}{5}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{5}{\ln(10)(5x+1)}$$

$$51.5. j'(x) = \left(\log_2\left(\frac{1}{x}\right)\right)' = \frac{\frac{-1}{x^2}}{\frac{1}{x} \times \ln(2)} = -\frac{1}{x \ln(2)}$$

$$j': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{x \ln(2)}$$

$$51.6. k'(x) = \left(\frac{1}{\log_2(x)}\right)' = \frac{0 \times \log_2(x) - 1 \times \frac{1}{x \ln(2)}}{[\log_2(x)]^2} = \frac{-1}{x \ln(2) [\log_2(x)]^2}$$

$$k': \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{-1}{x \ln(2) [\log_2(x)]^2}$$

$$51.7. l'(x) = (\ln(\sqrt{1-x^2}))' = \frac{\frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \times (-2x)}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{1-x^2}$$

$$l':]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -\frac{x}{1-x^2}$$

$$51.8. m'(x) = \left(\log\left(\frac{1}{x+1}\right)\right)' = \frac{\frac{-1}{(x+1)^2}}{\frac{\ln(10)}{x+1}} = \frac{-1}{(x+1)\ln(10)}$$

$$m':]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto -\frac{x}{1-x^2}$$

$$51.9. n'(x) = (\pi^{\ln(x)})' = \frac{1}{x} \times \pi^{\ln(x)} \times \ln(\pi)$$

$$n': \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \times \pi^{\ln(x)} \times \ln(\pi)$$

52.

$$52.1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} - 1}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} - 1}{-x} =$$

Considerando a mudança de variável $y = -x \Leftrightarrow x = -y$: se $x \rightarrow 1^-$, então $y \rightarrow 0^-$.

$$= -\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^y - 1}{y} =$$

$$= -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1$$

A função não admite derivada em $x = 0$.

$$52.2. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x e^{\frac{1}{x^2}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(e^{\frac{1}{x^2}} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{\frac{1}{x^2}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(e^{\frac{1}{x^2}} \right) = 0$$

A função admite derivada em $x = 0$.

$$52.3. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} - 0}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x(1 + e^{\frac{1}{x}})} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \right) = \frac{1}{1 + e^{-\infty}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(1 + e^{\frac{1}{x}})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \right) = 0$$

A função não admite derivada em $x = 0$.

$$53. f(0) = 0 \Leftrightarrow a + b + c = 0$$

$$f'(x) = (ae^{2x} + be^x + c)' = 2ae^{2x} + be^x$$

$$f'\left(\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 0 \Leftrightarrow 2ae^{2\ln\left(\frac{3}{4}\right)} + be^{\ln\left(\frac{3}{4}\right)} = 0 \Leftrightarrow 2ae^{\ln\left(\frac{9}{16}\right)} + b \times \frac{3}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2a \times \frac{9}{16} + \frac{3}{4}b = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{9}{8}a + \frac{3}{4}b = 0$$

$$\Leftrightarrow 9a + 6b = 0$$

$$\Leftrightarrow 3a + 2b = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (ae^{2x} + be^x + c) = 1 \Leftrightarrow a \times 0 + b \times 0 + c = 1 \Leftrightarrow c = 1$$

Então:

$$\begin{cases} a + b + 1 = 0 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -b - 1 \\ -3b - 3 + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \end{cases}$$

54.

$$54.1. f'(x) = (xe^{x-1})' = 1 \times e^{x-1} + x \times e^{x-1} = e^{x-1}(1 + x)$$

$$f'(1) = e^0 \times 2 = 2$$

$$f(1) = 1 \times e^{1-1} = 1$$

O ponto de coordenadas (1,1) pertence, simultaneamente, ao gráfico de f e à reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 1.

Reta tangente:

$$y = 2x + b$$

$$1 = 2 \times 1 + b \Leftrightarrow b = -1$$

$$\therefore y = 2x - 1$$

Reta normal:

$$y = -\frac{1}{2}x + b$$

$$1 = -\frac{1}{2} \times 1 + b \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{2} = b \Leftrightarrow b = \frac{3}{2}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$54.2. f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$f'(2) = \frac{4}{5}$$

$$f(2) = \ln(1 + 2^2) = \ln(5)$$

O ponto de coordenadas (2, $\ln(5)$) pertence, simultaneamente, ao gráfico de f e à reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 2.

Reta tangente:

$$y = \frac{4}{5}x + b$$

$$\ln(5) = \frac{4}{5} \times 2 + b \Leftrightarrow b = \ln(5) - \frac{8}{5}$$

$$\therefore y = \frac{4}{5}x + \ln(5) - \frac{8}{5}$$

Reta normal:

$$y = -\frac{5}{4}x + b$$

$$\ln(5) = -\frac{5}{4} \times 2 + b \Leftrightarrow \ln(5) = -\frac{5}{2} + b \Leftrightarrow b = \ln(5) + \frac{5}{2}$$

$$\therefore y = -\frac{5}{4}x + \ln(5) + \frac{5}{2}$$

$$55. 6x - 2y = 7 \Leftrightarrow -2y = -6x + 7$$

$$\Leftrightarrow y = 3x - \frac{7}{2}$$

$$f'(x) = 3 \Leftrightarrow (x - e^{-x})' = 3$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-x} = 3$$

$$\Leftrightarrow e^{-x} = 2$$

$$\Leftrightarrow -x = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow x = -\ln(2)$$

$$f(-\ln(2)) = -\ln(2) - e^{-(-\ln(2))} = -\ln(2) - 2$$

$$\begin{aligned}
 -\ln(2) - 2 &= 3 \times (-\ln(2)) + b \Leftrightarrow b = -\ln(2) - 2 + 3\ln(2) \\
 &\Leftrightarrow b = -2 + 2\ln(2) \\
 &\Leftrightarrow b = -2 + \ln(4)
 \end{aligned}$$

Assim, a equação da reta tangente ao gráfico de f e paralela à reta de equação $6x - 2y = 7$ é $y = 3x - 2 + \ln(4)$.

56.




56.1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x(x-1) = 0 \quad \wedge \quad x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
Sinal de f'	—	n.d.	—	0	+
Variação de f		n.d.		e mín.	

Cálculo auxiliar

$$f(1) = \frac{e^1}{1} = e$$

f é estritamente decrescente em $]-\infty, 0[$ e em $]0, 1[$ e é estritamente crescente em $[1, +\infty[$.

f tem um mínimo relativo igual a e para $x = 1$.



56.2. $D_g = \mathbb{R}^+$

$$g'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = -1$$

$$\Leftrightarrow x = e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$$

x	0		$\frac{1}{e}$	$+\infty$
Sinal de g'	n.d.	—	0	+
Variação de g	n.d.		mín.	

Cálculo auxiliar

$$g\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \times \ln(e^{-1}) = -\frac{1}{e}$$

g é estritamente decrescente em $\left]0, \frac{1}{e}\right[$ e é estritamente crescente em $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right[$.

g tem um mínimo relativo (absoluto) igual a $-\frac{1}{e}$ para $x = \frac{1}{e}$.

57.

$$57.1. f(x) \leq 0 \Leftrightarrow -[\ln(x)]^2 + 2 \ln(x) \leq 0$$

Considerando a mudança de variável $y = \ln(x) \Leftrightarrow x = e^y$, tem-se:

$$\Leftrightarrow -y^2 + 2y \leq 0$$

Cálculo auxiliar

$$y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow y(-y + 2) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee -y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = 2$$

$$\Leftrightarrow y \leq 0 \vee y \geq 2$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) \leq 0 \vee \ln(x) \geq 2$$

$$\Leftrightarrow x \leq e^0 \vee x \geq e^2$$

$$\Leftrightarrow x \leq 1 \vee x \geq e^2$$

$$\text{C.S.} =]0, 1] \cup [e^2, +\infty[$$

$$57.2. f'(x) = -2 \ln(x) \times \frac{1}{x} + 2 \times \frac{1}{x} = \frac{-2 \ln(x) + 2}{x}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2 \ln(x) + 2}{x} = 0 \Leftrightarrow -2 \ln(x) + 2 = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 1 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = e \wedge x \neq 0$$

x	0		e	$+\infty$
Sinal de f'	n.d.	+	0	-
Variação de f	n.d.	\nearrow	1	\searrow

Cálculo auxiliar

$$f(e) = -[\ln(e)]^2 + 2 \ln(e) = -1 + 2 = 1$$

Como 1 é máximo absoluto, $f(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^+$.

$$57.3. \text{ Vimos que } f'(x) = \frac{-2 \ln(x) + 2}{x} = \frac{2(1 - \ln(x))}{x}.$$

$$f''(x) = \frac{\left(-2 \times \frac{1}{x}\right)x - (-2 \ln(x) + 2) \times 1}{x^2} = \frac{-2 + 2 \ln(x) - 2}{x^2} = \frac{2 \ln(x) - 4}{x^2}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln(x) - 4 = 0 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow \ln(x) = 2 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow x = e^2 \wedge x \neq 0$$

x	0		e^2	$+\infty$
Sinal de f''	n.d.	-	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	n.d.	\cap	P.I.	\cup

Cálculo auxiliar

$$f(e^2) = -[\ln(e^2)]^2 + 2 \ln(e^2) = -(2 \ln(e))^2 + 4 \ln(e) = -4 + 4 = 0$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em $]0, e^2]$ e tem a concavidade voltada para cima em $[e^2, +\infty[$.

O ponto de coordenadas $(e^2, 0)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .

58.

$$58.1. D_f = \{x \in \mathbb{R}: e^x - 1 > 0\} = \mathbb{R}^+$$

Cálculo auxiliar

$$e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$$

$$D_g = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \wedge x \neq 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$D_h = \left\{x \in \mathbb{R}: \frac{x+1}{x} > 0 \wedge x \neq 0\right\} =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$$

Cálculo auxiliar

x	$-\infty$	-1		0	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{x+1}{x}$	$+$	0	$-$	n.d.	$+$

$$58.2. f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 1 \wedge x \in D_f$$

$$\Leftrightarrow e^x = 2 \wedge x \in D_f \Leftrightarrow x = \ln(2)$$

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\ln(x)}{x} = 0 \wedge x \in D_g \Leftrightarrow \ln(x) = 0 \wedge x \in D_g \Leftrightarrow x = 1$$

58.3. A função f é contínua em \mathbb{R}^+ , logo o único candidato a assíntota vertical ao seu gráfico é a reta de equação $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(e^x - 1) = \ln(0^+) = -\infty$$

A reta de equação $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de f .

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)\right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right)}{x} = \\ &= 1 + \frac{\ln(1)}{+\infty} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(e^x - 1) - x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln\left(e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)\right) - x\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right) - x\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{e^x}\right) = \\ &= \ln(1) = \\ &= 0 \end{aligned}$$

A reta de equação $y = x$ é assíntota oblíqua ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$. Dado o domínio de f ser \mathbb{R}^+ , não faz sentido averiguar a existência de assíntota não vertical ao seu gráfico quando $x \rightarrow -\infty$.

A função g é contínua em \mathbb{R}^+ , logo o único candidato a assíntota vertical ao seu gráfico é a reta de equação $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{\ln(0^+)}{0^+} = -\infty$$

A reta de equação $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de g .

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \times 0 = 0$$

A reta de equação $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de g quando $x \rightarrow +\infty$.

Dado o domínio de g ser \mathbb{R}^+ , não faz sentido averiguar a existência de assíntota não vertical ao seu gráfico quando $x \rightarrow -\infty$.

A função h é contínua em $] -\infty, -1[\cup]0, +\infty[$, logo os únicos candidatos a assíntotas verticais ao seu gráfico são as retas de equação $x = -1$ e $x = 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow -1^-} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \\ &= -1 - \lim_{x \rightarrow -1^-} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \\ &= -1 - \ln(0^+) = \\ &= +\infty \end{aligned}$$

A reta de equação $x = -1$ é assíntota vertical ao gráfico de h .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \\ &= +\infty - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \\ &= +\infty - \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(0^+) = \\ &= +\infty \end{aligned}$$

A reta de equação $x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de h .

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x} = \\ &= 0 - \frac{\ln(1)}{-\infty} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b = \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \\
 &= 0 - \ln(1) = \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

A reta de equação $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de h quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\begin{aligned}
 m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x} = \\
 &= 0 - \frac{\ln(1)}{+\infty} = \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \\
 &= 0 - \ln(1) = \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

A reta de equação $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de h quando $x \rightarrow +\infty$.

$$58.4. f'(x) = (\ln(e^x - 1))' = \frac{(e^x - 1)'}{e^x - 1} = \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$f'(x) > 0, \forall x \in D_f$$

A função f é estritamente crescente em \mathbb{R}^+ e não tem extremos.

$$g'(x) = \left(\frac{\ln(x)}{x} \right)' = \frac{(\ln(x))'x - \ln(x)(x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x}x - \ln(x)}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln(x)}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln(x) = 0 \quad \wedge \quad x^2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 1 \quad \wedge \quad x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = e$$



x	0		e	$+\infty$
Sinal de g'	n.d.	+	0	—
Variação de g	n.d.		Máx.	

Cálculo auxiliar

$$g(e) = \frac{\ln(e)}{e} = \frac{1}{e}$$

A função g é estritamente crescente em $]0, e]$ e é estritamente decrescente em $[e, +\infty[$; tem máximo absoluto $\frac{1}{e}$ para $x = e$.

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \left(\frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right)' = \left(\frac{1}{x} \right)' - \frac{\left(\frac{x+1}{x} \right)'}{\frac{x+1}{x}} = -\frac{1}{x^2} - \frac{\frac{x-x-1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} = \\
 &= -\frac{1}{x^2} + \frac{x}{x^2(x+1)} = \frac{-x-1+x}{x^2(x+1)} = \frac{-1}{x^2(x+1)}
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
Sinal de h'	+	n.d.	n.d.	–
Variação de h		n.d.	n.d.	

A função h é estritamente crescente em $]-\infty, -1[$ e é estritamente crescente em $]0, +\infty[$; não tem extremos.

$$58.5. f''(x) = \left(\frac{e^x}{e^x-1}\right)' = \frac{e^x(e^x-1) - e^x \times e^x}{(e^x-1)^2} = \frac{e^x(e^x-1-e^x)}{(e^x-1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x-1)^2}$$

$$f''(x) < 0, \forall x \in D_f$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em \mathbb{R}^+ , não tem pontos de inflexão.

$$g''(x) = \left(\frac{1-\ln(x)}{x^2}\right)' = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (1-\ln(x)) \times 2x}{x^4} = \frac{-x-2x(1-\ln(x))}{x^4} = \frac{-3+2\ln(x)}{x^3}$$

$$g''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-3+2\ln(x)}{x^3} = 0 \Leftrightarrow -3+2\ln(x) = 0 \wedge x^3 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = \frac{3}{2} \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{2}}$$

x	0		$e^{\frac{3}{2}}$	$+\infty$
Sinal de g''	n.d.	–	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de g	n.d.	\cap	P.I.	\cup

Cálculo auxiliar

$$g\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{\ln\left(e^{\frac{3}{2}}\right)}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{3}{2}}{2e^{\frac{3}{2}}}$$


O gráfico de g tem a concavidade voltada para baixo em $]0, e^{\frac{3}{2}}[$ e tem a concavidade voltada para cima em $\left[e^{\frac{3}{2}}, +\infty\right[$; tem um ponto de inflexão de coordenadas $\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}}\right)$.

$$\begin{aligned} h''(x) &= \left(\frac{-1}{x^2(x+1)}\right)' = \frac{(x^2)'(x+1)+x^2}{x^4(x+1)^2} = \frac{2x^2+2x+x^2}{x^4(x+1)^2} = \\ &= \frac{3x^2+2x}{x^4(x+1)^2} = \\ &= \frac{3x+2}{x^3(x+1)^2} \end{aligned}$$


x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
Sinal de h''	+	n.d.	n.d.	+
Sentido das concavidades do gráfico de h	\cup	n.d.	n.d.	\cup

O gráfico de h tem a concavidade voltada para cima e todo o seu domínio.


58.6.



$$D'_f = \mathbb{R}$$



$$D'_g = \left] -\infty, \frac{1}{e} \right]$$



$$D'_h = \mathbb{R}^+$$

$$59. f(x) = \ln^2(x + 2\ln(x))$$

$$f'(x) = \frac{2\ln(x)}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2\ln(x)+2}{x}$$

$$f''(x) = \frac{-2\ln(x)}{x^2}$$

$$f'''(x) = \frac{4\ln(x)-2}{x^3}$$

$$\begin{aligned} f'(x) + xf''(x) + x^2 f'''(x) &= \frac{2\ln(x)+2}{x} + x \times \frac{-2\ln(x)}{x^2} + x^2 \times \frac{4\ln(x)-2}{x^3} = \\ &= \frac{2\ln(x)+2-2\ln(x)+4\ln(x)-2}{x} = \\ &= \frac{4\ln(x)}{x} \quad \text{c. q. m.} \end{aligned}$$

60.

$$60.1. f(x) = xe^x$$

Domínio: \mathbb{R}

$$\text{Zeros : } xe^x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad \underbrace{e^x = 0}_{\text{equação impossível}}$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

(0,0) é a interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = -xe^{-x}$$

$$-f(x) = -xe^x$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:

$$f'(x) = e^x + x \times e^x = e^x(1+x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(1+x) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{e^x = 0}_{\text{equação impossível}} \vee 1+x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Sinal de f'	$-$	0	$+$
Variação de f	\searrow	mín.	\nearrow

Cálculo auxiliar

$$f(-1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$$

f é estritamente decrescente em $]-\infty, -1]$ e é estritamente crescente em $[-1, +\infty[$; tem um mínimo relativo (absoluto) igual a $-\frac{1}{e}$ para $x = -1$.

Concavidades e pontos de inflexão:

$$f''(x) = e^x(1+x) + e^x = e^x(x+2)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^x(x+2) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{e^x = 0}_{\text{equação impossível}} \vee x+2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -2$$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Sinal de f''	$-$	0	$+$
Sentido das concavidades do gráfico de f	\cap	P. I.	\cup

Cálculo auxiliar

$$f(-2) = -2 \times e^{-2} = -\frac{2}{e^2}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, -2[$ e tem a concavidade voltada para cima em $]-2, +\infty[$. O ponto de coordenadas $\left(-2, -\frac{2}{e^2}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .


Assíntotas: o gráfico de f não tem assíntotas verticais, uma vez que f é contínua em \mathbb{R} (domínio de f).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x) = +\infty \times e^{+\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = -\infty \times e^{-\infty} = -\infty \times 0 = 0$$

$y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

Representação gráfica:



$$\text{Contradomínio: } D'_f = \left[-\frac{1}{e}, +\infty\right[$$

60.2. $f(x) = x^2 e^{-2x}$

Domínio: \mathbb{R}

Zeros: $x^2 e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \vee e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee \underbrace{e^{-2x} = 0}_{\text{equação impossível}} \Leftrightarrow x = 0$

0 é o único zero de f .

$(0,0)$ é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo Oy .

Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = (-x)^2 e^{2x} = x^2 e^{2x}$$

$$-f(x) = -x^2 e^{-2x}$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:

$$f'(x) = 2xe^{-2x} + x^2 \times (-2)e^{-2x} = 2xe^{-2x}(1-x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2xe^{-2x}(1-x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x = 0 \vee \underbrace{e^{-2x} = 0}_{\text{equação impossível}} \vee 1-x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$$

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$2x$	—	0	+	+	+
e^{-2x}	+	+	+	+	+
$1-x$	+	+	+	0	—
Sinal de f'	—	0	+	0	—
Variação de f	\searrow	mín.	\nearrow	Máx.	\rightarrow

Cálculos auxiliares

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 1^2 \times e^{-2 \times 1} = e^{-2}$$

f é estritamente decrescente em $]-\infty, 0]$ e em $[1, +\infty[$ e é estritamente crescente em $[0, 1]$;

tem um mínimo relativo igual a 0 para $x = 0$ e tem um máximo relativo igual a e^{-2} para $x = 1$.

Concavidades e pontos de inflexão:

$$f'(x) = 2xe^{-2x}(1-x) = 2xe^{-2x} - 2x^2e^{-2x}$$

$$f''(x) = 2e^{-2x} + 2x \times (-2)e^{-2x} - [4xe^{-2x} + 2x^2 \times (-2)e^{-2x}] =$$

$$= 2e^{-2x} - 4xe^{-2x} - 4xe^{-2x} + 4x^2e^{-2x} =$$

$$= 2e^{-2x}(1 - 2x - 2x + 2x^2) =$$

$$= 2e^{-2x}(2x^2 - 4x + 1)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^{-2x}(2x^2 - 4x + 1) \Leftrightarrow 2e^{-2x} = 0 \vee 2x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{e^{-2x} = 0}_{\text{equação impossível}} \quad \vee \quad x = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

x	$-\infty$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$		$1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$2e^{-2x}$	+	+	+	+	+
$2x^2 - 4x + 1$	+	0	–	0	+
Sinal de f''	+	0	–	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	U	P.I.	∩	P.I.	U

Cálculos auxiliares

$$f\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 e^{-2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \left(1 - \sqrt{2} + \frac{1}{2}\right) e^{-2+\sqrt{2}} = \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right) e^{-2+\sqrt{2}}$$

$$f\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 e^{-2\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \left(1 + \sqrt{2} + \frac{1}{2}\right) e^{-2-\sqrt{2}} = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right) e^{-2-\sqrt{2}}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $\left]-\infty, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ e em $\left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right[$ e tem a concavidade voltada para baixo em $\left[1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$. Os pontos de coordenadas $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}; \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right) e^{-2+\sqrt{2}}\right)$ e $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}; \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right) e^{-2-\sqrt{2}}\right)$ são pontos de inflexão do gráfico de f .

Assíntotas: o gráfico de f não tem assíntotas verticais, uma vez que f é contínua em \mathbb{R} (domínio de f).

Assíntotas não verticais

$$x \rightarrow +\infty$$

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{-2x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{2x}} = \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} \times e^x\right)} = \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x} = \frac{1}{+\infty \times (+\infty)} = \frac{1}{+\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 0x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-2x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{2x}} = \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x}\right)^2} = \frac{1}{\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}\right)^2} = \frac{1}{(+\infty)^2} = \frac{1}{+\infty} = 0 \end{aligned}$$


A reta de equação $y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.

$x \rightarrow -\infty$

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^{-2x}) = -\infty \times (+\infty) = -\infty$$

Como o valor obtido não é um número real, concluímos que f não admite assíntota não vertical quando $x \rightarrow -\infty$.

Representação gráfica:



Contradomínio: $D'_f = \mathbb{R}_0^+$

60.3. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Zeros: não tem

Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = e^{-\frac{1}{x}}$$

$$-f(x) = -e^{\frac{1}{x}}$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$$

Como $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, f é estritamente decrescente em $]-\infty, 0[$ e em $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} \times e^{\frac{1}{x}} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \left(-\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}\right) =$$

$$= \frac{2}{x^3} \times e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^4} \times e^{\frac{1}{x}} =$$

$$= e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x+1}{x^4} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x+1 = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \wedge x \neq 0$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$		0	$+\infty$
Sinal de f''	–	0	+	n. d.	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	\cap	P. I.	\cup	n. d.	\cup

Cálculo auxiliar

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{-2}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $\left[-\frac{1}{2}, 0\right[$ e em $]0, +\infty[$ e tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, -\frac{1}{2}]$; o ponto de coordenadas $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{e^2}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .

Assíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) = e^{\frac{1}{0^+}} = +\infty$$

$x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de f .


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{\frac{1}{x}}\right) = e^{\frac{1}{-\infty}} = e^0 = 1$$

$y = 1$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

$y = 1$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.

Representação gráfica:

Contradomínio: $D'_f = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$

60.4. $f(x) = xe^{-x}$

Domínio: \mathbb{R}

Zeros: $xe^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee \underbrace{e^{-x} = 0}_{\text{equação impossível}} \Leftrightarrow x = 0$

$(0,0)$ é a interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = -xe^x$$

$$-f(x) = -xe^{-x}$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:

$$f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-x}(1 - x) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{e^{-x} = 0}_{\text{equação impossível}} \vee 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Sinal de f'	+	0	-
Variação de f	\nearrow	Máx.	\searrow

Cálculo auxiliar

$$f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$$

f é estritamente crescente em $]-\infty, 1]$ e estritamente decrescente em $[1, +\infty[$; tem um máximo absoluto igual a $\frac{1}{e}$ para $x = 1$.

Concavidades e pontos de inflexão:

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{-x}(1 - x)' = -e^{-x}(1 - x) - e^{-x} = \\ &= e^{-x}(-1 + x - 1) = \\ &= e^{-x}(x - 2) \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-x}(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{e^{-x} = 0}_{\text{equação impossível}} \vee x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
Sinal de f''	-	0	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	\cap	P.I.	\cup

Cálculo auxiliar

$$f(2) = 2 \times e^{-2} = \frac{2}{e^2}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, 2]$ e tem a concavidade voltada para cima em $[2, +\infty[$. O ponto de coordenadas $\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .


Assíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{-x}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = -\infty$$

$y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.

Representação gráfica:



$$\text{Contradomínio: } D'_f = \left] -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

60.5. $f(x) = (1 - \ln(x))^2$

Domínio: \mathbb{R}^+

Zeros: $f(x) = 0 \Leftrightarrow (1 - \ln(x))^2 = 0$

$$\Leftrightarrow 1 - \ln(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\ln(x) = -1$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x = e$$

$(0, e)$ é a interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = (1 - \ln(-x))^2$$

$$-f(x) = -(1 - \ln(x))^2$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:



$$f'(x) = 2(1 - \ln(x)) \times \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{-2(1 - \ln(x))}{x}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2(1 - \ln(x))}{x} = 0$$

$$\Leftrightarrow -2(1 - \ln(x)) = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \ln(x) = 0 \wedge x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 1 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow x = e$$

x	0		e	$+\infty$
Sinal de f'	n. d.	–	0	+
Variação de f	n. d.		mín.	

Cálculo auxiliar

$$f(e) = [1 - \ln(e)]^2 = 0$$

f é estritamente decrescente em $]0, e]$ e é estritamente crescente em $[e, +\infty[$; tem um mínimo absoluto igual a 0 para $x = e$.

Concavidades e pontos de inflexão:

$$f''(x) = \frac{-2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) \times x - (-2(1 - \ln(x)))}{x^2} = \frac{2 - (-2 + 2\ln(x))}{x^2} = \frac{4 - 2\ln(x)}{x^2}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{4 - 2\ln(x)}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 - 2\ln(x) = 0 \wedge x > 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) = 2 \wedge x > 0$$

$$\Leftrightarrow x = e^2$$

x	0		e^2	$+\infty$
Sinal de f''	n.d.	+	0	–
Sentido das concavidades do gráfico de f	n.d.	U	P.I.	∩

Cálculo auxiliar

$$f(e^2) = [1 - \ln(e^2)]^2 = 1$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $]0, e^2]$ e tem a concavidade voltada para baixo em $[e^2, +\infty[$. O ponto de coordenadas $(e^2, 1)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .


Assíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln(x))^2 = (1 - (+\infty))^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln(x))^2 = (1 - \ln(0^+))^2 = (1 - (-\infty))^2 = +\infty$$

$x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de f .

Representação gráfica:

Contradomínio: $D'_f = \mathbb{R}_0^+$

60.6. $f(x) = x^2(3 - 2\ln(x))$

Domínio: $D = \mathbb{R}^+$

Zeros: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(3 - 2\ln(x)) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \vee 3 - 2\ln(x) = 0$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee \ln(x) = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x = e^{\frac{3}{2}}$$

$(0, e^{\frac{3}{2}})$ é a interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

Continuidade: f é contínua em todo o seu domínio.

Paridade:

$$f(-x) = (-x)^2(3 - 2\ln(-x)) = x^2(3 - 2\ln(-x)) = 3x^2 - 2x^2\ln(-x)$$



$$-f(x) = -x^2(3 - 2\ln(x)) = -3x^2 + 2x^2\ln(x)$$

Como $f(x) \neq f(-x)$ e $f(-x) \neq -f(x)$, f não é par nem ímpar.

Monotonia e Extremos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x(3 - 2\ln(x)) + x^2 \times \left(-2 \times \frac{1}{x}\right) = 2x(3 - 2\ln(x)) - 2x = \\ &= 2x(3 - 2\ln(x) - 1) = \\ &= 2x(2 - 2\ln(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2x(2 - 2\ln(x)) = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \vee 2 - 2\ln(x) = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = 0 \vee \ln(x) = 1 \\
 &\Leftrightarrow x = 0 \vee x = e
 \end{aligned}$$

x	0		e	$+\infty$
Sinal de f'	n.d.	+	0	-
Variação de f	n.d.		Máx.	

Cálculo auxiliar

$$f(e) = e^2(3 - 2\ln(e)) = e^2$$

f é crescente em $]0, e]$ e é decrescente em $[e, +\infty[$; tem um máximo absoluto igual a e^2 para $x = e$.

Concavidades e pontos de inflexão:

$$f''(x) = 2(2 - 2\ln(x)) + 2x\left(-2 \times \frac{1}{x}\right) = 4 - 4\ln(x) - 4 = -4\ln(x)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -4\ln(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

x	0		1	$+\infty$
Sinal de f''	n.d.	+	0	-
Sentido das concavidades do gráfico de f	n.d.	∪	P.I.	∩

Cálculo auxiliar

$$f(1) = 3$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em $]0, 1]$ e a concavidade voltada para baixo em $[1, +\infty[$. O ponto de coordenadas $(1, 3)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .



Contradomínio: $D'_f =]-\infty, e^2]$

$$60.7. f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-x)-1}{x-1} & \text{se } x \leq 0 \\ x e^{\frac{1}{x}} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Domínio: \mathbb{R}

Zeros: Para $x \leq 0$:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\ln(1-x)-1}{x-1} = 0 \Leftrightarrow \ln(1-x)-1 = 0 \wedge x-1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(1-x) = 1 \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 1-x = e \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow x = 1 - e$$

Para $x > 0$:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow x e^{\frac{1}{x}} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee e^{\frac{1}{x}} = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \vee \frac{1}{x} = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1 \end{aligned}$$

$(0,1)$ e $(1-e, 0)$ são os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

Continuidade: f é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Paridade: f não é par nem ímpar.

Monotonia e extremos:

Para $x < 0$:

$$f'(x) = \frac{\frac{-1}{1-x} \times (x-1) - [\ln(1-x)-1]}{(x-1)^2} = \frac{1 - [\ln(1-x)-1]}{(x-1)^2} = \frac{2 - \ln(1-x)}{(x-1)^2}$$

Para $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^{\frac{1}{x}} + x \times \left(-\frac{1}{x^2} \times e^{\frac{1}{x}}\right) = e^{\frac{1}{x}} - \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \\ f'(x) &= \begin{cases} \frac{2 - \ln(1-x)}{(x-1)^2} & \text{se } x < 0 \\ e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) & \text{se } x > 0 \end{cases} \end{aligned}$$





$$\frac{2 - \ln(1-x)}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow 2 - \ln(1-x) = 0 \Leftrightarrow \ln(1-x)$$

$$\Leftrightarrow 1-x = e^2$$

$$\Leftrightarrow -x = e^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow x = 1 - e^2$$

$$e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{x}} = 0 \vee 1 - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	$1 - e^2$		0		1	$+\infty$
Sinal de f'	-	0	+	n.d.	-	0	+
Variação de f		mín.		1		Máx.	

f é decrescente em $]-\infty, 1 - e^2]$ e em $]0, 1]$ e é crescente em $[1 - e^2, 0]$ e em $[1, +\infty[$; tem um mínimo absoluto igual a $-\frac{1}{e^2}$ para $x = 1 - e^2$ e um mínimo relativo igual a e para $x = 1$.

Concavidades e pontos de inflexão:

Para $x < 0$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-\left(\frac{-1}{1-x}\right)(x-1)^2 - (2 - \ln(1-x)) \times 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{\frac{1}{1-x}(x-1)^2 - 2(2 - \ln(1-x))(x-1)}{(x-1)^4} = \\ &= \frac{-(x-1) - 2(2 - \ln(1-x))(x-1)}{(x-1)^4} = \\ &= \frac{-1 - 2(2 - \ln(1-x))}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

Para $x > 0$:

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^2} = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \left(-\left(1 - \frac{1}{x}\right) + 1\right) = \\
 &= \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \left(-1 + \frac{1}{x} + 1\right) = \\
 &= \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} \\
 f''(x) &= \begin{cases} \frac{-1-2(2-\ln(1-x))}{(x-1)^3} & \text{se } x < 0 \\ \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} & \text{se } x > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -1 - 2(2 - \ln(1-x)) = 0 \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 2 - \ln(1-x) = -\frac{1}{2} \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow \ln(1-x) = \frac{5}{2} \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 1-x = e^{\frac{5}{2}} \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow -x = e^{\frac{5}{2}} - 1 \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow x = 1 - e^{\frac{5}{2}}$$

x	$-\infty$	$1 - e^{\frac{5}{2}}$		0	$+\infty$
Sinal de f''	-	0	+	n.d.	+
Sentido das concavidades do gráfico de f	\cap	P.I.	\cup	1	\cup

Cálculo auxiliar

$$f\left(1 - e^{\frac{5}{2}}\right) = \frac{\ln\left[1 - \left(1 - e^{\frac{5}{2}}\right)\right] - 1}{1 - e^{\frac{5}{2}} - 1} = \frac{\ln\left(e^{\frac{5}{2}}\right) - 1}{-e^{\frac{5}{2}}} = \frac{\frac{5}{2} - 1}{-e^{\frac{5}{2}}} = \frac{\frac{3}{2}}{-e^{\frac{5}{2}}} = -\frac{3}{2e^{\frac{5}{2}}}$$

O gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo em $]-\infty, 1 - e^{\frac{5}{2}}]$ e tem a concavidade voltada para cima em $[1 - e^{\frac{5}{2}}, 0[$ e em $]0, +\infty[$. O ponto de coordenadas $\left(1 - e^{\frac{5}{2}}, -\frac{3}{2e^{\frac{5}{2}}}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .

Assíntotas:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x) - 1}{x - 1} =$$

Considerando a mudança de variável $1-x=y \Leftrightarrow -x=y-1 \Leftrightarrow x=1-y$: se $x \rightarrow -\infty$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y) - 1}{1 - y - 1} =$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y) - 1}{-y} =$$

$$\begin{aligned}
 &= -\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)-1}{y} = \\
 &= -\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(y)}{y} - \frac{1}{y} \right) = \\
 &= -\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y} + \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} = \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de f quando $x \rightarrow -\infty$.

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{x} = e^{\frac{1}{+\infty}} = e^{0^+} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow xy = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{y}$: se $x \rightarrow +\infty$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} (e^y - 1) = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$y = x + 1$ é assíntota oblíqua ao gráfico de f quando $x \rightarrow +\infty$.


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x e^{\frac{1}{x}} \right) =$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow xy = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{y}$: se $x \rightarrow 0^+$, então $y \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \times e^y = \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y} = \\
 &\quad \underbrace{\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y}}_{\text{limite notável}} = \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$x = 0$ é assíntota vertical ao gráfico de f .

Representação gráfica:



$$\text{Contradomínio: } D'_f = \left[-\frac{1}{e^2}, 1 \right] \cup [e, +\infty[$$

61.

$$\begin{aligned}
 \text{61.1. } P(t) = 1 &\Leftrightarrow \frac{1,5}{1+10e^{-0,2t}} = 1 \Leftrightarrow 1,5 = 1 + 10e^{-0,2t} \\
 &\Leftrightarrow 0,05 = e^{-0,2t}
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \ln(0,05) = -0,2t$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,05)}{-0,2}$$

$$\Leftrightarrow t \approx 14,97866$$

Cálculo auxiliar

$$0,97866 \times 12 \approx 11,74392$$

A população de tigres irá atingir um milhar de exemplares em dezembro de 2027.

$$61.2. P'(t) = \frac{-1,5 \times 10 \times (-0,2) \times e^{-0,2t}}{(1+10e^{-0,2t})^2} = \frac{3e^{-0,2t}}{(1+10e^{-0,2t})^2} > 0, \forall t \geq 0$$


Como $P'(t) > 0, \forall t \geq 0$, P é uma função estritamente crescente.

$$61.3. \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1,5}{1+10e^{-0,2t}} = \frac{1,5}{1+10e^{-\infty}} = \frac{1,5}{1+10 \times 0} = 1,5$$

$y = 1,5$ é assíntota horizontal ao gráfico de P quando $t \rightarrow +\infty$.

Com o decorrer do tempo, o número de tigres tende para 1500.

61.4.



O aumento instantâneo máximo atingido pela população de tigres foi de 75 tigres por ano.

62.

$$62.1. \lim_{t \rightarrow 5^-} 55(1 - e^{kt}) = 55(1 - e^{5k})$$

$$\lim_{t \rightarrow 5^+} (6 + 27e^{-1,7(t-5)}) = 6 + 27e^0 = 33$$

$$f(5) = 33$$

$$55(1 - e^{5k}) = 33 \Leftrightarrow 1 - e^{5k} = \frac{33}{55} \Leftrightarrow 1 - e^{5k} = \frac{3}{5}$$

$$\Leftrightarrow -e^{5k} = \frac{3}{5} - 1$$

$$\Leftrightarrow -e^{5k} = -\frac{2}{5}$$


$$\Leftrightarrow e^{5k} = \frac{2}{5}$$

$$\Leftrightarrow 5k = \ln\left(\frac{2}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{\ln\left(\frac{2}{5}\right)}{5}$$

$$\Leftrightarrow k \approx -0,183$$

62.2. $v'(t) = 27 \times (-1,7)e^{-1,7t+8,5} = -45,9e^{-1,7t+8,5}$

t	5	$+\infty$
Sinal de v'	–	–
Variação de v	$v(5) = 33$	

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (6 + 27e^{-1,7(t-5)}) = 6 + 27e^{-\infty} = 6$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v'(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (-45,9e^{-1,7t+8,5}) = -45,9e^{-\infty} = -45,9 \times 0 = 0$$

Para $t \geq 5$, v é estritamente decrescente, uma vez que $v'(t) \leq 0, \forall t \geq 5$, ou seja, após a abertura do paraquedas, e com o decorrer do tempo, a velocidade diminui e tende para 6 m/s.

62.3. Tem-se $v(5) = 33, v(9) \approx 6,03$ e $v(60) \approx 6$.

$$\begin{aligned} t.m.v._{[5,9]} &= \frac{v(9) - v(5)}{9 - 5} = \frac{6 + 27e^{-1,7 \times 4} - 6 - 27e^{-1,7 \times 0}}{4} = \\ &= \frac{27e^{-6,8} - 27}{4} \approx -6,742 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t.m.v._{[9,13]} &= \frac{v(13) - v(9)}{13 - 9} = \frac{6 + 27e^{-1,7 \times 8} - 6 - 27e^{-1,7 \times 4}}{4} = \\ &= \frac{27e^{-13,6} - 27e^{-6,8}}{4} \approx -0,008 \end{aligned}$$

Tendo em conta estes resultados e a alínea anterior, é razoável concluir que a afirmação é verdadeira.

63.

63.1. $I'(x) = a \times (-b) \times e^{-bx} = -abe^{-bx}$

$I'(x) < 0, \forall x \geq 0$, uma vez que a e b são constantes positivas. Logo, I é estritamente decrescente, $\forall x \geq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (ae^{-bx}) = ae^{-\infty} = a \times 0 = 0$$

$y = 0$ é assíntota horizontal ao gráfico de I quando $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (ae^{-bx}) = ae^{-b \times 0} = a \times e^0 = a$$

Não existem assíntotas verticais.

63.2. $\frac{I'(x)}{I(x)} = \frac{-abe^{-bx}}{ae^{-bx}} = -b$

Assim, $I'(x) = -bI(x)$.

63.3. $I(x) = \frac{I(0)}{2} \Leftrightarrow I(x) = \frac{a}{2} \Leftrightarrow ae^{-bx} = \frac{1}{2}a$

$$\Leftrightarrow e^{-bx} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -bx = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow -bx = \ln(1) - \ln(2) \Leftrightarrow -bx = -\ln(2)$$

$$\Leftrightarrow bx = \ln(2) \Leftrightarrow x = \frac{\ln(2)}{b} \quad \text{c. q. m.}$$

$$63.4. \begin{cases} I(0) = 10 \\ I(2) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ae^{-b \times 0} = 10 \\ ae^{-b \times 2} = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ e^{-2b} = \frac{9}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ -2b = \ln\left(\frac{9}{10}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = \frac{\ln\left(\frac{9}{10}\right)}{-2} \end{cases}$$



$$a = 10 \text{ e } b = \frac{\ln\left(\frac{9}{10}\right)}{-2} = \ln\left(\frac{\sqrt{10}}{3}\right)$$

64.

$$64.1. P(0) = 10\,000(7 + 15e^{-0,05 \times 0} + 0 \times e^{-0,05 \times 0}) = 220\,000 \text{ bactérias.}$$

$$64.2. P'(t) = 10\,000(0,25e^{-0,05t} - 0,05te^{-0,05t})$$

$$\begin{aligned} P'(t) = 0 &\Leftrightarrow 10\,000(0,25e^{-0,05t} - 0,05te^{-0,05t}) = 0 \Leftrightarrow 0,25e^{-0,05t} - 0,05te^{-0,05t} = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{-0,05t}(0,25 - 0,05t) = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{-0,05t} = 0 \vee 0,25 - 0,05t = 0 \\ &\Leftrightarrow t = \frac{-0,25}{-0,05} \\ &\Leftrightarrow t = 5 \text{ horas} \end{aligned}$$

t	0		5	$+\infty$
Sinal de P'	0,25	+	0	-
Variação de P	220 000		Máx.	

$$P(5) \approx 225\,760 \text{ bactérias}$$

O valor máximo é 225 760 bactérias e é atingido em $t = 5$.

$$64.3. \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} [10\,000(7 + 15e^{-0,05 \times (+\infty)} + (+\infty) \times e^{-0,05 \times (+\infty)})] = 70\,000$$

A população tende para 70 000 bactérias.

$$65. f'(x) = -e^{-x+1}$$

Assim, a equação da reta QR é da forma $y = (-e^{-x_0+1})x + b$.

$$f(x_0) = -e^{-x_0+1} \times x_0 + b$$

$$\text{Substituindo na equação da reta: } e^{-x_0+1} + e^{-x_0+1} \times x_0 = b \Leftrightarrow e^{-x_0+1}(1 + x_0) = b$$

$$\text{Logo, } QR: y = -e^{-x_0+1}x + e^{-x_0+1}(1 + x_0).$$

$$\text{Portanto, } Q(0, e^{-x_0+1}(1 + x_0)).$$

Coordenadas de P :

$$0 = -e^{-x_0+1}x + e^{-x_0+1}(1 + x_0) \Leftrightarrow x = \frac{e^{-x_0+1}(1+x_0)}{e^{-x_0+1}} \Leftrightarrow x = 1 + x_0$$

$$\text{Deste modo, } P(1 + x_0, 0).$$

$$\text{Então, } A(x_0) = \frac{(1+x_0)^2 e^{-x_0+1}}{2}.$$

$$\begin{aligned} A'(x) &= \frac{1}{2}(2(1+x_0)e^{-x_0+1} - (1+x_0)^2 e^{-x_0+1}) = \frac{1}{2}(1+x_0)e^{-x_0+1}(2-1-x_0) = \\ &= \frac{1}{2}(1-x_0)^2 e^{-x_0+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A'(x) = 0 \wedge x_0 > 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2}(1-x_0)^2 e^{-x_0+1} = 0 \wedge x_0 > 0 \\
 &\Leftrightarrow (1-x_0)^2 = 0 \wedge x_0 > 0 \\
 &\Leftrightarrow x_0 = 1
 \end{aligned}$$

O triângulo $[OQR]$ tem área máxima quando a abcissa de P é igual a 1.

66.

66.1. $g: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto 40 \times 1,002^x$$

$$g(0) = 40 \times 1,002^0 = 40 \text{ aves}$$

$$\begin{aligned}
 66.2. \frac{g(x+30)}{g(x)} &= \frac{40 \times 1,002^{x+30}}{40 \times 1,002^x} = \\
 &= \frac{40 \times 1,002^x \times 1,002^{30}}{40 \times 1,002^x} = \\
 &= 1,002^{30} \approx 1,06
 \end{aligned}$$

$$0,06 \times 100 = 6\% \text{ por mês}$$

$$\begin{aligned}
 66.3. \frac{g(x+t)}{g(x)} = 2 &\Leftrightarrow \frac{40 \times 1,002^{x+t}}{40 \times 1,002^x} = 2 \Leftrightarrow \frac{1,002^x \times 1,002^t}{1,002^x} = 2 \\
 &\Leftrightarrow 1,002^t = 2 \\
 &\Leftrightarrow t = \log_{1,002}(2) \\
 &\Leftrightarrow t \approx 347 \text{ dias}
 \end{aligned}$$

67.

$$\begin{aligned}
 67.1. -16^{x+1} + 20 \times 4^{2x+1} &= 4 \Leftrightarrow -4^{2x+2} + 20 \times 4^{2x+1} = 4 \\
 &\Leftrightarrow 4^{2x} (-4^2 + 20 \times 4) = 4 \\
 &\Leftrightarrow 4^{2x} \times 64 = 4 \\
 &\Leftrightarrow 4^{2x} = \frac{1}{16} \\
 &\Leftrightarrow 4^{2x} = 4^{-2} \\
 &\Leftrightarrow 2x = -2 \\
 &\Leftrightarrow x = -1
 \end{aligned}$$

$$\text{C. S.} = \{-1\}$$

$$\begin{aligned}
 67.2. \frac{8^x(x^2-3x)+16}{8^x-8} &= -2 \Leftrightarrow \frac{8^x(x^2-3x)+16}{8^x-8} + 2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{8^x(x^2-3x)+16+2 \times 8^x-16}{8^x-8} = 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{8^x(x^2-3x+2)}{8^x-8} = 0 \\
 &\Leftrightarrow 8^x(x^2-3x+2) = 0 \wedge 8^x-8 \neq 0
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \left(\underbrace{8^x = 0}_{\text{condição impossível}} \vee x^2 - 3x + 2 = 0 \right) \wedge 8^x \neq 8$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} \wedge x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x = 2 \vee x = 1) \wedge x \neq 1$$

$$\text{C. S.} = \{2\}$$

$$67.3. 4^x + 6^x = 2 \times 9^x \Leftrightarrow 6^x \left(\left(\frac{4}{6} \right)^x + 1 - 2 \left(\frac{9}{6} \right)^x \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{6^x = 0}_{\text{condição impossível}} \vee \left(\frac{2}{3} \right)^x + 1 - 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow y + 1 - \frac{2}{y} = 0 \wedge y = \left(\frac{2}{3} \right)^x$$

$$\Leftrightarrow y^2 + y - 2 = 0 \wedge y = \left(\frac{2}{3} \right)^x$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \wedge y = \left(\frac{2}{3} \right)^x$$

$$\Leftrightarrow (y = -2 \vee y = 1) \wedge y = \left(\frac{2}{3} \right)^x$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{2}{3} \right)^x = -2}_{\text{condição impossível}} \vee \left(\frac{2}{3} \right)^x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{C. S.} = \{0\}$$

$$67.4. \frac{3^x + 3^{-x}}{3^x - 3^{-x}} = 2 \Leftrightarrow \frac{3^x + \frac{1}{3^x}}{3^x - \frac{1}{3^x}} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{2x} + 1}{3^{2x} - 1} - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3^{2x} + 1 - 2 \times 3^{2x} + 2}{3^{2x} - 1} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-3^{2x} + 3}{3^{2x} - 1} = 0$$

$$\Leftrightarrow -3^{2x} + 3 = 0 \wedge 3^{2x} - 1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} = 3 \wedge 3^{2x} \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 2x = 1 \wedge 2x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \wedge x \neq 0$$

$$\text{C. S.} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$68. -2^{2x+1} + 4 \leq -31 \times 2^{x-1} \Leftrightarrow -2 \times 2^{2x} + 4 + \frac{31}{2} \times 2^x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -2y^2 + \frac{31}{2}y + 4 \leq 0 \wedge y = 2^x$$

$$\Leftrightarrow -4y^2 + 31y + 8 \leq 0 \wedge y = 2^x$$

Cálculo auxiliar

$$-4y^2 + 31y + 8 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{-31 \pm \sqrt{31^2 + 16 \times 8}}{-8} \Leftrightarrow y = \frac{31 \pm 33}{8} \Leftrightarrow y = 8 \vee y = -\frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(y \leq -\frac{1}{4} \vee y \geq 8 \right) \wedge y = 2^x$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{2^x \leq -\frac{1}{4}}_{\text{condição impossível}} \vee 2^x \geq 8$$

$$\Leftrightarrow 2^x \geq 2^3$$

$$\Leftrightarrow x \geq 3$$

$$\text{C.S.} = [3, +\infty[$$

$$69. D = \{x \in \mathbb{R}: x^7 > 0 \wedge x^{\log(x^7)} > 0 \wedge x^5 > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$\frac{1}{7} \log(x^{\log(x^7)}) - \log(x^5) + 4 = 0 \Leftrightarrow \log(x^{\log(x^7)})^{\frac{1}{7}} - 5 \log(x) + 4 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log\left(x^{\frac{1}{7} \log(x^7)}\right) - 5 \log(x) + 4 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log(x^{\log(x)}) - 5 \log(x) + 4 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log(x) \times \log(x) - 5 \log(x) + 4 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (\log(x))^2 - 5 \log(x) + 4 = 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log(x) = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \log(x) = \frac{5 \pm 3}{2} \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (\log(x) = 1 \vee \log(x) = 4) \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow (x = 10 \vee x = 10\,000) \wedge x \in D$$

$$\text{C.S.} = \{10, 10\,000\}$$

70.

$$70.1. D = \{x \in \mathbb{R}: 3x > 0 \wedge x + 6 > 0\} = \mathbb{R}^+$$

$$x^3 \ln(3x) + x^3 \log_{\frac{1}{e}}(x+6) \leq 0 \Leftrightarrow \underbrace{x^3}_{>0, \forall x \in D} \left(\ln(3x) + \log_{\frac{1}{e}}(x+6) \right) \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \ln(3x) + \frac{\ln(x+6)}{\ln(\frac{1}{e})} \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \ln(3x) - \ln(x+6) \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{3x}{x+6}\right) \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x}{x+6} \leq 1 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x}{x+6} - 1 \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-6}{x+6} \leq 0 \wedge x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2x - 6 \leq 0 \wedge x \in D \quad (x + 6 > 0, \forall x \in D)$$

$$\Leftrightarrow x \leq 3 \wedge x \in D$$

$$C.S. =]0, 3]$$

$$70.2. D = \left\{ x \in \mathbb{R} : 2x > 0 \wedge \frac{1-x}{x} > 0 \right\} =]0, 1[$$

Cálculo auxiliar

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$1-x$	+	+	+	0	-
x	-	0	+	+	+
$\frac{1-x}{x}$	-	n.d.	+	0	-

Em $]0, 1[$:

$$-\log_3(2x) < 2 + \log_3\left(\frac{1-x}{x}\right) \Leftrightarrow -2 < \log_3\left(\frac{1-x}{x}\right) + \log_3(2x)$$

$$\Leftrightarrow -2 < \log_3\left(\frac{1-x}{x} \times 2x\right)$$

$$\Leftrightarrow -2 < \log_3(2-2x)$$

$$\Leftrightarrow 2-2x > 3^{-2}$$

$$\Leftrightarrow 2-2x > \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow 2 - \frac{1}{9} > 2x$$

$$\Leftrightarrow \frac{17}{9} > 2x$$

$$\Leftrightarrow \frac{17}{18} > x$$

$$C.S. = \left]0, \frac{17}{18}\right[$$

$$70.3. D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4 > 0\} =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

Cálculo auxiliar

$$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 2$$

$$x \log_3(x^2 - 4) > x \Leftrightarrow x (\log_3(x^2 - 4) - 1) > 0 \wedge x \in D$$

Cálculo auxiliar

$$\log_3(x^2 - 4) - 1 = 0 \Leftrightarrow \log_3(x^2 - 4) = 1 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 3 \Leftrightarrow x^2 = 7 \Leftrightarrow x = \sqrt{7} \vee x = -\sqrt{7}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{7}$		-2	2		$\sqrt{7}$	$+\infty$
x	-	-	-	-	+	+	+	+
$\log_3(x^2 - 4) - 1$	+	0	-	n.d.	n.d.	-	0	+
$x (\log_3(x^2 - 4) - 1)$	-	0	+	n.d.	n.d.	-	0	+

$$C.S. =]-\sqrt{7}, -2[\cup]\sqrt{7}, +\infty[$$

70.4. $D = \{x \in \mathbb{R}: x - 1 > 0 \wedge 3x - 4 > 0\} = \left] \frac{4}{3}, +\infty \right[$

Cálculo auxiliar

• $\log_2(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 2$

• $\log_2(3x - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x - 4 = 1 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$

x	$\frac{4}{3}$		$\frac{5}{3}$		2	$+\infty$
$-\log_2(x - 1)$	+	+	+	+	0	–
$\log_2(3x - 4)$	n. d.	–	0	+	+	+
$-\log_2(x - 1) \times \log_2(3x - 4)$	n. d.	–	0	+	0	–

C. S. = $\left] \frac{5}{3}, 2 \right[$

71. $k \in \mathbb{R}^+$

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow (-4)^2 - 4 \times 1 \times \log_2(k) > 0 \Leftrightarrow 16 - 4 \log_2(k) > 0$$

$$\Leftrightarrow -4 \log_2(k) > -16$$

$$\Leftrightarrow \log_2(k) < 4$$

$$\Leftrightarrow k < 2^4$$

$$\Leftrightarrow k < 16$$

Logo, $k \in]0, 16[$.

72. $\log_2(\sqrt{a+4} + \sqrt{a-4}) = b \Leftrightarrow \sqrt{a+4} + \sqrt{a-4} = 2^b$

$$\Leftrightarrow (a+4) - (a-4) = 2^b (\sqrt{a+4} - \sqrt{a-4})$$

$$\Leftrightarrow a+4 - a+4 = 2^b (\sqrt{a+4} - \sqrt{a-4})$$

$$\Leftrightarrow 8 = 2^b (\sqrt{a+4} - \sqrt{a-4})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a+4} - \sqrt{a-4} = \frac{8}{2^b}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a+4} - \sqrt{a-4} = 2^{3-b}$$

Assim, $\log_2(\sqrt{a+4} - \sqrt{a-4}) = \log_2(2^{3-b}) = 3 - b$.

73.

73.1. $P(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{100}{3}(2^{2(1-t)} - 1) = 0 \Leftrightarrow 2^{2(1-t)} - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow 2^{2(1-t)} = 1$$

$$\Leftrightarrow 2(1-t) = \log_2(1)$$

$$\Leftrightarrow 2(1-t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{2 = 0}_{\text{equação impossível}} \vee 1 - t = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 1$$

A reação termina ao fim de 1 minuto.

73.2. $P(t) = 30$

$$\begin{aligned} \frac{100}{3} (2^{2(1-t)} - 1) = 30 &\Leftrightarrow 2^{2(1-t)} - 1 = \frac{90}{100} \Leftrightarrow 2^{2-2t} = \frac{9}{10} + 1 \\ &\Leftrightarrow 2^{2-2t} = \frac{19}{10} \\ &\Leftrightarrow 2 - 2t = \log_2\left(\frac{19}{10}\right) \\ &\Leftrightarrow -2t = -2 + \log_2\left(\frac{19}{10}\right) \\ &\Leftrightarrow t = 1 - \frac{1}{2} \log_2\left(\frac{19}{10}\right) \\ &\Leftrightarrow t = 1 + \frac{1}{2} \log_2 \sqrt{\frac{10}{19}} \\ &\Leftrightarrow t \approx 0,537 \end{aligned}$$

$$0,537 \times 60 \approx 32 \text{ segundos}$$

73.3. $P(t) = \frac{100}{3} (2^{2(1-t)} - 1) \Leftrightarrow 3P(t) = 100(2^{2(1-t)} - 1)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{3P(t)}{100} = 2^{2(1-t)} - 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{3P(t)}{100} + 1 = 2^{2(1-t)} \\ &\Leftrightarrow \log_2\left(\frac{3P(t)}{100} + 1\right) = 2 - 2t \\ &\Leftrightarrow \log_2\left(\frac{3P(t)}{100} + 1\right) - 2 = -2t \\ &\Leftrightarrow \frac{\log_2\left(\frac{3P(t)}{100} + 1\right) - 2}{-2} = t \end{aligned}$$

Assim:


$$P^{-1}(t): \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \frac{\log_2\left(\frac{3t}{100} + 1\right) - 2}{-2}$$

73.4. $y_1 = \frac{100}{3} (2^{2(1-t)} - 1)$

$$y_2 = 50$$

$$I(0,339; 50)$$



$$0,339 \times 60 \approx 20 \text{ segundos}$$

74. 1.º passo

$$\text{Log}(E) = 5,24 + 1,44 \times 8,6 \Leftrightarrow \log(E) = 17,624$$

$$\Leftrightarrow E = 10^{17,624}$$

$$\Leftrightarrow E \approx 4,207 \times 10^{17}$$

2.º passo

$$4 \times 4,207 \times 10^{17} = 1,6828 \times 10^{18}$$

3.º passo

$$\log(1,6828 \times 10^{18}) = 5,24 + 1,44M \Leftrightarrow \frac{\log(1,6828 \times 10^{18}) - 5,24}{1,44} = M \Leftrightarrow M \approx 9,0$$

75.

$$75.1. N(9,25) = 17,3 \Leftrightarrow \frac{20}{1+e^{-9,25k}} = 17,3 \Leftrightarrow 1 + e^{-9,25k} = \frac{20}{17,3}$$

$$\Leftrightarrow e^{-9,25k} = \frac{20}{17,3} - 1$$

$$\Leftrightarrow -9,25k = \ln\left(\frac{20}{17,3} - 1\right)$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{\ln\left(\frac{20}{17,3} - 1\right)}{-9,25}$$

$$\Leftrightarrow k \approx 0,2$$

$$75.2. \frac{N(t+3)}{N(t)} = 1,32 \Leftrightarrow \frac{\frac{20}{1+e^{-0,3(t+3)}}}{\frac{20}{1+e^{-0,3t}}} = 1,32$$

$$\Leftrightarrow \frac{1+e^{-0,3t}}{1+e^{-0,3t-0,9}} = 1,32$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-0,3t} = 1,32(1 + e^{-0,3t-0,9})$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-0,3t} = 1,32 + 1,32e^{-0,3t-0,9}$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-0,3t} = 1,32 + 1,32e^{-0,3t}e^{-0,9}$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-0,3t} = 1,32 + 0,53667e^{-0,3t}$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,3t} - 0,53667e^{-0,3t} = 1,32 - 1$$

$$\Leftrightarrow 0,46333e^{-0,3t} = 0,32$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,3t} = \frac{0,32}{0,46333}$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,3t} = 0,69065$$

$$\Leftrightarrow -0,3t = \ln(0,69065)$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,69065)}{-0,3}$$


$$\Leftrightarrow t \approx 1,23374$$

Cálculo auxiliar

$0,23374 \times 24 \approx 6$ horas

Decorreram 1 dia e 6 horas, aproximadamente.

75.3.



$$k \approx 0,49 \text{ ou } k \approx 0,73$$

76.

$$76.1. \frac{C(x+1)}{C(x)} = \frac{150\,000 \left(\frac{27}{25}\right)^{x+1}}{150\,000 \left(\frac{27}{25}\right)^x} = \frac{27}{25} = 1,08$$

8% ao ano.

$$76.2. C(x) = 300\,000 \Leftrightarrow 150\,000 \left(\frac{27}{25}\right)^x = 300\,000 \Leftrightarrow \left(\frac{27}{25}\right)^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \log_{\left(\frac{27}{25}\right)}(2)$$

$$\Leftrightarrow x \approx 9$$

O Pedro terá de esperar 9 anos, aproximadamente.

77.

77.1.

$$C: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 45\,000e^{-0,223x}$$

$$77.2. C(x) = 9000 \Leftrightarrow 45\,000e^{-0,223x} = 9000$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,223x} = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow -0,223x = \ln\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\ln\left(\frac{1}{5}\right)}{-0,223}$$

$$\Leftrightarrow x \approx 7,217$$

Cálculo auxiliar

$$0,217 \times 365 \approx 79 \text{ dias}$$

7 anos e 79 dias, aproximadamente.

$$77.3. C(x) = 45\,000e^{-0,223x}$$

$$\text{Valor ao fim de um mês: } C\left(\frac{1}{12}\right) = 45\,000e^{-0,223 \times \frac{1}{12}} \approx 44\,171,47225$$

$$\text{Valor ao fim de dois meses: } C\left(\frac{2}{12}\right) = C\left(\frac{1}{6}\right) = 45\,000e^{-0,223 \times \frac{1}{6}} \approx 43\,358,19912$$

$$\frac{43\,358,19912}{44\,171,47225} \approx 0,9816(4 \text{ c. d.})$$

Generalizando:

$$C(x) = 45\,000e^{-0,223x}$$

$$C\left(x + \frac{1}{12}\right) = 45\,000e^{-0,223\left(x + \frac{1}{12}\right)} = 45\,000e^{-0,223x - \frac{0,223}{12}}$$

$$\begin{aligned}\frac{C\left(x + \frac{1}{12}\right)}{C(x)} &= \frac{45\,000e^{-0,223x - \frac{0,223}{12}}}{45\,000e^{-0,223x}} = \\ &= \frac{45\,000e^{-0,223x}e^{-\frac{0,223}{12}}}{45\,000e^{-0,223x}} = \\ &= e^{-\frac{0,223}{12}} \approx 0,9816 \text{ (4 c. d.)}\end{aligned}$$

$$(1 - 0,9816) \times 100 \approx 1,8\%$$

78.

78.1. Seja $f(x) = xe^x$.

$$\text{Então, } f'(x) = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(x + 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xe^x - 2e^2}{x - 2} = f'(2) = e^2(2 + 1) = 3e^2$$

78.2. Seja $f(x) = xe^x$.

$$\text{Então, } f'(x) = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(x + 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{xe^x - 3e^3}{x - 3} = f'(3) = e^3(3 + 1) = 4e^3$$

$$\begin{aligned}\mathbf{78.3.} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(x^2 + 2x + 4) - \ln(x + 4)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln\left(\frac{x^2 + 2x + 4}{x + 4}\right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln\left(\frac{x^2 + x}{x + 4} + 1\right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln\left(\frac{x^2 + x}{x + 4} + 1\right)}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln\left(\frac{x^2 + x}{x + 4} + 1\right)}{\frac{x^2 + x}{x + 4}} \times \frac{x + 1}{x + 4}} = \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x^2 + x}{x + 4} + 1\right)}{\frac{x^2 + x}{x + 4}} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1}{x + 4}} =\end{aligned}$$

Considerando a mudança de variável $y = \frac{x^2 + x}{x + 4}$: se $x \rightarrow 0$, então $y \rightarrow 0$.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(y + 1)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1}{x + 4} =$$

Considerando a mudança de variável $z = \ln(y + 1) \Leftrightarrow y + 1 = e^z \Leftrightarrow y = e^z - 1$: se $y \rightarrow 0$, então $z \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}&= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1}{x + 4} = \\ &= 1 \times 4 = \\ &= 4\end{aligned}$$

78.4. $\lim_{x \rightarrow \ln(3)} \frac{-e^{2x}+9}{x-\ln(3)} =$

Considerando a mudança de variável $x - \ln(3) = y \Leftrightarrow x = \ln(3) + y$: se $x \rightarrow \ln(3)$, então $y \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-e^{2(\ln(3)+y)}+9}{y} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-e^{2\ln(3)+2y}+9}{y} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-e^{\ln(3^2)+2y}+9}{y} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-e^{\ln(9)} \times e^{2y}+9}{y} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-9e^{2y}+9}{y} = \\
 &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-9(e^{2y}-1)}{y} = \\
 &= -9 \times \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2y}-1}{2y} \times 2 \right) = \\
 &= -18 \times \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{2y}-1}{2y}}_{\text{limite notável}} = \\
 &= -18 \times 1 = \\
 &= -18
 \end{aligned}$$

79. $f(0) = b + 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[a + \frac{\ln(1-2x)}{x} \right] = a + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-2x)}{x} =$$

Considerando a mudança de variável $\ln(1-2x) = y \Leftrightarrow 1-2x = e^y \Leftrightarrow -2x = e^y - 1$
 $\Leftrightarrow x = \frac{e^y-1}{-2}$: se $x \rightarrow 0^+$, então $y \rightarrow 0^-$.

$$\begin{aligned}
 &= a + \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{\frac{y}{\frac{e^y-1}{-2}}}{\frac{e^y-1}{-2}} = \\
 &= a + \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{-2y}{e^y-1} = \\
 &= a - 2 \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{y}{e^y-1} = \\
 &= a - 2 \times \underbrace{\frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^y-1}{y}}}_{\text{limite notável}} = \\
 &= a - 2 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^x}{ax} &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^x}{x} = \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(e^x-1)}{x} = \\
 &= -\frac{1}{a} \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x-1}{x}}_{\text{limite notável}} = \\
 &= -\frac{1}{a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a - 2 = b + 2a \\ -\frac{1}{a} = b + 2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2 = -\frac{1}{a} \\ a - 2 + \frac{1}{a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 2a + 1 = 0 \\ (a - 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \end{cases}$$

Logo, $a = 1$ e $b = -3$.

$$\begin{aligned} 80. m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{g(x)}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x \times g(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{g(x)} = \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}} = \\ &= \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Assim, $y = \frac{1}{e}x$ é assíntota ao gráfico de h .

81. A reta de equação $y = 2$ é uma assíntota ao gráfico de g , uma vez que $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - 2] = 0$.

Assim, podemos eliminar a opção (III).

A função derivada g' e a função f têm o mesmo sinal, pois $e^{-x} > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Portanto, a derivada é positiva apenas no intervalo $]2, +\infty[$. Logo, g é crescente em $]2, +\infty[$, o que nos faz eliminar a opção (II).

-1 é zero da função f . Assim, $g'(-1) = f(-1) \times e^{-1} = 0 \times e^{-1} = 0$. Como o declive da reta tangente ao gráfico é igual a 0, a reta tangente é horizontal, o que nos permite eliminar a opção (I).


Assim, a opção correta é a (IV).

$$82. f(x) = xe^{-x} + (x+1)\ln(x+1)$$

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} + \ln(x+1) + (x+1)\frac{1}{x+1} =$$

$$= e^{-x}(1-x) + \ln(x+1) + 1$$

$$e^{-x}(1-x) + \ln(x+1) + 1 = x$$



$P(1,94; 1,94)$

A área do triângulo é aproximadamente igual a 1,88 unidades de área.

83. (I) Começemos por provar que $P(1)$ é verdadeira:

$$P(1): \forall n \in \mathbb{N}, f'(x) = e^x(x+1)$$

$$f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x(1+x) = e^x(x+1)$$

(II) Provemos que, para todo o $n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$, isto é, se $P(n)$ é verdadeira, então $P(n+1)$ também é verdadeira.

$$\text{Hipótese de indução: } \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = e^x(x+n)$$

$$\text{Tese de indução: } \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n+1)}(x) = e^x(x+n+1)$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= [f^{(n)}(x)]' \stackrel{\text{hipótese de indução}}{=} [e^x(x+n)]' = e^x(x+n) + e^x \times 1 = \\ &= e^x(x+n+1) \end{aligned}$$

Demonstrámos, assim, a hereditariedade da condição $P(n)$.

Por (I) e por (II), provámos que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = e^x(x+n)$.

84. (I) Começemos por provar que $P(1)$ é verdadeira:

$$P(1): \forall n \in \mathbb{N}, g'(x) = e^x(x+1)$$

$$g'(x) = \frac{(-1)^{1-1} \times (1-1)!}{x \ln(a)} = \frac{1}{x \ln(a)}$$

(II) Provemos que, para todo o $n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$, isto é, se $P(n)$ é verdadeira, então $P(n+1)$ também é verdadeira.

$$\text{Hipótese de indução: } P(n): \forall n \in \mathbb{N}, g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{x^n \times \ln(a)}$$

$$\text{Tese de indução: } P(n+1): \forall n \in \mathbb{N}, g^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^n \times n!}{x^{n+1} \times \ln(a)}$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} g^{(n+1)}(x) &= (g^{(n)}(x))' \stackrel{\text{hipótese de indução}}{=} \left(\frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{x^n \times \ln(a)} \right)' = \\ &= \left(\frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{\ln(a)} \times x^{-n} \right)' = \\ &= \frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{\ln(a)} \times (-n) \times x^{-n-1} = \\ &= \frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{\ln(a)} \times (-1)n \times x^{-n-1} = \\ &= \frac{(-1)^n \times n!}{\ln(a)} \times \frac{1}{x^{n+1}} = \\ &= \frac{(-1)^n \times n!}{x^{n+1} \times \ln(a)} \end{aligned}$$

Demonstrámos, assim, a hereditariedade da condição $P(n)$.

Por (I) e por (II), provámos que $\forall n \in \mathbb{N}, g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} \times (n-1)!}{x^n \times \ln(a)}$.

$$85. f(x) = 5(e^{1-0,1x} + e^{0,1x-1})$$

$$85.1. f(0) = 5(e^{1-0} + e^{-1}) = 5\left(e + \frac{1}{e}\right) \approx 15,431$$

$$f(30) = 5(e^{1-0,1 \times 30} + e^{0,1 \times 30-1}) \approx 37,622$$

$$f(30) - f(0) = 37,622 - 15,431 \approx 22,2$$

Aproximadamente 22,2 metros.

$$85.2. f'(x) = 5 \times (e^{1-0,1x} \times (-0,1) + e^{0,1x-1} \times 0,1) =$$

$$= 5 \times (0,1 \times e^{0,1x-1} - 0,1e^{1-0,1x}) =$$

$$= 0,5(e^{0,1x-1} - e^{1-0,1x})$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 0,5(e^{0,1x-1} - e^{1-0,1x}) = 0 \Leftrightarrow e^{0,1x-1} = e^{1-0,1x}$$

$$\Leftrightarrow 0,1x - 1 = 1 - 0,1x$$

$$\Leftrightarrow 0,1x + 0,1x = 1 + 1$$

$$\Leftrightarrow 0,2x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{2}{0,2}$$

$$\Leftrightarrow x = 10$$

$$f(10) = 5(e^{1-0,1 \times 10} + e^{0,1 \times 10-1}) = 5(e^{1-1} + e^{1-1}) =$$

$$= 5(e^0 + e^0)$$

$$= 5 \times 2 =$$

$$= 10$$

A distância é 10 metros

$$85.3. f(x) = 15 \Leftrightarrow 5(e^{1-0,1x} + e^{0,1x-1}) = 15 \Leftrightarrow e^{1-0,1x} + e^{0,1x-1} = 3$$

$$\Leftrightarrow e \times e^{-0,1x} + e^{0,1x}e^{-1} - 3 = 0$$

$$\frac{1}{e}(e^{0,1x})^2 - 3e^{0,1x} + e = 0 \Leftrightarrow e^{0,1x} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times \frac{1}{e} \times e}}{2 \times \frac{1}{e}}$$

$$\Leftrightarrow e^{0,1x} \approx 7,117 \vee e^{0,1x} \approx 1,038$$

$$\Leftrightarrow 0,1x = \ln(7,117) \vee 0,1x = \ln(1,038)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\ln(7,117)}{0,1} \vee x = \frac{\ln(1,038)}{0,1}$$

$$\Leftrightarrow x \approx 19,625 \vee x \approx 0,373$$

Aproximadamente, 0,4 e 19,6 metros.

86.

$$86.1. C'(t) = \frac{k}{a-b}(e^{-bt} \times (-b) - e^{-at} \times (-a)) = \frac{k}{a-b}(-be^{-bt} + ae^{-at})$$

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{k}{a-b}(-be^{-bt} + ae^{-at}) = 0 \Leftrightarrow ae^{-at} - be^{-bt} = 0$$

$$\Leftrightarrow ae^{-at}e^{at} - be^{-bt}e^{at} = 0$$

$$\Leftrightarrow ae^0 - be^{at}e^{-bt} = 0$$

$$\Leftrightarrow a - be^{at}e^{-bt} = 0$$

$$\Leftrightarrow -be^{at}e^{-bt} = -a$$

$$\Leftrightarrow e^{at}e^{-bt} = \frac{-a}{-b}$$

$$\Leftrightarrow e^{at-bt} = \frac{a}{b}$$

$$\Leftrightarrow at - bt = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$$

$$\Leftrightarrow (a - b)t = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{a}{b}\right)}{a-b} \quad \text{c. q. m.}$$

$$86.2. \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{k}{a-b} (e^{-bt} - e^{-at}) \right) = \frac{k}{a-b} (e^{-\infty} - e^{-\infty}) = 0$$

Com o decorrer do tempo, a concentração da substância injetada tende para 0.

87.

$$87.1. W(0) = 2600(1 - 0,51e^0)^3 \approx 306$$

Uma elefanta recém-nascida pesa, aproximadamente, 306 quilogramas.

Taxa de crescimento: em primeiro lugar, é necessário determinar a função derivada de W .

$$\begin{aligned} W'(t) &= 2600 \times 3(1 - 0,51e^{-0,075x})^2 \times 0,03825e^{-0,075x} = \\ &= 7800(1 - 0,51e^{-0,075x})^2 \times 0,03825e^{-0,075x} = \\ &= 298,35(1 - 0,51e^{-0,075x})^2 e^{-0,075x} \end{aligned}$$

$$W'(0) \approx 72$$

Aos zero anos, a massa aumenta a uma taxa de aproximadamente 72 kg/ano.

$$87.2. W(t) = 1800 \Leftrightarrow 2600(1 - 0,51e^{-0,075t})^3 = 1800 \Leftrightarrow (1 - 0,51e^{-0,075t})^3 = \frac{9}{13}$$

$$\Leftrightarrow 1 - 0,51e^{-0,075t} = \sqrt[3]{\frac{9}{13}}$$

$$\Leftrightarrow -0,51e^{-0,075t} = \sqrt[3]{\frac{9}{13}} - 1$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,075t} = \frac{\sqrt[3]{\frac{9}{13}} - 1}{-0,51}$$

$$\Leftrightarrow -0,075t = \ln\left(\frac{\sqrt[3]{\frac{9}{13}} - 1}{-0,51}\right)$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{\sqrt[3]{\frac{9}{13}} - 1}{-0,51}\right)}{-0,075}$$

$$\Leftrightarrow t \approx 20$$

A elefanta tem aproximadamente 20 anos

Taxa de crescimento:

$$W'(20) \approx 52$$

Aos 20 anos, a massa aumenta a uma taxa de, aproximadamente, 52 kg/ano.

$$\mathbf{87.3.} \lim_{t \rightarrow +\infty} W(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (2600(1 - 0,51e^{-0,075t})^3) = 2600(1 - 0,51e^{-\infty})^3 = 2600$$

Com o decorrer do tempo, a massa, em quilogramas, de uma elefanta africana tende para 2600 quilogramas.

87.4. Em primeiro lugar, temos de determinar W'' .

$$\begin{aligned} W''(t) &= 2 \times 298,35(1 - 0,51e^{-0,075t}) \times 0,03825e^{-0,075t} \times e^{-0,075t} + \\ &\quad + 298,35(1 - 0,51e^{-0,075t})^2 \times (-0,075)e^{-0,075t} = \\ &= 22,823775e^{-0,15t}(1 - 0,51e^{-0,075t}) - 22,37625e^{-0,075t}(1 - 0,51e^{-0,075t})^2 \end{aligned}$$

$$W(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow 22,823775e^{-0,15t}(1 - 0,51e^{-0,075t}) - 22,37625e^{-0,075t}(1 - 0,51e^{-0,075t})^2 = 0$$

Com recurso à calculadora gráfica, verificamos que $t \approx 5,67$.

Portanto, a taxa de crescimento é máxima entre os 5 e os 6 anos de idade.