

QUESTÃO-AULA - Matemática A 11.º ANO

Nome: ______ Turma: ____ N.º ___ Data: ___/__/__ Classificação: _____ Prof.: _____ Enc. Ed.: ____

Na figura ao lado, estão representados, em referencial ortonormado, Oxy, a circunferência trigonométrica, a reta de equação x=1 e o triângulo $\begin{bmatrix} AOB \end{bmatrix}$.

Sabe-se que:

- ullet o ponto A é a interseção do eixo das abcissas com a reta vertical;
- o ponto T pertence à reta vertical e tem ordenada t > 0;
- ullet o ponto B, pertencente ao 3.º quadrante, é a interseção da circunferência trigonométrica com a reta OT;
- $A\hat{O}B = \alpha$.
- **1.** Determina a área do triângulo $\begin{bmatrix} AOB \end{bmatrix}$, para $\alpha = \frac{7\pi}{6}$.



3. Mostra que a área do triângulo [AOB] é dada, em função de α , pela expressão

$$-\frac{\sin\alpha}{2} \quad \left(\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}\right)$$

- **4.** Determina o valor de t, sabendo que a área do triângulo [AOB] é igual a $\frac{\sqrt{3}}{4}$.
- **5**. Mostra que o perímetro do triângulo $\begin{bmatrix} AOB \end{bmatrix}$ é dado, em função de lpha , pela expressão

$$2+\sqrt{2-2\cos\alpha} \quad \left(\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}\right)$$

6. Determina o perímetro do triângulo [AOB], para $\sin(\alpha + \pi) = \frac{3}{5}$.

COTAÇÕES

1.	2.	3.	4.	5.	6.
20	40	30	30	50	30



PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO

1

$$\text{Área}_{[AOB]} = \frac{\overline{OA} \times |y_B|}{2} = \frac{1 \times \left| \sin \frac{7\pi}{6} \right|}{2} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

2

$$\tan \alpha = t = \frac{12}{5}$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow 1 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow \frac{169}{25} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{25}{169}} = \pm \frac{5}{13}$$

Como
$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$$
, tem-se $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

$$\sin \alpha = \tan \alpha \times \cos \alpha = \frac{12}{5} \times \left(-\frac{5}{13} \right) = -\frac{12}{13}$$

$$\text{Área}_{[AOB]} = \frac{\overline{OA} \times |y_B|}{2} = \frac{1 \times \frac{12}{13}}{2} = \frac{6}{13}$$

3.

$$\text{Área}_{[AOB]} = \frac{\overline{OA} \times |y_B|}{2} = \frac{1 \times |\sin \alpha|}{2}$$

Como, para $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, $\sin \alpha < 0$, tem-se $|\sin \alpha| = -\sin \alpha$.

Conclui-se, portanto, que Área_[AOB] = $-\frac{\sin \alpha}{2}$.

4

$$-\frac{\sin \alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow_{\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}} \alpha = \frac{4\pi}{3}$$

$$t = \tan\frac{4\pi}{3} = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$



5.

$$\overline{AO} = \overline{BO} = 1;$$


$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2$$

$$\overline{AB} = \sqrt{\left|\sin\alpha\right|^2 + \left(1 + \left|\cos\alpha\right|\right)^2} = \sqrt{\sin^2\alpha + 1 + 2\left|\cos\alpha\right| + \cos^2\alpha}$$
Como, para $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, $\cos\alpha < 0$, tem-se $\left|\cos\alpha\right| = -\cos\alpha$.

$$\overline{AB} = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 1 + 2(-\cos \alpha)} =$$

$$= \sqrt{1 + 1 - 2\cos \alpha} = \sqrt{2 - 2\cos \alpha}$$

Perímetro_[AOB] =
$$2 + \sqrt{2 - 2\cos\alpha}$$



6

$$\sin\alpha = -\sin(\alpha + \pi) = -\frac{3}{5}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} \Leftrightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}}$$

Como
$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$$
, tem-se $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

$$Perimetro_{[AOB]} = 2 + \sqrt{2 - 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right)} = 2 + \sqrt{2 + \frac{8}{5}} = 2 + \sqrt{\frac{18}{5}} = 2 + 3\sqrt{\frac{2}{5}} = 2 + \frac{3}{5}\sqrt{10}$$