




Nome: _____

Ano / Turma: _____ N.º: _____

Data: ____ - ____ - ____

1. No referencial da figura estão representadas as circunferências C_1 , C_2 , C_3 e C_4 .



Qual das circunferências pode ser caracterizada pela condição:


$$x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$$

- (A) C_1 (B) C_2 (C) C_3 (D) C_4

2. Na figura, em referencial cartesiano Oxy , estão representados os pontos $A(3,2)$, $B(3,0)$ e C e duas circunferências centradas em A e B .

Sabe-se que:

- a circunferência de centro B é tangente ao eixo Oy ;
- a circunferência de centro A tem raio 1;
- o ponto C pertence ao eixo Oy ;
- a reta BC é representada pela equação $3y - 2x + 6 = 0$.



- 2.1 Determina as coordenadas do ponto C .
- 2.2 Representa a reta BC através de uma equação vetorial.
- 2.3 Representa o conjunto de pontos da região colorida da figura através de uma condição.
- 2.4 Determina a equação reduzida da reta paralela a BC e que passa pelo ponto A .
- 2.5 Um valor, arredondado às unidades, da área da região colorida, é:

- (A) 25 (B) 13 (C) 6 (D) 11

3. Dado um referencial o.n., considera os pontos:

$$A(-1,6), B(2,5) \text{ e } C\left(\frac{2}{3}, -4\right) P(1-4m, 9m^2-9), m \in \mathbb{R}$$

3.1 Determina m de modo que $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AB}$.

3.2 A reta AB é estritamente paralela à reta representada por uma das seguintes equações. Indica qual.

- (A) $(x, y) = (1, 7) + k(2, -6), k \in \mathbb{R}$ (B) $(x, y) = (9, 2) + k(-6, 2), k \in \mathbb{R}$
(C) $(x, y) = (2, 5) + k(-1, 6), k \in \mathbb{R}$ (D) $(x, y) = (-1, 6) + k(3, -1), k \in \mathbb{R}$


3.3 Qual das condições representa a semirreta \overrightarrow{BA} ?

- (A) $(x, y) = (-1, 6) + k(-3, 1), k \in \mathbb{R}_0^+$ (B) $(x, y) = (2, 5) + k(-3, 1), k \in \mathbb{R}$
(C) $(x, y) = (2, 5) + k(-3, 1), k \in \mathbb{R}_0^+$ (D) $(x, y) = (-1, 6) + k(3, -1), k \in \mathbb{R}$

4. Considera o prisma quadrangular regular $[ABCDEFGH]$ representada na figura à qual foi aplicada um referencial o.n. com origem em D .

Os pontos A e C pertencem respetivamente aos eixos das abcissas e das ordenadas, tal como a figura sugere.

Sabe-se que as coordenadas do ponto A e G são: $(3, 0, 0)$ e $(0, 3, 6)$, respetivamente.



4.1 A aresta $[EF]$ é definida pela condição:


- (A) $x = 3 \wedge z = 6$
(B) $y = 3 \wedge z = 6 \wedge 0 \leq x \leq 3$
(C) $z = 6 \wedge y = 3$
(D) $x = 3 \wedge z = 6 \wedge 0 \leq y \leq 3$

4.2 Determina uma equação cartesiana do plano medidor do segmento de reta $[AG]$.

4.3 Seja M o ponto médio de $[BG]$.

Determina o ponto de interseção da reta AM com o plano que contém a face $[EFGH]$.

5. Na figura está representada a função f , real de variável real, de domínio $\left[-\pi, \frac{9}{2}\right]$.



5.1 Identifica o contradomínio da função.

5.2 Indica qual das opções representa o valor de: $f(-\pi) + f\left(-\frac{5}{2}\right) - f\left(\frac{9}{2}\right)$

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{5} - 3$ (C) $2\sqrt{5} - 1$ (D) $-\sqrt{5}$

5.3 Indica, justificando, o valor lógico da afirmação $f(1) \times f(4) < 0$.

5.4 Constrói uma tabela de sinais e indica os valores do domínio que satisfazem a condição $f(x) \geq 0$.

5.5 Identifica os intervalos de monotonia e extremos da função.

5.6 Considera a equação $f(x) = k$.

Indica para que valores de k a equação tem duas e só duas soluções.

5.7 Indica o domínio e o contradomínio da função g tal que $g(x) = 2f(x - \pi)$.

6. Seja g uma função afim tal que $g(x) = 3x - 12kx + 5$. Determina os valores de k para os quais a função g é uma função decrescente.

FIM

Questões	1.	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.	Total
Cotação (pontos)	10	10	10	12	10	5	12	10	10	10	10	15	5	5	10	12	10	12	10	12	200