

9. (1 valor) Considere, no espaço euclidiano complexo \mathbb{C}^3 munido do produto escalar usual, o operador $S(x, y, z) = (x + iy - z, 2iy + 3z, iz)$. Determine o operador S^* e a composição S^*S .

$$S = \begin{bmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2i & 3 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

$$\bar{S} = \begin{bmatrix} 1 & -i & -1 \\ 0 & -2i & 3 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$$

$$S^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -i & -2i & 0 \\ -1 & 3 & -i \end{bmatrix}$$

$$S^*S = \begin{bmatrix} 1 & i & -1 \\ -i & 5 & -5i \\ -1 & 5i & 11 \end{bmatrix}$$

10. (1 valor) Considere, no espaço euclidiano complexo \mathbb{C}^2 munido do produto escalar usual, o operador $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ definido por $T(x, y) = (2x - iy, ix + y)$. Determine uns operadores auto-adjuntos X e Y tais que $T = X + iY$.

$$T = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{T} = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^* = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{T + T^*}{2}$$

$$Y = \frac{T - T^*}{2i}$$

$$X = \frac{1}{2}(T + T^*) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 & -2i \\ 2i & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{2i}(T - T^*) = \frac{1}{2i}\left(\begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2i}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

12. (1 valor) Calcule valores e vetores próprios da matriz hermitica

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}$$

Valores Próprios:

$$\lambda = 2 \quad \lambda = -2$$

Vetores Próprios:

$$\begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

13. (1 valor) Considere a matriz C definida no exercício 12. Determine uma matriz unitária U e uma matriz diagonal Λ tais que $C = U\Lambda U^{-1}$.

Valores Próprios:

$$\lambda = 2 \quad \lambda = -2$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Vetores Próprios:

$$\begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$U^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

10. (1 valor) Determine a matriz que define, relativamente à base canónica, um operador ortogonal $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $R(1, 0) = (0, -1)$.

Base canónica \mathbb{R}^2 :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$R = \begin{bmatrix} 0 & b \\ -1 & d \end{bmatrix}$$

As colunas devem formar uma base ortogonal:

$$R(1, 0) = (0, -1) \implies \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

Precisamos de encontrar $R(0, 1)$:

$$(0, -1) \cdot (b, d) = 0 \Leftrightarrow d = 0$$

(b, d) tem de ter norma 1:

$$\sqrt{b^2 + 0} = 1 \Leftrightarrow b = \pm 1$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diagonalização de matriz
 $A = PDP^{-1}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

5. (2 valores) Seja $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a projeção ortogonal sobre a reta $y = -2x$ do plano euclidiano. Determine a matriz que representa P na base canônica.

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$proj_u v = \frac{v \cdot u}{u \cdot u} u$$

$$\frac{u}{||u||} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$v \cdot u = x \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + y \cdot -\frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{x - 2y}{\sqrt{5}}$$

$$proj_u v = \frac{x - 2y}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right) = \left(\frac{x - 2y}{5}, \frac{-2x + 4y}{5} \right)$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

6. (2 valores) Seja $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a reflexão na reta $y = \sqrt{3}x$. Determine a matriz que representa R na base canônica.

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$proj_u v = \frac{v \cdot u}{u \cdot u} u$$

$$R(v) = 2 \cdot proj_u v - v$$

$$\frac{u}{||u||} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$v \cdot u = x \cdot \frac{1}{2} + y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x + \sqrt{3}y}{2}$$

$$proj_u v = \frac{x + \sqrt{3}y}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{x + \sqrt{3}y}{4}, \frac{\sqrt{3}x + 3y}{4}\right)$$

$$R(v) = 2 \cdot \left(\frac{x + \sqrt{3}y}{4}, \frac{\sqrt{3}x + 3y}{4}\right) - (x, y) \Leftrightarrow \left(\frac{x + \sqrt{3}y}{2}, \frac{\sqrt{3}x + 3y}{2}\right) - (x, y)$$

$$R(v) = \begin{bmatrix} \frac{-x + \sqrt{3}y}{2} \\ \frac{\sqrt{3}x + y}{2} \end{bmatrix}$$

$$R(v) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$