9. (1 valor) Considere, no espaço euclidiano complexo \mathbb{C}^3 munido do produto escalar usual, o operador S(x,y,z)=(x+iy-z,2iy+3z,iz). Determine o operador S^* e a composição S^*S .

$$S = \begin{bmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2i & 3 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$
$$\bar{S} = \begin{bmatrix} 1 & -i & -1 \\ 0 & -2i & 3 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$$
$$S^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -i & -2i & 0 \\ -1 & 3 & -i \end{bmatrix}$$
$$S^*S = \begin{bmatrix} 1 & i & -1 \\ -i & 5 & -5i \\ -1 & 5i & 11 \end{bmatrix}$$

10. (1 valor) Considere, no espaço euclidiano complexo \mathbb{C}^2 munido do produto escalar usual, o operador $T: \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ definido por T(x,y) = (2x-iy,ix+y). Determine uns operadores auto-adjuntos X e Y tais que T = X + iY.

$$T = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{T} = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^* = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{T + T^*}{2}$$

$$Y = \frac{T - T^*}{2i}$$

$$X = \frac{1}{2}(T + T^*) = \frac{1}{2}(\begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}) = \frac{1}{2}(\begin{bmatrix} 4 & -2i \\ 2i & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y=\frac{1}{2i}(T-T^*)=\frac{1}{2i}(\begin{bmatrix}2&-i\\i&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2&-i\\i&1\end{bmatrix})=\frac{1}{2i}(\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix})=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

12. (1 valor) Calcule valores e vetores próprios da matriz hermítica

$$C = \left(\begin{array}{cc} 0 & 2i \\ -2i & 0 \end{array} \right)$$

Valores Próprios:

$$\lambda = 2$$
 $\lambda = -2$

Vetores Próprios:

$$\begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

13. (1 valor) Considere a matriz C definida no exercício 12. Determine uma matriz unitária U e uma matriz diagonal Λ tais que $C=U\Lambda U^{-1}$.

Valores Próprios:

$$\lambda = 2$$
 $\lambda = -2$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Vetores Próprios:

$$\begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$