

Use classes	Year	Percentage values																				
Artificial surfaces	1954	1,30	0,70	0,30	0,42	1,75	1,65	2,97	1,16	2,48	2,61	1,48	0,82	1,80	0,83	0,63	0,74	0,92	0,65	0,36	0,15	2,48
	2012	5,21	3,00	1,50	3,45	7,18	5,19	7,33	6,33	4,64	11,38	4,68	1,86	4,66	4,95	2,85	4,64	4,68	2,17	3,47	1,40	8,65
Forests	1954	19,07	18,81	12,65	26,30	18,98	16,15	22,00	18,31	55,70	18,75	15,10	16,05	23,20	3,53	7,76	4,49	38,40	45,24	23,44	20,83	12,64
	2012	33,66	36,49	34,90	43,73	33,19	24,36	43,20	30,37	74,11	27,52	26,78	31,79	37,16	8,55	45,60	17,94	47,85	56,73	40,63	39,70	23,19
Complex cultivation patterns	1954	16,37	17,18	9,00	15,03	19,89	32,40	24,39	12,94	8,33	14,26	43,08	8,92	8,21	6,68	0,83	9,08	22,26	11,82	34,54	0,12	34,43
	2012	15,54	19,07	14,17	17,19	22,04	22,39	13,25	19,26	12,03	6,48	20,01	17,94	17,23	17,56	19,88	12,34	13,54	5,02	16,54	4,29	13,35
		Italy	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia – Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino – Alto Adige	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto