



PRK Transepitelial

Correção do grau 100% a laser, na superfície da córnea

Paciente: _____

Data da cirurgia: _____

☐ OD ☐ OE ☐ Ambos


✂ Como é o procedimento?

- **100% a laser:** o excimer laser remove o epitélio que protege a superfície da córnea e, em seguida, corrige o grau.
- Anestesia feita apenas com **colírio**.
- **Indolor**, com duração em torno de **3 minutos** por olho.
- O grau já é corrigido no momento da cirurgia — a visão fica embaçada no início por conta da cicatrização.

👁 O que esperar no pós-operatório

- Ardência, sensação de “areia” nos olhos e sensibilidade à luz nas primeiras **24–48 horas**.
- É necessário regenerar **5 a 6 novas camadas de epitélio** — por isso a melhora acontece semana após semana.
- A visão começa a melhorar por volta de **3 a 5 dias** após a cirurgia.
- A qualidade da visão continua evoluindo por até **6 a 12 meses**.

📅 Linha do tempo da recuperação



✅ Cuidados e liberações

- **Atividades habituais:** entre 7 e 10 dias — pode ser antes ou depois, dependendo do tipo e da quantidade de grau corrigido.
- **Academia e exercícios sem impacto no rosto:** a partir do 5º dia.
- **Piscina, mar e exercícios com impacto no rosto:** após 21 dias.
- Sem restrições quanto à ingestão de alimentos e bebidas alcoólicas.

☀ **Óculos de sol: uso obrigatório.** Use óculos com filtro de luz ultravioleta sempre que estiver em ambiente aberto durante o dia, por **6 a 12 meses**.

⚠ Entre em contato imediatamente se houver:

- Dor intensa que não melhora com a medicação;
- Secreção amarelada ou vermelhidão intensa;
- Piora súbita da visão ou trauma no olho operado.

Na dúvida, fale com a equipe da clínica — estamos à disposição.





Femto-LASIK

Correção do grau 100% a laser, com recuperação visual rápida

Paciente: _____

Data da cirurgia: _____

☐ OD ☐ OE ☐ Ambos

🔪 Como é o procedimento?

- **100% a laser**, com 2 tipos de laser: o **femtosegundo** cria o espaço na córnea e, depois, o **excimer laser** corrige o grau no espaço criado.
- Anestesia feita apenas com **colírio**.
- **Indolor**, com duração em torno de **5 minutos** por olho.

👁 O que esperar no pós-operatório

- Ardência e sensação de “areia” nas primeiras horas podem acontecer — **é normal**.
- **Recuperação rápida**: a visão começa a melhorar poucas horas após a cirurgia.
- “Fantasminhas” nas letras e halos ao redor das luzes são normais e desaparecem em algumas semanas.
- A qualidade da visão continua evoluindo por até **3 a 6 meses**.

📅 Linha do tempo da recuperação



✅ Cuidados e liberações

- **Atividades habituais**: retorno rápido, em média 1 a 2 dias.
- **Academia e exercícios sem impacto no rosto**: a partir do 3º dia.
- **Piscina, mar e exercícios com impacto no rosto**: após 21 dias.
- Sem restrições quanto à ingestão de alimentos e bebidas alcoólicas.
- **Óculos de sol**: uso facultativo.

⚠ Entre em contato imediatamente se houver:

- Dor intensa que não melhora com a medicação;
- Secreção amarelada ou vermelhidão intensa;
- Piora súbita da visão ou trauma no olho operado.

Na dúvida, fale com a equipe da clínica — estamos à disposição.





Cirurgia Personalizada x Convencional

Qual é a diferença entre os dois tipos de correção a laser?

Na prática, a **cirurgia personalizada** leva a visão a um patamar acima da que o paciente tinha com o uso de óculos. Basicamente, além de corrigir o grau, **a visão é melhorada**.

CORREÇÃO PADRÃO

Convencional



- É confeccionado um programa de correção que será **igual em pacientes com o mesmo grau**.
- O excimer laser considera apenas o grau a ser corrigido.

CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA

Personalizada (topoguiada)



- O excimer laser programa a correção levando em conta, **além do grau, a topografia do seu olho**.
- A correção é **individualizada**: cada pessoa possui uma córnea com curvaturas diferentes.

Visão noturna

Outro aspecto que diferencia a cirurgia personalizada da correção convencional é o **período noturno**: temos **menos reflexos e efeitos luminosos**, como o borramento e o espalhamento dos raios de luz ao redor das fontes de iluminação.

Em resumo

	CONVENCIONAL	PERSONALIZADA
Corrige o grau	✓	✓
Considera a topografia individual da córnea	—	✓
Qualidade de visão acima da obtida com óculos	—	✓
Menos reflexos e efeitos luminosos à noite	—	✓

Dr. Giuliano Prediger Dobri

Oftalmologista · Especialista em cirurgia refrativa · CRM-DF 26.120 · RQE 20.766

CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia · ABCCR – Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa

@giulianodobri oftalmo
Sua avaliação é muito importante.





Implante de Anel Intraestromal

Túnel na córnea feito 100% a laser para o implante do anel

Paciente: _____

Data da cirurgia: _____

☐ OD ☐ OE ☐ Ambos


✂ Como é o procedimento?

- **100% a laser:** o laser de **femtosegundo** faz o túnel dentro da córnea por onde o anel será inserido.
- Anestesia feita apenas com **colírio**.
- **Indolor**, com duração em torno de **10 minutos**.

👁 O que esperar no pós-operatório

- Ardência, sensação de “areia” nos olhos e sensibilidade à luz nas primeiras **24–48 horas**.
- A visão começa a melhorar por volta de **2 a 3 semanas** após a cirurgia.
- Melhora progressiva, principalmente entre **45 e 60 dias** de cirurgia.
- A qualidade da visão continua evoluindo por até **6 a 12 meses**.

📅 Linha do tempo da recuperação



✅ Cuidados e liberações

- **Atividades habituais:** entre 7 e 10 dias — pode ser antes ou depois desse prazo.
- **Academia e exercícios sem impacto no rosto:** a partir do 5º dia.
- **Piscina, mar e exercícios com impacto no rosto:** após 21 dias.
- Sem restrições quanto à ingestão de alimentos e bebidas alcoólicas.

⚠ Entre em contato imediatamente se houver:

- Dor intensa que não melhora com a medicação;
- Secreção amarelada ou vermelhidão intensa;
- Piora súbita da visão ou trauma no olho operado.

Na dúvida, fale com a equipe da clínica — estamos à disposição.





Crosslinking Corneano

Fortalecimento da córnea com riboflavina e luz ultravioleta

Paciente: _____

Data da cirurgia: _____

☐ OD ☐ OE ☐ Ambos


🔧 Como é o procedimento?

- Realizado com a instilação de um colírio chamado **riboflavina** (vitamina B2) que, ao reagir com a **luz UV**, aumenta a resistência da córnea.
- Anestesia feita apenas com **colírio**.
- **Indolor**, com duração em torno de **30 minutos**.

👁 O que esperar no pós-operatório

- Ardência, sensação de “areia” nos olhos e sensibilidade à luz nas primeiras **24–48 horas**.
- A visão começa a melhorar por volta de **2 a 3 semanas** após a cirurgia.
- Melhora progressiva, principalmente entre **45 e 60 dias** de cirurgia.
- A qualidade da visão continua evoluindo por até **6 a 12 meses**.

📅 Linha do tempo da recuperação



✅ Cuidados e liberações

- **Atividades habituais**: entre 7 e 10 dias — pode ser antes ou depois desse prazo.
- **Academia e exercícios sem impacto no rosto**: a partir do 5º dia.
- **Piscina, mar e exercícios com impacto no rosto**: após 21 dias.
- Sem restrições quanto à ingestão de alimentos e bebidas alcoólicas.

☀ **Óculos de sol: uso obrigatório.** Use óculos com filtro de luz ultravioleta sempre que estiver em ambiente aberto durante o dia, por **6 a 12 meses**.

⚠ Entre em contato imediatamente se houver:

- Dor intensa que não melhora com a medicação;
- Secreção amarelada ou vermelhidão intensa;
- Piora súbita da visão ou trauma no olho operado.

Na dúvida, fale com a equipe da clínica — estamos à disposição.

