


Curva piana parametrizzata

La geometria locale lungo la curva



Obiettivo: ottenere tangente, normale, ascissa curvilinea e curvatura dalla mappa $x(\zeta)$.

M02-S02 · La derivata indica una direzione


In un punto regolare definiamo

$$\mathbf{x}'(\zeta) := \frac{d\mathbf{x}}{d\zeta}(\zeta).$$

Il vettore tangente è colineare a $\mathbf{x}'(\zeta)$.

La condizione di regolarità è

$$\mathbf{x}'(\zeta) \neq \mathbf{0}.$$



M02-S03 · Tangente unitario e norma

Il vettore unitario tangente è

$$\mathbf{t}(\zeta) = \frac{\mathbf{x}'(\zeta)}{\|\mathbf{x}'(\zeta)\|}.$$

Per $\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2$,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$

La normalizzazione conserva la direzione e fissa la lunghezza a 1.

Derivazione completa: [D-M02-1](#)

M02-S03b · Esempio: tangenti alla parabola

Riprendiamo l'esempio di M01:


$$\mathbf{x}(\zeta) = \zeta \mathbf{e}_1 + \zeta^2 \mathbf{e}_2, \quad \zeta \in (-1, 1).$$

$$\mathbf{x}'(\zeta) = \mathbf{e}_1 + 2\zeta \mathbf{e}_2, \quad \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{1 + 4\zeta^2}.$$

$$\mathbf{t}(\zeta) = \frac{\mathbf{e}_1 + 2\zeta \mathbf{e}_2}{\sqrt{1 + 4\zeta^2}}.$$

$$\boxed{\mathbf{t}(0) = \mathbf{e}_1},$$

$$\boxed{\mathbf{t}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}}.$$



Tangenti nei due punti valutati.

M02-S04 · Ascissa curvilinea: misurare lungo la curva

L'elemento di lunghezza soddisfa

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2.$$

Da qui otteniamo

$$s'(\zeta) = \frac{ds}{d\zeta}(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{x_1'(\zeta)^2 + x_2'(\zeta)^2}.$$

La costante d'integrazione sceglie l'origine di s .

Derivazione completa: D-M02-3

M02-S04b · Esempio: ascissa curvilinea della parabola


Per $\mathbf{x}(\zeta) = \zeta \mathbf{e}_1 + \zeta^2 \mathbf{e}_2$,

$$s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{1 + 4\zeta^2}.$$

Scegliamo l'origine $s(0) = 0$:

$$s(\zeta) = \int_0^\zeta \sqrt{1 + 4\eta^2} d\eta.$$

$$s(\zeta) = \frac{\zeta}{2} \sqrt{1 + 4\zeta^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsinh}(2\zeta).$$



$$s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2} + \operatorname{arsinh}(1)}{4}.$$

$$L = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 4\eta^2} d\eta = \sqrt{5} + \frac{1}{2} \operatorname{arsinh}(2).$$

Con l'origine nel vertice, l'ascissa è negativa sul ramo sinistro.

M02-S05 · Orientazione, angolo e normale

L'aumento di ζ fissa l'orientazione della curva.

Se $\alpha(\zeta)$ è l'angolo che $\mathbf{t}$ forma con $\mathbf{e}_1$,

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{n} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

$\mathbf{n}$ si ottiene ruotando $\mathbf{t}$ di $\pi/2$ in senso antiorario.

Derivazione completa: D-M02-2

M02-S05b · Esempio: normali alla parabola

La normale orientata si ottiene ruotando la tangente:

$$\mathbf{n}(\zeta) = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t}(\zeta).$$


Nel vertice:

$$\mathbf{n}(0) = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

Per $\zeta = \frac{1}{2}$:

$$\mathbf{n}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1}{\sqrt{2}}.$$

Controlli: $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$ e $\|\mathbf{n}\| = 1$.



Ogni normale è la rotazione antioraria della tangente corrispondente.

M02-S06 · Curvatura: quanto ruota la tangente

Definiamo la curvatura algebrica come derivata dell'angolo tangente rispetto all'ascissa curvilinea:

$$C(\zeta) = \frac{\alpha'(\zeta)}{s'(\zeta)}.$$

Poiché $d\alpha/ds = \alpha'/s'$, la curvatura misura la variazione dell'orientazione per unità di lunghezza.

Il suo segno dipende dall'orientazione scelta.

Derivazione completa: D-M02-3

M02-S06b · Esempio: curvatura della parabola

Poniamo $q(\zeta) = \sqrt{1 + 4\zeta^2}$. Allora


$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{e}_1 + 2\zeta\mathbf{e}_2}{q}, \quad \mathbf{n} = \frac{-2\zeta\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{q}.$$

Derivando la tangente:

$$\mathbf{t}'(\zeta) = \frac{2}{1 + 4\zeta^2} \mathbf{n}(\zeta).$$

Poiché $\mathbf{t}' = \alpha' \mathbf{n}$ e $s' = q$,

$$C(\zeta) = \frac{2}{(1 + 4\zeta^2)^{3/2}}.$$



$$C(0) = 2, \quad C\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$R(0) = \frac{1}{C(0)} = \frac{1}{2}.$$

Nel vertice il centro di curvatura giace sulla normale orientata.

M02-S06c · Dimensioni fisiche e unità di misura

Lunghezze e curvatura

$$[d_{\text{RO}}] = [s] = [R] = \text{L}, \quad [C] = \text{L}^{-1}.$$

La relazione $R = 1/|C|$ è dimensionalmente coerente.

Esempio di conversione:

$$d_{\text{RO}} = 30 \text{ km} = 3,0 \times 10^4 \text{ m}.$$

Velocità

$$[v_{\text{TS}}] = \text{L T}^{-1}.$$

$$v_{\text{TS}} = 145 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 145 \frac{10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 40,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Infatti

$$1 \text{ m} = 10^{-3} \text{ km}, \quad 1 \text{ s} = \frac{1}{3600} \text{ h}.$$

Cambiare unità modifica il valore numerico, non la dimensione fisica.

M02-S07 · Proprietà P-1.1: ricostruire la curva

Proprietà P-1.1. Su un intervallo connesso, siano $s \in C^1$, $s' > 0$ e C continua. Allora s e C determinano una curva regolare a meno di una rotazione diretta e di una traslazione.

Per fissare la rotazione assegniamo $\alpha(\zeta^*)$; per fissare la traslazione assegniamo $\mathbf{x}(\zeta^*)$.

Le due integrazioni costruiscono la curva sotto queste ipotesi. Per una curva chiusa servono anche condizioni di raccordo agli estremi.

Dimostrazione

M02-S08 · P-1.1: mappa della dimostrazione

La dimostrazione completa è nella sezione finale di questa presentazione.

$$s, C \longrightarrow \alpha' = s' C \longrightarrow \alpha \longrightarrow \mathbf{x}' = s' \mathbf{t} \longrightarrow \mathbf{x}.$$

Per la discussione alla lavagna servono due integrazioni:

1. $\alpha(\zeta^*)$ fissa la rotazione;
2. $\mathbf{x}(\zeta^*)$ fissa la traslazione.

HW-P-1.1: leggere la dimostrazione D-M02-4–D-M02-5b e preparare la mappa in quattro righe.

M02-S09 · Esempio guida e letture assegnate

Per il cerchio percorso in senso antiorario,

$$\mathbf{x}(\zeta) = R(\cos \zeta \mathbf{e}_1 + \sin \zeta \mathbf{e}_2), \quad \zeta \in [0, 2\pi), \quad C = \frac{1}{R}.$$

Per il semicirchio percorso con l'altra parametrizzazione di Marigo, $C = -1/R$: il segno cambia perché cambia l'orientazione.

Nel portico dell'Esempio 1.3, $s' = 1$ sui tratti; nei due vertici la tangente salta e la curvatura classica non è definita.

Per lo studio: verificare il segno del semicirchio e spiegare il caso dei vertici. La dimostrazione di P-1.1 resta il compito principale.

Marigo, Esempi 1.1–1.3.

M02-S10 · Chiusura e ponte a M03

Da $\mathbf{x}(\zeta)$ abbiamo ottenuto:

$$\mathbf{t}(\zeta), \quad \mathbf{n}(\zeta), \quad s(\zeta), \quad C(\zeta).$$

M03: usare s come parametro, cioè la parametrizzazione normale, e derivare le formule (1.8)–(1.11).

D-M02-1 · Tangente e tangente unitaria

Fissiamo ζ con $\mathbf{x}'(\zeta) \neq \mathbf{0}$. Per $h > 0$ la secante orientata è

$$\mathbf{q}_h = \frac{\mathbf{x}(\zeta + h) - \mathbf{x}(\zeta)}{h} \longrightarrow \mathbf{x}'(\zeta).$$

La norma è continua e il limite è non nullo. Perciò convergono anche le direzioni:

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathbf{q}_h}{\|\mathbf{q}_h\|} = \frac{\mathbf{x}'(\zeta)}{\|\mathbf{x}'(\zeta)\|} =: \mathbf{t}(\zeta).$$

La normalizzazione è lecita proprio perché $\|\mathbf{x}'\| > 0$; inoltre

$$\|\mathbf{t}\| = \frac{\|\mathbf{x}'\|}{\|\mathbf{x}'\|} = 1.$$

Per $h < 0$ il vettore $\mathbf{q}_h$ resta orientato nel verso di ζ crescente.

D-M02-2 · Normale orientata

Scriviamo la tangente mediante l'angolo α :

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2.$$

Nel riferimento positivo $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$ e
 $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$. Quindi

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

Controlli:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \|\mathbf{n}\|^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Se invertiamo il verso della curva, cambiano segno sia $\mathbf{t}$ sia $\mathbf{n}$.

D-M02-3 · Ascissa curvilinea e curvatura

Su un tratto regolare C^1 , Pitagora dà per lo spostamento infinitesimo

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2, \quad dx_i = x'_i(\zeta)d\zeta.$$

Definiamo la lunghezza percorsa nel verso di ζ crescente:

$$s(\zeta) = s(\zeta^*) + \int_{\zeta^*}^{\zeta} \sqrt{x'_1(\eta)^2 + x'_2(\eta)^2} d\eta.$$

Il teorema fondamentale del calcolo e $\mathbf{x}' \neq \mathbf{0}$ danno

$$s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| > 0.$$

Se l'angolo tangente α è derivabile, la regola della catena dà

$$C = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(\zeta)}{s'(\zeta)}.$$

In corrispondenza degli angoli, la curvatura classica non è definita.

D-M02-4 · P-1.1: ricostruzione della curva

Su un intervallo connesso I , assumiamo $s \in C^1(I)$ con $s' > 0$ e $C \in C^0(I)$. Fissiamo $\zeta^* \in I$.

Per $C = \alpha'/s'$ l'angolo tangente soddisfa

$$\alpha'(\zeta) = s'(\zeta)C(\zeta), \quad \alpha(\zeta) = \alpha_* + \int_{\zeta^*}^{\zeta} s'(\eta)C(\eta) d\eta.$$

Il versore tangente determina α modulo 2π . Scelto un valore reale α_* , la formula ne dà un rappresentante continuo su tutto I .

Cambiare α_* di $2\pi k$ lascia la curva invariata.

D-M02-5 · P-1.1: seconda integrazione

Poiché $\mathbf{x}' = s'\mathbf{t}$, con

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2,$$

costruiamo la curva con un punto iniziale $\mathbf{x}_*$:

$$\mathbf{x}(\zeta) = \mathbf{x}_* + \int_{\zeta^*}^{\zeta} s'(\eta) [\cos \alpha(\eta) \mathbf{e}_1 + \sin \alpha(\eta) \mathbf{e}_2] d\eta.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo,

$$\mathbf{x}' = s'\mathbf{t}, \quad \|\mathbf{x}'\| = s' > 0, \quad \frac{\alpha'}{\|\mathbf{x}'\|} = C.$$

Abbiamo quindi una curva regolare con l'ascissa e la curvatura richieste.

La scelta di $\mathbf{x}_*$ ne fissa la posizione.

D-M02-5b · P-1.1: unicità e orientazione

Siano $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ due curve sugli stessi dati s, C .

I loro angoli tangenti continui soddisfano

$$(\alpha_2 - \alpha_1)' = s'C - s'C = 0 \quad \implies \quad \alpha_2 - \alpha_1 = \delta.$$

Poiché I è connesso, δ è un'unica costante (modulo 2π).

Con R_δ rotazione fissa, $\mathbf{x}'_2 = R_\delta \mathbf{x}'_1$;

integrando,

$$\mathbf{x}_2(\zeta) = R_\delta \mathbf{x}_1(\zeta) + \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} = \mathbf{x}_2(\zeta^*) - R_\delta \mathbf{x}_1(\zeta^*).$$

A parità di parametro e verso, una riflessione manda C in

$-C$: se $C \not\equiv 0$, non conserva i dati.

La costruzione non impone la chiusura: per un anello occorrono condizioni di raccordo agli estremi.

← [Torna all'enunciato](#)

D-M02-6 · Controlli individuali

Cerchio antiorario.

$$\mathbf{x} = R(\cos \zeta \mathbf{e}_1 + \sin \zeta \mathbf{e}_2) \Rightarrow s' = R, \quad \alpha = \zeta + \frac{\pi}{2}, \quad C = \frac{1}{R}.$$

Semicirchio orientato diversamente. Verificare che $\alpha' = -1$ e quindi $C = -1/R$.

Portico. Sui tratti $s' = 1$ e $C = 0$; nei vertici la tangente ha due valori laterali e la curvatura classica non è definita.

Domande da portare alla discussione:

1. In quale integrazione compare la rotazione?
2. In quale compare la traslazione?
3. Perché $s' > 0$ e non solo $s' \geq 0$?
4. Che cosa cambia invertendo il verso della curva?