# 函数极限与连续：本科一年级微积分讲义计划

## 1　一元函数极限：定义、左右极限与无穷远极限

**定义 1.1.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 $A$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，满足当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

其中，$x_0$ 不要求属于函数的定义域。

**定义 1.2.** 设函数 $f$ 在 $x_0$ 的某个左侧去心邻域内有定义。若存在常数 $A_-$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时有 $|f(x)-A_-|<\varepsilon$，则称 $A_-$ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^-$ 时的左极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A_-.$$

设函数 $f$ 在 $x_0$ 的某个右侧去心邻域内有定义。若存在常数 $A_+$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A_+|<\varepsilon$，则称 $A_+$ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^+$ 时的右极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A_+.$$

**定义 1.3.** 设函数 $f$ 在某个右半无限区间 $(M,+\infty)$ 上有定义。若存在常数 $A$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $R>M$，当 $x>R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 $A$ 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A.$$

类似地，若函数在某个左半无限区间 $(-\infty,M)$ 上有定义，且对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $R<M$，使得当 $x<R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则记为

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

**定理 1.4.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

也就是说，函数在一点的双侧极限存在，当且仅当该点的左极限和右极限都存在且相等。

证明. 先设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。给定任意 $\varepsilon > 0$，由双侧极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。特别地，当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，上述不等式分别成立，因此左极限和右极限都等于 $A$。

反过来，设左极限和右极限都等于 $A$。给定任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，$x$ 必在 $x_0$ 的左侧或右侧，从而都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。因此 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。 □

**定理 1.5.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。因此，函数在同一点处的有限极限至多有一个。

证明. 假设 $A \neq B$。取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = B$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有 $|f(x) - B| < \varepsilon$。

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，并取一个满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 $x$。由三角不等式，

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

这与 $|A - B| > 0$ 矛盾。因此 $A = B$。 □

**例题 1.6.** 计算

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1)。$$

为说明双侧极限的处理方法，分别考察 $x \to 2^-$ 和 $x \to 2^+$ 两种情形。

**解：** 当 $x \to 2^-$ 或 $x \to 2^+$ 时，都有 $3x - 1 \to 3 \cdot 2 - 1 = 5$。更直接地，对任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/3$。当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时，

$$|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon。$$

因此由极限定义，

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1) = 5。$$

**例题 1.7.** 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 是否存在。

**解：** 当 $x \to 0^-$ 时，始终有 $f(x) = 1$，所以

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1。$$

当 $x \to 0^+$ 时，始终有 $f(x) = 2$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2。$$

由于左右极限不相等，根据定理 1.4，$\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

**练习 1.8.** 设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ 5, & x>1.\end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 是否存在；若存在，求出该极限。

## 2 极限的基本性质与运算

**定义 2.1.** 设函数 $f,g,h$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若在该邻域内有 $h(x)\le f(x)\le g(x)$，且存在有限数 $L$，使得

$$\lim_{x\to x_0} h(x)=L,\qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=L,$$

则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=L。$$

这称为夹逼原理。

**定理 2.2.** 设函数 $f$ 与 $g$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim_{x\to x_0} g(x)=B$。则

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=A+B,\qquad \lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=A-B,$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=AB.$$

若 $B\neq 0$，并且在某个去心邻域内 $g(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

复合极限的基础结论：设 $g$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，$\lim_{x\to x_0} g(x)=b$；外函数 $f$ 在 $b$ 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{t\to b} f(t)=L$。若在 $x_0$ 的某个去心邻域内，$g(x)\neq b$ 且 $g(x)$ 属于 $f$ 的定义域（因而复合函数有定义），则

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x))=L.$$

这里要求内函数最终不取到 $b$，不能仅凭上述两个极限就无条件推出复合极限。

证明. 先证明和的法则。给定 $\varepsilon>0$，由 $f(x)\to A$ 与 $g(x)\to B$，分别存在 $\delta_1>0$ 与 $\delta_2>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon/2$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|g(x)-B|<\varepsilon/2$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则

$$|(f(x)+g(x))-(A+B)|\le |f(x)-A|+|g(x)-B|<\varepsilon.$$

故 $f(x)+g(x)\to A+B$。由于 $|(-g(x))-(-B)|=|g(x)-B|$，由定义有 $-g(x)\to -B$；差的法则由 $f(x)-g(x)=f(x)+(-g(x))$ 及和的法则得到。

先说明局部有界性：若 $f$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且有有限极限 $A$，则 $f$ 在某个去心邻域内有界。事实上，在极限定义中取误差为 $1$，可得 $\delta_0>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时，

$$|f(x)-A|<1,\qquad |f(x)|\le |A|+|f(x)-A|<|A|+1.$$

这只涉及去心邻域，不要求 $f(x_0)$ 有定义。

对于积，令 $M = |A| + 1 > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由两个极限的定义可分别取 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon/(2M)$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/(2(|B| + 1))$。取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$|f(x)g(x) - AB| \le |f(x)|\,|g(x) - B| + |B|\,|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|B|\varepsilon}{2(|B| + 1)} < \varepsilon.$$

故由极限定义，$f(x)g(x) \to AB$。

若 $B \neq 0$，由 $g(x) \to B$，可取 $\delta_3 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时 $|g(x) - B| < |B|/2$。于是

$$|g(x)| \ge |B| - |g(x) - B| > \frac{|B|}{2} > 0,$$

故分母不仅非零，而且远离零，并有

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|g(x) - B|}{|g(x)||B|} \le \frac{2|g(x) - B|}{|B|^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，再由极限定义取 $\delta_4 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_4$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon|B|^2/2$。当 $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_3, \delta_4\}$ 时，上述倒数误差小于 $\varepsilon$。所以 $1/g(x) \to 1/B$。再由已证明的积的法则，得到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\frac{1}{g(x)} \to \frac{A}{B}.$$

最后证明复合极限结论。按该结论的假设，取 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \neq b$ 且 $f(g(x))$ 有定义。给定 $\varepsilon > 0$，由 $\lim_{t \to b} f(t) = L$，存在 $\eta > 0$，使得当 $0 < |t - b| < \eta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$。由 $g(x) \to b$，存在 $\delta_5 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_5$ 时 $|g(x) - b| < \eta$。因此，当 $0 < |x - x_0| < \min\{r, \delta_5\}$ 时，

$$0 < |g(x) - b| < \eta, \qquad |f(g(x)) - L| < \varepsilon.$$

由极限定义即得 $\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = L$。 □

**定理 2.3.** *设函数 $f, g, h$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，并且在该邻域内满足*

$$h(x) \le f(x) \le g(x).$$

*若*

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = L, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L,$$

*则*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

*证明.* 给定 $\varepsilon > 0$。由 $h(x) \to L$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $h(x) > L - \varepsilon$；由 $g(x) \to L$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时 $g(x) < L + \varepsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$L - \varepsilon < h(x) \le f(x) \le g(x) < L + \varepsilon.$$

因此 $|f(x) - L| < \varepsilon$，从而 $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$。 □

**定理 2.4.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。若 $A > 0$，则存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) < 0$。

证明. 设 $A > 0$。取 $\varepsilon = A/2$。由极限定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < A/2$，于是

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

当 $A < 0$ 时，取 $\varepsilon = |A|/2$，则

$$f(x) < A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0.$$

□

**例题 2.5.** 计算

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

要求在保持定义域条件 $x \neq 1$ 的前提下进行代数变形。

**解：** 当 $x \neq 1$ 时，$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$，所以

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

原函数虽然在 $x = 1$ 处没有定义，但极限只考察 $x \neq 1$ 且 $x \to 1$ 时的函数值。因此

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2.$$

**例题 2.6.** 设 $f(x) = x^2 - 3x + 2$。求 $\lim_{x\to 2} f(x)$，并说明所得极限的符号。

**解：** 由极限的和、差与积法则，

$$\lim_{x\to 2} (x^2 - 3x + 2) = 2^2 - 3 \cdot 2 + 2 = 0.$$

因此该极限等于 0。由于极限值为零，保号定理不能据此断言 $f(x)$ 在 2 的去心邻域内恒正或恒负。

**练习 2.7.** 设函数 $f$ 与 $g$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 2, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = -1.$$

求

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}.$$

并说明使用商的极限法则时需要检查的条件。

# 3 无穷小、基本极限与等价无穷小

**定义 3.1.** 设函数 $\alpha(x)$ 在考察点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0,$$

则称 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小。这里的“无穷小”表示函数值趋近于零，而不表示函数在某个邻域内恒不为零。若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$$|\alpha(x)|>M,$$

则称 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时绝对值意义下的无穷大，即 $|\alpha(x)|\to+\infty$。本节的“无穷大”采用这一含义，它本身不指定函数值的正负方向。

正无穷极限与负无穷极限须分别定义：若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $\alpha(x)>M$，则记为

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=+\infty;$$

若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $\alpha(x)<-M$，则记为

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=-\infty.$$

上述两种情形均满足绝对值意义下的无穷大条件，但仅有 $|\alpha(x)|\to+\infty$ 不能推出其中任何一种带符号的极限。无穷小与无穷大都是相对于特定的极限过程而言的。

**定义 3.2.** 设函数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且在该邻域内 $\beta(x)\neq0$。若

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0,\qquad \lim_{x\to x_0}\beta(x)=0,\qquad \lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$$

则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为等价无穷小，记为

$$\alpha(x)\sim\beta(x)\qquad(x\to x_0).$$

其中，前两个条件说明二者都是同一极限过程下的无穷小，最后一个条件给出它们的等价关系；比值条件只在商有定义的去心邻域内使用。若只满足比值极限为 1 而不要求二者都趋于零，则称为一般的等价函数关系，而不称为等价无穷小。

**定理 3.3.** 在实数范围内，当 $x\to0$ 时，有两个基本极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1.$$

其中，第一式中的 $x$ 取弧度制。由此可得

$$\sin x\sim x,\qquad e^x-1\sim x\qquad(x\to0).$$

这些结论只适用于所写出的极限过程及其定义域条件，不能不加条件地推广到任意点或任意角度单位。

证明. 先证明第一个基本极限。对 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$，由单位圆中的几何不等式，有

$$\sin x < x < \tan x.$$

由于 $\sin x > 0$，两边分别除以 $\sin x$，得到

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

取倒数可得

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，$\cos x \to 1$，由夹逼定理可知

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

又因为 $\sin x/x$ 是偶函数，所以左极限也等于 1，从而

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

再证明第二个基本极限。这里使用指数函数的一个独立基本性质：对 $0 < t < 1$，有

$$1 + t \le e^t \le \frac{1}{1 - t}.$$

该不等式是指数函数基本性质的标准推论，独立于待证的差商极限，不由导数定义推出。

当 $0 < x < 1$ 时，由上述不等式得到

$$1 \le \frac{e^x - 1}{x} \le \frac{1}{1 - x}.$$

令 $x \to 0^+$，夹逼定理给出

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

当 $x = -t < 0$ 且 $0 < t < 1$ 时，对 $1 + t \le e^t \le 1/(1 - t)$ 取倒数，得到

$$1 - t \le e^{-t} \le \frac{1}{1 + t}.$$

因此

$$\frac{1}{1 + t} \le \frac{e^{-t} - 1}{-t} \le 1.$$

令 $t \to 0^+$，再次由夹逼定理得到

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

左右极限相等，所以

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

整个论证只使用上述独立的指数函数不等式和夹逼定理，没有把待证极限作为指数函数在零点的导数值使用。 □

**定理 3.4.** 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义，且在该邻域内均不为零。若

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \qquad (x \to x_0),$$

并且函数 $F(x)$ 在相应去心邻域内有定义，满足 $F(x)\alpha(x)$ 有定义以及

$$\lim_{x\to x_0} F(x)\alpha(x) = L,$$

其中 $L$ 为有限数，则

$$\lim_{x\to x_0} F(x)\beta(x) = L,$$

只要 $F(x)\beta(x)$ 在该去心邻域内有定义。特别地，在乘积或商的极限中，可以用与某个无穷小等价的无穷小替换它，但必须保持相关表达式有定义。

证明. 由 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 的定义，有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1.$$

又由等价无穷小替换定理的假设，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在同一去心邻域内均不为零，因此商 $\beta(x)/\alpha(x)$ 在该邻域内有定义，并且

$$\frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\right)^{-1}.$$

由于 $\lim_{x\to x_0} \alpha(x)/\beta(x) = 1 \neq 0$，由倒数极限定理可得

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1.$$

在所给去心邻域内，利用乘积的代数分解，

$$F(x)\beta(x) = F(x)\alpha(x)\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}.$$

由假设和极限的乘法法则，得到

$$\lim_{x\to x_0} F(x)\beta(x) = \left(\lim_{x\to x_0} F(x)\alpha(x)\right)\left(\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right) = L \cdot 1 = L.$$

因此，在上述条件下，若原式写成 $F(x)\alpha(x)$，可以把其中的因子 $\alpha(x)$ 替换为 $\beta(x)$，得到 $F(x)\beta(x)$。这一操作等价于将原式整体乘以修正比值 $\beta(x)/\alpha(x)$，而不是用该比值替换原式中的某个因子。替换时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在同一去心邻域内均须非零，相关表达式须有定义，并且 $\lim_{x\to x_0} F(x)\alpha(x)$ 必须存在且为有限数。该结论适用于所证明的乘积结构，以及通过倒数改写后满足同样条件的商结构。它不表示可以在加减式中无条件逐项替换等价无穷小；例如加减项的替换必须另行检验整体极限，不能仅由等价关系和表达式有定义推出。 □

**例题 3.5.** 计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)\sin x}{x}.$$

要求说明等价无穷小替换的依据及适用条件。

**解：** 当 $x \to 0$ 时，$\sin x \sim x$，并且 $1+x \to 1$。在 $x \neq 0$ 的去心邻域内，原式有定义，且

$$\frac{(1+x)\sin x}{x} = (1+x)\frac{\sin x}{x}.$$

由基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}(1+x) = 1,$$

可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)\sin x}{x} = 1\cdot 1 = 1.$$

这里的替换只在 $x \to 0$ 且 $x \neq 0$ 的去心邻域内进行，未将原式在 $x = 0$ 处补定义。

**练习 3.6.** 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x}(1-2x),$$

并说明所使用的基本极限及乘法法则的条件。

# 4 函数连续性与间断点

**定义 4.1.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个邻域内有定义。若 $f$ 在 $x_0$ 处有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称函数 $f$ 在点 $x_0$ 处连续。等价地，$f$ 在 $x_0$ 处连续是指：对任意 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

其中，条件 $f(x_0)$ 有定义不可省略。若 $f$ 在区间内每一点都连续，则称 $f$ 在该区间上连续。

**定义 4.2.** 设 $f$ 在区间 $I$ 上有定义。若对每个内点 $x_0 \in I$，函数 $f$ 在 $x_0$ 处连续；当 $I$ 含有端点时，函数在左端点处连续是指右极限等于函数值，在右端点处连续是指左极限等于函数值，则称 $f$ 在区间 $I$ 上连续。

特别地，当 $I = [a,b]$ 且 $a < b$ 时，$f$ 在 $[a,b]$ 上连续意味着：对每个 $x_0 \in (a,b)$，有

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

并且有

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)。$$

**定义 4.3.** 设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若 $f$ 在 $x_0$ 处不连续，则称 $x_0$ 为 $f$ 的间断点。常见类型如下。

若极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在且为有限数，但 $f(x_0)$ 未定义或 $f(x_0) \neq \lim_{x\to x_0} f(x)$，则称 $x_0$ 为可去间断点。

若左、右极限都存在且有限，但不相等，即

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x),$$

则称 $x_0$ 为跳跃间断点。

若至少有一个单侧极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$，即函数值沿相应方向趋于正无穷或负无穷，则称 $x_0$ 为无穷间断点。若函数在 $x_0$ 附近无界，但不存在趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的单侧极限，则不称为无穷间断点，而归入第二类间断点中的无界振荡情形。分类时必须先说明函数在相关去心邻域内有定义以及所考察的极限存在性条件。

**定理 4.4.** 设函数 $f$ 与 $g$ 在点 $x_0$ 处连续，且相关运算在 $x_0$ 处有定义。则函数

$$f+g, \qquad f-g, \qquad fg$$

在 $x_0$ 处连续。若 $g(x_0)\neq 0$，并且在 $x_0$ 的某个邻域内 $g(x)\neq 0$，则

$$\frac{f}{g}$$

在 $x_0$ 处连续。

若函数 $g$ 在 $x_0$ 处连续，函数 $f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，并且复合函数 $f\circ g$ 在 $x_0$ 的某个邻域内有定义，则 $f\circ g$ 在 $x_0$ 处连续。

证明. 由连续性的定义，函数 $f$ 与 $g$ 在 $x_0$ 处连续分别意味着

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0), \qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)。$$

根据极限的和、差与积法则，有

$$\lim_{x\to x_0}\bigl(f(x)+g(x)\bigr)=f(x_0)+g(x_0)=(f+g)(x_0),$$

$$\lim_{x\to x_0}\bigl(f(x)-g(x)\bigr)=f(x_0)-g(x_0)=(f-g)(x_0),$$

以及

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=f(x_0)g(x_0)=(fg)(x_0)。$$

因此和、差与积在 $x_0$ 处连续。

若 $g(x_0)\neq 0$ 且 $g$ 在 $x_0$ 的某个邻域内不为零，则由商的极限法则，

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x_0)}{g(x_0)}=\left(\frac{f}{g}\right)(x_0),$$

所以商在 $x_0$ 处连续。

最后设 $g$ 在 $x_0$ 处连续，$f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，且复合函数在相应邻域内有定义。令 $\varepsilon>0$。由于 $f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，存在 $\eta>0$，使得当 $|t-g(x_0)|<\eta$ 时，

$$|f(t)-f(g(x_0))|<\varepsilon.$$

由于 $g$ 在 $x_0$ 处连续，存在 $\delta>0$，使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时，

$$|g(x)-g(x_0)|<\eta.$$

对这样的 $x$，取 $t=g(x)$；由复合函数在该邻域内有定义，且 $|t-g(x_0)|<\eta$，从而

$$|f(g(x))-f(g(x_0))|<\varepsilon.$$

又因为 $(f\circ g)(x_0)=f(g(x_0))$，所以 $f\circ g$ 在 $x_0$ 处连续。 □

**定理 4.5.** 设函数 $g$ 在点 $x_0$ 处连续，函数 $f$ 在点 $g(x_0)$ 处连续，并且存在 $x_0$ 的某个邻域 $U$，使得对每个 $x \in U$，$g(x)$ 都属于 $f$ 的定义域。则复合函数

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

在点 $x_0$ 处连续。

证明. 令 $\varepsilon > 0$。由于 $f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，存在 $\eta > 0$，使得当 $|t - g(x_0)| < \eta$ 时，

$$|f(t) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

由于 $g$ 在 $x_0$ 处连续，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

根据假设，当 $x$ 属于该邻域 $U$ 时，$g(x)$ 属于 $f$ 的定义域；缩小 $\delta$ 后还可令 $|x - x_0| < \delta$ 的点属于 $U$。于是对满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 $x$，令 $t = g(x)$，便有

$$|t - g(x_0)| = |g(x) - g(x_0)| < \eta$$

以及

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

而

$$(f \circ g)(x_0) = f(g(x_0)),$$

故

$$|(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_0)| < \varepsilon.$$

由点连续的定义，$f \circ g$ 在 $x_0$ 处连续。 □

**例题 4.6.** 判断函数

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

在 $x = 1$ 处的连续性，并指出该点的间断类型。

**解：** 函数 $f$ 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$，因此 $f(1)$ 未定义。当 $x \neq 1$ 时，

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1。$$

所以

$$\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1}(x + 1) = 2。$$

极限存在且为有限数，但函数在 $x = 1$ 处没有定义。因此 $x = 1$ 是可去间断点。若补定义 $f(1) = 2$，所得函数将在 $x = 1$ 处连续。

**例题 4.7.** 设

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x, & x < 0, \\ 2 + x^2, & x \geq 0。 \end{cases}$$

判断 $f$ 在 $x = 0$ 处的连续性及间断类型。

**解：**由左侧表达式可得

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (1+x) = 1。$$

由右侧表达式可得

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (2+x^2) = 2。$$

又因为 $f(0)=2$，所以右极限等于函数值，但左极限与右极限不相等。根据双侧极限存在的充要条件，$\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。因此 $f$ 在 $x=0$ 处不连续，且 $x=0$ 是跳跃间断点。

**练习 4.8.** 设

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ a, & x = 2。 \end{cases}$$

求常数 $a$ 的值，使函数 $f$ 在 $x=2$ 处连续，并说明若 $a$ 取其他值时该点的间断类型。

## 5 闭区间连续函数的基本定理及应用

本节从点附近的连续性转向整个闭区间上的结论。沿用定义 4.2：在 $[a,b]$ 上连续包括内点连续、左端点右连续和右端点左连续。

证明中使用实数的两条基本性质：非空且有上界的实数集合存在上确界（最小上界）；一列逐层包含的非空闭区间，若长度趋于零，则恰有一个公共点。这些性质作为实数的基础性质使用，不在此展开其完备性证明。

**定义 5.1.** 设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a\le b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$。若存在常数 $K>0$，使得对每个 $x\in[a,b]$ 都有 $|f(x)|\le K$，则称 $f$ 在 $[a,b]$ 上有界。

若存在 $u\in[a,b]$，使得对所有 $x\in[a,b]$ 都有 $f(x)\le f(u)$，则称 $f(u)$ 为最大值；若存在 $v\in[a,b]$，使得对所有 $x\in[a,b]$ 都有 $f(v)\le f(x)$，则称 $f(v)$ 为最小值。有界只要求存在统一的界，取得最值还要求相应的值确实由定义域中的点取到。

**定理 5.2.** 有界性与最值定理：设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a\le b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f$ 在该区间上有界，并且存在 $u,v\in[a,b]$，使得

$$f(v)\le f(x)\le f(u) \qquad \text{对所有} x\in[a,b].$$

因此，闭区间上的连续函数必能取得最大值和最小值；取得最值的点不一定唯一，也不一定是端点。

*证明.* 若 $a=b$，定义域只有一点，结论显然成立。以下设 $a<b$。

先证明有界性。反设 $f$ 在 $[a,b]$ 上无界。把区间平分，至少有一个半区间上 $f$ 无界，否则两个半区间各自的界取较大者便是整个区间的界。反复选择这样的半区间，得到逐层包含的闭区间 $I_n$，其中 $I_0=[a,b]$，$I_n$ 的长度为 $(b-a)/2^n$，且 $f$ 在每个 $I_n$ 上均无界。

由闭区间套性质，存在公共点 $c\in[a,b]$。由 $f$ 在 $c$ 处连续（端点采用相应的单侧连续），存在 $\delta>0$，使得对 $x\in[a,b]$，只要 $|x-c|<\delta$，就有

$$|f(x)-f(c)|<1, \qquad |f(x)|<|f(c)|+1.$$

取充分大的正整数 $n$，使 $(b-a)/2^n < \delta$。因为 $c \in I_n$，每个 $x \in I_n$ 都满足 $|x-c| < \delta$，于是 $f$ 在 $I_n$ 上有界，矛盾。

再证明最大值存在。值域 $\{f(x) : x \in [a,b]\}$ 非空且有界，令其上确界为 $M$。若没有任何点取到 $M$，则对每个 $x \in [a,b]$ 都有 $M - f(x) > 0$。由连续函数的运算性质，函数

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)} \qquad (x \in [a,b])$$

在 $[a,b]$ 上连续。因此由刚证明的有界性，存在 $K > 0$，使 $0 < g(x) \le K$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立。这意味着

$$f(x) \le M - \frac{1}{K} \qquad (x \in [a,b]),$$

从而比 $M$ 更小的数 $M - 1/K$ 也是值域的上界，与 $M$ 是最小上界矛盾。所以存在 $u \in [a,b]$ 使 $f(u) = M$。

将最大值的结论用于连续函数 $-f$，得到某个 $v \in [a,b]$ 使 $-f(x) \le -f(v)$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立，即 $f(v)$ 是 $f$ 的最小值。 □

**例题 5.3.** 分别考察下列函数，说明闭区间连续性定理的条件为什么不能随意省略。

$$f(x) = x, \qquad x \in (0,1);$$

$$g(x) = \frac{1}{x}, \qquad x \in (0,1];$$

$$h(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases} \qquad x \in [0,1].$$

判断它们是否有界以及是否取得最大值、最小值。

**解：** $f$ 有界，但没有最大值和最小值：对任意 $x \in (0,1)$，都有 $x/2 < x < (x+1)/2$，且这三个点均在定义域内。它连续，但定义域不是闭区间。

$g$ 无界，因为对任意 $K > 0$，取 $x = 1/(K+1) \in (0,1]$，便有 $g(x) = K+1 > K$。它在 $x = 1$ 处取得最小值 1，没有最大值；缺失端点 0 的条件不能忽略。

$h$ 有界，在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处取得最小值 0，但没有最大值：对 $0 \le x < 1$，点 $(x+1)/2$ 的函数值更大；$x = 1$ 处的值也不是最大值。它虽然定义在闭区间上，却在右端点不连续，因为

$$\lim_{x \to 1^-} h(x) = 1 \neq 0 = h(1).$$

这些例子说明，定理中的闭区间与连续性是保证结论的条件；缺少条件时，结论可能失效，而不是必然全部失效。

**定理 5.4.** 零点存在性定理：设 $a, b \in \mathbb{R}$，$a < b$，函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续。若 $f(a)f(b) < 0$，则至少存在一点 $c \in (a,b)$，使得 $f(c) = 0$。

若某个端点的函数值已经等于零，则该端点本身就是 $[a,b]$ 中的零点，但这并不保证开区间 $(a,b)$ 内还有零点。

证明. 先设 $f(a) < 0 < f(b)$。令 $[a_0, b_0] = [a,b]$。在已选区间 $[a_n, b_n]$ 中取中点 $m_n = (a_n + b_n)/2$。若 $f(m_n) = 0$，则找到所求零点；否则，若 $f(m_n) < 0$，取下一段为 $[m_n, b_n]$；若 $f(m_n) > 0$，取下一段为 $[a_n, m_n]$。

若过程一直没有遇到零点，就得到逐层包含的闭区间，且对每个非负整数 $n$，

$$f(a_n) < 0 < f(b_n), \qquad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

由闭区间套性质，存在公共点 $c \in [a,b]$，并且

$$|a_n - c| \le \frac{b-a}{2^n}, \qquad |b_n - c| \le \frac{b-a}{2^n}.$$

若 $f(c) > 0$，由连续性，存在 $\delta > 0$，使得当 $x \in [a,b]$ 且 $|x-c| < \delta$ 时，有 $|f(x)-f(c)| < f(c)/2$，因而 $f(x) > 0$。取充分大的 $n$，便得 $f(a_n) > 0$，矛盾。若 $f(c) < 0$，同理利用误差 $|f(c)|/2$ 可得充分大的 $n$ 满足 $f(b_n) < 0$，也矛盾。因此 $f(c) = 0$。由于两个端点的值均不为零，$c \in (a,b)$。

若 $f(a) > 0 > f(b)$，对连续函数 $-f$ 应用上述论证，即得同样结论。 □

**定理 5.5.** 介值定理：设 $a, b \in \mathbb{R}$，$a < b$，函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续。对任意满足

$$\min\{f(a), f(b)\} \le y \le \max\{f(a), f(b)\}$$

的实数 $y$，都存在 $c \in [a,b]$，使得 $f(c) = y$。若 $y$ 严格介于两个端点函数值之间，则可以取 $c \in (a,b)$。

结合定理 5.2，若 $m, M$ 分别为 $f$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值，则 $f$ 的值域恰为 $[m,M]$。

证明. 若 $y = f(a)$ 或 $y = f(b)$，取相应端点即可。若 $y$ 严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，令

$$F(x) = f(x) - y \qquad (x \in [a,b]).$$

由连续函数的运算性质，$F$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $F(a)F(b) < 0$。由定理 5.4，存在 $c \in (a,b)$ 使 $F(c) = 0$，即 $f(c) = y$。

最后，最值定理保证存在 $u, v \in [a,b]$，使 $f(u) = M$，$f(v) = m$。若 $m = M$，函数恒等于该常数，值域就是单点区间 $[m,M]$。若 $m < M$，则 $u \neq v$；在闭区间 $[\min\{u,v\}, \max\{u,v\}]$ 上应用刚证明的介值结论，知每个 $y \in [m,M]$ 都能取到。另一方面，由最值定义，每个函数值都在 $[m,M]$ 内，故值域恰为 $[m,M]$。 □

**例题 5.6.** 设 $f(x) = x^2 - 4x + 5$，$x \in [0,3]$。不用导数，求最大值、最小值及值域，并判断方程 $f(x) = 3$ 在此区间内是否有解。

**解：** 多项式连续，故最值定理适用。对所有实数 $x$，配方恒等式为

$$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1.$$

对 $x \in [0,3]$，有 $-2 \le x - 2 \le 1$，故 $0 \le (x-2)^2 \le 4$。下界在 $x = 2$ 处取到，上界在 $x = 0$ 处取到，所以最小值为 $1$，最大值为 $5$。由介值定理，值域为 $[1,5]$，因而 $f(x) = 3$ 至少有一解。

具体解方程得 $x = 2 \pm \sqrt{2}$。由于 $1 < \sqrt{2} < 2$，只有 $2 - \sqrt{2}$ 属于 $[0,3]$，所以此区间内恰有一个解。这里的唯一性来自具体代数求解，而不是介值定理。

**例题 5.7.** 在价格范围 $p \in [0,8]$ 内，某商品的需求量与供给量分别为

$$D(p) = 24 - 2p, \qquad S(p) = 4 + p.$$

先用连续性说明该价格范围内存在供需相等的均衡价格，再求出均衡价格与交易量，并说明唯一性的依据。

**解：** 在 $[0,8]$ 上，两种数量均非负，且 $D,S$ 均为连续函数。定义超额需求

$$E(p)=D(p)-S(p)=20-3p \qquad (p\in[0,8]).$$

它在闭区间上连续，且 $E(0)=20>0$，$E(8)=-4<0$。由零点存在性定理，存在 $p_*\in(0,8)$ 使 $E(p_*)=0$，即供需相等。

解线性方程 $20-3p_*=0$，得

$$p_*=\frac{20}{3}, \qquad D(p_*)=S(p_*)=\frac{32}{3}.$$

对任意 $0\le p_1<p_2\le 8$，都有

$$E(p_2)-E(p_1)=-3(p_2-p_1)<0.$$

因此超额需求严格递减，不可能有两个不同零点。存在性来自连续性与端点异号，唯一性则需要这里的严格递减性质；一般连续模型未必只有一个均衡点。

应用时应依次检查：定义域是否为有限闭区间；函数是否在整个区间上连续，包括端点；所求目标值是否介于两个已知函数值之间。对方程 $f(x)=g(x)$，通常先令 $F(x)=f(x)-g(x)$，再检查连续性与异号条件。

零点定理给出的是充分条件：端点同号不等于没有零点；端点异号也不等于只有一个零点。最值定理保证最值能取到，但不直接给出最值的位置或数值。以下练习的答案集中放在本节最后，作为讲义末尾的练习答案。

**练习 5.8.** 不用导数，求函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在 $[0,3]$ 上的最小值、最大值及值域。再判断方程 $f(x)=4$ 在该区间内有几个解。

**练习 5.9.** 设 $F(x)=x^3+x-1$，$x\in[0,1]$。证明方程 $F(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个解，并用因式分解说明这个解唯一。

**练习 5.10.** 某商品在 $p\in[1,5]$ 上的需求函数 $D$ 和供给函数 $S$ 均连续且非负，满足

$$D(1)=12,\quad S(1)=3, \qquad D(5)=4,\quad S(5)=8.$$

证明存在区间内部的均衡价格。若进一步知道 $D$ 严格递减、$S$ 严格递增，证明均衡价格唯一。仅凭最初给出的条件能否断言唯一？

**练习答案（讲义末尾）**

以下按上述练习顺序给出答案与必要说明。

## 练习答案

**练习 1.8 的解答：** 当 $x\to 1^-$ 时，$f(x)=2x+1$，因此

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=2\cdot 1+1=3。$$

当 $x\to 1^+$ 时，$f(x)=5$，因此

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=5。$$

由于左极限 3 与右极限 5 不相等，根据定理 1.4，双侧极限 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 不存在。

**练习 2.7 的解答：** 由极限的和与差法则，

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = 2+(-1) = 1,$$

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x)) = 2-(-1) = 3.$$

分母的极限为 $3 \neq 0$，所以分母在 $x_0$ 的某个去心邻域内不为零，可以使用商的极限法则。因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)} = \frac{1}{3}.$$

**练习 3.6 的解答：** 当 $x\to 0$ 且 $x\neq 0$ 时，$\dfrac{e^x-1}{x}$ 有定义。由基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1,$$

以及

$$\lim_{x\to 0}(1-2x) = 1,$$

再由极限的乘法法则，得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}(1-2x) = 1\cdot 1 = 1.$$

乘法法则要求两个因子在同一去心邻域内有定义，并且各自的有限极限存在；这些条件在本题中均满足。

**练习 4.8 的解答：** 当 $x\neq 2$ 时，

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2。$$

因此

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4。$$

函数在 $x=2$ 处连续的条件是

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2) = a,$$

所以必须取

$$a = 4。$$

当 $a=4$ 时，函数在 $x=2$ 处连续；当 $a\neq 4$ 时，极限仍存在且等于 4，但函数值不等于极限值，因此 $x=2$ 是可去间断点。

**练习 5.8 的解答：** 配方得 $f(x)=(x-1)^2+2$。当 $x\in[0,3]$ 时，$-1\le x-1\le 2$，故 $0\le (x-1)^2\le 4$。最小值为 $f(1)=2$，最大值为 $f(3)=6$。由连续性与介值定理，值域为 $[2,6]$。

方程 $f(x)=4$ 等价于 $(x-1)^2=2$，实数解为 $1\pm\sqrt{2}$。其中 $1-\sqrt{2}<0$，而 $1+\sqrt{2}\in[0,3]$，故区间内恰有一个解。

**练习 5.9 的解答：** $F$ 为多项式，在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-1<0$，$F(1)=1>0$，所以由零点存在性定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $F(c)=0$。

若 $0\le x_1<x_2\le 1$，则

$$F(x_2)-F(x_1) = (x_2-x_1)(x_2^2+x_1x_2+x_1^2+1) > 0.$$

因此 $F$ 严格递增，若有两个不同零点，就会与此严格不等式矛盾。故零点唯一。

**练习 5.10 的解答：** 令 $E(p) = D(p) - S(p)$，$p \in [1,5]$。由连续函数的差仍连续，$E$ 在 $[1,5]$ 上连续，且

$$E(1) = 9 > 0, \qquad E(5) = -4 < 0.$$

所以存在 $p_* \in (1,5)$ 使 $E(p_*) = 0$，即 $D(p_*) = S(p_*)$。

若进一步有需求严格递减、供给严格递增，则对任意 $1 \le p_1 < p_2 \le 5$，

$$E(p_1) - E(p_2) = [D(p_1) - D(p_2)] + [S(p_2) - S(p_1)] > 0.$$

因此 $E$ 严格递减，零点唯一。

仅凭最初的连续性和端点数据不能断言唯一。例如，令 $D, S$ 分别在相邻整数价格之间作直线连接，其在 $p = 1,2,3,4,5$ 处的值依次为

| $p$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $D(p)$ | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| $S(p)$ | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |

所得函数连续且非负，并满足给定端点条件。

超额需求在这五个价格处的值依次为

$$9, -1, 3, -1, -4.$$

因此在 $(1,2)$、$(2,3)$、$(3,4)$ 各有一个零点，说明原条件允许多个均衡价格。