目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

第二章

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

级数概念的引入

芝诺悖论 古希腊哲学家芝诺说：阿喀琉斯永远追不上乌龟。因为阿喀琉斯每次到达乌龟之前的位置时，乌龟又向前爬了一小段。设阿喀琉斯的速度是乌龟的 10 倍，初始距离为 1。他追到乌龟原位置时，乌龟又爬了 0.1；他再追 0.1，乌龟又爬了 0.01；如此继续，他需要跑的无限段距离是：

$$1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \cdots = 1.111\ldots$$

芝诺认为无限段长度的和是无穷大——但这是错的！

事实上，$1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \cdots = \dfrac{10}{9}$ 是有限的。阿喀琉斯只需跑 $\dfrac{10}{9}$ 的距离就能追上乌龟。

级数概念的引入

上述悖论将追赶的总距离分解为无穷多个正数之和。按照有限项求和的经验，人们容易误认为无穷多个正数相加，其结果必然是无穷大，这也是芝诺论证看似成立的根源。然而，有限项加法所满足的运算性质不能随意移植到无穷项的情形。为了准确研究无穷多个数量依次相加是否能够得到一个有限确定的值，我们需要建立“无穷项求和”的严格定义，由此引出级数的概念。

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

级数的基本概念

定义

给定数列 $\{a_n\}$，称

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

为无穷级数，简称级数，a_n 称为通项。

级数的基本概念

定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

称为部分和。

级数的基本概念

定义

若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于 S，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，且和为 S，记作 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = S$；若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数发散。

级数的基本概念

注: 级数不是“把无穷多个数一次性相加”，而是先形成部分和数列

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad \ldots, \quad S_n = a_1 + \cdots + a_n,$$

再研究 $\{S_n\}$ 是否有极限。因此级数的敛散性完全由部分和数列决定。

级数的基本概念

例题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

是否收敛，并求其和。

级数的基本概念

例题

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

是否收敛，并求其和。

解：先裂项：

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

第 N 个部分和为

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

由于 $S_N \to 1$，故原级数收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

几何级数

例题

几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^n \ (a \neq 0)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \begin{cases} \dfrac{a}{1-r}, & |r| < 1, \\ \text{发散}, & |r| \geq 1. \end{cases}$$

几何级数

证明 当 $r \neq 1$ 时，部分和为

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a\frac{1-r^n}{1-r}.$$

- 若 $|r| < 1$，则 $r^n \to 0$，所以 $S_n \to \dfrac{a}{1-r}$。
- 若 $|r| > 1$，则 $|r^n| \to \infty$，S_n 发散。
- 若 $r = 1$，则 $S_n = na$，当 $a \neq 0$ 时有 $|S_n| \to \infty$。
- 若 $r = -1$，则 $S_n = a, 0, a, 0, \ldots$，发散。

几何级数

例题

将 $0.333\ldots$ 化为分数。

几何级数

例题

将 $0.333\ldots$ 化为分数。

解:

$$0.333\ldots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots = \frac{3/10}{1-1/10} = \frac{3/10}{9/10} = \frac{1}{3}.$$

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

级数的基本性质

性质

设 A 为非零常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 同时收敛或同时发散。

级数的基本性质

证明

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和分别记为 S'_n 与 S''_n，则有

$$\begin{aligned} S'_n &= Au_1 + Au_2 + \cdots + Au_n \\ &= A(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = AS''_n \end{aligned}$$

于是，由数列极限的性质可知，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S'_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} S''_n$ 同时存在或同时不存在，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} Au_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 同时收敛或同时发散．且当二极限同时存在时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} S'_n = A \lim\limits_{n\to\infty} S''_n$，即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} Au_n = A\sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

级数的基本性质

性质

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛于 T，α, β 为常数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha S + \beta T.$$

级数的基本性质

证明 记

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k.$$

由条件 $A_n \to S$, $B_n \to T$。对级数 $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$，其第 n 个部分和为

$$\sum_{k=1}^{n}(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha A_n + \beta B_n.$$

由收敛数列四则运算法则，

$$\alpha A_n + \beta B_n \to \alpha S + \beta T.$$

因此该级数收敛，且和为 $\alpha S + \beta T$。

级数的基本性质

性质

在级数中添加、删除或改变有限项，不改变级数的敛散性。但若级数收敛，其和可能会改变。

级数的基本性质

证明 以改变前 m 项为例。设原级数部分和为

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n,$$

改变前 m 项后得到的新级数部分和记为 T_n。当 $n > m$ 时，T_n 与 S_n 只相差一个固定常数 C，即

$$T_n = S_n + C.$$

若 S_n 收敛，则 T_n 也收敛；若 S_n 发散而 T_n 收敛，则 $S_n = T_n - C$ 收敛，矛盾。因此二者敛散性相同。当收敛时，极限值相差 C，所以级数和可能改变。

级数的基本性质

性质

收敛级数任意加括号后所成的新级数仍然收敛，且和不变。
注意：逆命题不成立。即加括号后收敛的级数，原级数未必收敛。例如：

$$(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots=0+0+0+\cdots=0,$$

但原级数 $1-1+1-1+1-1+\cdots$ 是发散的。

级数的基本性质

证明 设原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 $S_n \to S$。任意加括号后，新级数的部分和等于原部分和数列中的一个子列：

$$T_k = S_{n_k}, \qquad 1 \le n_1 < n_2 < \cdots .$$

收敛数列的任意子列收敛到同一极限，因此 $T_k \to S$。所以加括号后的级数仍收敛，且和不变。逆命题不成立的例子如定理中所示。

级数的基本性质

性质

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。

级数的基本性质

证明 设部分和 $S_n \to S$，则 $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$。□

级数的基本性质

注意：这个条件是必要的，但不是充分的。也就是说，$a_n \to 0$ 不能保证级数收敛。

级数的基本性质

例题

调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 虽然通项 $\frac{1}{n} \to 0$，但它是发散的。

级数的基本性质

证明 考虑部分和 S_{2^n}：

$$S_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right).$$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}, \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} > \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$，以此类推，第 k 组有 2^{k-1} 项，每项不小于 $1/2^k$，每一括号的和至少为 $\frac{1}{2}$，所以

$$S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \to \infty.$$

故调和级数发散。

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

正项级数及其判别法

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是它的部分和数列有上界.

正项级数及其判别法

证明 由 $a_n \geqslant 0 (n = 1, 2, \cdots)$ 可知

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geqslant S_n \geqslant 0, \quad n \in N.$$

可见 $\{S_n\}$ 是单调增加数列. 因此，由定理 2.7 可知，若 $\{S_n\}$ 有上界，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，充分性得证；若 $\{S_n\}$ 无上界，则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$ ，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，换句话说，若数列收敛，则部分和数列 $\{S_n\}$ 必有上界，必要性得证. 定理得证.

正项级数及其判别法

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，且存在 N，当 $n > N$ 时 $a_n \leq b_n$。

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。

正项级数及其判别法

证明 只需考虑从 $N+1$ 项开始的尾级数，因为添加或删除有限项不改变敛散性。记

$$A_m = \sum_{n=N+1}^{m} a_n, \qquad B_m = \sum_{n=N+1}^{m} b_n.$$

由于 $0 \le a_n \le b_n$，所以对所有 $m > N$ 有

$$0 \le A_m \le B_m.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\{B_m\}$ 有上界，从而 $\{A_m\}$ 是单调递增且有上界的数列，由单调有界准则知 $\{A_m\}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

第二个结论是第一个结论的逆否命题：若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。因此若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 不可能收敛，只能发散。

正项级数及其判别法

比较判别法的道理很简单：想象你在往一个杯子里倒水。

如果 b_n 代表“大杯子”倒进去的水量，而 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛意味着这个大杯子里的水总量是有限的（不会溢出）。那么，比它更小的 a_n（小杯子）倒进去的水总量当然更有限——肯定也收敛。

反过来，如果你知道小杯子 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的水量已经无限大（发散），那么比它更大的大杯子 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的水量一定也无限大。

一句话总结：**大的收敛，小的必收敛；小的发散，大的必发散**。

正项级数及其判别法

推论

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且存在常数 $c > 0$ 和自然数 N，使当 $n > N$ 时，有

$$u_n \leqslant c v_n.$$

则有

(1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散时，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的敛散性。

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 的敛散性。

解：当 $n \geq 1$ 时，$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{n-1}$，因此

$$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

而几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}} = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \cdots = 2$ 是收敛的。由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 也收敛。

事实上，这个级数的和就是自然常数 e：

$$\mathrm{e} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots \approx 2.71828.$$

正项级数及其判别法

例题

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性。

正项级数及其判别法

例题

判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的敛散性。

解：当 $n\geq 2$ 时，$\dfrac{1}{n^2}\leq\dfrac{1}{n(n-1)}=\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n}$。而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n}\right)=1$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。

正项级数及其判别法

例题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散。

正项级数及其判别法

证明 先设 $p > 1$。将 $n \geq 2$ 的项按

$$2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1 \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

分组。在第 k 组中共有 2^k 项，且每项不超过 $1/(2^k)^p$，故该组和不超过

$$2^k \cdot \frac{1}{(2^k)^p} = 2^{k(1-p)}.$$

因为 $p > 1$，几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{k(1-p)}$ 收敛，由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 收敛。

若 $p = 1$，得到调和级数，前文已经证明其发散。若 $p < 1$，则对 $n \geq 1$ 有 $n^p \leq n$，从而

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}.$$

由比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 发散。

正项级数及其判别法

$p = 1$ 是调和级数，发散；$p = 2$ 收敛；$p = 0.5$ 的项比调和级数对应项更大，因而其部分和增长得更快。参数 p 越大，通项衰减越快。

正项级数及其判别法

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，则

- 若 $\rho < 1$，级数收敛；
- 若 $\rho > 1$（包括 $\rho = +\infty$），级数发散；
- 若 $\rho = 1$，判别法失效，需用其他方法判断。

正项级数及其判别法

证明 若 $\rho < 1$，取常数 r 使 $\rho < r < 1$。由极限定义，存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r.$$

于是

$$a_{N+k} \leq a_N r^k \qquad (k = 1, 2, \ldots).$$

尾级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_N r^k$ 是收敛的几何级数，由比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

若 $\rho > 1$，取 r 使 $1 < r < \rho$。则存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq r > 1.$$

因此 $a_{n+1} \geq a_n$ 对充分大的 n 成立，且 a_n 不可能趋于 0。由级数收敛的必要条件，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。当 $\rho = +\infty$ 时同理可取任意 $r > 1$。

当 $\rho = 1$ 时，该方法不能给出结论。例如 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 收敛，二者的相邻项比值极限都为 1。

正项级数及其判别法

比值判别法的道理是：如果相邻两项的比值趋于一个小于 1 的数，那么级数的项最终会像一个公比小于 1 的几何级数那样衰减，从而收敛；如果比值趋于大于 1，则项会越来越大，级数发散。

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 的敛散性。

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 的敛散性。

解：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1,$$

由比值判别法，级数收敛。

正项级数及其判别法

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$，则

- 若 $\rho < 1$，级数收敛；
- 若 $\rho > 1$（包括 $\rho = +\infty$），级数发散；
- 若 $\rho = 1$，判别法失效。

正项级数及其判别法

证明 若 $\rho < 1$，取 r 使 $\rho < r < 1$。由极限定义，存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n} \leq r,$$

即 $a_n \leq r^n$。因 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛，由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

若 $\rho > 1$，取 r 使 $1 < r < \rho$。则存在 N，当 $n \geq N$ 时

$$\sqrt[n]{a_n} \geq r,$$

从而 $a_n \geq r^n > 1$。因此 a_n 不趋于 0，由级数收敛的必要条件，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。$\rho = +\infty$ 的情形同理。

当 $\rho = 1$ 时，该判别法不能区分 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 这类情形，因此失效。

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性。

正项级数及其判别法

例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性。

解:

$$\sqrt[n]{a_n}=\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2+\frac{1}{n}}\to\frac{1}{2}<1,$$

由根值判别法，级数收敛。

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

任意项级数的敛散性及其判别法

定义

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

任意项级数的敛散性及其判别法

定义

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛。

任意项级数的敛散性及其判别法

定理

绝对收敛的级数一定收敛。即若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛。

任意项级数的敛散性及其判别法

证明 定义

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \qquad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}.$$

则 $a_n^+ \geq 0$, $a_n^- \geq 0$, 且

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \qquad 0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|.$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，由比较判别法，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛。由级数线性性质，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

收敛。因此绝对收敛必推出收敛。

任意项级数的敛散性及其判别法

- **绝对收敛**：无论你把所有项都取正（去掉符号），总和仍然是有限的。这类级数最“乖”，可以随意重排顺序而不改变和。
- **条件收敛**：你之所以能得到有限的和，完全是因为正负项互相抵消。如果把所有项都取正，总和就会变成无穷大。这类级数很“敏感”，重排顺序可能会改变和（甚至变成发散）。

任意项级数的敛散性及其判别法

例题

- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 绝对收敛，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。
- 交错调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 条件收敛，因为它本身收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。

任意项级数的敛散性及其判别法

条件收敛是一个相当微妙的概念。一个著名的定理（黎曼重排定理）说：条件收敛的级数，可以通过重排使其收敛到任意实数，甚至发散！这再次提醒我们，无穷级数中的“加法”与有限和的加法有着本质的不同。

任意项级数的敛散性及其判别法

定义

$b_n > 0$, 形如

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$

的级数称为交错级数。

任意项级数的敛散性及其判别法

定理

若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$ 满足：

1. b_n 单调递减，即 $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$；
2. $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$，

则级数收敛，且其和 S 满足 $\boxed{0 \leq S \leq b_1}$，余项满足

$$\boxed{|R_n| \leq b_{n+1}}.$$

任意项级数的敛散性及其判别法

证明 记部分和为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} b_k$。偶数项部分和满足

$$S_{2m+2} - S_{2m} = b_{2m+1} - b_{2m+2} \geq 0,$$

故 $\{S_{2m}\}$ 单调递增。又

$$S_{2m} = (b_1 - b_2) + \cdots + (b_{2m-1} - b_{2m}) \geq 0,$$

且

$$S_{2m} = b_1 - (b_2 - b_3) - \cdots - (b_{2m-2} - b_{2m-1}) - b_{2m} \leq b_1.$$

因此 $\{S_{2m}\}$ 单调有界，设其极限为 S。
奇数项部分和满足

$$S_{2m+1} = S_{2m} + b_{2m+1}.$$

因 $b_{2m+1} \to 0$，得 $S_{2m+1} \to S$。偶数子列和奇数子列趋于同一极限，所以 $S_n \to S$，级数收敛。由 $0 \leq S_{2m} \leq S \leq S_{2m+1} \leq b_1$ 可得 $0 \leq S \leq b_1$。若进一步假设 $b_n > 0$ 且严格单调递减，则可进一步得到 $0 < S < b_1$。
余项估计来自同样的夹逼。从第 $n+1$ 项起的尾和是首项为 b_{n+1}、项的绝对值单调趋零的交错和，其值位于 0 与首项之间或二者相反数之间，所以

$$|R_n| \leq b_{n+1}.$$

若进一步假设 $b_n > 0$ 且严格单调递减，则可进一步得到 $|R_n| < b_{n+1}$；主定理统一采用非严格估计。

任意项级数的敛散性及其判别法

交错级数像一个人在左右摇摆：第一步向右走 b_1，第二步向左走 b_2，第三步向右走 b_3……如果每一步的步长越来越小（单调递减），并且最终步长趋近于零，那么这个人会逐渐稳定在一个点上，而不会无限摇摆下去。

任意项级数的敛散性及其判别法

例题

判断交错调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性。

任意项级数的敛散性及其判别法

例题

判断交错调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 的敛散性。

解：这里 $b_n=\frac{1}{n}$ 单调递减趋于 0，满足莱布尼茨判别法的条件，故级数收敛。

值得注意的是：调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的，但给它加上交错符号后却收敛了。这说明正负交替可以“抵消”掉部分发散性。

目录

1. 数学内容
2. 级数概念的引入
3. 级数的基本概念
4. 几何级数
5. 级数的基本性质
6. 正项级数及其判别法
7. 任意项级数的敛散性及其判别法
8. 判别法小结

判别法小结

判别法	适用类型	结论
比较判别法	正项级数	需已知一个比较级数
比值判别法	正项级数（含阶乘、指数）	$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散
根值判别法	正项级数（含 n 次幂）	$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散
莱布尼茨判别法	交错级数	单调递减趋于 0 则收敛

判别法小结

应用拓展——几何级数在金融中的运用：永续年金

假设你有一笔资金存入银行，希望每年年末都能领取固定金额 A 元，且本金永不减少（即每年只领取利息，本金保持不变）。设年利率为 $i > 0$，问最初需要存入多少本金？

分析：

- 要保证每年年末领取 A 元，第一年末领取的 A 元来源于本金的利息。
- 更一般的思路是：将未来每年领取的 A 元折算到当前，其现值之和应等于最初存入的本金。
- 第 k 年末领取的 A 元，折现到当前的价值为 $\dfrac{A}{(1+i)^k}$。

因此，最初需要存入的本金为：

$$P = \frac{A}{1+i} + \frac{A}{(1+i)^2} + \frac{A}{(1+i)^3} + \cdots$$

这是一个首项 $a = \dfrac{A}{1+i}$、公比 $q = \dfrac{1}{1+i}$ 的几何级数。由于 $0 < q < 1$，级数收敛，其和为：

$$P = \frac{\frac{A}{1+i}}{1 - \frac{1}{1+i}} = \frac{A}{1+i} \cdot \frac{1+i}{i} = \frac{A}{i}.$$

结论：永续年金的现值公式为 $P = \dfrac{A}{i}$。例如，若年利率为 5%，希望每年末领取 10000 元，则最初需要存入 $P = \dfrac{10000}{0.05} = 200000$ 元。

注：这个公式在养老金设计、endowment fund（捐赠基金）等场景中广泛应用。

判别法小结

应用拓展——几何级数在医学中的运用：药物浓度累积

下面使用一个简化的单室、线性叠加模型说明几何级数。假设每次给药带来的浓度增量相同，药物浓度按指数规律衰减：经过时间 Δt 后，单次给药所贡献的浓度降至原来的 $\mathrm{e}^{-k\Delta t}$ 倍。

设每次注射后体内药物的初始浓度为 C_0，每隔时间 T 注射一次。则：

- 第一次注射后，体内药物浓度为 C_0。
- 第二次注射前，第一次注射的药物浓度已衰减为 $C_0\mathrm{e}^{-kT}$。第二次注射后，模型给出的峰浓度为 $C_0 + C_0\mathrm{e}^{-kT}$。
- 第三次注射前，前两次的药物浓度分别衰减为 $C_0\mathrm{e}^{-2kT}$ 和 $C_0\mathrm{e}^{-kT}$。第三次注射后的峰浓度为 $C_0 + C_0\mathrm{e}^{-kT} + C_0\mathrm{e}^{-2kT}$。
- 依此类推，第 n 次注射后的模型峰浓度为：

$$C_n = C_0\left(1 + \mathrm{e}^{-kT} + \mathrm{e}^{-2kT} + \cdots + \mathrm{e}^{-(n-1)kT}\right).$$

这是一个首项为 C_0、公比为 e^{-kT} 的几何级数部分和。由于 $0 < \mathrm{e}^{-kT} < 1$，当 $n \to \infty$ 时，给药后峰浓度趋于稳态峰值：

$$C_\infty = \lim_{n\to\infty} C_n = \frac{C_0}{1 - \mathrm{e}^{-kT}}.$$

模型说明：该公式只展示重复给药的累积效应，不能直接用于确定临床剂量。实际的负荷剂量与维持剂量还取决于目标浓度、分布容积、清除率、生物利用度和给药间隔等，并需由专业人员结合患者情况确定。[?] 例如，若一个给药间隔恰好等于半衰期，即 $\mathrm{e}^{-kT} = 1/2$，则本模型中的稳态峰值是单次给药初始峰值的 $1/(1-0.5) = 2$ 倍。

一个小计算：若模型中每次给药带来的初始浓度增量为 $10\,\mathrm{mg/L}$，每 8 小时给药一次，且 $\mathrm{e}^{-8k} = 0.6$，则稳态峰值为

判别法小结

应用拓展——工程：多次反射与信号衰减 设初始信号能量为 E_0，每经过一次反射后保留固定比例 r，其中 $0 < r < 1$。若各级反射分量在接收端按能量相加，则总贡献为

$$E = E_0 + E_0 r + E_0 r^2 + \cdots = \frac{E_0}{1 - r}.$$

若 $E_0 = 2\ \mathrm{mJ}$、$r = 0.3$，则 $E = 20/7\ \mathrm{mJ}$。这一几何级数结构可用于理解声学回声、光学多次反射或通信中的重复衰减分量。模型忽略了相位干涉、频率依赖和随传播路径变化的衰减，因此只用于说明级数累积。