

Lecture Notes

Quantum Mechanics II

Gavin Kerr (B00801584)

PHYC 0000

Physics and Atmospheric Science
Dalhousie University

1 Definitions

Linear Vector Space: Collection of objects

$$|v\rangle + |w\rangle \in V$$

$$a(|v\rangle + |w\rangle) = a|v\rangle + a|w\rangle$$

$$a(b|v\rangle) = b(a|v\rangle)$$

$$|v\rangle + |w\rangle = |w\rangle + |v\rangle$$

$$|v\rangle + (|w\rangle + |x\rangle) = (|v\rangle + |w\rangle) + |x\rangle$$

There needs to be a null vector($|0\rangle$) $\rightarrow |v\rangle + |0\rangle = |v\rangle$

For every vector (v) there is an inverse $|v\rangle + |-v\rangle = |0\rangle$

2022-09-07

2 Vector Spaces

Def. Linear Vector Space: Collection of objects which follow the rules below

$$|v\rangle + |w\rangle \in V$$

$$a(|v\rangle + |w\rangle) = a|v\rangle + a|w\rangle$$

$$a(b|v\rangle) = b(a|v\rangle)$$

$$|v\rangle + |w\rangle = |w\rangle + |v\rangle$$

$$|v\rangle + (|w\rangle + |x\rangle) = (|v\rangle + |w\rangle) + |x\rangle$$

There needs to be a null vector($|0\rangle$) $\rightarrow |v\rangle + |0\rangle = |v\rangle$

For every vector (v) there is an inverse $|v\rangle + |-v\rangle = |0\rangle$