




$LuPc_2$ (unsubstituted)
θ 45.0°, d_{N4} 2.649 Å, $d_{C\alpha}$ 2.972 Å




YPc_2 (unsubstituted)
θ 45.0°, d_{N4} 2.730 Å, $d_{C\alpha}$ 3.023 Å




$LaPc_2$ (unsubstituted)
θ 45.0°, d_{N4} 3.084 Å, $d_{C\alpha}$ 3.241 Å




Lu-1 (tert-butyl)
θ 44.0°, d_{N4} 2.668 Å, $d_{C\alpha}$ 2.957 Å




Lu-2 (methylthio)
θ 41.9°, d_{N4} 2.672 Å, $d_{C\alpha}$ 2.952 Å




Lu-3 (bis(4-methoxyphenyl)amino)
θ 37.6°, d_{N4} 2.684 Å, $d_{C\alpha}$ 2.977 Å



Lu-4 (phenothiazin-10-yl)
θ 45.0°, d_{N4} 2.707 Å, $d_{C\alpha}$ 2.974 Å



Lu-8 (10-methylphenothiazin-3-yl)
θ 29.9°, d_{N4} 2.721 Å, $d_{C\alpha}$ 3.016 Å



La-2 (methylthio)
θ 30.1°, d_{N4} 3.139 Å, $d_{C\alpha}$ 3.285 Å