
VARIABLE COMPLEJA

25th Aug, 2025

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: Los números complejos constituyen una extensión fundamental del sistema de los números reales, al introducir la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$. En electromagnetismo, la representación compleja simplifica el análisis de ondas y circuitos al expresar amplitudes y fases de manera compacta; en mecánica cuántica, los números complejos son esenciales para describir el estado y evolución de las partículas mediante funciones de onda; en ingeniería, permiten abordar problemas de control, análisis de señales, dinámica de fluidos y óptica, proporcionando herramientas que integran tanto el comportamiento oscilatorio como el disipativo de sistemas reales. Así, los números complejos no solo enriquecen el lenguaje matemático, sino que se convierten en una herramienta indispensable para la modelización y comprensión del mundo físico.

Keywords números, complejos, Euler, representación, operaciones, Argand

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Reconocer y comprender la naturaleza de los números complejos:** Identificar la estructura de un número complejo en forma rectangular, distinguiendo su parte real e imaginaria, y representar gráficamente los números complejos en el plano de Argand.
2. **Manejar las distintas representaciones de los números complejos:** Convertir números complejos entre sus formas rectangular, polar y exponencial, comprendiendo el significado del módulo y el argumento, así como su interpretación geométrica.
3. **Aplicar operaciones básicas con números complejos:** Realizar suma, resta, multiplicación, división y conjugación de números complejos en sus distintas representaciones, interpretando los resultados tanto algebraica como geométricamente.

1 Números complejos

Los **números complejos** surgieron como una solución a problemas algebraicos en el siglo XVI. Durante este periodo, matemáticos italianos como **Gerolamo Cardano** se enfrentaron a ecuaciones cúbicas que, en ciertos casos, requerían tomar la raíz cuadrada de números negativos para encontrar soluciones reales. Aunque estos números no tenían una interpretación física o geométrica clara en ese momento, se utilizaron como herramientas algebraicas. Cardano, en su obra **Ars Magna** (1545), presentó por primera vez las soluciones que involucraban raíces cuadradas de números negativos, aunque no comprendía completamente su significado.

En la física y la ingeniería, los números complejos se utilizan ampliamente en el análisis de señales y sistemas. En ingeniería eléctrica, por ejemplo, los números complejos permiten simplificar la representación de ondas sinusoidales y analizar circuitos de corriente alterna mediante el uso de **impedancias** complejas. Las **transformadas de Fourier**,

que descomponen señales en componentes de frecuencia, se expresan naturalmente en términos de números complejos.

Ondas sinusoidales con números complejos (fasores)

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) = \Re\{Ae^{i\phi}e^{i\omega t}\} = \Re\{Xe^{i\omega t}\}, E(z, t) = \Re\{E_0e^{i(kz - \omega t)}\}, \quad (\text{onda plana armónica}). \text{ Si } x_1(t) = \Re\{X_1e^{i\omega t}\} \quad (1)$$

Uno de los campos donde los números complejos son absolutamente fundamentales es la **mecánica cuántica**. Las funciones de onda, que describen el estado cuántico de partículas, son funciones complejas, y las operaciones en este *espacio de funciones* son clave para determinar probabilidades y realizar predicciones sobre el comportamiento de sistemas cuánticos.

Matemáticamente, un número complejo es cualquier cantidad expresable de la forma

$$z = a + bi \quad (2)$$

donde a y b son números reales e $i = \sqrt{-1}$, se conoce como **unidad imaginaria**; es decir, es una constante que satisface la **ecuación cuadrática** $x^2 + 1 = 0$.

El conjunto de los números complejos se denotan por $\mathbb{C}$.

Raíces complejas

La ecuación $z^2 - 2z + 2 = 0$ tiene por solución

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i \quad (3)$$

Note que una ecuación algebraica tiene raíces complejas si su discriminante es negativo.

1.1 Representación de los números complejos

1.1.1 Parte real e imaginaria

A partir de la relación entre las coordenadas rectangulares (x, y) de un punto y sus coordenadas polares $(r; \theta)$ (ver Figura Figure 1) es posible expresar un número complejo z en *forma rectangular*:

$$z = (x, y) = x + yi \quad (4)$$

o en *forma polar*:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad (5)$$

donde x se conoce como la *parte real* y y la *parte imaginaria* de z . A r y a θ se les llama el *módulo* y el *argumento* de z , respectivamente.

Símbolicamente:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(z) &= \Re(z) = x, \\ \operatorname{Im}(z) &= \Im(z) = y, \\ \operatorname{mod}(z) &= |z| = r, \\ \operatorname{arg}(z) &= \theta. \end{aligned} \quad (6)$$




Figure 1: Coordenadas polares.

Generalmente θ se mide en radianes, y cuando su valor se toma en el rango $(-\pi, \pi]$, se le llama *argumento principal*.

El **diagrama de Argand** también conocido como *plano de Argand* o *plano complejo*, es una representación gráfica de números complejos en un plano bidimensional. El eje horizontal (generalmente llamado *eje real*) representa la parte real de un número complejo, mientras que el eje vertical (llamado *eje imaginario*) representa la parte imaginaria de un número complejo (ver Figure 2). Este diagrama es una herramienta fundamental en matemáticas para visualizar y operar con números complejos.

Figure 2: Plano complejo o de Argand.

Note que, por ejemplo

$$\begin{aligned}(x, 0) &= x, \\ (0, 1) &= i, \\ (0, -1) &= -i;\end{aligned}\tag{7}$$

y que $|i| = |-i| = 1$. Además, que $\arg(\pm i) = \pm\pi/2$.

Ejemplo - Plano complejo

Considere el número $z = (1, \sqrt{3}) = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

Ejemplo - Plano complejo

Considere el número $z = (-1, \sqrt{3}) = -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$

Dada la periodicidad de las funciones trigonométricas, note que hay varios valores de θ que representan el mismo número complejo.

Periodicidad de los números complejos

El número $z = (-1, -1) = -1 - i$ es equivalente a

$$z = \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi \right) \right], \tag{8}$$

donde $n = 0, 1, 2, \dots$ es un entero.

Para $n = 0$, $z = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right]$;

Para $n = 1$, $z = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right]$.

1.1.2 Conjugado complejo

El número complejo $\bar{z} = x - iy$, obtenido de cambiar el signo de i en $z = x + iy$ se llama *conjugado complejo* de z :

$$\bar{z} = r[\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)] = r(\cos \theta - i \sin \theta) = (x, -y) \quad (9)$$

En algunos campos, como en la estadística o la mecánica cuántica, se utiliza el símbolo z^* en lugar de $\bar{z}$.

Por lo tanto, el módulo de un número complejo, puede escribirse también como

$$|z| = r = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (10)$$

Note que

$$\begin{aligned} \arg(\bar{z}) &= -\arg(z) = -\theta, \\ \text{mod}(\bar{z}) &= \text{mod}(z) = r. \end{aligned} \quad (11)$$

Conjugado complejo

1.1.3 Fórmula de Euler

A partir de la expansión en serie de $\cos \theta$ y $\sin \theta$, puede escribirse

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (12)$$

de manera que cualquier número complejo también puede expresarse como

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}. \quad (13)$$

A esta expresión, se le conoce como *Fórmula de Euler*. Note que

$$\bar{z} = re^{-i\theta}, \quad (14)$$

(Ver **Ejemplo - Figure ??**.)

Teorema de Moivre's

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad (15)$$

Aplicacion Teorema de Moivre's

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\theta) \quad (16)$$

$$z^n - \frac{1}{z^n} = 2i \sin(n\theta) \quad (17)$$

1.2 Operaciones elementales con números complejos

Las operaciones elementales con números complejos son una extensión de las operaciones aritméticas básicas para los números reales, pero considerando las propiedades de los números complejos, particularmente la unidad imaginaria i . Estas operaciones incluyen la suma, resta, multiplicación, división, conjugación, y el cálculo del módulo y argumento.

1.2.1 Suma/resta de números complejos

Dado dos números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$, la suma/resta se realiza sumando las partes reales y las partes imaginarias por separado:

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2)i \quad (18)$$

Suma de números complejos

Considere los números $z_1 = 3 + 4i$ y $z_2 = 1 + 2i$:

$$z_1 + z_2 = (3 + 4i) + (1 + 2i) = (3 + 1) + (4 + 2)i = 4 + 6i \quad (19)$$

1.2.2 Multiplicación de números complejos

Para multiplicar dos números complejos, se aplica la propiedad distributiva:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i \quad (20)$$

Multiplicación de números complejos

$$\begin{aligned} (2 + 3i)(1 + 4i) &= (2 \times 1 - 3 \times 4) + (2 \times 4 + 3 \times 1)i \\ &= 2 - 12 + 8i + 3i \\ &= -10 + 11i \end{aligned} \quad (21)$$

A partir de la fórmula de Euler, también es posible expresar la multiplicación de números complejos:

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \quad (22)$$

De esta expresión, se puede observar que

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2| \quad (23)$$

y

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2). \quad (24)$$

Note que multiplicar un número complejo por $\pm i$ corresponde en una "rotación" en el plano complejo de $\pm \pi/2$.

Multiplicación de un número complejo por $\pm i$.

1.2.3 División de números complejos

Para dividir z_1 entre z_2 , multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Si $z_2 = a_2 + b_2i$, su conjugado es $\bar{z}_2 = a_2 - b_2i$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (b_1 a_2 - a_1 b_2) i}{a_2^2 + b_2^2} \quad (25)$$

División de números complejos

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{(3 + 2i + 3i - 2)}{1 + 1} = \frac{(1 + 5i)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i \quad (26)$$

También es posible realizar la división de números complejos a partir de la fórmula de Euler:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, \quad (27)$$

de donde

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (28)$$

y

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2). \quad (29)$$

División de números complejos

$$\frac{i + 1}{1 - i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = e^{3i\pi/2} = -i \quad (30)$$

1.2.4 Argumento y módulo de un número complejo

El argumento de un número complejo $z = a + bi$ es el ángulo θ que forma el vector z con el eje real positivo en el plano de Argand. Este ángulo está dado por:

$$\theta = \arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), \quad (31)$$

mientras que el módulo de un número complejo, $|z|$, es su distancia al origen en el plano complejo:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (32)$$

Argumento y módulo de un número complejo

$$|\sqrt{5} + 3i| = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}, \quad (33)$$

$$\arg(\sqrt{5} + 3i) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right) \quad (34)$$

Referencias

[Boas \(2006\)](#)

[Arfken and Weber \(2005\)](#)

[Riley et al. \(2006\)](#) [Cap. 3 "Complex numbers and hyperbolic functions ", pág. 83-95]

References

- G. Arfken and H. Weber. *Mathematical Methods For Physicists International Student Edition*. Academic Press, 2005. ISBN 9780080470696. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EYZyPT-acRtHka7SWJWDt1MBvRUkcF1mobqS50e21bMccQ?e=0xYamS.
- M. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcAct-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.