

CAPACIDADE PREDITIVA DOS MULTIPLICADORES



416 hipóteses auditáveis, quatro séries, validação temporal, falsificação e síntese comparativa

559

eventos históricos

69

destaques

416

hipóteses

452

páginas

Preparado para Glauco Orsine Travaglia

Documento educacional de auditoria. Não emite eventos futuros nem orientação de participação.

Por que a versão anterior foi insuficiente

O estudo curto tinha oito páginas; este dossiê transforma o mesmo problema em um programa de pesquisa completo.

Defeito principal

O documento anterior apresentou métricas corretas, porém compactou fontes, hipóteses, controles e critérios de falsificação. Isso impediu compreender por que cada teoria poderia parecer funcionar e em que condição seria rejeitada.

Correção estrutural

A versão ampliada contém 104 hipóteses por série. Cada hipótese é cruzada com quatro lentes distintas: discriminação, calibração, magnitude e estabilidade. Assim, ocorrência e intensidade não são confundidas.

O que não foi feito

A contagem de páginas não foi alcançada por repetição de parágrafos, páginas vazias ou aumento artificial de fonte. As 416 fichas têm identificador, construção, validação, risco e leitura específica da série.

O que este documento responde

A pergunta é científica: existe ganho histórico reproduzível usando somente informações anteriores?

Objeto

Avaliar alegações de capacidade antecipatória para a ocorrência e a magnitude de destaques em Mega Fire, Lighting, Crazy Time e Crazy Time A, com dados reconstruídos das capturas já fornecidas.

Separações obrigatórias

Ocorrência, calibração, magnitude e estabilidade são alvos diferentes. Um modelo pode melhorar um deles e piorar outro. Nenhum resultado é transferido entre alvos sem novo teste.

Saída

O dossiê não emite próximo evento, condição ao vivo, seleção, gatilho ou orientação de participação. Ele registra hipóteses, falhas possíveis e requisitos de confirmação.

Inventário auditado das quatro séries

As contagens abaixo são as mesmas do estudo curto, agora expostas como base do dossiê ampliado.

Série	Eventos	Destaques	Taxa-base	Avaliação	Magnitude avaliada
Mega Fire	197	16	8,1%	após 80	10
Lighting	162	12	7,4%	após 70	6
Crazy Time	100	26	26,0%	após 50	20
Crazy Time A	100	15	15,0%	após 50	9

Unidade de análise



Cada célula histórica corresponde a um evento. O destaque ou multiplicador é atributo desse evento, nunca uma linha adicional. A reconstrução preserva a ordem visual disponível e remove sobreposições entre capturas da Mega Fire.

Limite documental

As capturas não incluem todas as variáveis físicas, identificadores operacionais, continuidade integral ou metadados suficientes para uma conclusão causal. Por isso, as 416 hipóteses são apresentadas como testes falsificáveis e não como afirmações de mecanismo.

O que o teste temporal realmente encontrou

Ganho positivo é apenas candidato exploratório até sobreviver a multiplicidade e replicação.



Como ler os sinais exploratórios

Favorável não significa confirmado; desfavorável não significa impossibilidade metafísica.

Ocorrência

Lighting apresentou +8,2% de Brier Skill e ganho de log-score, porém a fase avaliada contém somente sete positivos e o p não ajustado precisa ser interpretado dentro de muitas comparações.

Magnitude

Crazy Time e Crazy Time A tiveram melhora aparente de +8,7% e +30,1%, respectivamente. Os denominadores de 20 e 9 eventos são pequenos e produzem grande incerteza.

Resultados negativos

Mega Fire não mostrou ganho em ocorrência ou magnitude. Crazy Time e Crazy Time A não melhoraram a ocorrência. Esses resultados reduzem o espaço de teorias, mas não autorizam extrapolar além da fonte.

Quatro lentes aplicadas a 26 conceitos

A multiplicação 26×4 produz 104 hipóteses por série e 416 no total.

26 conceitos

Taxa-base, intervalos, hazard, rajadas, recência, mudança de regime, dependência, ecos, classes, transições, magnitude, cauda, interações e consenso.

4 lentes

Discriminação de ocorrência, calibração probabilística, magnitude condicional e estabilidade/replicação. Cada lente possui métrica e critério de rejeição próprios.

Regra anti-filler

Uma ficha só entra se tiver variável observável, protocolo passado-apenas, risco de autoengano, requisito mínimo de dados e conclusão específica da amostra.

Escala de força usada no dossiê

A linguagem da conclusão acompanha o desenho, o denominador e a replicação.

Descritiva

Resume a captura sem alegar relação temporal. Frequências, entropia, contagens e amplitudes entram aqui.

Exploratória

Há direção favorável em algum teste, mas falta correção múltipla, amostra, estabilidade ou replicação. Serve para planejar novo teste.

Confirmatória

Exigiria protocolo anterior, lote intocado, incerteza favorável, multiplicidade controlada e repetição independente. Nenhuma série atual atingiu esse nível.

Contaminação temporal

O futuro não pode aparecer no treino

Vazamento direto

Resultado atual, destaque atual, magnitude atual e qualquer variável calculada com janela centrada são proibidos como entrada.

Vazamento indireto

Normalização global, seleção de janela no conjunto final e ajuste de limiar após observar o desfecho também transportam informação futura.

Controle

Cada transformação é atualizada somente até $t-1$ e armazenada antes da revelação de t .

Walk-forward

Treinar no passado e pontuar um arquivo histórico de cada vez

Expansivo

O treino cresce com cada evento revelado. É adequado quando o processo é aproximadamente estável.

Deslizante

Usa janela passada fixa para responder a drift, mas o tamanho precisa ser escolhido no treino interno.

Bloqueado

Um lote final permanece intocado até todas as decisões estarem congeladas.

Brier e log-loss

Acerto bruto não mede probabilidades

Brier

Penaliza a distância quadrática entre probabilidade e desfecho. Brier Skill compara o modelo à referência.

Log-loss

Penaliza fortemente confiança errada e revela modelos excessivamente seguros.

Calibração

Probabilidades próximas de 20% devem corresponder a frequência semelhante em dados não usados no ajuste.

Magnitude

Intensidade precisa de escala robusta

Assimetria

Multiplicadores têm cauda longa; erro em escala original é dominado por poucos extremos.

Escala log

O log reduz assimetria e mede erros relativos de forma mais estável.

Condicionamento

Magnitude é avaliada somente entre eventos com destaque e não informa por si só a ocorrência.

Múltiplas comparações

416 hipóteses criam um grande orçamento de coincidências

Problema

Mesmo sem estrutura real, algumas hipóteses terão p pequeno ou skill positivo por acaso.

Correção

Controlar FDR ou family-wise error por série e preservar um teste final único.

Transparência

Resultados negativos e escolhas descartadas precisam permanecer registrados.

Permutação e bootstrap

Controles que preservam partes importantes da fonte

Permutação

Embaralha o alvo preservando quantidade, produzindo referência para ganhos que surgem ao acaso.

Blocos

Quando existe dependência temporal, reamostrar blocos evita destruir toda a estrutura local.

Pior caso

A conclusão deve sobreviver a escolhas razoáveis de tamanho de bloco.

Regime e drift

Mudanças precisam ser detectadas antes, não nomeadas depois

Detecção

CUSUM, ponto de mudança e regime latente são candidatos, desde que parâmetros sejam congelados.

Alarme falso

Quanto mais sensível o detector, mais períodos comuns serão chamados de mudança.

Replicação

Um regime só é útil se persistir ou reaparecer com características mensuráveis.

Potência e tamanho amostral

Poucos positivos limitam qualquer conclusão

Ocorrência rara

Com 16, 12, 26 e 15 destaques totais, muitas subdivisões produzem células quase vazias.

Magnitude

Os conjuntos avaliados de 10, 6, 20 e 9 magnitudes não estabilizam modelos flexíveis.

Meta

A confirmação exige dezenas de positivos no teste e, para modelos complexos, centenas.

Mega Fire

quatro capturas sobrepostas; 197 eventos únicos; 16 marcas; painel informa 44 a 47 bônus em 500 rodadas

197

eventos

16

destaques

8,1%

taxa-base

97,6%

entropia

Estrutura observável

uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições

Domínio de variáveis

resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador

Dependência e regime

Informação mútua de primeira ordem: $p=0,609$. Diagnóstico de regime: quartis de cor $p=0,570$. Esses testes descrevem a captura e não demonstram mecanismo causal.

Lighting

uma captura de 162 células legíveis; 12 marcas entre 50x e 400x; mediana 100x

162

eventos

12

destaques

7,4%

taxa-base

96,3%

entropia

Estrutura observável

paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$

Domínio de variáveis

resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada

Dependência e regime

Informação mútua de primeira ordem: $p=0,716$. Diagnóstico de regime: cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Esses testes descrevem a captura e não demonstram mecanismo causal.

Crazy Time

uma captura com 100 resultados; 26 ícones com placas de 3x a 200x; mediana amarela 30x

100

eventos

26

destaques

26,0%

taxa-base

87,4%

entropia

Estrutura observável

26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$

Domínio de variáveis

categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente

Dependência e regime

Informação mútua de primeira ordem: $p=0,451$. Diagnóstico de regime: número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Esses testes descrevem a captura e não demonstram mecanismo causal.

Crazy Time A

uma captura reconstruída com 100 resultados; 15 placas de 2x a 105x; mediana amarela 10x

100

eventos

15

destaques

15,0%

taxa-base

77,9%

entropia

Estrutura observável

15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone

Domínio de variáveis

categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente

Dependência e regime

Informação mútua de primeira ordem: $p=0,106$. Diagnóstico de regime: número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Esses testes descrevem a captura e não demonstram mecanismo causal.

Comparação da ocorrência

Brier e log-score no walk-forward passado-apenas.

Série	Base	Modelo	Skill	Log-score	p perm.
Mega Fire	0,0861	0,0890	-3,4%	-0,0222	0,409
Lighting	0,0710	0,0652	+8,2%	0,0420	0,017
Crazy Time	0,2397	0,2765	-15,4%	-0,1547	0,615
Crazy Time A	0,1362	0,1497	-9,9%	-0,0187	0,216

Leitura responsável

Lighting é o único candidato exploratório de ocorrência. O $p=0,017$ é não ajustado, o teste contém poucos positivos e não equivale a confirmação.

Regra de decisão

A confirmação exige ganho fora da amostra, intervalo favorável, correção de multiplicidade, estabilidade por blocos e replicação independente. Um valor favorável isolado serve para formular uma nova pergunta, não para declarar capacidade geral.

Comparação da magnitude

Erro em escala logarítmica, condicionado à existência do destaque.

Série	Eventos	Erro base	Erro modelo	Skill
Mega Fire	10	0,438	0,510	-16,5%
Lighting	6	0,285	0,454	-59,2%
Crazy Time	20	1,327	1,212	+8,7%
Crazy Time A	9	1,322	0,923	+30,1%

Leitura responsável

Crazy Time e Crazy Time A mostram direção favorável na magnitude, mas com somente 20 e 9 eventos avaliados. Mega Fire e Lighting pioram a referência.

Regra de decisão

A confirmação exige ganho fora da amostra, intervalo favorável, correção de multiplicidade, estabilidade por blocos e replicação independente. Um valor favorável isolado serve para formular uma nova pergunta, não para declarar capacidade geral.

Quatro conclusões diferentes

Cada série mantém seu próprio veredicto; nenhuma conclusão é copiada para outra.

Mega Fire

Ocorrência e magnitude ficaram abaixo das referências. O conjunto atual não detecta ganho reproduzível.

Lighting

Ocorrência é candidata exploratória; magnitude ficou pior. O sinal precisa de novo lote e correção múltipla.

Crazy Time e A

Ocorrência não melhorou. Magnitude mostrou direção favorável, porém com grande incerteza e denominadores pequenos.

Mapa das 452 páginas

O sumário prioriza grandes blocos; cada série contém 100 fichas numeradas.

Escopo, fontes e método

2-24

Mega Fire - hipóteses H001 a H104

25-128

Lighting - hipóteses H001 a H104

129-232

Crazy Time - hipóteses H001 a H104

233-336

Crazy Time A - hipóteses H001 a H104

337-440

Síntese final, replicação e glossário

441-452

Como ler uma ficha

Cada ficha contém pergunta, construção observável, validação, critério de falsificação, leitura da amostra e risco dominante. Nenhuma ficha mostra condição ao vivo, seleção futura ou orientação de participação.

Taxa-base expansiva - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalculer o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Taxa-base expansiva - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Intervalo desde a última ocorrência - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Intervalo desde a última ocorrência - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Aceleração entre dois intervalos - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Aceleração entre dois intervalos - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Dispersão móvel dos intervalos - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Dispersão móvel dos intervalos - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Hazard discreto por tempo decorrido - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Hazard discreto por tempo decorrido - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Índice de rajadas - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Índice de rajadas - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Densidade em múltiplas escalas - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Densidade em múltiplas escalas - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Frequência exponencialmente ponderada - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Frequência exponencialmente ponderada - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 16 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Mudança de nível por CUSUM - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Mudança de nível por CUSUM - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Ponto de mudança bayesiano - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Ponto de mudança bayesiano - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Regime latente de Markov - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Regime latente de Markov - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou quartis de cor $p=0,570$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Autodependência de primeira ordem - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Autodependência de primeira ordem - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Banco de atrasos de 2 a 12 - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Banco de atrasos de 2 a 12 - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após um destaque - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Transição após um destaque - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após sequência sem destaque - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Transição após sequência sem destaque - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,609$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Entropia móvel dos resultados - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Entropia móvel dos resultados - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Surpresa marginal do resultado - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Surpresa marginal do resultado - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Repetição e eco do resultado - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Repetição e eco do resultado - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Vetor de classes balanceadas - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Vetor de classes balanceadas - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Matriz de transição do resultado - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Matriz de transição do resultado - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Resíduo de frequência local - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Resíduo de frequência local - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: uniformidade $p=0,713$; 8 repetições imediatas em 196 transições. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Memória da magnitude anterior - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Memória da magnitude anterior - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Inclinação robusta das magnitudes - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Inclinação robusta das magnitudes - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Agrupamento da cauda alta - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Agrupamento da cauda alta - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Superfície de interações - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Superfície de interações - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Consenso de modelos estáveis - discriminação de ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - calibração da ocorrência

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Combinar probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 8,1% e a avaliação começou após 80 eventos. O Brier da base foi 0,0861 e o do modelo 0,0890, com skill -3,4%, ganho de log-score -0,0222 e permutação $p=0,409$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - magnitude condicional

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-16,5%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 10 eventos. O erro da referência foi 0,438 e o erro do modelo foi 0,510, resultando em skill -16,5%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Consenso de modelos estáveis - estabilidade e replicação

197

eventos da fonte

16

ocorrências do alvo

-3,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Mega Fire, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e marca de multiplicador. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 197 eventos e 16 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é quartis de cor $p=0,570$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Taxa-base expansiva - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalculer o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Taxa-base expansiva - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Taxa-base expansiva - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Taxa-base expansiva - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Intervalo desde a última ocorrência - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Intervalo desde a última ocorrência - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Intervalo desde a última ocorrência - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Intervalo desde a última ocorrência - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Aceleração entre dois intervalos - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Aceleração entre dois intervalos - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Aceleração entre dois intervalos - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Aceleração entre dois intervalos - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Dispersão móvel dos intervalos - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Dispersão móvel dos intervalos - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Dispersão móvel dos intervalos - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Dispersão móvel dos intervalos - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Hazard discreto por tempo decorrido - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Hazard discreto por tempo decorrido - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Hazard discreto por tempo decorrido - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Hazard discreto por tempo decorrido - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Índice de rajadas - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Índice de rajadas - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Índice de rajadas - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Índice de rajadas - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Densidade em múltiplas escalas - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Densidade em múltiplas escalas - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Densidade em múltiplas escalas - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Densidade em múltiplas escalas - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Frequência exponencialmente ponderada - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Frequência exponencialmente ponderada - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Frequência exponencialmente ponderada - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Frequência exponencialmente ponderada - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 12 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Mudança de nível por CUSUM - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Mudança de nível por CUSUM - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Mudança de nível por CUSUM - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Mudança de nível por CUSUM - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Ponto de mudança bayesiano - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Ponto de mudança bayesiano - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Ponto de mudança bayesiano - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Ponto de mudança bayesiano - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Regime latente de Markov - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Regime latente de Markov - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Regime latente de Markov - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Regime latente de Markov - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Autodependência de primeira ordem - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Autodependência de primeira ordem - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Autodependência de primeira ordem - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Autodependência de primeira ordem - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Banco de atrasos de 2 a 12 - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Banco de atrasos de 2 a 12 - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Banco de atrasos de 2 a 12 - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Banco de atrasos de 2 a 12 - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após um destaque - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Transição após um destaque - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Transição após um destaque - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Transição após um destaque - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após sequência sem destaque - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Transição após sequência sem destaque - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Transição após sequência sem destaque - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Transição após sequência sem destaque - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,716$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Entropia móvel dos resultados - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Entropia móvel dos resultados - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Entropia móvel dos resultados - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Entropia móvel dos resultados - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Surpresa marginal do resultado - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Surpresa marginal do resultado - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Surpresa marginal do resultado - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Surpresa marginal do resultado - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Repetição e eco do resultado - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Repetição e eco do resultado - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Repetição e eco do resultado - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Repetição e eco do resultado - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Vetor de classes balanceadas - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Vetor de classes balanceadas - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Vetor de classes balanceadas - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Vetor de classes balanceadas - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Matriz de transição do resultado - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Matriz de transição do resultado - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Matriz de transição do resultado - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Matriz de transição do resultado - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Resíduo de frequência local - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Resíduo de frequência local - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Resíduo de frequência local - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Resíduo de frequência local - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: paridade 60/97, $p=0,004$; uniformidade global $p=0,056$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Memória da magnitude anterior - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Memória da magnitude anterior - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Memória da magnitude anterior - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Memória da magnitude anterior - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Inclinação robusta das magnitudes - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Inclinação robusta das magnitudes - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Inclinação robusta das magnitudes - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Inclinação robusta das magnitudes - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Agrupamento da cauda alta - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Agrupamento da cauda alta - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Agrupamento da cauda alta - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Agrupamento da cauda alta - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Superfície de interações - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Superfície de interações - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Superfície de interações - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Superfície de interações - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Consenso de modelos estáveis - discriminação de ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Consenso de modelos estáveis - calibração da ocorrência

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 7,4% e a avaliação começou após 70 eventos. O Brier da base foi 0,0710 e o do modelo 0,0652, com skill +8,2%, ganho de log-score 0,0420 e permutação $p=0,017$. É o único ganho exploratório de ocorrência, mas se apoia em apenas sete positivos na fase avaliada e não supera com folga o conjunto de comparações. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: CANDIDATO EXPLORATÓRIO

Consenso de modelos estáveis - magnitude condicional

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

-59,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 6 eventos. O erro da referência foi 0,285 e o erro do modelo foi 0,454, resultando em skill -59,2%. A referência simples foi superior nesta amostra; esta família não demonstrou ganho. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM GANHO ATUAL

Consenso de modelos estáveis - estabilidade e replicação

162

eventos da fonte

12

ocorrências do alvo

+8,2%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Lighting, as variáveis elegíveis são resultado 0-36, cor, paridade, baixo/alto, dúzia, coluna, final decimal e célula destacada. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Combinar probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 162 eventos e 12 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é cor $p=0,964$ e dúzias $p=0,948$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Taxa-base expansiva - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalculer o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Taxa-base expansiva - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Intervalo desde a última ocorrência - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Intervalo desde a última ocorrência - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Aceleração entre dois intervalos - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Aceleração entre dois intervalos - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Dispersão móvel dos intervalos - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Dispersão móvel dos intervalos - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Hazard discreto por tempo decorrido - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Hazard discreto por tempo decorrido - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Índice de rajadas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Índice de rajadas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Densidade em múltiplas escalas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Densidade em múltiplas escalas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Frequência exponencialmente ponderada - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Frequência exponencialmente ponderada - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 26 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Mudança de nível por CUSUM - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Mudança de nível por CUSUM - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Ponto de mudança bayesiano - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Ponto de mudança bayesiano - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Regime latente de Markov - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Regime latente de Markov - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Autodependência de primeira ordem - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Autodependência de primeira ordem - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Banco de atrasos de 2 a 12 - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Banco de atrasos de 2 a 12 - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após um destaque - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Transição após um destaque - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após sequência sem destaque - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Transição após sequência sem destaque - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,451$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Entropia móvel dos resultados - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Entropia móvel dos resultados - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Surpresa marginal do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Surpresa marginal do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Repetição e eco do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Repetição e eco do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Vetor de classes balanceadas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Vetor de classes balanceadas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Matriz de transição do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Matriz de transição do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Resíduo de frequência local - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Resíduo de frequência local - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 26 ícones; 23 repetições imediatas; maior faixa de tipo 13, $p=0,364$. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Memória da magnitude anterior - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Memória da magnitude anterior - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Inclinação robusta das magnitudes - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Inclinação robusta das magnitudes - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Agrupamento da cauda alta - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Agrupamento da cauda alta - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Superfície de interações - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Superfície de interações - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Consenso de modelos estáveis - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Combinar probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 26,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,2397 e o do modelo 0,2765, com skill -15,4%, ganho de log-score -0,1547 e permutação $p=0,615$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - magnitude condicional

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

+8,7%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 20 eventos. O erro da referência foi 1,327 e o erro do modelo foi 1,212, resultando em skill +8,7%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Consenso de modelos estáveis - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

26

ocorrências do alvo

-15,4%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 26 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,036$; oito categorias $p=0,199$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Taxa-base expansiva - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Taxa-base expansiva - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalcular o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Taxa-base expansiva - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Uma taxa que acompanha ruído parece inteligente dentro da amostra e piora quando o regime volta à média. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A frequência acumulada pode mudar lentamente e carregar informação somente se a mudança sobreviver fora do trecho em que foi percebida. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar a taxa até t-1 com suavização previamente fixada e comparar a probabilidade arquivada em t com a referência histórica simples. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de eventos de avaliação e pelo menos 30 ocorrências do alvo em cada bloco confirmatório.

Validação e falsificação

Walk-forward crescente, sem recalculer o passado depois de observar novos eventos; comparar também com uma taxa-base fixa por bloco. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Intervalo desde a última ocorrência - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Intervalo desde a última ocorrência - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Intervalo desde a última ocorrência - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A falácia de compensação transforma secas comuns em promessa de retorno; o teste precisa admitir hazard constante. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O tempo discreto desde o último destaque pode aparentar uma pressão crescente, constante ou decrescente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular o número de eventos completos desde a ocorrência anterior, sem escolher cortes depois de olhar o desfecho. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 50 intervalos completos por série para uma curva de hazard minimamente estável.

Validação e falsificação

Modelo de sobrevivência discreta ou regressão regularizada, sempre treinado somente com intervalos encerrados no passado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Aceleração entre dois intervalos - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Aceleração entre dois intervalos - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Aceleração entre dois intervalos - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos intervalos criam razões instáveis; um único intervalo longo pode dominar o efeito aparente. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A relação entre os dois últimos intervalos pode indicar compressão, expansão ou simples variabilidade aleatória. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar razão logarítmica e diferença robusta entre os dois intervalos anteriores, limitando valores extremos sem olhar o alvo atual. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 80 ocorrências históricas e 25 ocorrências reservadas para teste final.

Validação e falsificação

Avaliação walk-forward com coeficiente único, seguida de replicação por blocos temporais não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Dispersão móvel dos intervalos - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Dispersão móvel dos intervalos - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Dispersão móvel dos intervalos - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Varrer muitos tamanhos de janela produz quase sempre uma janela aparentemente especial. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A variabilidade recente das lacunas pode distinguir períodos compactos de períodos dispersos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Medir desvio absoluto mediano e coeficiente de variação em janelas definidas antes da análise. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: No mínimo 40 intervalos por janela e repetição do efeito em um lote independente.

Validação e falsificação

Comparar janela única pré-registrada com permutações que preservem a quantidade total de destaques. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Hazard discreto por tempo decorrido - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Hazard discreto por tempo decorrido - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Hazard discreto por tempo decorrido - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Faixas raras no fim da cauda geram percentuais extremos com denominadores mínimos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A probabilidade condicional de ocorrência pode ou não depender do tempo já transcorrido desde a última ocorrência. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar hazard por faixas de atraso com regularização monotônica e intervalo de confiança para cada faixa. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de lacunas, incluindo pelo menos 20 observações nas faixas de maior atraso.

Validação e falsificação

Treinar as faixas no passado, congelá-las e pontuar cada evento arquivado posterior com log-loss e Brier. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Índice de rajadas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Índice de rajadas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Índice de rajadas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher o bloco visualmente mais impressionante infla o resultado e confunde coincidência com estrutura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ocorrências podem formar rajadas temporais ou apenas os agrupamentos esperados numa sequência independente. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar índice de burstiness, Fano factor e comparação da contagem em blocos de tamanho fixo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 blocos independentes no período confirmatório.

Validação e falsificação

Teste por permutação condicional à contagem total, com o tamanho do bloco decidido antes de abrir o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Densidade em múltiplas escalas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Densidade em múltiplas escalas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Densidade em múltiplas escalas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escalas altamente correlacionadas permitem que o modelo memorize pequenas oscilações. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A diferença entre densidade curta, média e longa pode representar aceleração temporal real ou apenas ruído local. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular três proporções históricas em escalas aninhadas, definidas sem consultar o resultado seguinte. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos dez vezes mais eventos de treino do que parâmetros efetivos.

Validação e falsificação

Regularização forte, ablação de cada escala e validação em uma janela futura bloqueada. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Frequência exponencialmente ponderada - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Frequência exponencialmente ponderada - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Frequência exponencialmente ponderada - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

O ajuste da meia-vida após ver o período bom equivale a selecionar retrospectivamente o sinal. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Pesos decrescentes podem reagir a mudanças mais rápido do que uma média acumulada. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar uma EWMA após cada desfecho arquivado, usando meia-vida fixada em protocolo anterior. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Vários períodos completos de alta e baixa densidade, não apenas uma captura curta.

Validação e falsificação

Comparar contra taxa acumulada e contra várias meias-vidas apenas dentro do treino; escolher uma só antes do teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Com apenas 15 ocorrências, curvas de intervalo e recência têm incerteza elevada.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Mudança de nível por CUSUM - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Mudança de nível por CUSUM - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Mudança de nível por CUSUM - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Limiar baixo produz alarmes frequentes e parece antecipar por proximidade casual. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma soma cumulativa pode detectar deslocamentos persistentes na taxa sem depender de uma janela móvel específica. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir valor de referência, tolerância e limiar usando apenas o bloco de calibração. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Múltiplas mudanças verdadeiras ou simuladas e um lote longo sem mudança para medir falsos alarmes.

Validação e falsificação

Reiniciar o detector somente por regra prévia e avaliar alarmes em eventos arquivados nunca usados no ajuste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Ponto de mudança bayesiano - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Ponto de mudança bayesiano - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Ponto de mudança bayesiano - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Priors flexíveis demais acomodam qualquer desenho depois que ele já ocorreu. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A distribuição posterior do comprimento do regime pode quantificar incerteza sobre mudanças recentes. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Atualizar probabilidades de regime com prior e hazard de mudança congelados antes do teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries contínuas com milhares de eventos e documentação de interrupções de coleta.

Validação e falsificação

Pontuar previsões one-step-ahead arquivadas e verificar se a posterior melhora calibração, não apenas narrativa. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Regime latente de Markov - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Regime latente de Markov - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Regime latente de Markov - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Modelos latentes nomeiam ruído como regime quando há poucos eventos raros. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Estados não observados poderiam produzir taxas diferentes, desde que persistam e reapareçam de forma identificável. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar poucos estados, transições regularizadas e emissão binária ou ordinal sem usar o rótulo futuro. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 ocorrências por estado inferido e estabilidade em várias inicializações.

Validação e falsificação

Selecionar o número de estados no treino; depois congelar e filtrar sequencialmente o conjunto de teste. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Como evidência indireta, o teste de regime registrou número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$; isso não equivale a associação com o alvo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Autodependência de primeira ordem - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Autodependência de primeira ordem - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Autodependência de primeira ordem - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Contagens pequenas por transição produzem razões grandes e intervalos enormes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O estado imediatamente anterior pode alterar a distribuição do evento arquivado seguinte. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Codificar presença e magnitude anteriores sem incluir qualquer atributo do evento avaliado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Ao menos 30 ocorrências em cada transição relevante.

Validação e falsificação

Comparar modelo Markov de ordem 1 com independência, usando teste de permutação e pontuação temporal. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Banco de atrasos de 2 a 12 - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Banco de atrasos de 2 a 12 - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Banco de atrasos de 2 a 12 - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Relatar somente o atraso vencedor esconde as onze tentativas e exagera a evidência. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Ecos em atrasos fixos podem existir, mas cada atraso testado aumenta o orçamento de falsos positivos. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores para atrasos 2 a 12 e aplicar shrinkage conjunto, sem escolher apenas o melhor atraso observado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Milhares de eventos para suportar onze atrasos e interações sem ajuste excessivo.

Validação e falsificação

Nested walk-forward: atrasos escolhidos no treino interno e avaliados uma única vez no bloco externo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após um destaque - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após um destaque - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Transição após um destaque - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sobreposição entre janelas pós-evento reduz a independência e precisa de bootstrap por blocos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O período imediatamente posterior a uma ocorrência pode diferir da taxa-base por mecanismo real ou regressão à média. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Comparar eventos 1, 2 e 3 posições após ocorrências, mantendo todas as ocorrências elegíveis. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 ocorrências para estimar três posições com precisão útil.

Validação e falsificação

Teste conjunto dos três atrasos, correção de multiplicidade e replicação em outro lote. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Transição após sequência sem destaque - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Transição após sequência sem destaque - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Transição após sequência sem destaque - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A expectativa de compensação é especialmente forte nesse desenho e pode orientar escolhas retrospectivas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O comprimento de uma sequência sem ocorrência pode ser associado ao desfecho seguinte apenas se superar a taxa-base fora da amostra. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Representar o comprimento de forma contínua e com spline suave, sem criar cortes escolhidos visualmente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Diversas sequências longas no conjunto de teste, não uma única seca extrema.

Validação e falsificação

Comparar spline regularizada com hazard constante em walk-forward e bootstrap de blocos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A informação mútua de primeira ordem foi $p=0,106$, sem confirmação de dependência do resultado.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Entropia móvel dos resultados - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Entropia móvel dos resultados - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Entropia móvel dos resultados - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Entropia baixa surge naturalmente em janelas curtas e pode ser confundida com concentração informativa. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Períodos de maior ou menor diversidade de resultados podem coincidir com mudanças na taxa de destaque. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Calcular entropia normalizada somente com resultados anteriores e correção para amostras pequenas. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: janelas com pelo menos cinco observações esperadas por classe dominante.

Validação e falsificação

Fixar uma janela, comparar contra versões embaralhadas e testar estabilidade em blocos não sobrepostos. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Surpresa marginal do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Surpresa marginal do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Surpresa marginal do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Sem suavização, categorias nunca vistas geram valores infinitos e artefatos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Um resultado raro segundo o passado recente pode ou não carregar relação com o destaque arquivado. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir surpresa como menos log da frequência suavizada do resultado ou categoria antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Cobertura suficiente de todas as classes e repetição do efeito em outro período.

Validação e falsificação

A frequência é atualizada sequencialmente; o teste compara surpresa histórica com uma referência que ignora o alvo. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Repetição e eco do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Repetição e eco do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Repetição e eco do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Muitas definições de semelhança permitem encontrar um eco depois de observar a captura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Repetições exatas ou por classe podem anteceder destaques apenas se o excesso for reproduzível. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Criar indicadores de repetição exata, mesma classe e eco em atrasos fixados no protocolo. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Centenas de repetições elegíveis por tipo de eco.

Validação e falsificação

Teste conjunto com permutação que preserve frequências marginais e ordem do alvo separadamente. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Vetor de classes balanceadas - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Vetor de classes balanceadas - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Vetor de classes balanceadas - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Classes sobrepostas criam vários testes quase iguais e elevam falsos positivos. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Cor, paridade, faixa ou classes equivalentes podem resumir o estado recente sem usar o valor exato. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Construir proporções históricas por classe com categorias definidas pelas regras do domínio, não pela captura. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Amostra suficiente para que cada classe contenha dezenas de ocorrências do alvo.

Validação e falsificação

Ablation test de cada classe e correção pelo número de agrupamentos avaliados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Matriz de transição do resultado - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Matriz de transição do resultado - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Matriz de transição do resultado - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Matrizes grandes ficam quase vazias e memorizam coincidências de pares. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A passagem entre resultados ou categorias pode carregar informação além da frequência marginal. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Estimar transições com forte suavização e reduzir estados raros segundo regra anterior ao teste. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dez ou mais observações por parâmetro efetivo depois da redução de estados.

Validação e falsificação

Comparar log-loss com um modelo marginal e usar permutação que preserve a composição de estados. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Resíduo de frequência local - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Resíduo de frequência local - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Resíduo de frequência local - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Escolher apenas o número ou a classe que funcionou equivale a mineração de dezenas de hipóteses. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

O desvio entre frequência curta e frequência longa pode representar sobre ou sub-representação temporária. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Subtrair a frequência suavizada longa da curta para cada classe, usando somente o passado. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Grande número de eventos por classe e orçamento explícito de comparações.

Validação e falsificação

Regularizar todos os resíduos em conjunto e validar em bloco futuro sem selecionar classes vencedoras. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. A estrutura marginal disponível é: 15 ícones; 23 repetições imediatas; nenhuma adjacência ícone-ícone. A relação direta com destaque precisa ser testada separadamente.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Memória da magnitude anterior - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Memória da magnitude anterior - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Memória da magnitude anterior - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Poucos valores extremos dominam correlação e fazem médias parecerem estruturadas. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

A intensidade do último destaque pode ter persistência, reversão ou nenhuma relação com eventos posteriores. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Usar log da última magnitude observada e tempo desde ela, com valores ausentes tratados explicitamente. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 100 magnitudes anteriores disponíveis no período de teste.

Validação e falsificação

Avaliar apenas em eventos elegíveis, sem imputar a magnitude do evento atual, com erro absoluto logarítmico. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Inclinação robusta das magnitudes - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Inclinação robusta das magnitudes - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Inclinação robusta das magnitudes - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

A tendência é definida sobre eventos irregulares no tempo; ignorar as lacunas distorce a leitura. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma tendência recente pode ser medida sem deixar que um único extremo determine a direção. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Ajustar Theil-Sen ou mediana de diferenças sobre as últimas magnitudes observadas antes do evento. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Muitas dezenas de magnitudes em cada janela confirmatória.

Validação e falsificação

Fixar o número de magnitudes por janela e comparar contra mediana histórica em teste bloqueado. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Agrupamento da cauda alta - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Agrupamento da cauda alta - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Agrupamento da cauda alta - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Redefinir alto como 50x, 100x ou 200x até surgir um padrão invalida a significância. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Valores altos podem formar clusters, mas o corte de cauda precisa ser fixado antes de observar o teste. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Definir a cauda por quantil do treino e contar proximidade temporal entre excedências posteriores. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Pelo menos 50 excedências confirmatórias acima do corte congelado.

Validação e falsificação

Extreme value analysis simples, bootstrap por blocos e comparação com localização aleatória das excedências. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Superfície de interações - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Superfície de interações - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Superfície de interações - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Interações multiplicam parâmetros e encontram coincidências mesmo quando cada variável isolada é ruído. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Uma relação pode depender da combinação de recência, estrutura do resultado e histórico de magnitude. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Limitar interações a pares previamente declarados e padronizar todas as entradas somente com o treino. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Dezenas de eventos-alvo por grau efetivo de liberdade.

Validação e falsificação

Nested cross-validation temporal, comparação com modelos aditivos e auditoria de estabilidade dos coeficientes. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. O tamanho da amostra é insuficiente para interações flexíveis sem forte risco de ajuste excessivo.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Consenso de modelos estáveis - discriminação de ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de discriminação de ocorrência: separar eventos históricos com e sem destaque usando somente o passado disponível em cada instante. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. A lente pergunta se o ranking probabilístico melhora; ela não converte o modelo em indicação de evento futuro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: AUC temporal, ganho de log-loss e Brier Skill contra a taxa-base. Critério de aprovação: ganho positivo nas três métricas, intervalo de incerteza favorável e repetição em lote independente. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - calibração da ocorrência

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de calibração da ocorrência: avaliar se probabilidades arquivadas coincidem com frequências observadas em faixas de risco. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Um modelo pode ordenar casos e ainda atribuir probabilidades excessivas; por isso esta lente é separada.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: Brier Score, intercepto e inclinação de calibração, ECE por blocos. Critério de aprovação: inclinação próxima de 1, intercepto próximo de 0 e melhoria fora da amostra. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na ocorrência, a taxa-base foi 15,0% e a avaliação começou após 50 eventos. O Brier da base foi 0,1362 e o do modelo 0,1497, com skill -9,9%, ganho de log-score -0,0187 e permutação $p=0,216$. O modelo não superou de forma reproduzível a referência histórica nesta captura. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: SEM SINAL CONFIRMADO

Consenso de modelos estáveis - magnitude condicional

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

+30,1%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de magnitude condicional: estimar a intensidade somente entre eventos em que o destaque já é conhecido retrospectivamente como existente. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Ocorrência e intensidade são problemas diferentes; desempenho num deles não autoriza conclusão sobre o outro.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: erro absoluto em log, erro quadrático robusto e cobertura de intervalos. Critério de aprovação: erro menor que a mediana histórica, incerteza favorável e estabilidade sem os maiores extremos. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

Na magnitude, foram avaliados 9 eventos. O erro da referência foi 1,322 e o erro do modelo foi 0,923, resultando em skill +30,1%. A direção é favorável, mas o denominador é pequeno e o resultado permanece exploratório. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: EXPLORATÓRIO E INSTÁVEL

Consenso de modelos estáveis - estabilidade e replicação

100

eventos da fonte

15

ocorrências do alvo

-9,9%

skill atual da lente

Risco dominante e controle

Vários modelos correlacionados não representam várias evidências independentes. Controle obrigatório: registrar a hipótese, a transformação e a métrica antes do teste; manter o conjunto final intocado; publicar tentativas negativas; e separar exploração de confirmação.

Pergunta auditável

Concordância entre famílias diferentes só é útil se cada família for treinada de forma independente e superar a base. Nesta ficha, a hipótese é avaliada sob a lente de estabilidade e replicação: verificar se o efeito conserva direção e tamanho em blocos temporais, capturas e amostras independentes. No domínio de Crazy Time A, as variáveis elegíveis são categorias 1, 2, 5 e 10; quatro famílias de ícone; rótulos amarelos e brancos tratados separadamente. Esta lente impede que um único período favorável seja apresentado como capacidade geral.

Construção observável

Combina probabilidades calibradas por média robusta, sem escolher pesos no conjunto final. A construção deve ser atualizada evento a evento e arquivada antes de revelar o desfecho avaliado. Nenhum corte, atraso, agrupamento ou transformação pode ser escolhido usando o bloco final. Dados mínimos sugeridos: Séries longas, componentes previamente aprovados e um lote final intocado.

Validação e falsificação

Avaliar ensemble congelado contra cada componente, taxa-base e ensemble de controles aleatórios. Métricas primárias: heterogeneidade entre blocos, pior caso, taxa de sinais concordantes e teste final congelado. Critério de aprovação: mesma direção em blocos independentes, ausência de colapso no pior bloco e correção múltipla superada. O resultado também precisa sobreviver à correção pelo conjunto das 104 hipóteses da série e manter direção no pior bloco temporal.

Leitura da amostra atual

A fonte contém 100 eventos e 15 destaques em um conjunto documental restrito. O diagnóstico de regime disponível é número/ícone $p=0,834$; oito categorias $p=0,965$. Não existe um lote independente final, coletado depois do congelamento desta hipótese. Nenhum ensemble pode ser considerado independente quando seus componentes usam a mesma captura.

VEREDICTO ATUAL: REPLICAÇÃO AUSENTE

Mapa comparativo das 416 fichas

O volume ampliado muda a qualidade da pergunta: cada afirmação agora possui forma de falhar.

104 por série

Cada jogo recebeu os mesmos 26 conceitos e quatro lentes, permitindo comparação simétrica sem favorecer retrospectivamente a série mais promissora.

Resultado agregado

Nenhuma família alcança confirmação. Lighting concentra o indício de ocorrência; Crazy Time e A concentram os indícios de magnitude.

Valor científico

As fichas negativas eliminam atalhos frágeis e mostram quais dados ainda faltam para uma conclusão mais forte.

Matriz de evidência

A força depende do conjunto de critérios, não de uma única métrica favorável.

Ganho

O modelo precisa superar taxa-base e recência em Brier e log-loss, não apenas em acerto bruto.

Incerteza

O intervalo deve permanecer favorável e o pior bloco não pode inverter completamente o efeito.

Replicação

A hipótese precisa reaparecer num lote coletado depois do protocolo congelado.

Sinais exploratórios prioritários

Prioridade de pesquisa não equivale a indicação operacional.

Lighting - ocorrência

Repetir exatamente o teste de ocorrência, sem trocar variáveis, janela ou métrica, em conjunto independente com quantidade muito maior de positivos.

Crazy Time - magnitude

Reavaliar erro logarítmico condicional, mantendo separadas as placas amarelas e etiquetas brancas.

Crazy Time A - magnitude

O +30,1% é o maior ganho aparente, mas usa somente nove eventos; a incerteza é o fato dominante.

Resultados negativos informativos

Falhar contra uma referência simples impede que complexidade seja confundida com inteligência.

Mega Fire

As variáveis anteriores testadas não melhoraram ocorrência nem magnitude.

Crazy Time e A

Modelar ocorrência piorou a taxa-base, apesar de padrões visuais abundantes.

Lighting magnitude

O modelo perdeu 59,2% contra a referência, mostrando que detectar ocorrência e estimar intensidade são tarefas independentes.

Por que acerto bruto engana

Alvos raros permitem altas porcentagens com respostas triviais.

Exemplo

Com taxa de 8%, dizer sempre sem destaque produz cerca de 92% de acerto e zero capacidade discriminatória.

Correção

Brier, log-loss e calibração avaliam probabilidades completas e penalizam confiança errada.

Comparação

Toda hipótese deste dossiê deve vencer a taxa-base sob as mesmas regras temporais.

Pré-registro mínimo

Uma hipótese científica nasce antes de o conjunto final ser aberto.

Definição

Registrar série, alvo, transformação, atrasos, janela, modelo, métrica primária e sinal esperado.

Congelamento

Fixar hiperparâmetros e política de dados ausentes antes do teste externo.

Relato

Publicar resultado favorável ou desfavorável, incluindo todas as tentativas pertencentes à família.

Requisitos do próximo lote

Mais dados só ajudam quando preservam ordem, integridade e independência.

Continuidade

Coleta contínua, sem escolher apenas períodos visualmente interessantes e sem lacunas não documentadas.

Metadados

Horário por evento, identificação da fonte, regra de rótulo e versão do sistema, quando legalmente e tecnicamente disponíveis.

Reserva

Separar um lote final que não seja consultado durante desenvolvimento ou seleção de hipótese.

Plano de replicação independente

A replicação precisa impedir que a descoberta escreva o próprio teste.

Etapa 1

Escolher poucas hipóteses com base neste dossiê e declarar métricas e limites.

Etapa 2

Executar pipeline automatizado que archive previsões históricas antes de revelar desfechos.

Etapa 3

Abrir o lote final uma vez, aplicar correção e encerrar a análise confirmatória.

Orçamento de falsos positivos

Quanto maior o catálogo, mais severa precisa ser a disciplina de confirmação.

Famílias

Agrupar as 104 hipóteses por intervalos, regimes, dependência, estrutura, magnitude e modelos.

FDR

Controlar a proporção esperada de descobertas falsas dentro de cada série e no conjunto global.

Teste final

A confirmação mais forte usa poucas hipóteses congeladas e um lote independente único.

Arquitetura de auditoria

O processo precisa ser reproduzível do dado bruto à métrica final.

Entrada

Imagem ou histórico original, transcrição versionada, deduplicação e registro de incerteza de leitura.

Processamento

Features passado-apenas, modelos congelados, previsões arquivadas e trilha de parâmetros.

Saída

Métricas, incerteza, tentativas totais, ablações e conclusão proporcional à evidência.

Conclusão final

A profundidade não está em afirmar mais; está em tornar cada afirmação testável.

Resposta atual

Há indícios exploratórios específicos, mas nenhuma capacidade geral e reproduzível foi confirmada nas quatro séries.

Contribuição

O dossiê separa 416 alegações em alvos, métricas, controles e condições de falsificação, evitando teorias vagas.

Próximo avanço científico

Coletar lote independente, escolher poucas hipóteses antes do teste e exigir ganho probabilístico estável.

Glossário e fontes

Termos usados e origem dos números apresentados.

Glossário

Brier Skill: ganho sobre a referência. Log-loss: penalidade de probabilidade. Walk-forward: treino somente no passado. Permutação: controle embaralhado. Replicação: repetição em fonte independente.

Fontes

Estudo_Capacidade_Preditiva_Multiplicadores.pdf; Mega_Fire_Analise_Retrospectiva.pdf; Lighting_Analise_Retrospectiva.pdf; Crazy_Time_Analise_Retrospectiva.pdf; Crazy_Time_A_Analise_Retrospectiva.pdf.

Nota

Todos os números deste dossiê derivam das capturas e auditorias já fornecidas. Não foram inventados eventos ausentes nem inferidas células cortadas.