


ИНСТРУКЦИЯ

(информация для потребителей)

по медицинскому применению лекарственного средства
ЛИНКАС пастилки



Торговое название: ЛИНКАС

Лекарственная форма: пастилки (с мятным, медово-лимонным, апельсиновым вкусами)

Описание:

Пастилки с мятным вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с мятным вкусом;

Пастилки с медово-лимонным вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с медово-лимонным вкусом;

Пастилки с апельсиновым вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с апельсиновым вкусом.

Состав:

Каждая пастилка содержит:

Активные компоненты: густые водные экстракты

Адхатоды сосудистой листьев (5:1) – 30,0 мг,

Солодки голой корневищ и корней (4:1) – 7,0 мг,

Перца длинного плодов (4:1) – 6,0 мг,

Калгана большого корневищ (4:1) – 3,0 мг,

Иссопа лекарственного листьев (4:1) – 3,0 мг,

Фиалки душистой листьев (4:1) – 2,0 мг

Вспомогательные компоненты:

для пастилок с медово-лимонным вкусом: ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидкая глюкоза, лимонная кислота безводная, медово-лимонная эссенция, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий;

для пастилок с апельсиновым вкусом: ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидкая глюкоза, лимонная кислота безводная, апельсиновая эссенция, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий;

для пастилок с мятным вкусом: масло мяты перечной, ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидкая глюкоза, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий.

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях

Код АТХ R05X

Фармакологические свойства:

Комбинированный препарат растительного происхождения. Входящие в его состав компоненты оказывают противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие.

Фармакокинетика:


Поскольку Линкас® пастилки является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (фарингит, трахеит, бронхит)

Способ применения и дозировка:

Взрослым следует медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 пастилок. Средний курс лечения – 3 – 7 дней. Применение



13

лекарственного средства у детей до 18 лет противопоказано в связи с наличием в составе корня солодки.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В связи с наличием в составе ментола возможно появление следующих побочных эффектов: кожная сыпь, головная боль, изжога, жжение в анальной области, брадикардия, дрожание мышц и атаксия, особенно при применении высоких доз. Возможно появление рецидивирующей мышечной боли.

При появлении побочных эффектов необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Заболевания печени и/или почек, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипокалиемия, сахарный диабет, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, недостаточность сахаразы-изомальтазы, детский возраст (до 18 лет), беременность и период лактации, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта или желчного пузыря, нарушения функции печени.

Передозировка:

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности:

Пастилки содержат сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной пастилке содержится количество углеводов, соответствующее 0,18 ХЕ.

При появлении или нарастании одышки, лихорадки или гнойной мокроты необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и лактации:

Применение лекарственного средства у беременных и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности.

Применение при управлении автомобилем и работе с механизмами:

Исследований по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работу с движущимися механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и пищевыми продуктами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.


Экстракт корней солодки может вызывать снижение эффективности антигипертензивных лекарственных средств. Не рекомендуется одновременное применение с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, стимулирующими слабительными или другими лекарственными средствами, влияющими на электролитный баланс.

Форма выпуска:

8 пастилок в блистере из алюминиевой фольги. Два блистера с инструкцией по применению в коробке из картона

Условия хранения:

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь



40113

5080

2015

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.
Беречь от детей.

Срок годности:

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Отпускается без рецепта.

Производитель:



Herbion Pakistan Private Limited

Пакистан, Карачи, 74900, промышленная зона Коранги, участок 30.

Представительство компании «Herbion Pakistan Private Limited» в Республике Беларусь
220030 г. Минск, пр. Независимости, д. 25, к. 329/1, тел. 200-84-01

Website: www.herbion.com

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

