

蚜蟲與植物

1714208015 - 黃若綺

一、夏熱

(一) 蚜蟲 → 植物

- >大量繁殖、吸食汁液->葉片捲曲、發黃、植株矮小
- >蚜蟲分泌蜜露->植物罹患煤煙病，降低光合作用效率
- >蚜蟲攜帶植物病毒->植物病毒傳播，農作物產量降低

(二) 植物 → 蚜蟲

- >豐富的嫩葉與養分->蚜蟲數量增長快速

二、秋涼

(一) 蚜蟲 → 植物

- >危害程度下降，但仍吸食汁液->使植物更快進入衰退
- >病毒傳播持續，但因蚜蟲數量減少，影響範圍縮小

(二) 植物 → 蚜蟲

- >養分供應下降->迫使蚜蟲，尋找新寄主
- >因低溫、短日照，以及族群密度過高的影響->部分蚜蟲轉為有性生殖，開始準備產下越冬卵

三、冬冷

(一) 蚜蟲 → 植物

- >危害程度極低，因大多數成蟲與若蟲無法存活

(二) 植物 → 蚜蟲

- >一年生草本枯萎->營養來源幾乎消失
- >多年生木本植物提供棲息處與越冬卵產地，讓蚜蟲族群能延續到來年春天