

Линейная алгебра

Проекции. Ортогонализация базиса.

Глеб Карпов

МНаД ФКН ВШЭ

Ортогональные базисы.

i Определение

Система векторов $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ называется ортогональной, если любые два вектора взаимно ортогональны, то есть $(\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k) = 0$ при $j \neq k$.

Если дополнительно $\|\mathbf{v}_k\| = 1$ для всех k , то система называется ортонормированной.

Зачем это нужно?

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{v}_j$$

Взяв скалярное произведение обеих частей равенства с \mathbf{v}_1 , получаем

$$(\mathbf{x}, \mathbf{v}_1) = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_1) = \alpha_1 (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1) = \alpha_1 \|\mathbf{v}_1\|^2$$

Аналогично, беря скалярное произведение обеих частей с \mathbf{v}_k , получаем

$$(\mathbf{x}, \mathbf{v}_k) = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_k) = \alpha_k (\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_k) = \alpha_k \|\mathbf{v}_k\|^2$$

Итак

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{v}_k)}{\|\mathbf{v}_k\|^2}$$

Проекции

Ортогональная проекция на вектор.

i Определение (ортогональная проекция)

Пусть $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Обозначим единичный вектор в направлении \mathbf{x} как

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}.$$


Ортогональная проекция вектора \mathbf{y} на направление \mathbf{x} (обозначение: $\text{Pr}_{\mathbf{x}}(\mathbf{y})$) равна

$$\text{Pr}_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{u}) \mathbf{u} = \frac{(\mathbf{y}, \mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} \mathbf{x}.$$

Сопряжённый (ортогональный) остаток:

$$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \text{Pr}_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}), \quad (\mathbf{r}, \mathbf{x}) = 0.$$

Пример: ортогональная проекция



Алгоритм Грама-Шмидта

Вход: линейно независимые векторы $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$.

Классический (ортогонализирующий) шаги:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1,$$

$$\mathbf{v}_m = \mathbf{x}_m - \sum_{j=1}^{m-1} \frac{(\mathbf{x}_m, \mathbf{v}_j)}{\|\mathbf{v}_j\|^2} \mathbf{v}_j, \quad m = 2, \dots, k.$$

Получаем ортогональную систему $\{\mathbf{v}_j\}$ с теми же линейными оболочками:
 $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}.$

Нормировка (получение ортонормированного базиса):

$$\mathbf{e}_m = \frac{\mathbf{v}_m}{\|\mathbf{v}_m\|}, \quad m = 1, \dots, k.$$

Пример

Ортогонализировать набор векторов $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

Слайд для записей