Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics

Guillem Lluís i Luengo

Estudis Clínics i Epidemiològics

Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística

Nom del director/a del TF:
Susana Pérez Álvarez

Nom del de/la PRA:
Laia Subirats Maté

31 d'octubre de 2026

Universitat Oberta de Catalunya



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/`

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics
Nom de l'autor/a:	Guillem Lluís i Luengo
Nom del director/a del TF:	Susana Pérez Álvarez
Nom del de/la PRA:	Laia Subirats Maté
Data de lliurament:	31 d'octubre de 2026
Titulació o programa:	Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística
Àrea del treball final:	Estudis Clínics i Epidemiològics
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	cardiac rehabilitation, machine learning, fairness, clinical outcomes, sex and gender bias

Resum del treball

Màxim 250 paraules, amb la finalitat, context d'aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball.

Abstract

A maximum of 250 words, detailing the purpose, context of application, methodology, results and conclusions of the work.

Índex

1 Introducció **9**
1.1 Context i justificació del treball . . . 9
1.2 Descripció general . . . 10
1.3 Objectius del treball . . . 10
1.4 Enfocament i mètode seguit . . . 11
1.4.1 Estratègia de recerca . . . 11
1.4.2 Metodologia de treball . . . 11
1.5 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat . . . 12
1.6 Planificació del treball . . . 13
1.6.1 Tasques . . . 13
1.6.2 Calendari . . . 15
1.6.3 Fites . . . 16
1.6.4 Anàlisi de riscos . . . 16
1.7 Resultats esperats . . . 17
1.8 Ús responsable de la Intel · ligència Artificial . . . 17

2 Estat de l'art **18**
2.1 Rehabilitació cardíaca . . . 18
2.1.1 Antecedents . . . 18
2.1.2 Resultats clínics i variables predictores . . . 19
2.1.3 Reptes . . . 20
2.2 Consideracions sobre el sexe i el gènere . . . 20
2.3 Biaixos existents . . . 21
2.3.1 Derivació i reclutament . . . 21
2.3.2 Adherència al tractament i compleció dels programes . . . 22
2.3.3 Resultats clínics . . . 22
2.3.4 Intervencions proposades . . . 23
2.4 Equitat algorítmica . . . 23

3 Bibliografia **24**

A Annex 1 **29**
A.1 Llistat d'abreviacions . . . 29
A.1.1 Abreviatures . . . 29
A.1.2 Sigles i acrònims . . . 29

A.1.3 Símbols 30

B Annex 2 **31**
B.1 Codi 31

Índex de figures

1.1 Calendari de tasques 15

Índex de taules

1.1 Planificació de tasques 13
1.2 Fites 16
1.3 Anàlisi de riscos 16

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del treball

La rehabilitació cardíaca (RC) és una intervenció amb eficàcia demostrada per a la recuperació posterior a esdeveniments cardiovasculars. Les persones que participen en programes de RC presenten millors resultats clínics, a més d'una reducció en la taxa de readmissions hospitalàries i en la mortalitat i d'un efecte positiu en la qualitat de vida [1]. No obstant això, la participació en aquesta mena d'intervencions és considerablement baixa i existeixen diferències de gènere en tres àrees clau: l'accés als programes, l'adherència al tractament i els resultats clínics obtinguts. Les barreres que originen aquestes desigualtats poden ser individuals, socials o pròpies dels sistemes sanitaris [2].

La infrarepresentació de les dones, així com d'altres col · lectius vulnerables, pot conduir a biaixos en la recerca i, en última instància, a una disminució de l'eficàcia dels tractaments. Els mètodes d'aprenentatge automàtic (ML, per les seves sigles en anglès) poden ser útils per mitigar aquestes desigualtats, però també poden perpetuar-les si no se'n tenen en compte els potencials biaixos [3]. Per això és necessari disposar d'eines per avaluar l'equitat algorítmica (*fairness*) dels models emprats i, posteriorment, millorar-la sense comprometre la precisió de les prediccions.

La tria de l'àmbit del treball està motivada per la meva formació i experiència professional prèvia com a fisioterapeuta, amb especial interès en la rehabilitació cardiorespiratòria. Si bé els biaixos en el diagnòstic i el tractament de patologies cardiovasculars són de domini públic des de fa temps, no s'ha d'oblidar l'impacte que tenen al llarg de tot el procés d'atenció sanitària, en què intervenen altres disciplines a banda de la medicina. És important dur a terme recerca de qualitat en infermeria, fisioteràpia, psicologia o nutrició per assegurar uns resultats òptims i lliures de discriminacions.

En definitiva, aquest treball pretén estudiar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de resultats clínics de la RC, avaluar-ne l'equitat algorítmica i proposar mesures per atenuar-ne els efectes.

1.2 Descripció general

Per a la realització d'aquest treball, s'ha optat per utilitzar l'estudi *Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: a prospective study with 6-month follow-up* [4] com a font de dades. S'hi pot accedir a través dels enllaços que s'inclouen a continuació:

- **Estudi**: `https://smw.ch/index.php/smw/article/view/4160/6376`.
- **Dades**: `https://data.mendeley.com/datasets/hbztb7wmc5/1`.

El conjunt de dades conté 273 registres, majoritàriament homes (81%). Si bé aquest fet pot esdevenir una limitació per a l'auditoria de gènere, també evidencia el biaix de representació existent a la literatura científica. Les variables sobre les quals es treballarà es poden agrupar en tres àmbits:

- **Demogràfiques**: edat, sexe, diagnòstic, antecedents de tabaquisme.
- **Capacitat funcional**: prova de la marxa de 6 minuts (6MWT), capacitat d'exercici màxima a curt termini (MSEC), equivalent metabòlic de l'activitat (MET), força isomètrica màxima del quàdriceps (QIS).
- **Qüestionaris de salut**: escales d'ansietat i depressió (HADS), qualitat de vida (HeartQoL) i nivells de treball, esport i activitat física (Baecke).

1.3 Objectius del treball

A continuació es detalla la relació d'objectius principals i secundaris del treball:

1. Determinar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de la resposta a la rehabilitació cardíaca.
   - 1.1. Descriure l'estat actual de l'evidència científica en l'àmbit d'estudi.
   - 1.2. Elaborar diferents models predictius per explicar els resultats de les variables d'interès.
   - 1.3. Quantificar les diferències en les prediccions dels models proposats mitjançant mètriques d'equitat algorítmica.
2. Proposar mesures per atenuar els biaixos detectats.
   - 2.1. Exposar tècniques de preprocessament, processament i postprocessament utilitzades per corregir la disparitat de les dades.
   - 2.2. Avaluar l'adequació de les mesures als models predictius proposats.

1.4 Enfocament i mètode seguit

1.4.1 Estratègia de recerca

En una primera fase del treball, es durà a terme una cerca de literatura científica a les principals bases de dades d'investigació clínica (PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect...), així com en altres fonts especialitzades que es considerin rellevants.

Els resultats obtinguts es filtraran segons la seva adequació al tema i es classificaran en tres àmbits que permetran estructurar-ne adequadament els continguts:

- **Rehabilitació cardíaca**: estat de l'art general, càrrega de les patologies cardiovasculars en la salut global, impacte en resultats clínics, descripció de variables predictores.
- **Biaixos de sexe i gènere**: diferències en l'accés, la participació i els resultats de la rehabilitació cardíaca, interseccionalitat de les desigualtats, intervencions proposades.
- **Equitat algorítmica**: evidència sobre mètodes estadístics, limitacions i propostes de mitigació de biaixos.

1.4.2 Metodologia de treball

Un cop feta la recerca d'evidència, es procedirà a l'anàlisi de les dades disponibles mitjançant el programari `R` i adoptant, en la mesura del possible, els principis del `tidyverse`. Se seguiran els passos que s'indiquen:

- **Preprocessament de dades**: neteja, tractament de valors nuls, anàlisi descriptiva estratificada per sexe i definició de variables objectiu. Les principals variables d'interès són la capacitat funcional (mesurada habitualment amb la 6MWT) i la qualitat de vida, que es poden binaritzar en funció de si la millora és superior o no a la mínima diferència clínicament important per a cada cas.
- **Modelització estadística**: construcció de models predictius a partir del conjunt de dades. Tenint en compte les característiques de les variables objectiu, es prendrà com a model de referència la regressió logística. S'optimitzarà el model amb mètodes de regularització (Ridge, LASSO). Malgrat que el nombre de registres és limitat, es podria comparar el resultat amb una alternativa no lineal, com ara un Random Forest.
- **Avaluació i auditoria de gènere**: valoració del rendiment del model. A més de les mesures habituals, s'utilitzaran les mètriques d'equitat algorítmica que es considerin adequades d'entre les descrites a la literatura científica.
- **Discussió de resultats**: exploració de tècniques de mitigació de biaixos i elaboració de recomanacions metodològiques per a futures investigacions.

Aquest enfocament permetrà, d'una banda, disposar del context clínic adient per a la comprensió dels resultats i, de l'altra, garantir un tractament net i reproduïble de les dades.

1.5 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

L'impacte d'aquest treball es concreta principalment en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es detallen:

- **ODS 3: Salut i benestar**.

  3.4. Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.

- **ODS 5: Igualtat de gènere**.

  5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.

- **ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides**.

  16.6. Crear en tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes.

  16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

D'altra banda, el treball inclou la perspectiva de gènere en el seu mateix disseny. En aquest sentit, es pretén identificar i combatre els biaixos existents en la recerca clínica per fomentar una investigació més inclusiva i accessible per a tothom. És responsabilitat del personal sanitari i de recerca contemplar la dimensió ètica i social de la seva tasca, de manera que puguin vetllar per la reducció de les desigualtats basades en prejudicis de gènere, ètnia, edat, estatus socioeconòmic, capacitats o orientació sexual, entre d'altres. A més, cal destacar que l'optimització de sistemes de suport a la decisió clínica basats en models predictius té la capacitat de millorar els circuits existents d'atenció sanitària. D'aquesta manera, es podrà contribuir a un ús més eficient dels recursos i, en conseqüència, s'aconseguirà un impacte positiu en termes de sostenibilitat a mitjà i llarg termini.

Per acabar, es farà ús de les formes inclusives del llenguatge que s'escaiguin en cada context. De manera puntual i honorífica, es pot emprar el femení com a genèric per referir-se a les persones professionals de la salut, de qualsevol gènere, donat l'elevat percentatge de dones que exerceixen aquestes professions.

1.6 Planificació del treball

1.6.1 Tasques

A la **??** es descriuen les tasques que caldrà desenvolupar durant el treball, que s'han detallat a l'apartat [**Enfocament i mètode seguit**]. S'indica també la relació amb els objectius proposats.

Taula 1.1: Planificació de tasques

Tasca	Objectius	Inici	Final	Estat
1. Definició i pla de treball				
Plantejament del treball		23/9/26	7/10/26	Completada
2. Estat de l'art				
Cerca preliminar d'evidència	1.1, 2.1	23/9/26	7/10/26	Completada
Revisió de l'evidència trobada	1.1, 2.1	1/10/26	28/10/26	Completada
3. Implementació				
Preprocessament de dades	1.2	29/10/26	11/11/26	En curs
Modelització estadística	1.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Avaluació i auditoria de gènere	1.2, 1.3, 2.2	12/11/26	25/11/26	Pendent
Discussió de resultats	1.3, 2.2	26/11/26	2/12/26	Pendent
4. Lliurament final				
Introducció		23/9/26	14/10/26	Completada
Estat de l'art	1.1, 2.1	15/10/26	4/11/26	Completada
Materials i mètodes	1.2	5/11/26	25/11/26	Pendent
Resultats	1.3, 2.2	26/11/26	16/12/26	Pendent
Discussió	1.1, 1.3, 2.2	17/12/26	31/12/26	Pendent
Conclusions		1/1/27	7/1/27	Pendent

Tasca	Objectius	Inici	Final	Estat
Glossari i Annexos		23/9/26	7/1/27	En curs
Article		15/10/26	7/1/27	En curs
5. Presentació				
Elaboració de diapositives		8/1/27	13/1/27	Pendent
Enregistrament		8/1/27	13/1/27	Pendent

1.6.2 Calendari

La Figura 1.1 mostra el diagrama de Gantt corresponent a les tasques descrites.




Figura 1.1: Calendari de tasques

1.6.3 Fites

A la **??** s'indiquen les fites corresponents a cada prova d'avaluació continuada (PAC).

Taula 1.2: Fites

Fita	Termini	Estat
Entrega: PAC 1	7/10/26	Completada
Final de la recerca bibliogràfica	28/10/26	Completada
Entrega: PAC 2	4/11/26	Completada
Final de la implementació	25/11/26	En curs
Entrega: PAC 3	2/12/26	Pendent
Cos del treball redactat	31/12/26	En curs
Entrega: PAC 4 i article	7/1/27	Pendent
Entrega: PAC 5	13/1/27	Pendent

1.6.4 Anàlisi de riscos

La **??** descriu els riscos que poden fer que la planificació no es compleixi i les accions previstes per al pla de contingència.

Taula 1.3: Anàlisi de riscos

Risc	Impacte	Probabilitat	Mitigació
Abundància de registres incomplets en les dades	Alt	Alta	Imputació de valors faltants o eliminació dels registres afectats o de variables que no es considerin crítiques, segons el cas
Biaixos inherents a la composició del conjunt de dades	Alt	Alta	Comparació dels resultats amb l'evidència disponible i aplicació de tècniques de ponderació o remostreig
Desviacions del pla de treball marcat	Mitjà	Mitjana	Establiment de fites parcials per a les PAC, de manera que l'última setmana de cadascuna es pugui reservar per a la revisió o com a marge per acabar de completar les tasques pendents

Risc	Impacte	Probabilitat	Mitigació
Problemes de reproductibilitat	Mitjà	Baixa	Documentació rigorosa del codi i creació d'un repositori de GitHub que contingui tots els documents rellevants

1.7 Resultats esperats

Al final del projecte s'obtindran els productes següents:

- Una **memòria** del treball, que contindrà la planificació, l'estat de l'art i els resultats obtinguts en el seu desenvolupament.
- **Informes** de progrés per a cadascuna de les entregues de l'avaluació continuada.
- Una síntesi de les troballes més rellevants en format d'**article** científic.
- Una **presentació** en format virtual i les corresponents diapositives de suport.

1.8 Ús responsable de la Intel · ligència Artificial

L'ús de la Intel · ligència Artificial (IA) generativa en aquest treball estarà limitat segons el que estableixen els criteris d'integritat acadèmica de la UOC. Se'n preveu l'ús en algunes tasques menors, com ara per complementar la recerca d'evidència científica, depurar codi o gestionar errors en l'exportació del document PDF final, sempre sota supervisió de l'autor.

Es declara que en cap cas s'empraran eines d'IA per a la redacció de contingut o la interpretació de resultats, ni per a cap altra tasca que pugui entrar en conflicte amb les limitacions d'un ús ètic, crític i responsable.

Capítol 2

Estat de l'art

2.1 Rehabilitació cardíaca

2.1.1 Antecedents

Les cardiopaties isquèmiques han estat la primera causa de mortalitat estandarditzada per edat a tot el món des de l'any 1990 (amb l'única excepció del 2021, en què la primera posició va ser ocupada per la COVID-19) [5]. A més, l'any 2023 van esdevenir la primera causa de mortalitat prematura i salut precària a escala mundial [6]. Malgrat els avenços en el diagnòstic i el tractament d'aquesta mena de patologies, és necessari garantir que aquestes millores arriben a totes les poblacions de manera equitativa i lliure de discriminacions.

La rehabilitació cardíaca (RC) és l'etiqueta sota la qual s'engloben un conjunt de programes de característiques similars que les guies de pràctica clínica recomanen per a la recuperació d'esdeveniments cardiovasculars (p. ex. insuficiència cardíaca, infart agut de miocardi [IAM], malalties cardíaques congènites o diferents intervencions quirúrgiques amb afectació de l'aparell cardiorespiratori). Els seus objectius principals són reduir l'estrès fisiològic i psicològic produït per aquestes patologies, reduir la mortalitat, prevenir hospitalitzacions recurrents i millorar la funció cardiovascular i la qualitat de vida (QdV) de les persones ateses [1].

Els programes de RC tradicionals es fonamenten en l'exercici terapèutic, però la pràctica basada en evidència hi ha anat incorporant altres components, convertint-la en una intervenció interdisciplinària que demana la col · laboració de professionals de disciplines tan diverses com la infermeria, la fisioteràpia, la medicina, la nutrició o la psicologia [7]. El seu contingut varia en funció de l'evolució de l'episodi: sol incloure teràpia de mobilització precoç i educació sanitària en la fase hospitalària, exercici supervisat, prevenció de factors de risc i suport psicosocial en fase ambulatòria i activitat física regular i intervencions d'autocontrol de la patologia en fase domiciliària [1].

Es tracta d'una intervenció segura, amb un risc baix de complicacions i amb nombrosos beneficis demostrats. En persones que conviuen amb malalties coronàries, la RC redueix el risc de patir un IAM (risc relatiu [RR] 0,72 [0,55–0,93], qualitat d'evidència alta) i el nombre d'hospitalitzacions (RR 0,58 [0,43–0,77], qualitat d'evidència moderada), a la vegada que permet aconseguir millores en la mortalitat per causes cardiovasculars, la QdV i la cost-efectivitat dels tractaments [8]. Resultats semblants s'obtenen en casos d'insuficiència cardíaca. En una patologia que suposa una elevada càrrega per a les persones que la pateixen, una disminu-

ció de la tolerància a l'exercici, un major risc de mortalitat i readmissions hospitalàries i, en conseqüència, un cost més elevat per als sistemes sanitaris, la RC permet reduir el nombre d'ingressos (RR 0,69 [0,56–0,86], qualitat d'evidència moderada) i millorar la QdV relacionada amb la salut [9].

En altres condicions de salut, com les cirurgies valvulars o la fibril · lació auricular, encara manca evidència de qualitat per avaluar l'impacte real de la RC basada en exercici [10,11]. Tanmateix, la RC podria reduir el risc de recurrència de la fibril · lació auricular (RR 0,70 [0,56–0,88], qualitat d'evidència moderada) i millorar-ne la QdV [11]. Un altre aspecte que cal considerar és l'afectació que tenen les malalties cardiovasculars en salut mental, que precisament està considerada com un dels factors de risc que les pot desencadenar [12]. En persones que havien patit un IAM, la RC va tenir efectes positius en els nivells d'ansietat i depressió. A més, l'inici precoç del tractament va suposar un augment de la QdV i una reducció de la mortalitat i la morbiditat [13].

Per entendre millor els efectes de la RC sobre diferents patologies cardiovasculars, cal analitzar-ne els principals resultats clínics i les variables que s'acostumen a emprar per a la seva predicció.

2.1.2 Resultats clínics i variables predictores

En general, els resultats clínics de la RC es poden agrupar en dos àmbits: la capacitat funcional i la qualitat de vida. En la primera sol ser rellevant conèixer la capacitat aeròbica, mitjançant una ergometria o una prova funcional com la 6MWT, i la força màxima dels principals grups musculars que intervenen a la marxa. Pel que fa a la segona, és habitual l'ús de mesures de resultat informades pel pacient (PROMs, per les seves sigles en anglès), que inclouen els nivells d'ansietat, depressió, activitat física o QdV relacionada amb la salut. És important disposar d'aquestes mesures perquè estan associades amb la taxa de mortalitat, la recurrència d'hospitalitzacions, la rendibilitat dels tractaments i l'impacte en les activitats de la vida diària (AVD) [4].

En general, la RC és una intervenció eficaç per incrementar la tolerància a l'exercici i el benestar de les persones que hi participen [7]. No obstant això, els resultats poden diferir en funció de les característiques pròpies de cada pacient. Alguns factors que influeixen en la millora final són l'edat, l'estat físic inicial, l'índex de massa corporal (IMC), la presència de comorbiditats o paràmetres hemodinàmics, com l'hemoglobina, la pressió arterial o la fracció d'ejecció ventricular esquerra (FEVE) [14–18]. La identificació de variables predictores és necessària per poder adaptar millor els programes i optimitzar els beneficis per a totes les persones que hi participen [19].

S'ha omès deliberadament d'aquesta llista el sexe, sobre el qual es tractarà en els apartats següents. Tot i que alguns estudis apunten que les persones de sexe masculí podrien aconseguir millors resultats en la 6MWT [20,21], d'altres obtenen resultats contraris [22]. Per acabar, cal destacar la relació de reciprocitat que existeix entre la capacitat funcional i la QdV: mentre que l'ansietat i la depressió tenen un impacte negatiu en l'activitat física [23], un augment d'aquesta darrera pot contribuir a obtenir nivells més elevats de benestar [24].

2.1.3 Reptes

A mesura que l'evidència científica sobre RC creix en nombre i en qualitat, també es van detectant reptes importants que cal abordar per tal d'optimitzar-ne els resultats clínics. D'una banda, la participació als programes és relativament baixa: només s'hi inscriuen prop d'un 25% de pacients elegibles [1]. Aquest fet pot ser degut a l'existència de barreres tant clíniques com personals o dels sistemes sanitaris. Determinats col · lectius, com les dones, les persones d'edat avançada, racialitzades o de minories ètniques o socials, tenen menor probabilitat de participació. L'envelliment poblacional, a més, comporta un increment de les comorbiditats (p. ex. hipertensió arterial [HTA], diabetis, fibril · lació auricular), que també suposen un obstacle important per a la inclusió en programes de RC [7].

L'adherència terapèutica és un component imprescindible de qualsevol tractament i, en el cas de la RC, les taxes d'abandonament són considerablement elevades. La persistència en l'exercici terapèutic pot caure fins a prop del 50% al cap de 6 mesos o fins al 10% al cap d'un any [25]. Aquest fet és preocupant, perquè el compliment terapèutic és un dels principals predictors de la millora de resultats clínics i del seu manteniment a mitjà i llarg termini. Es tracta d'un problema complex en què influeixen factors demogràfics, clínics i psicosocials [26,27].

És necessari, per tant, millorar l'accés i la participació als programes de RC. Amb aquesta finalitat, han pres força alternatives de rehabilitació domiciliària i, fins i tot, virtual, així com programes adaptats a diferents col · lectius. No obstant això, als estudis disponibles encara s'hi troben infrarepresentades les dones, les persones d'edat avançada o de països de renda baixa i mitjana [9]. Si bé s'està avançant en la generalitzabilitat de l'evidència, encara queda un llarg camí per recórrer, com s'argumentarà en els propers apartats.

2.2 Consideracions sobre el sexe i el gènere

La inclusió del sexe i el gènere en recerca és complexa i, a falta d'un estàndard clar, sovint existeix confusió entre els dos termes [28]. El sexe és una característica biològica, determinada pel cariotip, els gàmetes, els òrgans reproductius o la funció hormonal. El gènere, en canvi, es refereix als components socials que s'atribueixen a un sexe determinat: els rols, comportaments i expectatives associats a una població, lloc i temps històric, però també la identitat percebuda, la performativitat o l'estigma cap a certes expressions considerades fora de la normativitat [29,30].

La importància del sexe i el gènere rau en la seva multidimensionalitat i en l'associació amb altres variables que poden ser d'interès segons el context, com ara l'expressió gènica o el pes corporal. Més encara, el sexe i el gènere poden actuar com a mesures indirectes (*proxy*), de manera que cal entendre les relacions causals subjacents que s'estableixen entre variables [30].

Existeixen diferents problemes pel que fa a l'ús del sexe i el gènere en recerca clínica. Majoritàriament, els estudis inclouen només el sexe; és el cas del que s'utilitza en aquest treball com a font de dades. S'ha considerat que, tot i aquesta limitació, les dades disponibles seran suficients per il · lustrar les desigualtats entre sexes sense dilatar l'abast del treball més enllà d'uns límits raonables. Tanmateix, cal tenir en compte que el gènere també pot ser un factor de risc per a nombroses malalties i pot influir en l'adherència i l'eficàcia dels tractaments [29].

De fet, els factors socials poden tenir efectes sobre els processos biològics: per exemple, en rehabilitació, els hàbits d'exercici afecten notablement la capacitat funcional. Ara bé, com

examinen Hélène Colineaux et al. [31], la mesura del gènere és complexa: encara que habitualment es binaritza per la influència de la concepció normativa del sexe, es tracta d'un fenomen continu que depèn del context i que pot fluctuar en el temps. També la mesura dels efectes del sexe i el gènere és difícil; en aquest sentit, les autores proposen un marc per entendre els diferents mecanismes causals que hi intervenen:

Efecte total del sexe. És la diferència en la variable resposta entre haver nascut mascle o femella sense tenir en compte altres mecanismes. És la mesura que es fa servir més habitualment i que s'utilitzarà també en aquest treball.

Efecte indirecte del sexe mediat socialment. Es tracta de l'efecte del sexe que està mediat per mecanismes socials de gènere (i. e. la diferència en la resposta entre gèneres si el sexe es manté constant).

Efecte directe o residual del sexe. És l'efecte del sexe biològic que no es veu afectat per components de gènere (i. e. la diferència en la resposta entre sexes si el gènere es manté constant).

Efecte del gènere controlat per sexe. Correspon a l'efecte total del gènere sense tenir en compte el sexe de naixement, que en aquest cas és un factor de confusió.

La manca d'anàlisi de les diferències de sexe i gènere o la infrarepresentació de les dones en recerca tenen efectes negatius en la qualitat dels resultats obtinguts i, per extensió, en la salut de totes les persones (no només les dones) [32]. Malgrat que existeixen guies per incloure el sexe i el gènere en recerca, els plans inicials no sempre es reflecteixen en la transferència del coneixement. A més, és important considerar la interseccionalitat amb altres desigualtats, com les que sorgeixen de l'edat, l'ètnia o la classe socioeconòmica, entre d'altres. En aquest treball s'intentarà donar resposta a alguns d'aquests aspectes.

2.3 Biaixos existents

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat a escala global: això és cert també per a les dones [33]. La RC compta amb la recomanació de classe 1A de l'American Heart Association i l'American College of Cardiology [34] pels beneficis que aporta en la millora de factors de risc, la reducció d'hospitalitzacions i mortalitat i l'augment de QdV. Específicament en el cas de les dones, la RC pot contribuir a una major reducció del risc de mortalitat, millores superiors en capacitat d'exercici i salut mental i una disminució dels nivells d'HTA [2].

No obstant això, les dones pateixen restriccions en l'accés i la participació als programes de rehabilitació i, en conseqüència, els seus resultats clínics es veuen alterats. A continuació es detallen les principals barreres existents i les intervencions que s'han proposat per superar-les.

2.3.1 Derivació i reclutament

La participació global als programes de RC ja és baixa, però encara ho és més entre les dones. La primera barrera d'accés es troba en el moment de la derivació per part del personal mèdic: malgrat que els beneficis d'aquesta mena d'intervencions no difereixen entre sexes, les dones tenen prop d'un 32% menys de probabilitat de ser derivades a rehabilitació en comparació a

homes amb criteris d'elegibilitat similars [33]. Aquest fet s'explica per diferents motius, que es poden agrupar en tres àmbits clau:

Factors individuals. Es refereixen a aspectes com la falta de coneixement sobre la RC, el nivell educatiu o barreres culturals i lingüístiques que dificulten l'accés a determinats col · lectius. Per exemple, encara que les dones afroamericanes tenen una major incidència de malalties cardiovasculars, les taxes de derivació en aquest grup poblacional són menors [35].

Factors socials. És l'àrea en què més influència tenen els rols i les expectatives de gènere. Les dones solen càrregar un pes molt superior en les tasques de cures, especialment en l'àmbit domèstic i familiar. Aquest fet, juntament amb la manca de suport psicosocial, està associat a nivells més elevats d'estrès, ansietat i depressió [33]. També poden comprometre l'accés a la RC els desavantatges socioeconòmics, els conflictes laborals o les dificultats en el transport fins als centres de rehabilitació.

Factors sanitaris. Els serveis de salut també tenen part de responsabilitat en les diferències en la derivació i el reclutament. Per començar, la fallada en la detecció de símptomes provoca retards importants en el diagnòstic i el tractament de patologies cardiovasculars en dones, provocant fins i tot una mortalitat superior. A més, els biaixos del personal mèdic poden comportar l'exclusió de dones d'edat més avançada o amb més comorbiditats, però precisament aquestes característiques fan que la RC sigui encara més necessària i beneficiosa [34]. Per acabar, existeix una sèrie de malalties que afecten principalment les dones, com ara la dissecció espontània de les artèries coronàries, l'infart de miocardi sense obstrucció de les artèries coronàries o les cardiomiopaties per estrès (p. ex. síndrome de Takotsubo). Tot i que la necessitat de rehabilitació en aquestes condicions és la mateixa, la derivació és molt menor [35].

Evidentment, la falta de recerca repercuteix enormement en el problema. Si bé el percentatge de dones amb malalties cariovasculars va augmentar de l'11% al 17% en la dècada del 2010, la seva representació en estudis clínics continua per sota del 15% [8]. No hi ha raons de seguretat ni eficàcia per justificar aquest valor [33]. Per tal de poder prendre decisions més informades, és necessari disposar d'evidència sòlida sobre l'efecte de diversos factors biològics (p. ex. nivells hormonals, distibució de teixit adipós i massa muscular, embaràs, lactància) en la resposta al desacondicionament físic.

2.3.2 Adherència al tractament i compleció dels programes

L'accés a la RC no hi garanteix la participació, i la participació no n'assegura la finalització. L'adherència al tractament presenta problemes semblants als que s'han descrit en el cas de la derivació i el reclutament, tant a escala individual com social i sanitària. Les taxes més elevades de depressió i distrès psicosocial, una menor QdV relacionada amb la salut, la falta de suport o la inflexibilitat de les activitats i els horaris proposats contribueixen que les dones participin menys en els programes i els abandonin amb més freqüència que els homes [2].

2.3.3 Resultats clínics

En circumstàncies semblants, les millores aconseguides gràcies a la RC en capacitat funcional, perfil de risc cardiovascular i benestar psicosocial són comparables entre homes i dones (en aquest darrer àmbit, les dones assolirien una reducció més important dels nivells de depressió)

[36]. Ara bé, les dones habitualment parteixen d'un estat basal amb nivells menors d'activitat física, edat més avançada, més factors de risc cardiovasculars i comorbiditats i menor QdV. Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar els resultats clínics de la RC i l'assoliment d'objectius de salut, que es poden veure afectats per la manca d'adaptació dels programes a les necessitats específiques d'alguns col · lectius [34]. Fins i tot la mesura emprada pot canviar la interpretació: les dones millorarien menys que els homes en consum màxim d'oxigen (VO_2 $màx$), però no en MET [37].

De nou, l'ús d'evidència basada principalment en dades d'homes impedeix la generalització dels resultats. Si s'extrapolen aquestes dades per prendre decisions sobre la pràctica clínica en dones, les recomanacions esdevenen inevitablement pitjors [36].

2.3.4 Intervencions proposades

S'han proposat diverses solucions per a cadascun dels problemes identificats en els apartats anteriors. L'automatització de les derivacions a partir de criteris definits, el foment de l'atenció interdisciplinària en fase hospitalària, la flexibilització de les intervencions i la millora en l'educació sanitària podrien afavorir l'accés de persones que hi tenien dificultats [33].

L'adherència al tractament podria incrementar amb programes de RC domiciliària, amb l'ús d'eines de salut digital o amb activitats alternatives a l'exercici aeròbic tradicional (p. ex. ioga), sense que això suposi una disminució de l'eficàcia. Tanmateix, falta evidència de qualitat que confirmi aquestes hipòtesis [38].

Pel que fa als resultats clínics, no sembla que la solució passi per proposar intervencions no-mixtes [39], sinó més aviat per personalitzar més els tractaments. L'entrenament intervàl · lic d'alta intensitat (HIIT, per les seves sigles en anglès) podria ser més efectiu que l'entrenament continu per a les dones [38]. La rehabilitació intensiva, que combina exercici terapèutic amb intervencions de gestió de l'estrès, nutrició i teràpia en grup pot contribuir a una millora més important de la QdV amb nivells d'adherència semblants [40]. Addicionalment, el suport psicosocial personalitzat sembla clau per assegurar un millor benestar en qualsevol grup de pacients [41].

Les dones no són un col · lectiu homogeni i, com a tal, poden estar presents en altres eixos de desigualtat [42]. Cal avançar en la sensibilització cultural i de gènere de la població i de les professionals de la salut per tal de garantir una atenció sanitària optimitzada i una recerca més inclusiva. Les mètriques d'equitat prenen força en un context en què és més necessària que mai l'automatització de decisions clíniques per rebaixar la pressió sobre els sistemes sanitaris.

2.4 Equitat algorítmica

Text

Capítol 3

Bibliografia

1. Tessler J, Ahmed I, Bordoni B. Cardiac rehabilitation. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.

2. Coutinho T, Khadanga S, Adedinsewo D, Barac A, Brown TM, Deaton C, et al. Cardiac rehabilitation in women: A scientific statement from the american heart association. Circulation. 2025;152:e376e390. doi:10.1161/cir.0000000000001379

3. Caton S, Haas C. Fairness in machine learning: A survey. ACM Computing Surveys. 2024;56:138. doi:10.1145/3616865

4. Vieli C, Duong HP, Duc M, Carré JL, Bast JD, Girod G, et al. Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: A prospective study with 6-month follow-up. Swiss Medical Weekly. 2025;155:4160. doi:10.57187/s.4160

5. Collaborators G2023C of D, Naghavi M, Kyu HH, A B, Aalipour MA, Aalruz H, et al. Global burden of 292 causes of death in 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1990–2023: A systematic analysis for the global burden of disease study 2023. The Lancet. 2025;406:18111872. doi:10.1016/s0140-6736(25)01917-8

6. Collaborators, GBD 2023 Disease and Injury and Risk Factor, Hay SI, Ong KL, Santomauro DF, A B, Aalipour MA, et al. Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, including 660 subnational locations, 1990–2023: A systematic analysis for the global burden of disease study 2023. The Lancet. 2025;406:18731922. doi:10.1016/s0140-6736(25)01637-x

7. Taylor RS, Dalal HM, McDonagh STJ. The role of cardiac rehabilitation in improving cardiovascular outcomes. Nature Reviews Cardiology. 2022;19:180194. doi:10.1038/s41569-021-00611-7

8. Dibben GO, Faulkner J, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Zwisler AD, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: A meta-analysis. European Heart Journal. 2023;44:452469. doi:10.1093/eurheartj/ehac747

9. Molloy C, Long L, Mordi IR, Bridges C, Sagar VA, Davies EJ, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024;2024:CD003331. doi:10.1002/14651858.cd003331.pub6

10. Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, Tang LH, Risom SS, Lindschou J, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021;2021:CD010876. doi:10.1002/14651858.cd010876.pub3

11. Buckley BJ, Long L, Risom SS, Lane DA, Berg SK, Gluud C, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024;2024:CD011197. doi:10.1002/14651858.cd011197.pub3

12. Wrzeciono A, Mazurek J, Cieślik B, Kiper P, Gajda R, Szczepańska-Gieracha J. Psychologically-enhanced cardiac rehabilitation for psychological and functional improvement in patients with cardiovascular disease: A systematic review with meta-analysis and future research directions. Physiotherapy. 2024;125:101412. doi:10.1016/j.physio.2024.07.003

13. Zheng X, Zheng Y, Ma J, Zhang M, Zhang Y, Liu X, et al. Effect of exercise-based cardiac rehabilitation on anxiety and depression in patients with myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. Heart & Lung. 2019;48:17. doi:10.1016/j.hrtlng.2018.09.011

14. Suzuki Y, Ito K, Yamamoto K, Fukui N, Yanagi H, Kitagaki K, et al. Predictors of improvements in exercise capacity during cardiac rehabilitation in the recovery phase after coronary artery bypass graft surgery versus acute myocardial infarction. Heart and Vessels. 2018;33:358366. doi:10.1007/s00380-017-1076-2

15. Baldasseroni S, Silverii MV, Pratesi A, Burgisser C, Orso F, Lucarelli G, et al. Cardiac rehabilitation in advanced aGE after PCI for acute coronary syndromes: Predictors of exercise capacity improvement in the CR-AGE ACS study. Aging Clinical and Experimental Research. 2022;34:21952203. doi:10.1007/s40520-022-02130-y

16. Tokeshi T, Date A, Miura H, Kumasaka L, Arakawa T, Nakao K, et al. Predictors of improvement in exercise capacity after cardiac rehabilitation differ between octogenarian and young-old patients with acute myocardial infarction. Circulation Journal. 2023;87:815823. doi:10.1253/circj.cj-22-0606

17. Uszko-Lencer NHMK, Mesquita R, Janssen E, Werter C, Rocca HPBL, Pitta F, et al. Reliability, construct validity and determinants of 6-minute walk test performance in patients with chronic heart failure. International Journal of Cardiology. 2017;240:285290. doi:10.1016/j.ijcard.2017.02.109

18. Kurpaska M, Krzesiński P, Banak M, Piotrowicz K. Predictors of impaired exercise performance in patients qualified for cardiac rehabilitation: The impact of sex and comorbidities. Journal of Clinical Medicine. 2025;14:7512. doi:10.3390/jcm14217512

19. Smith JR, Medina-Inojosa JR, Suarez ASC, Taylor JL, Fischer KM, Bonikowske AR, et al. Sex differences in exercise capacity and outcomes following outpatient cardiac rehabilitation. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease. 2026;15:e044403. doi:10.1161/jaha.125.044403

20. Bargehr J, Thomas CS, Oken KR, Thomas RJ, Lopez-Jimenez F, Trejo-Gutierrez JF. Predictors of suboptimal gain in exercise capacity after cardiac rehabilitation. The American Journal of Cardiology. 2017;119:687691. doi:10.1016/j.amjcard.2016.08.005

21. Sutherland N, Harrison A, Doherty P. Factors influencing change in walking ability in patients with heart failure undergoing exercise-based cardiac rehabilitation. International Journal of Cardiology. 2018;268:162165. doi:10.1016/j.ijcard.2018.05.021

22. Artiles RF, Euler S, Auschra B, Silva HB da, Niederseer D, Schmied C, et al. Predictors of gain in exercise capacity through cardiac rehabilitation: Sex and age matter. Heart & Lung. 2023;62:200206. doi:10.1016/j.hrtlng.2023.08.003

23. Sakamoto M, Suematsu Y, Yano Y, Kaino K, Teshima R, Matsuda T, et al. Depression and anxiety are associated with physical performance in patients undergoing cardiac rehabilitation: A retrospective observational study. Journal of Cardiovascular Development and Disease. 2022;9:21. doi:10.3390/jcdd9010021

24. Kjesbu IE, Sibilitz KL, Petersen J, Houben VJG, Wilhelm M, Pena-Gil C, et al. Health-related quality of life in elderly cardiac patients undergoing cardiac rehabilitation and the association with exercise capacity: The EU-CaRE study. European Journal of Preventive Cardiology. 2024;31:19501957. doi:10.1093/eurjpc/zwae195

25. Young L, Zhang Q, Lian E, Roberts K, Weintraub N, Dong Y, et al. Factors predicting the utilization of center-based cardiac rehabilitation program. Geriatrics. 2020;5:66. doi:10.3390/geriatrics5040066

26. Malak MM, Hushcha P, Jafri SH, Bousquet G, Cabral L, Lutfy C, et al. PREDICTORS OF CARDIAC REHABILITATION COMPLETION. Journal of the American College of Cardiology. 2021;77:1585. doi:10.1016/s0735-1097(21)02942-9

27. Yuan L, Xu L, Zhang C, Yang Z. The heterogeneous trajectory of adherence to home-based cardiac rehabilitation exercises in patients with coronary heart disease: A cohort study. Journal of Advanced Nursing. 2026;82:72907299. doi:10.1111/jan.70369

28. Regensteiner JG, Libby AM, Huxley R, Clayton JA. Integrating sex and gender considerations in research: Educating the scientific workforce. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2019;7:248250. doi:10.1016/s2213-8587(19)30038-5

29. Bewley S, McCartney M, Meads C, Rogers A. Sex, gender, and medical data. BMJ. 2021;372:n735. doi:10.1136/bmj.n735

30. Bauer GR. Sex and gender multidimensionality in epidemiologic research. American Journal of Epidemiology. 2022;192:122132. doi:10.1093/aje/kwac173

31. Colineaux H, Soulier A, Lepage B, Kelly-Irving M. Considering sex and gender in epidemiology: A challenge beyond terminology. From conceptual analysis to methodological strategies. Biology of Sex Differences. 2022;13:23. doi:10.1186/s13293-022-00430-6

32. Colantonio A. Sex and gender reporting in rehabilitation research: A commentary. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2023;104:13561358. doi:10.1016/j.apmr.2023.03.034

33. Alexander S, Li S, Tracy M. Cardiac rehabilitation - the answer for the second chance. American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice. 2022;13:100108. doi:10.1016/j.ahjo.2022.100108

34. Khadanga S, Gaalema DE, Savage P, Ades PA. Underutilization of cardiac rehabilitation in women. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2021;41:207213. doi:10.1097/hcr.0000000000000629

35. Sawan MA, Calhoun AE, Fatade YA, Wenger NK. Cardiac rehabilitation in women, challenges and opportunities. Progress in Cardiovascular Diseases. 2022;70:111118. doi:10.1016/j.pcad.2022.01.007

36. HOEVE NT, BAKKER MD, SUNAMURA M, LENNEP JERV, BOERSMA E, BERG-EMONS RJGVD. WOMEN AND MEN PROFIT EQUALLY FROM CARDIAC REHABILITATION: A SECONDARY ANALYSIS OF THE OPTICARE RCT. Journal of Rehabilitation Medicine. 2026;58:44504. doi:10.2340/jrm.v58.44504

37. Rengo JL, Khadanga S, Savage PD, Ades PA. Response to exercise training during cardiac rehabilitation differs by sex. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2020;40:319324. doi:10.1097/hcr.0000000000000536

38. McFeely AE, Bittner VA. Sex and gender-based differences in outcomes of cardiac rehabilitation following acute myocardial infarction. Current Atherosclerosis Reports. 2025;27:109. doi:10.1007/s11883-025-01360-5

39. Heald FA, Marzolini S, Colella TJF, Oh P, Nijhawan R, Grace SL. Women's outcomes following mixed-sex, women-only, and home-based cardiac rehabilitation participation and comparison by sex. BMC Women's Health. 2021;21:413. doi:10.1186/s12905-021-01553-5

40. Jafri SHH, Ngamdu KS, Price D, Baloch ZQ, Cohn J, Wilcox M, et al. Intensive cardiac rehabilitation attenuates the gender gap in cardiac rehabilitation participation. Current Problems in Cardiology. 2023;48:101668. doi:10.1016/j.cpcardiol.2023.101668

41. Chung S, Candelaria D, Gallagher R. Women's health-related quality of life substantially improves with tailored cardiac rehabilitation. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2022;42:217226. doi:10.1097/hcr.0000000000000692

42. Angelino E. 41Bridging the gender gap in cardiac rehabilitation. The first step: The equal opportunities project. International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention. 2024;21:200268. doi:10.1016/j.ijcrp.2024.200268

Apèndix A

Annex 1

A.1 Llistat d'abreviacions

A.1.1 Abreviatures

- et al.: i altres (*et alii*).
- i. e.: és a dir (*id est*).
- p. ex.: per exemple.

A.1.2 Sigles i acrònims

- **AVD**: activitats de la vida diària.
- **FEVE**: fracció d'ejecció ventricular esquerra.
- **HADS**: Escala Hospitalària d'Ansietat i Depressió (de l'anglès *Hospital Anxiety & Depression Scale*).
- **HIIT**: entrenament interval · lic d'alta intensitat (de l'anglès *high-intensity interval training*).
- **HTA**: hipertensió arterial.
- **IA**: intel · ligència artificial.
- **IAM**: infart agut de miocardi.
- **IMC**: índex de massa corporal.
- **LASSO**: operador de selecció i contracció mínima absoluta (de l'anglès *least absolute shrinkage and selection operator*).
- **MET**: equivalent metabòlic de l'activitat (de l'anglès *metabolic equivalent of task*).
- **ML**: aprenentatge automàtic (de l'anglès *machine learning*).
- **MSEC**: capacitat d'exercici màxima a curt termini (de l'anglès *maximal short-time exercise capacity*).
- **ODS**: objectius de desenvolupament sostenible.
- **PROMs**: mesures de resultat informades pel pacient (de l'anglès *Patient-Reported Outcome Measures*).
- **QdV**: qualitat de vida.
- **QIS**: força isomètrica màxima del quàdriceps (de l'anglès *quadriceps maximal isometric strength*).

- **RC**: rehabilitació cardíaca.
- **RR**: risc relatiu.
- **6MWT**: prova de la marxa de 6 minuts (de l'anglès *Six-Minute Walk Test*).

A.1.3 Símbols

- VO_2 $màx$: consum màxim d'oxigen.

Apèndix B

Annex 2

B.1 Codi

```
library(knitr)

opts_chunk$set(echo = FALSE,
               warning = FALSE,
               message = FALSE,
               comment = "",
               cache = TRUE,
               tidy = FALSE,
               prompt = FALSE,
               tidy.opts = list(width.cutoff = 72))

options(width = 75)

Sys.setlocale("LC_TIME", "C")

# ---- PAQUETS I LLIBRERIES ----

#' Instal·lació de paquets
#'
#' @description
#' Comrpova si els paquets d'una llista estan instal·lats al sistema.
#' Si algun no ho està, l'instal·la automàticament.
#'
#' @param pkg Vector de caràcters amb els noms dels paquets.
#'
#' @returns No retorna cap valor.
#'
#' @importFrom utils install.packages
#' @export
```

```
#'
#' @examples
#' \dontrun{
#' # Exemple d'ús amb dades hipotètiques
#' install_if_not(packages)
#' }
install_if_not <- function(pkg) {
  for (p in pkg) {
    if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE)) {
      install.packages(p, dependencies = TRUE)
    }
  }
}

# Llista de paquets i instal·lació
paquets <- c("tidyverse")

install_if_not(paquets)

rm(paquets)

# Llibreries carregades
library(tidyverse)


# ---- 1.6 PLANIFICACIÓ DEL TREBALL ----

# Data frame de tasques
df_gantt <- data.frame(
  Fase = factor(rep(c(
    "1. Definició i pla de treball",
    "2. Estat de l'art",
    "3. Implementació",
    "4. Lliurament final",
    "5. Presentació"
  ), times = c(1, 2, 4, 8, 2))),
  Tasca = c(
    "Plantejament del treball",
    "Cerca preliminar d'evidència",
    "Revisió de l'evidència trobada",
    "Preprocessament de dades",
    "Modelització estadística",
    "Avaluació i auditoria de gènere",
    "Discussió de resultats",
```

```
    "Introducció",
    "Estat de l'art",
    "Materials i mètodes",
    "Resultats",
    "Discussió",
    "Conclusions",
    "Glossari i Annexos",
    "Article",
    "Elaboració de diapositives",
    "Enregistrament"
  ),
  Objectius = c(
    "", "1.1, 2.1", "1.1, 2.1", "1.2",
    "1.2", "1.2, 1.3, 2.2", "1.3, 2.2", "",
    "1.1, 2.1", "1.2", "1.3, 2.2", "1.1, 1.3, 2.2",
    "", "", "", "", ""
  ),
  Inici = as.Date(c(
    "2026-09-23", "2026-09-23", "2026-10-01", "2026-10-29",
    "2026-11-12", "2026-11-12", "2026-11-26", "2026-09-23",
    "2026-10-15", "2026-11-05", "2026-11-26", "2026-12-17",
    "2027-01-01", "2026-09-23", "2026-10-15", "2027-01-08",
    "2027-01-08"
  )),
  Final = as.Date(c(
    "2026-10-07", "2026-10-07", "2026-10-28", "2026-11-11",
    "2026-11-25", "2026-11-25", "2026-12-02", "2026-10-14",
    "2026-11-04", "2026-11-25", "2026-12-16", "2026-12-31",
    "2027-01-07", "2027-01-07", "2027-01-07", "2027-01-13",
    "2027-01-13"
  )),
  Estat = factor(c(
    "Completada", "Completada", "Completada", "En curs",
    "Pendent", "Pendent", "Pendent", "Completada",
    "Completada", "Pendent", "Pendent", "Pendent",
    "Pendent", "En curs", "En curs", "Pendent", "Pendent"
  ), levels = c("Completada", "En curs", "Pendent"))
)

# Tasques ordenades
df_gantt$Tasca <- factor(df_gantt$Tasca,
                         levels = rev(unique(df_gantt$Tasca)))

# Dates
```

```r
inici <- as.Date("2026-09-23")
final <- as.Date("2027-01-13")

dates <- seq(inici, final, by = "1 week")

# Diagrama de Gantt
plot_gantt <- ggplot(df_gantt,
                     aes(x = Inici, xend = Final,
                         y = Tasca, yend = Tasca,
                         color = Estat)) +
  geom_segment(linewidth = 3) +
  scale_x_date(date_labels = "%d/%m",
               breaks = dates,
               limits = c(inici, final),
               expand = expansion(mult = c(0.01, 0.02))) +
  scale_color_manual(values = c("Completada" = "#03047a",
                                "En curs" = "#7ff0ff",
                                "Pendent" = "#d0d0d0")) +
  facet_wrap(~ Fase, ncol = 1, scales = "free_y",
             space = "free_y") +
  theme_minimal() +
  labs(x = "", y = "", color = NULL) +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1,
                               vjust = 1),
    strip.text = element_text(face = "bold", hjust = 0)
  )

plot_gantt

rm(inici, final, dates)
```