

Prüfung: T-Test und Gruppenvergleiche

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Wofür wird der t-Test verwendet?

- A) Mittelwertsvergleich zweier Gruppen
- B) Test auf Korrelation
- C) Vergleich von Varianzen
- D) Test auf Normalverteilung

2. Welche Voraussetzung gilt für den unabhängigen t-Test?

- A) Normalverteilung der AV in beiden Gruppen
- B) Keine Ausreißer
- C) Ordinalskalierte AV
- D) Gleiche Stichprobengröße

3. Was testet der Levene-Test?

- A) Gleichheit der Varianzen
- B) Normalverteilung
- C) Gleichheit der Mittelwerte
- D) Unabhängigkeit

4. Wann verwendet man den gepaarten t-Test?

- A) Bei einer Stichprobe
- B) Bei mehr als zwei Gruppen
- C) Bei zwei unabhängigen Gruppen
- D) Bei zwei abhängigen Messungen

5. Was ist Cohens d?

- A) Der t-Wert
- B) Die Korrelation
- C) Ein Mass für die Effektgröße
- D) Die Standardabweichung

6. Wann ist der Welch-Test vorzuziehen?

- A) Bei gleichen Varianzen
- B) Bei großen Stichproben
- C) Bei ungleichen Varianzen
- D) Bei Normalverteilung

7. Welche Freiheitsgrade hat ein t-Test $n_1=n_2=20$?

- A) 38
- B) 20
- C) 19
- D) 40

8. Was bedeutet $p < 0.05$?

- A) Die Stichprobe ist repräsentativ
- B) Der Effekt ist praktisch relevant
- C) H_1 ist bewiesen
- D) H_0 wird abgelehnt

Lösungen

1: A

2: A

3: A

4: D

5: C

6: C

7: A

8: D