

Prüfung: Chi-Quadrat-Tests

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Was testet der Chi-Quadrat-Test?

- A) Varianzunterschiede
- B) Zusammenhänge zwischen kategorialen Variablen
- C) Mittelwertsunterschiede
- D) Korrelationen

2. Welche Voraussetzung gilt für den Chi-Quadrat-Test?

- A) Normalverteilung
- B) Gleiche Gruppengrößen
- C) Erwartete Häufigkeiten > 5 pro Zelle
- D) Metrische Daten

3. Was ist Cramers V?

- A) Ein Test auf Normalverteilung
- B) Ein Korrelationsmaß
- C) Ein Maß für die Effektgröße bei Chi-Quadrat
- D) Ein Post-hoc-Test

4. Wann verwendet man Fishers exakten Test?

- A) Bei kleinen Stichproben oder erwarteten Häufigkeiten < 5
- B) Bei mehr als 4 Feldern
- C) Bei metrischen Daten
- D) Bei großen Stichproben

5. Was ist der Phi-Koeffizient?

- A) Der p-Wert
- B) Die Effektgröße für t-Tests
- C) Der Chi-Quadrat-Wert
- D) Spezialfall von Cramers V für 2x2-Tabellen

6. Was bedeutet ein signifikanter Chi-Quadrat-Test?

- A) Die Varianzen sind homogen
- B) Die Variablen sind kausal verbunden
- C) Die Variablen hängen zusammen
- D) Die Mittelwerte unterscheiden sich

7. Wie berechnet man Chi-Quadrat?

- A) Produkt von Zeilen- und Spaltensummen
- B) Summe (Beobachtet - Erwartet)
- C) Summe (Beobachtet - Erwartet) ² / Erwartet
- D) Mittelwert der Differenzen

8. Wie viele Freiheitsgrade hat eine 3x4-Tabelle?

- A) 6
- B) 2
- C) 12
- D) 7

Lösungen

1: B

2: C

3: C

4: A

5: D

6: C

7: C

8: A