

Prüfung: Einfaktorielle ANOVA

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Wann verwendet man eine ANOVA?

- A) Vergleich von 2 Gruppen
- B) Vergleich von 3+ Gruppen
- C) Zusammenhang zweier metrischer Variablen
- D) Normalverteilungstest

2. Welche Varianz steht im Zähler der F-Statistik?

- A) Fehlervarianz
- B) Varianz zwischen den Gruppen
- C) Gesamtvarianz
- D) Varianz innerhalb der Gruppen

3. Was bedeutet ein signifikanter F-Test?

- A) Stichproben sind repräsentativ
- B) Varianzen sind gleich
- C) Alle Mittelwerte unterscheiden sich
- D) Mindestens ein Mittelwert unterscheidet sich

4. Welcher Post-hoc-Test ist der konservativste?

- A) Bonferroni
- B) Tukey HSD
- C) Scheffe
- D) LSD

5. Wie heißt das Effektgrößenmaß in der ANOVA?

- A) R-Quadrat
- B) Cramers V
- C) Eta-Quadrat
- D) Cohens d

6. Welche Annahme ist für die ANOVA zentral?

- A) Homogenität der Varianzen
- B) Gleiche Stichprobengrößen
- C) Metrische UV
- D) Ordinalskalierte AV

7. Wozu dienen Post-hoc-Tests?

- A) Zur Varianzprüfung
- B) Zur Poweranalyse
- C) Zur Lokalisierung signifikanter Unterschiede
- D) Zur Normalverteilungsprüfung

8. Was bedeutet Omnibus Test?

- A) Test auf Varianzhomogenität
- B) Test auf Gesamtunterschied
- C) Test auf einzelne Unterschiede
- D) Test auf Interaktion

Lösungen

1: B

2: B

3: D

4: C

5: C

6: A

7: C

8: B