

Prüfung: Nichtparametrische Tests

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Wann sind nichtparametrische Tests indiziert?

- A) Bei Varianzhomogenität
- B) Bei verletzter Normalverteilungsannahme
- C) Bei metrischen Daten
- D) Bei großen Stichproben

2. Welcher Test ist das nichtparametrische Pendant zum t-Test?

- A) Korrelation nach Pearson
- B) Mann-Whitney-U-Test
- C) ANOVA
- D) Chi-Quadrat

3. Was testet der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test?

- A) Unterschiede in zwei verbundenen Stichproben
- B) Zusammenhang zweier Variablen
- C) Unterschiede in unabhängigen Gruppen
- D) Normalverteilung

4. Welcher Test vergleicht 3+ unabhängige Gruppen nichtparametrisch?

- A) Friedman-Test
- B) Kruskal-Wallis-Test
- C) Mann-Whitney-U
- D) Wilcoxon-Test

5. Welcher Test vergleicht 3+ verbundene Gruppen nichtparametrisch?

- A) Kruskal-Wallis
- B) Chi-Quadrat
- C) Friedman-Test
- D) Mann-Whitney-U

6. Was ist der Nachteil nichtparametrischer Tests?

- A) Geringere Power bei erfüllten Parametervoraussetzungen
- B) Sie benötigen größere Stichproben
- C) Sie setzen Normalverteilung voraus
- D) Sie können nur Dichotomien testen

7. Welche Informationen nutzt der Mann-Whitney-U-Test?

- A) Rangplätze der Werte
- B) Mittelwerte der Gruppen
- C) Die tatsächlichen Messwerte
- D) Varianzen der Gruppen

8. Der Friedman-Test ist das Pendant zu welchem parametrischen Verfahren?

- A) Pearson-Korrelation
- B) t-Test
- C) Einfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung
- D) Multiple Regression

Lösungen

1: B

2: B

3: A

4: B

5: C

6: A

7: A

8: C