

Uvod v modelsko analizo I

0

Možna definicija predmetne ravn: "Matematično modeliranje" = proces formulacije abstraktnega modela v matematični formi za opis kompleksnega obnašanja realnega sistema" (Yang '13)

Ta "matem. govorica" je lahko zelo splošna, kot bomo videli: ODE, PDE, integralne enačbe, statistična orodja in pristopi, modeli na osnovi prail (tje), itd.

Fizikalne teorije tvorijo veljavno hierarhijo:

TEORIJA

Tu je vse udeleženo: teorija splošne relativnosti, kvantna elektrodinamika kot zleda: omeni natančnost napovedi in izrednost Experimentator, ki so jo potrdili: $(g-2)_\mu$, Lambov premik, gravitac. lence, preverjanje Mercurjevega perihelija kot spektakul. zled!

HIPOTEZA

Shopenična uide: čaka (večkratno) potrditve, da postane teorija.

FENOMENOLSKI MODEL

Na izkušni in empirični dejstvih temelječ opis pojavn, ki pa pridolj globlje, da bi jih pojasnil "17 prail principov". Zled: termodinamika → ne sprašujemo se, zakaj so stvari take, kot so, upr. $C_p = \frac{3}{2}R$, $C_v = \frac{5}{2}R$, $\gamma = C_p/C_v = 5/3$, ne da bi se nam sanjalo o prostostnih stopnjah in shleni molekuli in translac. in rotac. kinet. energiji. → na to odgovori statistična fizika, ki je teorija

APROKSIMACIJE

Zavedemo zavemanje določene vidne pojave, da poskušamo razložiti njeno bistvo in da je vse skupaj tudi tehnično lažje. Zled: elektrodinamika v vakuumu, $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{P} =$ približen, da je susceptibilnost majhna, efekt linearen, itd. → spet se da bi se otirali na mikroskopsko shleno spremenljiv, ki so prostostle \vec{D} , \vec{P} , ...

V uideu smislu je vse to model in uas zavmanje, le na različnih ravneh razumevanja. Razmisli: zakaj Standardnemu modelu osnovnih delcev pravimo model?



%
0

POUČNA SLIKA

MISELNI EKSPERIMENT

Ti dve kategoriji nas sicer ne zanimata, a
mogoče to dodamo kot še eno duo
le hierarhijske, ker sta lahko to koristni
orodji: finalnih pojavov namreč ni vedno
nujnost izmeriti v njihovi matematični reprezentaciji.

Standardni model osnovnih delcev

- glej ločen list, na katerem je napisan Lagrangian;
- opiše močve in elektromagnetne interakcije (ne gravitacije);
- kot input potrebuje 19 parametrov (!)
 - * tri mase nabijenih leptonov (e, μ, τ)
 - * šest mas kvarkov (u, c, t, d, s, b)
 - * tri sklopitvene konstante za vmesneve polja ($g_{1,2,3}$)
 - * tri kvarkovske mase in eno θ fazo (CKM)
 - * maso Higgsovega bozona in kvarkovske sklop. konst.
 - * QCD vacuum angle
- dožal, da je potrebna iteracija ④ med resničnim
problemom in idealizacijo, je ta, da so neutrinske
mase različne od nič!
 - ⇒ "beyond the standard model"

Standard Model Lagrangian (including neutrino mass terms)
 From *An Introduction to the Standard Model of Particle Physics, 2nd Edition*,
 W.N. Cottingham and D.A. Greenwood, Cambridge University Press, Cambridge, 2007,
 Extracted by J.A. Shiflett, updated from Particle Data Group tables at pdg.lbl.gov, 25 Aug 2013.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{8}\text{tr}(\mathbf{W}_{\mu\nu}\mathbf{W}^{\mu\nu}) - \frac{1}{2}\text{tr}(\mathbf{G}_{\mu\nu}\mathbf{G}^{\mu\nu}) & (\text{U(1), SU(2) and SU(3) gauge terms}) \\
 & +(\bar{\nu}_L, \bar{e}_L)\tilde{\sigma}^\mu iD_\mu \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix} + \bar{e}_R\sigma^\mu iD_\mu e_R + \bar{\nu}_R\sigma^\mu iD_\mu \nu_R + (\text{h.c.}) & (\text{lepton dynamical term}) \\
 & -\frac{\sqrt{2}}{v} \left[(\bar{\nu}_L, \bar{e}_L)\phi M^e e_R + \bar{e}_R\bar{M}^e \bar{\phi} \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix} \right] & (\text{electron, muon, tauon mass term}) \\
 & -\frac{\sqrt{2}}{v} \left[(-\bar{e}_L, \bar{\nu}_L)\phi^* M^\nu \nu_R + \bar{\nu}_R\bar{M}^\nu \phi^T \begin{pmatrix} -e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \right] & (\text{neutrino mass term}) \\
 & +(\bar{u}_L, \bar{d}_L)\tilde{\sigma}^\mu iD_\mu \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix} + \bar{u}_R\sigma^\mu iD_\mu u_R + \bar{d}_R\sigma^\mu iD_\mu d_R + (\text{h.c.}) & (\text{quark dynamical term}) \\
 & -\frac{\sqrt{2}}{v} \left[(\bar{u}_L, \bar{d}_L)\phi M^d d_R + \bar{d}_R\bar{M}^d \bar{\phi} \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix} \right] & (\text{down, strange, bottom mass term}) \\
 & -\frac{\sqrt{2}}{v} \left[(-\bar{d}_L, \bar{u}_L)\phi^* M^u u_R + \bar{u}_R\bar{M}^u \phi^T \begin{pmatrix} -d_L \\ u_L \end{pmatrix} \right] & (\text{up, charmed, top mass term}) \\
 & +(\bar{D}_\mu\phi)D^\mu\phi - m_h^2[\bar{\phi}\phi - v^2/2]^2/2v^2. & (\text{Higgs dynamical and mass term}) \quad (1)
 \end{aligned}$$

where (h.c.) means Hermitian conjugate of preceeding terms, $\bar{\psi} = (\text{h.c.})\psi = \psi^\dagger = \psi^{*T}$, and the derivative operators are

$$D_\mu \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix} = \left[\partial_\mu - \frac{ig_1}{2}B_\mu + \frac{ig_2}{2}\mathbf{W}_\mu \right] \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \quad D_\mu \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix} = \left[\partial_\mu + \frac{ig_1}{6}B_\mu + \frac{ig_2}{2}\mathbf{W}_\mu + ig\mathbf{G}_\mu \right] \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad (2)$$

$$D_\mu \nu_R = \partial_\mu \nu_R, \quad D_\mu e_R = [\partial_\mu - ig_1 B_\mu] e_R, \quad D_\mu u_R = \left[\partial_\mu + \frac{i2g_1}{3}B_\mu + ig\mathbf{G}_\mu \right] u_R, \quad D_\mu d_R = \left[\partial_\mu - \frac{ig_1}{3}B_\mu + ig\mathbf{G}_\mu \right] d_R, \quad (3)$$

$$D_\mu \phi = \left[\partial_\mu + \frac{ig_1}{2}B_\mu + \frac{ig_2}{2}\mathbf{W}_\mu \right] \phi. \quad (4)$$

ϕ is a 2-component complex Higgs field. Since \mathcal{L} is $SU(2)$ gauge invariant, a gauge can be chosen so ϕ has the form

$$\phi^T = (0, v + h)/\sqrt{2}, \quad \langle \phi \rangle_0^T = (\text{expectation value of } \phi) = (0, v)/\sqrt{2}, \quad (5)$$

where v is a real constant such that $\mathcal{L}_\phi = (\bar{\partial}_\mu\phi)\partial^\mu\phi - m_h^2[\bar{\phi}\phi - v^2/2]^2/2v^2$ is minimized, and h is a residual Higgs field. B_μ , \mathbf{W}_μ and \mathbf{G}_μ are the gauge boson vector potentials, and \mathbf{W}_μ and \mathbf{G}_μ are composed of 2×2 and 3×3 traceless Hermitian matrices. Their associated field tensors are

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu, \quad \mathbf{W}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathbf{W}_\nu - \partial_\nu \mathbf{W}_\mu + ig_2(\mathbf{W}_\mu \mathbf{W}_\nu - \mathbf{W}_\nu \mathbf{W}_\mu)/2, \quad \mathbf{G}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathbf{G}_\nu - \partial_\nu \mathbf{G}_\mu + ig(\mathbf{G}_\mu \mathbf{G}_\nu - \mathbf{G}_\nu \mathbf{G}_\mu). \quad (6)$$

The non-matrix A_μ, Z_μ, W_μ^\pm bosons are mixtures of \mathbf{W}_μ and B_μ components, according to the weak mixing angle θ_w ,

$$A_\mu = W_{11\mu} \sin\theta_w + B_\mu \cos\theta_w, \quad Z_\mu = W_{11\mu} \cos\theta_w - B_\mu \sin\theta_w, \quad W_\mu^+ = W_\mu^{-*} = W_{12\mu}/\sqrt{2}, \quad (7)$$

$$B_\mu = A_\mu \cos\theta_w - Z_\mu \sin\theta_w, \quad W_{11\mu} = -W_{22\mu} = A_\mu \sin\theta_w + Z_\mu \cos\theta_w, \quad W_{12\mu} = W_{21\mu}^* = \sqrt{2} W_\mu^+, \quad \sin^2\theta_w = .2315(4). \quad (8)$$

The fermions include the leptons e_R, e_L, ν_R, ν_L and quarks u_R, u_L, d_R, d_L . They all have implicit 3-component generation indices, $e_i = (e, \mu, \tau)$, $\nu_i = (\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)$, $u_i = (u, c, t)$, $d_i = (d, s, b)$, which contract into the fermion mass matrices $M_{ij}^e, M_{ij}^\nu, M_{ij}^u, M_{ij}^d$, and implicit 2-component indices which contract into the Pauli matrices,

$$\sigma^\mu = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right], \quad \tilde{\sigma}^\mu = [\sigma^0, -\sigma^1, -\sigma^2, -\sigma^3], \quad \text{tr}(\sigma^i) = 0, \quad \sigma^{\mu\dagger} = \sigma^\mu, \quad \text{tr}(\sigma^\mu \sigma^\nu) = 2\delta^{\mu\nu}. \quad (9)$$

The quarks also have implicit 3-component color indices which contract into \mathbf{G}_μ . So \mathcal{L} really has implicit sums over 3-component generation indices, 2-component Pauli indices, 3-component color indices in the quark terms, and 2-component $SU(2)$ indices in $(\bar{\nu}_L, \bar{e}_L), (\bar{u}_L, \bar{d}_L), (-\bar{e}_L, \bar{\nu}_L), (-\bar{d}_L, \bar{u}_L), \bar{\phi}, \mathbf{W}_\mu, \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -d_L \\ u_L \end{pmatrix}, \phi$.

The electroweak and strong coupling constants, Higgs vacuum expectation value (VEV), and Higgs mass are,

$$g_1 = e/\cos\theta_w, \quad g_2 = e/\sin\theta_w, \quad g > 6.5e = g(m_\tau^2), \quad v = 246 \text{ GeV} (PDG) \approx \sqrt{2} \cdot 180 \text{ GeV} (CG), \quad m_h = 125 - 127 \text{ GeV} \quad (10)$$

where $e = \sqrt{4\pi\alpha\hbar c} = \sqrt{4\pi/137}$ in natural units. Using (4,5) and rewriting some things gives the mass of A_μ, Z_μ, W_μ^\pm ,

$$-\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{8}\text{tr}(\mathbf{W}_{\mu\nu}\mathbf{W}^{\mu\nu}) = -\frac{1}{4}A_{\mu\nu}A^{\mu\nu} - \frac{1}{4}Z_{\mu\nu}Z^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\mathcal{W}_{\mu\nu}^+ \mathcal{W}^{\mu\nu} + \left(\begin{smallmatrix} \text{higher} \\ \text{order terms} \end{smallmatrix} \right), \quad (11)$$

$$A_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad Z_{\mu\nu} = \partial_\mu Z_\nu - \partial_\nu Z_\mu, \quad \mathcal{W}_{\mu\nu}^\pm = D_\mu W_\nu^\pm - D_\nu W_\mu^\pm, \quad D_\mu W_\nu^\pm = [\partial_\mu \pm ieA_\mu]W_\nu^\pm, \quad (12)$$

$$D_\mu \langle \phi \rangle_0 = \frac{iv}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} g_2 W_{12\mu}/2 \\ g_1 B_\mu/2 + g_2 W_{22\mu}/2 \end{pmatrix} = \frac{ig_2 v}{2} \begin{pmatrix} W_{12\mu}/\sqrt{2} \\ (B_\mu \sin\theta_w/\cos\theta_w + W_{22\mu})/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{ig_2 v}{2} \begin{pmatrix} W_\mu^+ \\ -Z_\mu/\sqrt{2}\cos\theta_w \end{pmatrix}, \quad (13)$$

$$\Rightarrow m_A = 0, \quad m_{W^\pm} = g_2 v/2 = 80.425(38) \text{ GeV}, \quad m_Z = g_2 v/2\cos\theta_w = 91.1876(21) \text{ GeV}. \quad (14)$$

Ordinary 4-component Dirac fermions are composed of the left and right handed 2-component fields,

$$e = \begin{pmatrix} e_{L1} \\ e_{R1} \end{pmatrix}, \quad \nu_e = \begin{pmatrix} \nu_{L1} \\ \nu_{R1} \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{R1} \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} d_{L1} \\ d_{R1} \end{pmatrix}, \quad (\text{electron, electron neutrino, up and down quark}) \quad (15)$$

$$\mu = \begin{pmatrix} e_{L2} \\ e_{R2} \end{pmatrix}, \quad \nu_\mu = \begin{pmatrix} \nu_{L2} \\ \nu_{R2} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} u_{L2} \\ u_{R2} \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} d_{L2} \\ d_{R2} \end{pmatrix}, \quad (\text{muon, muon neutrino, charmed and strange quark}) \quad (16)$$

$$\tau = \begin{pmatrix} e_{L3} \\ e_{R3} \end{pmatrix}, \quad \nu_\tau = \begin{pmatrix} \nu_{L3} \\ \nu_{R3} \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} u_{L3} \\ u_{R3} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} d_{L3} \\ d_{R3} \end{pmatrix}, \quad (\text{tauon, tauon neutrino, top and bottom quark}) \quad (17)$$

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \quad \text{where} \quad \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2I g^{\mu\nu}. \quad (\text{Dirac gamma matrices in chiral representation}) \quad (18)$$

The corresponding antiparticles are related to the particles according to $\psi^c = -i\gamma^2\psi^*$ or $\psi_L^c = -i\sigma^2\psi_R^*$, $\psi_R^c = i\sigma^2\psi_L^*$. The fermion charges are the coefficients of A_μ when (8,10) are substituted into either the left or right handed derivative operators (2-4). The fermion masses are the singular values of the 3×3 fermion mass matrices M^ν, M^e, M^u, M^d ,

$$M^e = \mathbf{U}_L^{e\dagger} \begin{pmatrix} m_e & 0 & 0 \\ 0 & m_\mu & 0 \\ 0 & 0 & m_\tau \end{pmatrix} \mathbf{U}_R^e, \quad M^\nu = \mathbf{U}_L^{\nu\dagger} \begin{pmatrix} m_{\nu_e} & 0 & 0 \\ 0 & m_{\nu_\mu} & 0 \\ 0 & 0 & m_{\nu_\tau} \end{pmatrix} \mathbf{U}_R^\nu, \quad M^u = \mathbf{U}_L^{u\dagger} \begin{pmatrix} m_u & 0 & 0 \\ 0 & m_c & 0 \\ 0 & 0 & m_t \end{pmatrix} \mathbf{U}_R^u, \quad M^d = \mathbf{U}_L^{d\dagger} \begin{pmatrix} m_d & 0 & 0 \\ 0 & m_s & 0 \\ 0 & 0 & m_b \end{pmatrix} \mathbf{U}_R^d, \quad (19)$$

$$m_e = .510998910(13) \text{ MeV}, \quad m_{\nu_e} \sim .001 - .23 \text{ eV}, \quad m_u = 1.7 - 3.1 \text{ MeV}, \quad m_d = 4.1 - 5.7 \text{ MeV}, \quad (20)$$

$$m_\mu = 105.658367(4) \text{ MeV}, \quad m_{\nu_\mu} \sim .001 - .23 \text{ eV}, \quad m_c = 1.18 - 1.34 \text{ GeV}, \quad m_s = 80 - 130 \text{ MeV}, \quad (21)$$

$$m_\tau = 1776.84(17) \text{ MeV}, \quad m_{\nu_\tau} \sim .001 - .23 \text{ eV}, \quad m_t = 171.4 - 174.4 \text{ GeV}, \quad m_b = 4.13 - 4.37 \text{ GeV}, \quad (22)$$

where the \mathbf{U} s are 3×3 unitary matrices ($\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^\dagger$). Consequently the “true fermions” with definite masses are actually linear combinations of those in \mathcal{L} , or conversely the fermions in \mathcal{L} are linear combinations of the true fermions,

$$e'_L = \mathbf{U}_L^e e_L, \quad e'_R = \mathbf{U}_R^e e_R, \quad \nu'_L = \mathbf{U}_L^\nu \nu_L, \quad \nu'_R = \mathbf{U}_R^\nu \nu_R, \quad u'_L = \mathbf{U}_L^u u_L, \quad u'_R = \mathbf{U}_R^u u_R, \quad d'_L = \mathbf{U}_L^d d_L, \quad d'_R = \mathbf{U}_R^d d_R, \quad (23)$$

$$e_L = \mathbf{U}_L^{e\dagger} e'_L, \quad e_R = \mathbf{U}_R^{e\dagger} e'_R, \quad \nu_L = \mathbf{U}_L^{\nu\dagger} \nu'_L, \quad \nu_R = \mathbf{U}_R^{\nu\dagger} \nu'_R, \quad u_L = \mathbf{U}_L^{u\dagger} u'_L, \quad u_R = \mathbf{U}_R^{u\dagger} u'_R, \quad d_L = \mathbf{U}_L^{d\dagger} d'_L, \quad d_R = \mathbf{U}_R^{d\dagger} d'_R. \quad (24)$$

When \mathcal{L} is written in terms of the true fermions, the \mathbf{U} s fall out except in $\bar{u}'_L \mathbf{U}_L^u \tilde{\sigma}^\mu W_\mu^\pm \mathbf{U}_L^{d\dagger} d'_L$ and $\bar{\nu}'_L \mathbf{U}_L^\nu \tilde{\sigma}^\mu W_\mu^\pm \mathbf{U}_L^{e\dagger} e'_L$. Because of this, and some absorption of constants into the fermion fields, all the parameters in the \mathbf{U} s are contained in only four components of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix $\mathbf{V}^q = \mathbf{U}_L^q \mathbf{U}_L^{q\dagger}$ and four components of the Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata matrix $\mathbf{V}^l = \mathbf{U}_L^l \mathbf{U}_L^{l\dagger}$. The unitary matrices \mathbf{V}^q and \mathbf{V}^l are often parameterized as

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\delta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\delta/2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\delta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c_j = \sqrt{1 - s_j^2}, \quad (25)$$

$$\delta^q = 69(4) \text{ deg}, \quad s_{12}^q = 0.2253(7), \quad s_{23}^q = 0.041(1), \quad s_{13}^q = 0.0035(2), \quad (26)$$

$$\delta^l = ?, \quad s_{12}^l = 0.558(16), \quad s_{23}^l = 0.7(1), \quad s_{13}^l = 0.151(17). \quad (27)$$

\mathcal{L} is invariant under a $U(1) \otimes SU(2)$ gauge transformation with $U^{-1} = U^\dagger$, $\det U = 1$, θ real,

$$\mathbf{W}_\mu \rightarrow U \mathbf{W}_\mu U^\dagger - (2i/g_2) U \partial_\mu U^\dagger, \quad \mathbf{W}_{\mu\nu} \rightarrow U \mathbf{W}_{\mu\nu} U^\dagger, \quad B_\mu \rightarrow B_\mu + (2/g_1) \partial_\mu \theta, \quad B_{\mu\nu} \rightarrow B_{\mu\nu}, \quad \phi \rightarrow e^{-i\theta} U \phi, \quad (28)$$

$$\begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix} \rightarrow e^{i\theta} U \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix} \rightarrow e^{-i\theta/3} U \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad \nu_R \rightarrow \nu_R, \quad u_R \rightarrow e^{-4i\theta/3} u_R, \quad (29)$$


$$e_R \rightarrow e^{2i\theta} e_R, \quad d_R \rightarrow e^{2i\theta/3} d_R,$$

and under an $SU(3)$ gauge transformation with $V^{-1} = V^\dagger$, $\det V = 1$,

$$\mathbf{G}_\mu \rightarrow V \mathbf{G}_\mu V^\dagger - (i/g) V \partial_\mu V^\dagger, \quad \mathbf{G}_{\mu\nu} \rightarrow V \mathbf{G}_{\mu\nu} V^\dagger, \quad u_L \rightarrow V u_L, \quad d_L \rightarrow V d_L, \quad u_R \rightarrow V u_R, \quad d_R \rightarrow V d_R. \quad (30)$$

Procedura strojna matematičnega modeliranja

0''



- 1 Na podlagi domnev, izkušenj, intuicije, ... iz resničnega pojava najprej poskušamo narediti idealizacijo = predstavljati fizikalni model, ta latterja upamo, da se kajane ne lastnosti resničnega.
- 2 Tako zastavljeno idealizirani problem prevajamo v matematični jezik: NDE, PDE, statistični model, ...
- 3 Ta model potem analiziramo, izvajamo numerične simulacije, in ugotovimo, če ugotovimo kakšno ugotovitev, če dobro razumemo pojave, v katerih model teče. Rezultate simulacij in te ugotovitve lahko potem validiramo glede na druge modele, ki poskušajo opisati isto stvar, podatke (eksperimentalne) ali benchmarke.

Če so rezultati OK — kar se zelo redko zgodi — matematični model lahko sprejmemo; če niso, moramo spreminjati tako mat. model kot fizikalno idealizacijo (4) v iterativnem postopku, dokler ne dosežemo zadovoljivega ujemanja. Potem ko matem. model tudi ^{velja} dobra aproksimacija za resnični problem in bomo lahko delali tudi ugotoviti zajaj! To raduje je pomembna pridobitev!


čléd

Vse to inkihimo že vemo, pa vemo opisimo konstantno
talnega "modela" na primer roba sladkorja v vodi.

Kaj vemo? Da bi sladkor difundiral, če bi do pr p r v d i v d e
gradienti ujeprve koncentracije.

Kaj se reči napletep? Muojs shani opliva na pradeliter sladkorja:
temperatura, mešanje, vrsta sladkorja, kako ga vrčemo v vodo,
oblika posode, itd. Tato moramo narediti približje:

- konstantna T (ni prenosu toplote)
- nič mešanja, kajti mešanje spremeni efektivni difuz. koeficient D
in bi dodal advekcijo vode ali celo vrhince (turbulenco)
- v vodi ni nobenih drugih učitelj
- roba sladkorja je majhna in se ne uadoma majde sreli
posode ... sicer bi imeli obupen hidrodinamiški problem!



Ω = volumen, dosti večji od loche
sladkorja, a dosti manjši od
posode
 $\partial\Omega$ = ujepr ob (plushev)

Ohranitev mase sladkorja pravi ($c=c(\vec{r},t)$, \vec{j} = flux sladkorja)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} c \, dV + \int_{\partial\Omega} \vec{j} \, d\vec{S} = 0$$

→ to je že matematični model, zapisan v integralni obliki!

Po Gaussu $\int_{\partial\Omega} \vec{j} \, d\vec{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{j} \, dV$

Torej
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} c \, dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{j} \, dV = \int_{\Omega} \frac{\partial c}{\partial t} \, dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{j} \, dV = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} \right) dV = 0$$

ker je integrac. vol. Ω neodvisen od t ,
lahko zamengamo odvod po t
in integracijo po V (množica)

→ ker mora to veljati na celotnem $\Omega \rightarrow \boxed{\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0}$ (III)
(kontinuitetna enačba
ot. ohranitev mase)

Ker vemo, da gre di fuzija it mesta + vsjo c na mesto \vec{r} in sjo c,
mora biti hitrost difuzije sorazmerna z ∇c :

$$\vec{j} = -D \nabla c$$

↑
v splošnem odvisen od T
(tudi pa od suši, v kateri se dif. pde.)

Damo v kontinuitetno enačbo →

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla \cdot (D \nabla c) = 0$$

$$\text{ot. } \boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla c)}$$

To je naš končni model v diferencialni obliki.
D smo pustili tuotraj $\nabla \cdot (\quad)$, ker je lahko
odvisen od \vec{r} (upr. mestu!), če pa te to
povzroča, pa seveda

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c}$$

- Torej reči smo reševali pri najprejšnjem priručniku!
Torej nas zanima bolj to, kako izdelati tak model
(in ga potem rešiti) in kako ga primenjati + raziskati.

Vselej imamo tudi uveljavljeno dvojnost, dualizem

Diskretus \leftrightarrow zvezno

Populacijski problemi so diskretni (posamezni ljudje, živali, bakterije),
vendar jih obravnavamo zvezno! Ali pa reševanje problemov
+ metoda Monte Carlo, ki je diskretna. zvezno
(recimo, numerična integracija zveznih f. po izpolnjenih območjih)

→ ni nujno, da preidemo po matematičnem stroju, ki ima isto
inherentno strukturo kot problem! Lahko uporabimo drugačen
pristop.

načrtno (slučajno) \leftrightarrow deterministično
(stohastično)

Če to dilemo se bomo srečali pri generiranju načrtnih števil —
to so namreč le deterministični algoritmi, pri katerih se nam zgubi
polariteta dovolj dolgo — "pseudorandom".

lokalno \leftrightarrow globalno

↑
postopni
prijemi

↑ eden redkih pristopov je variacijski račun;
+ radikalnejši je tisti, ko malo lažje
ker lahko obkledujemo celotno rešbo —
upr. lattice QCD

linearno \leftrightarrow nelinearno

↑ velja predpostaviti, da imamo superpozicijsko rešitev;
pri nelinearnih problemih tega ni

Verjetno \leftrightarrow deterministično
(stohastično)

• Temu smo že govorili pri strukturi modeliranja.