

一、填空 (每小题 3 分)

1. \mathbb{R}^3 中的两个子空间 $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 = x_2\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 = x_3\}$,

则 W_1 与 W_2 的维数均为 1, $W_1 \cap W_2$ 的维数为 1, $W_1 + W_2$ 的维数为 1.

2. 从多项式空间 $P_1(t)$ 到多项式空间 $P_2(t)$ 的线性变换 T 定义为 $TP(t) = 3p(t) + 2 \int_0^1 p(t) dt$, 则 T 在基偶 $\{1, t\}$ 与 $\{1, t, t^2\}$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$?

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $A^8 - 9A^6 + A^4 - 8A^2 + A - 12I = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$.

4. 已知 $x^2 + ax + b$ 与 1 和 x 在 $[0, 2]$ 上带权 $\rho(x) = 1$ 正交, 则 $a = \underline{-2}$, $b = \underline{2/3}$.

5. 若求积公式 $\int_0^4 f(x) \approx A_1 f(1) + A_2 f(4)$ 有一次代数精度, 则 $A_1 = \underline{\frac{4}{3}}$, $A_2 = \underline{\frac{1}{3}}$.

6. 对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$, 单步法 $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{4}f(x_n, y_n) + af(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))]$ 在 $a = \underline{\frac{1}{3}}$ 时为一阶方法 (即局部截断误差二阶).

7. 对于线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 0.5x_2 = 3 \\ 3x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$, 写出 Gauss-Seidel 迭代法的迭代公式 $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} + 3 \\ x_2^{(k+1)} = 3x_1^{(k+1)} + 7 \end{cases}$, Gauss-Seidel 迭代法是否收敛 否.

8. 若求解方程的迭代公式 $x_{k+1} = ax_k + \sin(x_k)$ 在根 $x^* = 0$ 附近收敛, 则 a 满足 $\underline{-2 < a < 0}$. 若 $a = 0.5$, 初值 $x_0 \in [-\pi/2, \pi/2]$, 则以上迭代公式是否保证收敛 不保证收敛.

二、(8 分) 设 T_1 是 V^n 到 V^n 的线性变换, T_2 是 V^n 到 V^n 的线性变换, 定义 V^n 到

V^n 的变换 $T_2 \circ T_1$ 为 $(T_2 \circ T_1)\alpha = T_2(T_1\alpha), \forall \alpha \in V^n$. 证明, $T_2 \circ T_1$ 是线性变换.

证明: $\because T_2, T_1$ 均为线性变换
 $\therefore (T_2 \circ T_1)(k\alpha) = T_2(T_1(k\alpha)) = T_2(k \cdot T_1\alpha) = k \cdot T_2(T_1\alpha) = k(T_2 \circ T_1)\alpha$
 $\therefore T_2 \circ T_1$ 是线性变换.

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{bmatrix}$$

三、(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$.

(1) 特征函数为 $\{1, x, x^2, x^3\}$
 $f(x) = x^2 + 2x + 3$

四、(10分)

(1) 求二次多项式 $f(x)$ 使得 $f(-1)=2, f(0)=3, f(1)=6$.

(2) 求三次多项式 $g(x)$ 使得 $g(-1)=2, g(0)=3, g(1)=6, g'(1)=0$.

(2) $f(x) = -2x^3 + x^2 + 4x + 3$

五、(8分) 求出一度多项式 $P_1(x)$ 使 $\int_0^2 (x^3 - P_1(x))^2 dx$ 的值达到最小 (即 $P_1(x)$ 为

x^3 在 $(0,2)$ 上的一次最佳平方逼近). $P_1(x) = -\frac{8}{5} + \frac{18}{5}x$.

六、(10分)

(1) 给出两点求积公式 $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 使其关于 $f(x)$ 有最高的

代数精度, 并问此代数精度是多少. x_0, x_1, A_1, A_2 高斯型 $2n+1=3$ 阶.

(2) 求出 $\int_0^4 \frac{2f(x)}{\sqrt{4x-x^2}} dx$ 的关于 $f(x)$ 具有最高代数精度的两点求积公式.

七、(10分) 对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -10y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$

(1) 写出显式欧拉法的迭代格式, 并求出这种方法的绝对稳定区间和稳定步长范围;

(2) 求出改进欧拉法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))]$ 的绝对稳定区间和稳定步长范围. $\eta = \lambda h$
 $\lambda = -10$

八、(10分) 对于线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 7x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_2 - 6x_3 = 0 \end{cases}$

(1) 使用三角分解 (LU 分解) 法求解;

(2) 若以上方程组的矩阵表示为 $Ax = b$, 求矩阵 A 的条件数 $\text{cond}_2(A)$; 当 b 具有相对误差 $\frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}$ 时, 给出解 x 的相对误差 $\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2}$ 的一个上界.

九、(10分) 对于非线性方程 $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$,

(1) 写出牛顿法的迭代公式;

(2) 说明牛顿法在根 $x^* = 1$ 附近线性收敛;

(3) 对以上的牛顿法进行改进, 并说明改进后的迭代法在根 $x^* = 1$ 附近平方收敛.

致. $x=1$ 是二重根. $M=2$.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad \varphi'(x) = 0$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \varphi''(x) \neq 0$$

平方收敛.

一. 填空题:

1. $x_1 = x_2 = x_3 \Rightarrow \dim W_1 = \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) = \dim(W_1 + W_2) = 1$.

2. $E_1 = \{1, t\}$, $E_2 = \{1, t, t^2\}$.

$T \cdot E_1 = E_2 \cdot A$

$\{5, 3t+1\} = \{1, t, t^2\} \cdot A$

$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ $\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -5 \\ 1 & \lambda+2 \end{bmatrix}$ $f(\lambda) = \lambda^2 - 9 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3$.

设 $g(\lambda) = f(\lambda) \cdot r(\lambda) + a\lambda + b$.

$\begin{cases} g(3) = f(3) \cdot r(3) + 3a + b = 0 \\ g(-3) = f(-3) \cdot r(-3) - 3a + b = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \end{cases}$

$g(\lambda) = f(\lambda) \cdot r(\lambda) + \lambda - 3$

$g(A) = f(A) \cdot r(A) + A - 3I = A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$.

4. $\begin{cases} \int_0^2 (x^2 + ax + b) \cdot f(x) \cdot 1 dx = 0 \\ \int_0^2 (x^2 + ax + b) \cdot f(x) \cdot x dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2/3 \end{cases}$

5. 一次代数精度 \Rightarrow 求积公式对 $f(x)=1, f(x)=x$ 准确成立.

$f(x)=1$ 时, $\int_0^4 1 dx = A_1 + A_2$.

$f(x)=x$ 时, $\int_0^4 x dx = A_1 + 4A_2$.

$A_2 = \frac{4}{3}$, $A_1 = \frac{8}{3}$.

6. $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{4} f(x_n, y_n) + a f(x_{n+1}, y_{n+1})]$

泰勒展开:

$y_n + h \cdot y'_n + \frac{h^2}{2} y''_n + \frac{h^3}{6} y'''_n = y_n + h(\frac{1}{4} y'_n + a(y'_n + h y''_n + \frac{h^2}{2} y'''_n))$

$\frac{h^3}{6} = \frac{a h^3}{2}$ $a = 1/3$.

$$7. \text{迭代公式: } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} + 3 \\ x_2^{(k+1)} = -3x_1^{(k+1)} + 7 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = L + D + U \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = -(D+U)^{-1} \cdot U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \rho(B) = \frac{1}{2} > 1, \text{ 不收敛.}$$

$$8. \text{令 } \varphi(x) = ax + \sin x \quad \text{则 } \varphi'(x) = a + \cos x.$$

$$|\varphi'(0)| = |a+1| < 1, \quad -2 < a < 0.$$

$a = 0.5$ 时, $|\varphi'(x)|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可能大于 1, 不保证收敛.

二. 证明. T_1, T_2 均为线性变换.

$$\therefore \text{有 } T_1(\alpha + \beta) = T_1\alpha + T_1\beta \quad T_1(k\alpha) = kT_1\alpha$$

$$T_2(\alpha + \beta) = T_2\alpha + T_2\beta \quad T_2(k\alpha) = kT_2\alpha.$$

$$\therefore (T_2 \cdot T_1)(\alpha + \beta) = T_2[T_1(\alpha + \beta)] = T_2[T_1\alpha + T_1\beta] = T_2(T_1\alpha) + T_2(T_1\beta) = (T_2 \cdot T_1)\alpha + (T_2 \cdot T_1)\beta.$$

$$(T_2 \cdot T_1)(k\alpha) = T_2[T_1(k\alpha)] = T_2(k \cdot T_1\alpha) = k \cdot T_2(T_1\alpha) = k(T_2 \cdot T_1)\alpha.$$

$\therefore T_2 \cdot T_1$ 是线性变换.

$$\text{三. 解: } A - \lambda I = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 2 & \lambda - 3 \\ 1 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 4)^2 (\lambda - 3).$$

$\lambda = 3$ 时.

$$(A - 3I)X_1 = 0$$

$$\text{特征向量 } X_1 = (2, 1, 1)^T$$

$\lambda = 4$ 时.

$$(A - 4I)X_2 = 0$$

$$\text{特征向量 } X_2 = (0, 1, 0)^T$$

$$(A - 4I)X_3 = X_2.$$

$$\text{取特征向量 } X_3 = (1, k, 1)^T$$

$$k \text{ 取 } 0, \text{ 则 } X_3 = (1, 0, 1)^T.$$

$$\begin{cases} (A - 3I)X_1 = 0 \Rightarrow A \cdot X_1 = 3X_1 \\ (A - 4I)X_2 = 0 \Rightarrow A \cdot X_2 = 4X_2 \\ (A - 4I)X_3 = X_2 \Rightarrow A \cdot X_3 = X_2 + 4X_3. \end{cases}$$

$$P = \{X_1, X_2, X_3\} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & k \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AP = P \cdot J, \Rightarrow J = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

四. (1) x_i y_i 1阶差商 2阶差商.

-1	2		
0	3	1	
1	6	3	1

$$f(x) = 2 + (x+1) + (x+1)x$$

$$= x^2 + 2x + 3$$

(2) 重节点差商表:

x_i	y_i	1阶	2阶	3阶
-1	2			
0	3	1		
1	6	3	1	
1	6	0	-3	-2

$$f(x) = 2 + (x+1) + (x+1)x - 2(x+1) \cdot x(x-1)$$

$$= -2x^3 + x^2 + 4x + 3$$

五. 解: 用 $q_0=1$, $q_1=x$ 对 $f(x)=x^3$ 做逼近.

法为程组求:

$$\begin{bmatrix} (q_0, q_0) & (q_0, q_1) \\ (q_1, q_0) & (q_1, q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (q_0, f) \\ (q_1, f) \end{bmatrix}$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{有 } a = -\frac{5}{2}, b = \frac{15}{2}$$

$$\therefore p_1(x) = -\frac{5}{2} + \frac{15}{2}x$$

$$\therefore \text{解: (1)} \quad p(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

用切比雪夫正交多项式:

$$T_0=1, T_1=x, T_2=2x^2-1$$

进行插值求积.

求积节点 x_0, x_1 为 T_2 的根.

$$x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$A_0 = A_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{1-x^2} dx \approx \frac{\pi}{2} f(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + \frac{\pi}{2} f(\frac{\sqrt{3}}{2})$$

代数精度: $2n+1=3$ 阶.

$$(2) \text{ 令 } x = \frac{b-a}{2}t = 2+t$$

$$\int_0^4 \frac{2f(x)}{\sqrt{4x-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{f(2+t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$\approx \pi f(2-\sqrt{3}) + \pi f(2+\sqrt{3})$$

七. 解: (1) 迭代公式: $y_{n+1} = y_n + h y'_n = y_n - 10h y_n = (1-10h)y_n$

设 $y' = \lambda y$, 则 $y_{n+1} = (1+\lambda h)y_n$, 考虑误差存在有: $\tilde{y}_{n+1} = (1+\lambda h)\tilde{y}_n$

$$\text{令 } \varepsilon_n = y_n - \tilde{y}_n, \text{ 由迭代公式有: } \varepsilon_{n+1} = (1+\lambda h)\varepsilon_n$$

要使方法稳定: 要求 $|1+\lambda h| \leq 1$

\therefore 稳定区间 $\lambda h \in [-2, 0]$ 稳定步长 $h \in [0, 0.05]$

$$(2). y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} [y_n' + y_{n+1}'] \\ = y_n + \frac{\Delta x}{2} y_n' + \frac{\Delta x}{2} y_{n+1}'$$

$$\therefore y_{n+1} = \frac{1 + \frac{\Delta x}{2}}{1 - \frac{\Delta x}{2}} y_n$$

同上, $-2 \leq \lambda h \leq 0$

$$0 \leq h \leq 1/5$$

$$11. \text{解: } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\text{求得: } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 20/3 & 3 \\ 0 & 0 & -14/3 \end{bmatrix}$$

$$LY = b = (0, 1, 0)^T, \quad Y = (0, 1, -9/20)^T$$

$$LUX = LY \Rightarrow UX = Y$$

$$\text{求得: } \begin{cases} x_1 = 2/49 \\ x_2 = 6/49 \\ x_3 = 3/49 \end{cases}$$

$$(2). \text{cond}_2(A) = \|A^{-1}\|_2 \cdot \|A\|_2$$

$$\text{其中 } \|A\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

$$\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \|A\|_2 \cdot \|x\|_2 \cdot \frac{\|b\|_2}{\|b\|_2}$$

$$12. (1) \text{牛顿迭代公式: } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x)}{f'(x)} \\ = x_k - \frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{3x^2 - 10x + 7}$$

$$(2) \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{3x^2 - 10x + 7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 5x^2 + 7x - 3)(6x - 10)}{(3x^2 - 10x + 7)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2 (x-3)(6x-10)}{(x-1)^2 (3x-7)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \neq 0, \quad \text{线性收敛.}$$

(3). $x=1$ 为 2 重根.

$$\text{改进牛顿公式: } x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x)}{f'(x)}$$

$$\varphi(x) = x - \frac{2f(x)}{f'(x)}$$

$$\varphi'(x) = \frac{-(3x-7)^2 - 2(x-3)(6x-10)}{(3x-7)^2}$$

$$\therefore \varphi'(1) = 0$$

且 $\varphi'(x) \neq 0$

\therefore 在 $x^*=1$ 附近平方收敛.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2018-12 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空 (每小题 3 分)

1、向量 $(1, 2, 3)^T$ 在给定的一组基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 下的坐标为 _____。

2、 \mathbb{R}^4 中的两个子空间 $W_1 = \text{span}\{a_1 = (1, 1, 0, 0)^T, a_2 = (0, 0, 1, 1)^T\}$, $W_2 = \text{span}\{a_3 = (1, 0, 0, 1)^T, a_4 = (0, 1, 1, 0)^T\}$ 的交空间 $W_1 \cap W_2$ 的维数是 _____, 基是 _____。

3、方阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 _____。

4、将多项式 $2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ 的计算改写成只需要 3 次乘法和 3 次加法的形式为 _____。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 。

三、(10 分) 多项式空间 $P_1(t)$ 的线性变换的定义为: $Tp(t) = 5p(t) + (t-1)\frac{d}{dt}p(t)$, 求 T 的特征值与特征向量。

四、(10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=1, f(1)=1, f(2)=3, f'(0)=1$, 试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 并写出误差余项。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2017-12 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

二、填空 (每小题 3 分)

1、若某近似值与 π 之间的相对误差小于 0.01%，则此近似值至少有 位有效数字 ($\pi = 3.14159265\cdots$)。

2、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ ，求 $A^4 - 9A^3 + A^2 - 8A - 4I =$ _____。

3、已知方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^3$ ，最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ ，则 A 的 Jordan 标准型为 _____。

4、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ，则 $\|Ax\|_\infty =$ _____, $\text{cond}(A)_1 =$ _____。

5、多项式空间 $P_2(t)$ 上的线性变换 T 定义为 $Tp(t) = 3p(t) - (t+1)\frac{d}{dt}p(t)$ ，则 T 在基 $\{1, t, t^2\}$ 下的矩阵为 _____。

6、用隐式 Euler 法求解初值问题

$\begin{cases} y'(x) = -5y + x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ ，取步长 $h = 0.2$ ，则 $y(0.4) =$ _____。

7、若求解某线性方程组有迭代公式 $X^{(n+1)} = BX^{(n)} + F$ ，

其中 $B = \begin{bmatrix} a & -\sqrt{a} \\ 3\sqrt{a} & -3 \end{bmatrix}$ ，则该迭代公式收敛的充要条件是 _____。

8、若求解方程的简单迭代格式 $x_{k+1} = ax_k + \frac{b}{x_k}$ 在根 $x^* = \sqrt{3}$ 附近平方收敛，

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 三、

(8 分) 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 R^3 的一个基, $V_1 = \text{span}\{2\alpha_1 + 3\alpha_2\}$,

$V_2 = \text{span}\{\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3\}$, 证明: $R^3 = V_1 \oplus V_2$ 。

四、(10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=1, f(2)=-3, f(3)=4, f'(3)=13$, 试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 并算出 $f(1)$ 的近似值 $H_3(1)$; 若还已知 $|f^{(4)}(x)| < 1 (0 \leq x \leq 3)$, 证明此近似值的绝对误差小于 0.2。

五、(10 分) 试求实数 a, b 使 $\int_0^1 (a + bx - x^2)^2 dx$ 最小, 并求出此最小值。

六、(10 分) 利用 3 次 Chebyshev 正交多项式 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ 构造三点

Gauss-Chebyshev 型求积公式:

$$\int_0^2 \frac{f(x)}{\sqrt{2x-x^2}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

并问:

(1) 所得求积公式的代数精度是多少?

(2) 用所得求积公式计算 $\int_0^2 \frac{(3x^5 + 4x^4 + 2x^2 - 1)}{\sqrt{2x-x^2}} dx$ 时截断误差是多少? 七、

(12 分) 给定线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ -4x_1 + 7x_2 - x_3 = -18.5 \\ 6x_2 + 10x_3 = -7 \end{cases}$$

(1) 试用 LU 分解法求解其方程组;

(2) 分别写出方程组的 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代矩阵, 并说明这两种迭代格式的收敛性。

八、(8 分) 讨论求解初值问题 $\begin{cases} y'(x) = \lambda y \ (\lambda < 0) \\ y(0) = a \end{cases}$ 的二阶中点公式

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right) \text{ 的稳定性。}$$

九、(8 分)试证用牛顿法求方程 $f(x) = (x^2 - a)^2 = 0$ ($a > 0$) 的根 $x^* = \sqrt{a}$ 是线性收敛的, 并将 Newton 公式变形, 使其在 $x^* = \sqrt{a}$ 附近具有局部二阶收敛性。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 矩阵论、数值分析 课程类别 ☒公共课 ☐开卷
☐专业课 考核形式 ☒闭卷

学生类别_____ 考试日期 2016-12-15 学生所在院系_____

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____

三、填空 (每小题 3 分)

1、计算 $y = 1000 + \frac{1}{1001} + \frac{1}{1002} + \cdots + \frac{1}{2000}$, 给出了两种运算顺序, (A) 从左到右相加, (B) 从右到左相加, 应选择运算顺序 () 可使计算结果接近于真值。

2、Newton-cotes 求积公式的精确程度是否一定能随着其代数精度的提高而提高? _____

3、设 $\varphi_2(x) = x^2 - x + b$ 是 $[0,1]$ 上带权 $\rho(x) = 1$ 的正交多项式, 则 $b =$ _____。

4、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$, 当 $a \in$ _____ 时, 必有分解式 $A = LL^T$, 其中 L 为

非奇异下三角矩阵, 当其对角线元素 $l_{ii} (i = 1, 2, 3)$ 满足条件 _____ 时, 这种分解是唯一的。

5、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 3 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ _____; $\|AX\|_\infty =$ _____。

6、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J =$ _____。

7、设 T 是线性空间 V 的线性变换, 已知 V 的基 $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 和 T 在 B 下

的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 则 T 的特征值为 $\lambda =$ _____; 特征向量 $\xi =$ _____。

8、设 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 是 V^3 的一个基, V^3 上的线性变换 T 将 a_1, a_2, a_3 分别映为

$-a_1 + 2a_2 + a_3, a_1 + a_2 - a_3, 2a_1 - a_2 + a_3$, 则 T 在这个基下的矩阵是 $B = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$ 。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $AP = PJ$ 。

三、(10 分) 设 V_1 和 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 和 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明 $R^n = V_1 \oplus V_2$ 。

四、(12 分) 设函数 $f(x)$ 满足表中条件:

x_k	0	1	2
$f(x_k)$	1	0	1
$f'(x_k)$		-2	0

求一个四次插值多项式 $H_4(x)$, 使其满足表中所有条件, 并给出其余项表达式。

五、(10 分) 试构造计算奇异积分 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx$ 的两点求积公式, 使其代数

精度尽可能高; 若被积函数为 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$, 问用所构造的求积公式计算, 所产生的误差为多少?

六、(10 分) 设有常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的单步法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})],$$

证明: 该方法是无条件稳定的。

七、(14 分) 给定方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

(1) 确定 a 的取值范围使方程组对应的 Jacobi 迭代收敛。

(2) 当 $a = 2$ 时, 用直接三角分解法求解方程。

八、(10 分) 已知 $x = \varphi(x)$ 的 $\varphi'(x)$ 满足 $|\varphi'(x) - a| < 1, (a > 2)$, 试问如何利用 $\varphi(x)$ 构造一个收敛的简单迭代函数 $\psi(x)$, 使 $x_{k+1} = \psi(x_k) \quad k = 0, 1, \dots$ 收敛?

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生类别 研究生 考试日期 2015-12-11 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题(每题 3 分共 24 分)

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_{\infty} =$ _____, $\rho(A) =$ _____。

2. 方阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 _____。

3. 设 $A, B \in R^{n \times n}$, 且 $\|\cdot\|$ 为 $R^{n \times n}$ 上矩阵的算子范数, 则 $\text{cond}(AB) \underline{\hspace{1cm}} \text{cond}(A)\text{cond}(B)$ 。

4. 为避免有效数字的损失, 应将 $\ln(1+x) - \ln x, x \gg 1$, 改写为 _____。

5. 已知数据 $(x_k, y_k) (k=1, 2, \dots, n)$, 用直线 $y = a + bx$ 拟合这 n 个点, 则参数 a, b 满足的法方程组是 _____。

6. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则计算 $\int_a^b f(x)dx$ 的复化梯形公式是 _____ 阶收敛的, 其代数精度为 _____。

7. 用显式 Euler 法解初值问题 $y' = -10y, y(0) = y_0$, 为保证绝对稳定性, 步长 h 应在范围 _____ 内选取。

8. $A = \begin{bmatrix} a+1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 当 a 满足条件 _____ 时, A 可作 LU 分解, 当 a 满足条件 _____ 时,

必有分解式 $A = L \cdot L^T$, 这种分解唯一吗? _____。

二、(8分) 已知 \mathbb{R}^4 中的两个子空间是 $W_1 = \text{span}\{a_1 = [1 \ 2 \ 1 \ 0]^T, a_2 = [-1 \ 1 \ 1 \ 1]^T\}$,

$$W_2 = \text{span}\{a_3 = [2 \ -1 \ 0 \ 1]^T, a_4 = [-1 \ -1 \ 3 \ 7]^T\},$$

求 $W_1 + W_2$ 及 $W_1 \cap W_2$ 的基和维数。

三、(8分) $p_1(t)$ 的线性变换的定义为: $Tp(t) = 3p(t) - (t-4)\frac{d}{dt}p(t)$, 求 T 的特征值与特征向量。

四、(8分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $g(A) = A^5 - 4A^4 + 4A^3 + 6A^2 + I$.

五、(8分) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为 *Jordan* 矩阵, 其中: $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

六、(10分) 构造一个次数 ≤ 4 的多项式 $p(x)$, 使满足下列条件 $p(1) = 4$, $p'(1) = 3$, $p''(1) = 2$, $p(2) = 7$, $p'(2) = 2$, 写出其余项. 并说明存在无穷多个次数 > 4 的多项式, 满足上述 5 个条件.

七、(8分) 已知三点 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9}f(\sqrt{0.6}) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f(-\sqrt{0.6}), \text{ 用该公式估算 } \int_{0.5}^1 \sqrt{x}dx \text{ 的值.}$$

八、(8分) 给定方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & w & w \\ 3w & 1 & 0 \\ w & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

试确定 $w \in \mathbb{R}$ 的取值范围, 使求解该方程组的 Jacobi 迭代法均收敛。

九、(8分) 用三角分解法 (Doolittle 分解) 求解线性代数方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix},$$

十、(10 分) 设 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的二重根, $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内有二阶连续导数

- (1) 证明对 $f(x) = 0$ 用 Newton 迭代法计算是局部线性收敛的.
- (2) 将 Newton 公式变形, 使其具有局部二阶收敛性.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生类别 研究生 考试日期 2014-12-16 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题 (任选 10 小题, 每小题 2 分, 共计 20 分, 多答不加分。)

1. 设 $A = \{A_{ij}\}_{3 \times 3}$ 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$ 则与 A 相似的对角

阵 $B = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$.

2. 设矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 满足等式: $A^2 + A = 2I$, 问 A 是否可对角化_____.

3. 矩阵的谱半径是指 矩阵 A 的特征值的模的最大值.

4. 矩阵特征值的根空间维数等于 该特征值的代数重度

5. 对任何非奇异矩阵 A , 都有 $\text{cond}(A)_p$ 1, 当 A 为正交矩阵时 $\text{cond}(A)_2 =$ 1.

6. 已知 $\sqrt{5} = 2.236067977499\ldots$, 则其近似值 2.23607 有 5 位有效数字, 通过四舍五入得到其有四位有效数字的近似值为 2.236.

7. 已知 $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f[0,1,2,3] =$ 1, $f[0,1,2,3,4] =$ 1.

8. 当 n 为奇数时, 等距节点的插值型 $(N-C)$ 求积公式 $I_n = (b-a) \sum_{i=1}^n C_i f(x_i)$ 至少有 n 次代数精度.

9. $\varphi(x) = x + \lambda(x^2 - 3)$, 要使迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{3}$, 则 λ 的取值范围是 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

10. 试写出方程 $f(x) = x^3 - a = 0$ 的牛顿迭代格式 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{a}{2x_k^2}$.

11. 设 (X_1, \dots, X_n) 为 $X \sim N(0,1)$ 的样本, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为次序统计量, 则

$$X_{(1)}^2 + X_{(2)}^2 + \dots + X_{(n)}^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. 给出点估计评价的三个标准_____.

13. 给出假设检验中显著性水平 α 与统计假设 H_0 的关系_____.

14. 设 (X_1, \dots, X_n) 为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知, σ^2 已知, μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧区间估计为_____.

15. 使用方差分析时对数据的要求是_____.

二、计算证明题 (任选 4 题, 每小题 10 分, 满分 40 分, 多答不加分。)

16. 已知 R^3 中的两个基底 $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, 求从 B_1 到 B_2 的基变换矩阵。

17. 设 R^4 中的向量 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$, 分别张成 $w_1 = \text{span}\{x_1, x_2\}$, $w_2 = \text{span}\{x_3, x_4\}$, 求 $w_1 + w_2$ 及 $w_1 \cap w_2$ 的基底及维数。

18. 设 T 是线性空间 V^3 的线性变换, 已知 T 在基 $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

求 T 的特征值和对应的特征向量。

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $AP = PJ$ 。

20. 设 $A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 & 0.4 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$, 问 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ 成立吗? 若成立证明之。

21. $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, 求 A 的满秩分解。

22. 设有微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = 2x_1(t) + e^{2t} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) + e^{2t} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} = x_1(t) - x_2(t) + 3x_3(t) \end{cases}$$

$x(0) = [-1, 1, 0]^T$, 求满足初始条件的特解。

23. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的奇异值分解。

三、计算证明题 (任选 4 题, 每小题 10 分, 满分 40 份, 多答不加分。)

24. 对函数 $f(0) = -1$, $f'(0) = -2$, $f(1) = 0$, $f'(1) = 10$, 试求过这 2 点的三次

Hermite 插值多项式 $H_3(x)$, 并写出插值余项的表达式。

25. 试构造两点 Gauss-Chebyshev 求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

并由此计算积分 $\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3+2x^2}{1-x^2}} dx$ 。

26. 设有常微分方程初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = a \end{cases}$ 的隐式中点公式

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_{n+\frac{1}{2}}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right), \text{ 证明该方法是无条件稳定的。}$$

27. 方程 $Ax = b$ 的系数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & 5 & 0 \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$, 问 a 取何值时, Jacobi 迭代收敛?

28. 设 (X_1, \dots, X_n) 为总体 X 的一个样本, $EX = \mu$, μ 未知。

(1) \bar{X} 是否为 μ 的无偏估计?

(2) 由 (X_1, \dots, X_n) 构造 μ 的 n 个无偏估计.

(3) 设 $\sum_{i=1}^n a_i = 1, a_i > 0, i = 1, \dots, n$.

问 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ 是否为 μ 的无偏估计, 若是 μ 的无偏估计, 确定 $a_i, i = 1, \dots, n$,

使 $\hat{\mu}$ 的方差最小。

29. 某纺织厂生产的某种产品的纤度, 设服从正态分布, 标准差 $\sigma = 0.048$, 现抽

取 5 根测得纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44, 问在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 能

否认为 σ^2 无显著变化。($\chi_{0.05}^2(4) = 0.711$, $\chi_{0.95}^2(4) = 9.488$)

30. 设有三个工厂生产同一种机械锻件，为比较这三个厂生产的锻件强度无显著差异，分别从每个厂随机抽 4 件，测得强度数据如下：

工厂	强度数据			
A_1	103	101	98	110
A_2	113	107	108	116
A_3	82	92	84	86

设第*i*个厂的强度服从 $N(\mu_i,\sigma^2)$ ， $i=1,2,3$ 。检验三个厂的平均强度有无显著差异？ $\alpha=0.05$ （ $F_{0.95}(2,9)=4.26,F_{0.95}(3,12)=3.49$ ）

31. 已知*y*与三个自变量的观察值如下表：

x_1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1
x_2	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1
x_3	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1
y	7.6	10.3	9.2	10.2	8.4	11.1	9.8	12.6

求*y*对 x_1,x_2,x_3 的回归方程。

32. 有经过 xmin 反应之后的数据如下：

x_i	1	2	3	4	5	6
-------	---	---	---	---	---	---

y_i	28.5	16.9	17.5	14.0	9.8	8.9
-------	------	------	------	------	-----	-----

设 $y = \beta_0 \beta_1^x \varepsilon$ (ε 满足回归分析条件), 求 β_0, β_1 的点估计, 并求 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 \hat{\beta}_1^x$.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷
学生类别 _____ 考试日期 2013.12.17 学生所在院系 _____
学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题: (1×10=10 分)

1. 给出三个线性变换的例子 _____.
2. 矩阵的特征值的几何重数与代数重数的关系是 _____.
3. 对 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 给出 A 的某一范数 _____.
4. 矩阵对角化可认为是矩阵 Jordan 标准型的 _____.
5. 三个节点的 Newton-Cotes 求积公式的代数精度为 _____.
6. Newton-Cotes 求积公式的精确程度能否一定随着代数精度的提高而提高? _____
7. 用非线性方程求根的 Newton 迭代法, 写出求 $\sqrt{3}$ 的近似值的一种计算格式 _____.
8. 若 $f(x) = 2x^7 + x^5 + 1$, 则 $f[0, 1, \dots, 7] =$ _____.
9. 设 (X_1, \dots, X_n) 为 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 则 $X_{(1)}^2 + \dots + X_{(n)}^2 \sim$ _____.
10. 设 (X_1, \dots, X_n) 为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知, μ 的置信概率为 $1-\alpha$ 的双侧区间估计为 _____.

二、计算证明题 (9×10=90 分)

11. 设 V_1, V_2 分别为齐次方程组 $x_1 + \dots + x_n = 0$ 和 $x_1 = \dots = x_n$ 的解空间, 问: $R^n = V_1 \oplus V_2$ 是否成立? 若成立给出证明, 若不成立给出反例.
12. 设 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为线性空间 V 的一个基底, T 为 V 上的一个线性变换. 设 T 在

$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 求 T 的特征值与特征向量。

13. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型。

14. 用 Gauss 列主元解法求下列方程组的解。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

15. 给出方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 确定 a 的范围, 使方程组对应的 Jacobi 迭代收敛。

16. 求一个次数不超过 4 的多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(0) = P'(1) = 1$, $P(1) = P'(0) = 0$,

$P(2) = 1$, 并写出其余项表达式。

17. 设 (X_1, \dots, X_n) , (Y_1, \dots, Y_n) 为分别来自 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个独立样本, X 与 Y 独立, 求 μ_1, μ_2, σ^2 的极大似然估计。

18. (1) 叙述某一非参数假设检验方法。

(2) 设有甲、乙两赌徒, 他们将一正四面体的四面分别涂为红、黄、蓝、白四种不同颜色, 作抛掷试验, 任意抛掷四面体, 直到白色一面与地面接触为止。

记录下抛掷次数, 作如此试验 200 次, 结果如下:

抛掷次数	1	2	3	4	≥ 5
频数	56	48	32	28	56

甲赌此四面体均匀, 乙赌不均匀, 找到一位统计学家, (统计学家取 $\alpha = 0.05$)

判决, 问统计学家判断谁输? ($\chi_{0.95}^2(4) = 9.488$)

19. (1) 叙述方差分析的条件。

16. 利用垂直方差公式可以做出差商。

(2) 五种粮食贮藏法，以含水量为标准，设粮食贮藏前含水量几乎无差别，贮藏后含水量如下：

含水量% 贮藏法 \ 试验号	1	2	3	4	5
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1		
A_3	8.1	6.4	7.0		
A_4	7.9	9.5	9.2	8.6	
A_5	7.1	7.5	7.3		

设粮食含水量都服从正态分布，方差相同，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问贮藏方法对粮食含水量的影响是否有显著性差异？（ $F_{0.95}(4,13) = 3.18$ ， $t_{0.975}(12) = 2.1788$ ）

20. 叙述高斯—马尔可夫条件，给出一元线性回归模型中，模型参数最小二乘估计的算法。