

CAMBRIDGE

Astrobiology

Solving Fermi's Paradox

Duncan Forgan



Предисловие

В книгу включены основные концепции и подходы, касающиеся решения парадокса Ферми (FP) и связанной с ним проблемой поиска внеземного разума (SETI). Возникновение парадокса Ферми можно рассматривать как отражение нашего стремления к познанию окружающего мира, космического пространства и Вселенной в целом. Его решение возможно на основе получения детальных астрономических данных и построения численных моделей эволюции жизни на планетах в зонах обитаемости звёзд и за их пределами, однако для окончательного объяснения и подтверждения прогнозов моделирования необходим реальный контакт по меньшей мере с одной из внеземных цивилизаций. При освещении вопроса преследовались следующие цели:

1. Дать обзор существующих подходов к решению Парадокса Ферми и выделить среди них основные вычислительные методы и численные модели, предназначенные для расчётов на компьютерах;
2. На базе имеющихся астрономических данных и с учётом экзистенциальных рисков существования высокоорганизованной материи на экзопланетах земного типа предложить концепцию динамической модели эволюции жизни и разума в нашей Галактике для решения FP путём численного эксперимента. Для этого обосновать выбор определяющих параметров появления, развития, экспансии и миграции звёздных цивилизаций II типа по Кардашеву в галактическом пространстве Млечного Пути.
3. Создать программно-алгоритмическую систему астроноологического моделирования окрестностей Солнца с радиусом в 160 световых лет в её базовом варианте для 120000 звёзд. Проанализировать результаты расчётов с возможностью экстраполяции области моделирования на всю зону обитаемости Галактики (GHZ), а также спиральные ветви и гало. Определить дальнейшее направление масштабирования численной модели для решения Парадокса Ферми с высоким уровнем надёжности.

Не претендуя на полный охват темы по данному вопросу монография предлагает *численное решение* «Парадокса Ферми», что требует привлечения, по мере накопления всё большего объёма астрономических данных, более мощных вычислительных средств. Фактически можно утверждать, что для полномасштабного решения проблем FP и SETI требуется не только расширение исследований в области астробиологии, но

и углубление понимания эволюции самой биосферы Земли, состояния человеческого общества и его движения в будущее.

Сумма рациональных знаний из различных научных дисциплин позволяет дать более обоснованные решения ГР, приблизить нас к пониманию закономерностей происхождения жизни и путей распространения разума во Вселенной.

1. Введение в Парадокс Ферми

1.1 Ферми и его парадокс

1.1.1 Главное о парадоксе

Рассмотрим галактику Млечный Путь. Это спиральная галактика с перемычками, соответствующая классу Хаббла Sbc, указывающая на то, что ее спирали относительно свободно намотаны. Он может быть разделен на несколько компонентов (по массе): перекрывающиеся толстые и тонкие диски звезд, газ и пыль со спиральной структурой, внутренняя выпуклость (и полоска), сфероидальное гало относительно старых звезд и гораздо большее гало темной материи, который является наиболее массивным компонентом и охватывает всю галактику, простираясь далеко за пределы ее видимого компонента.

Звездный диск Млечного Пути имеет диаметр около 160 000 световых лет (около 50 килопарсек или кПк) (Xu et al., 2015). Если мы рассмотрим космическую цивилизацию, которая пожелает исследовать всю галактику, то, по оценкам, она могла бы сделать это во временных рамках, τ_{explore} не более чем за сто миллионов лет и, скорее всего, намного меньше этого (мы далее рассмотрим обоснование этих оценок).

Теперь рассмотрим Землю. Его родительская звезда, Солнце, вращается вокруг Галактического Центра на расстоянии около 26 000 световых лет (около 8 кпк). Установлено, что возраст Земли, по данным радиометрического датирования цирконов, составляет не менее 4.4 млрд. Лет. Оценки возраста составляют $4.54^{+0.1}_{-0.03}$ Гуг и определяется по радиометрическому датированию метеоритов (см., например, Dalrymple, 2001). Парадокс Ферми становится понятным, если мы выражаем возраст Земли в единицах τ_{explore} :

$$\tau_{\oplus} > 4.5_{\text{explore}} \quad (1.1)$$

Парадокс лучше всего описать на языке логического аргумента. Формально логические аргументы состоят из:

- набор предпосылок, утверждений или предложений, которые считаются истинными в начале аргументации;
- набор выводов из этих посылок, полученных с использованием (например) правил пропозициональной логики, и
- вывод, утверждение или предложение, вытекающие из посылок и шагов, описанных выше.

Действительный аргумент гарантирует, что вывод верен когда предположения верны. Аргумент является обоснованным, если он обоснован и его посылки действительно верны. Таким образом, мы можем оказаться в ситуации, когда аргумент действителен, но необоснован – логический аргумент внутренне непротиворечив, но построен на явно ложных постулатах. Теперь рассмотрим следующие предположения:

Постулат 1. Люди не единственный разумный вид в Млечном Пути.

Постулат 2. Земля не является самой старой планетой земной группы в Млечном Пути.

Постулат 3. Другие разумные цивилизации способны сообщить нам о себе.

Некоторые шаги вывода могут быть следующими:

Шаг 1. Другие цивилизации существуют в Млечном Пути в настоящее время, и живут дольше, чем человечество.

Шаг 2. У других цивилизаций было более чем достаточно времени, чтобы заявить о себе нам. С окончательным выводом:

Шаг 3. У людей должны быть доказательства существования других цивилизаций в Млечном Пути.

«Парадокс» заключается в том, что общий вывод ошибочен: у людей нет доказательств существования других разумных цивилизаций, несмотря на обоснованность (и кажущуюся обоснованность) приведенного выше аргумента. Как будет ясно тем, кто знаком с формальной логикой, этот аргумент на самом деле не представляет собой парадокса, как мы обсудим ниже. Это веский аргумент, который приводит к выводу, который противоречит астрономическим наблюдениям и другим научным данным. Мы можем решить эту проблему, либо показав ложность одной или нескольких посылок, сделав аргумент необоснованным, либо показав, что один из шагов вывода либо ложен, либо не вытекает логически из посылок.

1.1.2 Парадокс не Ферми и это не Парадокс

По правде говоря Парадокс Ферми в своей основе не принадлежит Ферми, и как мы увидели в предыдущем разделе, формально это не парадокс. Его лучше было бы описать как вопрос Ферми, дилемма Ферми-Харта, аргумент Харта-Типлера или даже, как предложил Уэбб (2002), парадокс ‘Циолковского-Ферми-Вьюинга-Харта’, отдавая Циолковскому приоритет в описании концепции Парадокса Ферми в начале 1930х. Однако ярлык ‘Парадокс Ферми’ общепринят в литературе и в сообществе поиска внеземного разума (SETI), поэтому мы будем использовать это наименование.

Истоки того, что сейчас называют парадоксом Ферми, обычно восходят к ставшему легендарным разговору за обедом в Лос-Аламосской национальной лаборатории в 1950 году между Энрико Ферми, Эмилем Конопински, Эдвардом Теллером и Гербертом Йорком, все четверо из которых были глубоко вовлечены в разработку ядерных технологий. Собственные воспоминания Ферми об этом разговоре не сохранились (Ферми умер в 1954 году). Нашим единственным источником являются более поздние разговоры с другими участниками (Джонс, 1985; Грей, 2015). Время разговора подтверждается показаниями, которые указывают на то, что он предшествовал «выстрелу Джорджа» 8–9 мая 1951 года, испытанию ядерной бомбы, которое оказалось решающей вехой в разработке термоядерного оружия. Конопински вспомнил, как присоединился к остальным, когда они шли на обед:

Когда я присоединился к группе, я услышал, что обсуждаются доказательства существования летающих тарелок. Это сразу же напомнило мне карикатуру, которую я недавно увидел в журнале «Нью-Йоркер» с объяснением, почему общественные мусорные баки исчезают с улиц Нью-Йорка. На карикатуре было показано, что на заднем плане, очевидно, виднелась летающая тарелка, а к ней устремлялись «зеленые человечки» (наделенные антеннами), несущие мусорные баки. Завязалась дискуссия о том, могут ли тарелки каким-то образом превысить скорость света. (Gray, 2015, p. 196)

Карикатура также помогает нам определить более позднюю дату разговора, ближе к лету 1950 года. Мы уже можем видеть здесь зачатки логических аргументов, которые составляют основу парадокса Ферми. Говорят, что затем Ферми спросил Теллера:

Эдвард, как ты думаешь? Насколько вероятно, что в течение следующих десяти лет мы получим материальные доказательства существования объектов, движущихся со скоростью, превышающей скорость света? (Jones, 1985, p. 2)

Оценка вероятности Теллером была пессимистичной (10^{-6} , т. е. один на миллион). Ферми предполагал вероятность 10%, и это стало темой споров, пока группа не села за обед (счета расходятся в зависимости от общего числа присутствующих). Разговор перешёл на другие темы. Отчеты достигают консенсуса в следующий момент, когда Ферми произнес вдруг:

А где они все?

(Jones, 1985, p. 3)

Точная формулировка вопроса также вызывает сомнения, но в его сути все согласны. Куда развернулась дискуссия после этого замечания, также неясно. Теллер отверг значение того, что было сказано дальше:

Не думаю, что из этого разговора что-то вышло, кроме разве что утверждения о том, что расстояния до следующего местонахождения живых существ могут быть очень велики и что действительно, что касается нашей галактики, то мы живем где-то на задворках, далеко удаленных от агломерации галактического центра.

(Jones, 1985, p. 3)

Йорк предположил, что Ферми продолжил оценку (в своем теперь знаменитом стиле) вероятности существования планет земного типа, вероятности появления жизни на этих планетах, вероятности существования разумных существ и так далее. Как мы вскоре увидим, эти факторы являются прямыми предшественниками членов уравнения Дрейка. Признание Йорка, что его воспоминания об этом моменте были «смутными», может привести к выводу, что воспоминания Йорка о 1950 году перепутаны с последующими событиями 1960-х годов, что вполне правдоподобно.

Так какое же место в этой истории занимают Харт и Типлер? Майклу Харту приписывают формулировку парадокса Ферми в его сегодняшнем понимании, однако он не получил должного признания. В своей статье «Объяснение отсутствия инопланетян на Земле» Харт (1975) заявляет об «А факте» – отсутствии доказательств существования на Земле разумных существ, кроме людей. Его аргумент прост: если разумные существа существуют и способны путешествовать в космосе, то Млечный Путь может быть колонизирован за время, меньшее по сравнению с возрастом Земли, и, следовательно, кажется, что разумные существа уже должны быть здесь, но это не так. Согласно А факту Харт начинает перечислять несколько возможных решений этого несоответствия и одним из первых публикует работу о том, что мы теперь называем парадоксом Ферми.

Типлеру обычно приписывают наряду с Хартом формулировку, пожалуй, наиболее убедительной формы парадокса. Он называет универсальный конструктор или машину фон Неймана идеальным устройством для исследования галактики. По сути, это компьютеры, способные к запрограммированному самовоспроизведению. Один зонд может экспоненциально вырасти в целый флот зондов, способных быстро исследовать весь Млечный Путь (подробнее мы углубимся в разделе 20.1).

Типлер утверждает, что любой разумный вид, способный к межзвездному общению, в конечном итоге создаст устройства фон Неймана, и поэтому, если существуют другие разумные существа, весьма вероятно, что Млечный Путь уже исследован. Затем Типлер ссылается на А факт Харта, чтобы настаивать на том, что внеземного разума не существует и, следовательно, усилия SETI бесплодны (см., например, Tipler, 1993).

Эта формулировка во многом считается наиболее строгой формой парадокса Ферми, поскольку она не зависит от продолжительности жизни цивилизации. После запуска первого зонда исследования продолжаются даже после гибели цивилизации. Он также учитывает технологические траектории, по которым следуют люди, за счет большей автоматизации и самодостаточности вычислительных процессов. Таким образом, кажется очевидным, что парадокс Ферми силен, и любое его решение также должно быть сильным.

Но это не парадокс, по крайней мере, в том смысле, в котором он определяется формальной логикой. В этом случае парадокс — это набор предложений, который приводит к амбивалентному или противоречивому выводу (т. е. окончательное утверждение может быть либо истинным, либо ложным, либо и тем, и другим). Классическим примером парадокса является парадокс лжеца, изложенный в одном предложении:

Приговор - ложный.

Если вышесказанное правда, тогда да, приговор - ложный. А если ложь, тогда приговор - истинный. Или парадокс про «парикмахера, который бреет всех, кто не бреется сам - должен ли он брить себя?»

Парадокс Ферми не удовлетворяет ни этому определению парадокса, ни любому другому его, более разговорному определению (например, «концепция, содержащая взаимоисключающие или противоречивые аспекты»). В лучшем случае оно описывает логический аргумент, который является действительным, но необоснованным. Фраза «парадокс Ферми», по-видимому, была придумана Стивенсоном (1977). Статус знаменитости Ферми, а также драматическая привлекательность слова «Парадокс» успешно внедрились в воображение как ученых, так и широкой публики, даже если это не совсем правильное описание концепции. Для удобства мы продолжим описывать рассматриваемую проблему как «Парадокс Ферми».

1.2 Дрейк и его уравнение

В 1958 году Фрэнк Дрейк, недавний аспирант Гарвардского университета, принял должность научного сотрудника Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в Грин-Бэнк, Западная Вирджиния. Радиоастрономия в Соединенных Штатах находилась в зачаточном состоянии – Дрейк был лишь третьим человеком, занявшим свою должность в Green Bank, который сам был основан всего два года назад. Во время учебы в аспирантуре Дрейк рассчитал, что военный радар мощностью 1 мегаватт может связываться с аналогичной системой на расстоянии примерно 10 световых лет.

Дрейк убедил временного директора NRAO Ллойда Беркнера использовать 26-метровую радиоантенну Грин-Бэнка для поиска искусственно созданных сигналов при условии, что это будет происходить тихо и что наблюдения дадут данные, полезные для традиционной астрономии. Начав то, что он назвал «Project Ozma», Дрейк нацелился на две звезды, Тау Кита и Эпсилон Эридана, для искусственной передачи. Его подготовка совпала с публикацией основополагающей статьи Коккони и Моррисона (1959) «Searching for Interstellar Communications». Его наблюдения в 1960 году не выявили никаких признаков внеземного разума, но его публикация об этой попытке положила начало множеству мыслителей в отношении концепции разумной жизни. В 1961 году в Грин-Бэнке была созвана неофициальная встреча для обсуждения возможности обнаружения разумной жизни. Пытаясь сфокусировать дискуссию, Дрейк записал на доске свое теперь знаменитое уравнение.:

$$N_c = R_* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L \quad (1.2)$$

Количество цивилизаций, излучающих сигналы в любой момент времени, N_c , связано с:

R^* – скорость звездообразования, звезд в год.

f_p – доля звезд, имеющих планетные системы.

n_e – среднее количество обитаемых планет в планетной системе.

f_l – доля обитаемых планет на которых есть жизнь, они обитаемы.

f_i – доля обитаемых планет с разумными цивилизациями.

f_c – доля разумных цивилизаций, способных излучать сигналы.

L – среднее время жизни цивилизации, передающей сигналы.

Каждый из этих семи параметров на протяжении многих лет принимал различные значения в зависимости от современных знаний о формировании звезд и планет, а также довольно субъективных мнений относительно эволюции жизни, интеллекта и долговечности цивилизаций. Оптимисты обычно вводят относительно большие значения исходных параметров, в результате чего $N_c \approx L$, т. е. количество существующих сигналов чувствительно только к длительности их передачи. Более строгая аргументация может легко дать $N_c < 10^{-10}$, что указывает на то, что мы, вероятно, останемся одни в Галактике.

Из-за неопределенности в оценке его параметров стоит отметить, что Дрейк, да и другие участники SETI, рассматривают уравнение Дрейка как полезный инструмент для фактического расчета количества разумных цивилизаций, которые мы должны ожидать обнаружить по ряду причин. У уравнения есть две основные проблемы: его фиксация в пространстве и времени. Он неявно предполагает, что устойчивое состояние рождения и

гибели цивилизации сохраняется по всему Млечному Пути. В более широком смысле, предполагается, что астрофизические ограничения на рождение и гибель цивилизаций также достигают устойчивого состояния во всех представляющих интерес местах.

Каждому, кто имеет представление об астрономии, сразу становится ясно, что за исключением некоторых физических констант Вселенную нельзя описать как постоянную ни в пространстве, ни во времени. Состав Вселенной постоянно меняется, и это ясно видно на примере Млечного Пути. Склонность Млечного Пути к образованию пригодных для жизни планет, безусловно, сильно изменилась с тех пор, как первоначальная дисковая структура Галактики сформировалась около 10 миллиардов лет назад (Haywood et al., 2016), и, вероятно, появятся регионы, более благоприятные для разумной жизни (Haywood et al., 2016), чем другие (см. раздел 4.2.2). Можно позволить семи факторам развиваться со временем, создавая ряд взаимодействующих цивилизаций, которые также меняются со временем, $N_c(t)$, но построение функций для описания временной зависимости каждого параметра является сложной задачей. Многие авторы обсуждали, каким образом различия в нашем понимании процесса звездообразования в Млечном Пути (т.е. форма $R^*(t)$ и свойства начальной функции масс (в широком смысле, вероятностное распределение звездной массы) могут привести к изменению N_c , сильно меняющемуся во времени.

Также ясно, что доступность химических элементов с атомными номерами больше, чем у гелия (то, что астрономы называют металличностью) сильно меняется со временем, поскольку несколько поколений звездообразования создают более тяжелые элементы посредством ядерного синтеза, которые затем выбрасываются при смерти звезды. Достаточно богатая химия является предпосылкой для пребиотических молекул (а впоследствии и жизни), поэтому функция, описывающая f_l , будет содержать член, который растет вместе с ростом металличности. Эти эволюционные тенденции заставили многих предположить, что парадокс Ферми возникает из-за влияния времени, как мы увидим в разделе 18.2.

Даже если для каждой переменной будут найдены подходящие функции, уравнение Дрейка все равно не сможет указать нам, где искать технологические цивилизации. Манипулирование уравнением Дрейка, возможно, не даст более полезного выражения, но оно может дать понимание. Масcone (2012) отмечает, что мы могли бы рассмотреть расширенную форму уравнения, в которой семь факторов выражаются как большое (фактически бесконечное) количество подфакторов X_i . Уравнение теперь будет состоять из следующего произведения:

$$N_c = \prod_i X_i \quad (1.3)$$

Давайте предположим, что каждый фактор X_i является случайной величиной. Если мы возьмем логарифм этого уравнения:

$$\log N_c = \sum_i \log X_i \quad (1.4)$$

тогда нам дается представление о свойствах N_c через Центральную предельную теорему. Рассмотрим набор независимых случайных величин $[X_i]$, которые могут иметь произвольные распределения вероятностей со средним значением μ_i и дисперсией σ_i^2 . Центральная предельная теорема гарантирует, что выборочное среднее этих случайных величин само по себе является случайной величиной с гауссовым распределением (при условии, что дисперсии конечны). Это означает, что $\log N_c$ имеет нормальное распределение или, что то же самое, N_c имеет логнормальное распределение. Более того, параметры, определяющие распределение N_c , определяются параметрами, определяющими X_i :

$\mu_N = \frac{1}{N} \sum_i \mu_{X_i}$	(1.5)
$\sigma_N^2 = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_{X_i}^2$	(1.6)
Таким образом, среднее число цивилизаций равно	
$\bar{N} = e^{\mu_N} e^{\sigma_N^2/2}$	(1.7)

В том же духе Глейд (Glade et al., 2012) предложил моделировать появление цивилизаций как точечный процесс Пуассона, где временной интервал между появлением цивилизаций распределен по Пуассону. Как и подход Макконе, этот метод имеет то преимущество, что описывает уровень неопределенности в результирующих параметрах. Это также приводит к пуассоновскому распределению вероятностей для N_c в любой момент времени t . Эквивалентно:

$P((N(t + \Delta t) - N(t)) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$	(1.8)
---	-------

Прантзос (Prantzos, 2013) провел совместный анализ уравнения Дрейка и парадокса Ферми, где оба были описаны довольно просто (уравнение Дрейка использовалось для определения вероятности радиоконтакта, а парадокс Ферми применялся к галактической колонизации). Моделируя как фронт

колонизации, так и количество жизнеспособных двусторонних переговоров в зависимости от

$$f_{biotech} = f_i f_c$$




Рисунок 1.1 Совместный анализ Prantzos (2013) уравнения Дрейка и парадокса Ферми. Учитывая сжатые параметры уравнения Дрейка $f_{biotech}$ (см. текст) и L , можно определить области пространства параметров, которые приводят к полностью заполненной Галактике, где мы должны ожидать увидеть признаки ЕТІ (вверху справа). В левом нижнем углу факт А может быть объяснен просто - либо редкостью цивилизаций, либо невозможностью колонизации в короткие сроки.

(где астрофизические параметры фиксированы), Прантзос определяет важное пространство параметров в $f_{biotech}$ и L , где Парадокс Ферми практически сильный (Рисунок 1.1). Вкратце, если существует N_c цивилизаций, способных колонизировать сферические объемы с заданной скоростью (т.е. каждая цивилизация занимает сферу радиусом $v_{col} L$), то существует типичное значение L , при котором весь галактический объем занят, и парадокс Ферми проявляется в полной мере (верхняя правая часть рисунка 1.1).

Основная функция уравнения Дрейка — это дорожная карта. Он выявляет препятствия на пути к нашим знаниям и проливает свет на наше

собственное невежество. Действительно, когда Дрейк впервые написал это уравнение, с какой-либо степенью уверенности понимался только первый член. Следующие два коэффициента стали доступны нам только в последние двадцать лет. Оптимист скажет, что поток знаний продолжает двигаться слева направо и что со временем все семь членов уравнения Дрейка будут поняты с некоторой точностью.

В чем сходятся и оптимисты, и пессимисты, так это в глубоких последствиях структуры уравнения Дрейка. В крайнем левом углу ее условия диктуются физическими науками – сначала физикой и астрономией, затем химией, геологией и биологией. Тогда фракции справа, описывающие разумную жизнь, требуют участия социальных и гуманитарных наук – антропологии, психологии, лингвистики, социологии и так далее.

Уравнение Дрейка напоминает нам, что SETI требует всех научных знаний, чтобы понять феномен разумной жизни во Вселенной. Наука SETI — это наука о состоянии человека, обобщенная и охватывающая все формы разумной жизни.

1.3 Большой фильтр

До сих пор мы сосредоточились на одном конкретном выражении проблемы, заключенной в парадоксе Ферми. Конечно, это не единственный способ описать это. Аргументация «Парадокса» мотивирована в основном физикой и астрономией, но другие дискуссии о том, что Брин называет «Великим молчанием», основаны на других дисциплинах.

Большой фильтр - одна из таких альтернатив, и он основан на концепции экзистенциального риска. Следуя Бострому (2002), мы можем определить риск, связанный с конкретным событием, с точки зрения трех свойств: масштаба, интенсивности и вероятности. Другими словами, мы хотим знать, насколько вероятно, что произойдет событие, насколько масштабными могут быть его последствия и связанный с ними уровень опасности или ущерба.

Экзистенциальный риск затрагивает всё человечество и угрожает его дальнейшему существованию, то есть он имеет широкий масштаб и высокую интенсивность. Конечно, вероятность возникновения одних рисков выше, чем других. Без возникновения таких рисков, по всей видимости, человечество расширит свою территорию за пределы Земли, обеспечив себе тем самым дальнейшее выживание. Если такие существа, как мы, начнут доминировать в Млечном Пути в течение нескольких миллионов лет, как объяснить их отсутствие, используя концепцию экзистенциального риска?

Хансон предложил существование Большого Фильтра в качестве решения. Если мы рассмотрим некоторые из важнейших этапов, которые жизнь проходит на пути к разумной жизни, и если вероятность наступления любого из этих этапов мала, то этот этап и есть Большой Фильтр — барьер,

который миры не могут преодолеть на пути к возникновению разумной жизни. Мы видим, что эта концепция очень похожа на те, которые предлагали Ферми, Харт, Типлер и Дрейк, но рассматривается через призму экзистенциального риска.

Хансон перечисляет девять этапов, но нет единого мнения о том, что должно входить в этот список, и любой подобный список вряд ли будет исчерпывающим. Первые восемь этапов несут в себе экзистенциальный риск не наступления. Например, если то, что Хансон называет «репродуктивным чем-то», под чем они подразумевают самовоспроизводящиеся молекулы, такие как РНК, и способность наследовать признаки, не произойдет, то будущее существование разумной жизни окажется под угрозой.

Последний этап, описанный Хансоном, несёт в себе экзистенциальный риск, и, по сути, это обобщающий термин для того, что изучают большинство экспертов по экзистенциальным рискам: риск самоуничтожения человеческой цивилизации. В этот этап втиснуты десятки решений парадокса Ферми, все они основаны на предположении о самоуничтожении технологических цивилизаций и очень низкой средней продолжительности их существования.

Важным результатом этой аргументации являются выведенные из неё последствия открытия примитивной жизни. Традиционно это считалось бы очень позитивным признаком для человечества, но Хансон демонстрирует, что это палка о двух концах. Чтобы понять почему, мы должны задать вопрос: Большой Фильтр — это наше прошлое или наше будущее? Если Великое Молчание будет продолжаться, то мы, возможно, сможем отнести Большой Фильтр к нашему прошлому и спокойно вздохнуть с облегчением, наслаждаясь нашим непреднамеренным превосходством в выживании.

Если Великое Молчание будет нарушено, то Большой Фильтр окажется в нашем будущем. В настоящее время у нас нет данных, подтверждающих положение Большого Фильтра, поэтому вместо этого мы должны рассмотреть вероятность того, что он находится в нашем будущем. Стоит отметить, что с байесовской точки зрения выбор априорных распределений становится важным (Verendel and Häggström, 2015).

Вкратце, существуют два основных подхода к оценке вероятности событий: частотный подход и байесовский подход. В частотном подходе вероятность события зависит от того, как часто ожидается, что это событие произойдет, если мы подвергнем мир большому количеству испытаний.

В байесовском подходе вероятность наступления события A при условии, что событие B уже произошло, $P(A|B)$, может быть определена с помощью теоремы Байеса:

$P(A B) = \frac{P(B A)P(A)}{P(B)}$	(1.9)
------------------------------------	-------

Это, по сути, довольно простая переформулировка простого правила вероятности:

$P(A B)P(B) = P(B A)P(A) (= P(A \cap B))$	(1.10)
---	--------

где $P(A \cap B)$ представляет собой вероятность того, что события A и B произойдут одновременно. Мощност теоремы Байеса заключается в том, что её можно использовать для описания способности модели M , определяемой параметрами θ , соответствовать данным текущего эксперимента или наблюдения, D :

$P(\theta D) = \frac{P(D \theta)P(\theta)}{P(D)}$	(1.11)
---	--------

$P(D|\theta)$ — это вероятность того, что данные произойдут при условии, что модель верна. $P(\theta)$ — это априорное распределение (оценка степени уверенности в наборе параметров θ , возможно, с учетом предыдущих экспериментов).

Таким образом, теорема Байеса становится надежным инструментом для обновления апостериорного распределения $P(\theta|D)$ с учетом предыдущих данных (априорного распределения) и текущих данных (через функцию правдоподобия). Знаменатель часто называют свидетельством и можно интерпретировать как константу нормализации для функции правдоподобия:

$P(D) = \int_M P(D \theta)d\theta$	(1.12)
------------------------------------	--------

Применение теоремы Байеса к комбинации априорного распределения/вероятности/доказательств дает апостериорное распределение, которое само может стать априорным распределением для следующего применения теоремы Байеса, что приводит к новому, более точному апостериорному распределению. Например, оценка вероятности выпадения числа 2 на игральной кости, если она была подготовлена для выпадения числа 6, будет происходить следующим образом. Разумным первым априорным распределением является предположение, что все грани игральной кости одинаково вероятны ($P(\theta) = 1/6$ для любого θ). Это называется равномерным или плоским априорным распределением. По мере многократного бросания игральной кости и появления ясности, что не все

значения одинаково вероятны, это априорное распределение постепенно модифицируется до тех пор, пока модель не предскажет, что вероятность выпадения числа 6 выше, чем вероятность выпадения остальных пяти вариантов. Теперь рассмотрим упрощенную перефразировку Большого фильтра:

$$N f_l f_i f_{sup} \leq 1 \quad (1.13)$$

где N - общее число пригодных для жизни планет, f_l - доля планет, на которых развивается примитивная жизнь, f_i - доля планет, которые становятся разумными, и f_{sup} - доля планет, которые становятся заметными технологическими цивилизациями. Считается, что N велико, поэтому теперь мы должны присвоить значения остальным параметрам f в диапазоне $[0,1]$, эффективно распределяя вероятности того, что данная пригодная для жизни планета будет живой, разумной и явно разумной соответственно.

Первоначальный байесовский подход к этой проблеме состоял бы в том, чтобы присвоить одинаковые значения всем трем f -членам, т.е. эти параметры имеют равную вероятность принятия любого значения в диапазоне $[0,1]$. Применение теоремы Байеса для получения апостериорного распределения для f_{sup} , по сути, является нашей мерой эффективности Большого Фильтра, и эта мера меняется в зависимости от нашей информации о Вселенной. Если Великое Молчание сохраняется, то при увеличении N апостериорное распределение для f_{sup} , естественно, резко уменьшается. Если мы начинаем получать данные о f_l (т.е. обнаруживаем примитивную жизнь на другой планете), то в результате апостериорное распределение для f_{sup} снижается еще более резко. Именно по этой причине некоторые философы были бы глубоко встревожены, если бы мы обнаружили второе место происхождения жизни, например, на Марсе.

Эта картина может кардинально измениться, если мы выберем другое начальное значение. Например, если факторы f не являются независимыми друг от друга. Открытие другой разумной цивилизации может затем распространяться по всем трем факторам по мере того, как мы обновляем апостериор, что потенциально дает нам надежду, если мы обнаружим признаки жизни в других мирах.

2 Факт А – Великое молчание

Очевидно, что существование Парадокса полностью основано на Факте А – что у нас нет доказательств существования разумной жизни за пределами Земли (то, что Брин в 1983 назвал Великим Молчанием). Но как получить эти доказательства? Факт А имеет два аспекта: отсутствие доказательств существования инопланетного разума на Земле и отсутствие инопланетного разума за пределами Земли.

Первый этап – это исследования геологов и археологов. Мы вернемся к этому несколько позже, когда будем обсуждать более дикие (и фактически ошибочные) утверждения о «древних пришельцах» в главе 26. Сейчас нам следует рассмотреть второй аспект, который является прерогативой астрономов и ученых-космонавтов. Наблюдательные поиски внеземного разума (SETI) проводились в основном в радио- и видимой частях электромагнитного спектра. В последних главах этой книги мы обсудим будущие исследования, охватывающие другие части спектра. А пока мы сосредоточимся на истории наблюдательного SETI. Tarter (2007) определяет девятимерное пространство поиска искусственных сигналов:

- **Направление** – Сигнал будет исходить из какой-то точки неба, которую мы представляем в двух измерениях. Обычно небесная сфера описывается через экваториальную систему координат, в которой используются прямое восхождение (иногда RA или α) и склонение (Dec или δ). Они в некоторой степени эквивалентны долготе и широте соответственно, но их определение предназначено для того, чтобы гарантировать, что положение звезды (α , δ) не изменится, если изменится положение наблюдателя на Земле или когда Земля движется по своей орбите вокруг Солнца. Давайте сначала определим небесный экватор как плоскость, содержащую экватор Земли, а небесный северный полюс как вектор, направленный на север и перпендикулярный этой плоскости (и аналогично для небесного южного полюса). Склонение объекта (δ) — это просто угол, образуемый между небесным экватором и земным шаром как




Рисунок 2.1 Экваториальная система координат. Небесная сфера определяется небесным экватором (плоскостью, содержащей экватор Земли), небесными северным и южным полюсами, перпендикулярными этой плоскости, и контрольным местоположением на экваторе (точка весеннего равноденствия). Затем с помощью этой системы можно рассчитать прямое восхождение α и склонение δ с соответствующим расчетом часового угла, который учитывает вращение Земли.

вектор, соединяющий Землю с объектом на небесной сфере. Прямое восхождение (α) требует от нас нарисовать на небесной сфере большой круг, соединяющий объект и северный полюс мира (известный как часовой круг), а затем вычислить угол между плоскостью, на которой лежит этот часовой круг, и исходное положение вдоль небесного экватора.

Стандартное исходное положение известно как точка весеннего равноденствия и определяется с использованием плоскости Солнечной системы (см. Рисунок 2.1). Точнее, оно определяется с использованием видимого пути, по которому Солнце следует в течение года, известного как эклиптика. Ось вращения Земли не совпадает с осью ее орбиты (т. е. имеет ненулевой наклон). В результате эклиптика в течение года перемещается по небу на север и юг. Весеннее равноденствие относится к моменту (и месту на орбите Земли), когда движение Солнца пересекает небесный экватор (двигаясь на юг). В результате это также относится к дню года, когда дневная и ночная составляющие 24-часового интервала времени равны (отсюда и название «равноденствие», которое примерно переводится от латинского корня *aequinoctium* как «равная ночь»).

Прямое восхождение точки весеннего равноденствия определяется как ноль. Однако вращение Земли вокруг своей оси требует от нас также определения времени наблюдения любого небесного объекта. Определяется часовой угол объекта на небе.

$$H = UTC - \lambda_{\text{observer}} - \alpha \quad (2.1)$$

где UTC — всемирное координированное время (более или менее эквивалентное среднему времени по Гринвичу, хотя и измеряемое по-другому), $\lambda_{\text{observer}}$ — долгота наблюдателя на поверхности Земли.

- **Расстояние** – Это имеет два решающих воздействия на любой сигнал: во-первых, электромагнитные сигналы затухают с расстоянием D как $1/D^2$, и, следовательно, слабый сигнал в конечном итоге становится невидимым для наших детекторов, и, во-вторых, электромагнитные сигналы вынуждены распространяться не быстрее, чем скорость света c . Следовательно, сигнал, полученный с расстояния D , потребует времени прохождения $t = D/c$, и, следовательно, любой полученный сигнал будет содержать информацию из момента времени t в прошлом.
- **Уровень сигнала** – Неважно как мы проводим измерения, наше оборудование будет иметь минимальный предел чувствительности. Сигнал излучается с некоторой мощностью P на расстоянии D и принимается на Земле. Уровень сигнала, измеренный на Земле P_{Earth} равен

$P_{\text{Earth}} = \frac{PGA}{4\pi D^2}$	(2.2)
---	-------

Эффективная изотропная излучаемая мощность PG состоит из мощности и коэффициента усиления G передающей антенны. Коэффициент усиления описывает, насколько хорошо сфокусировано излучение. В терминах телесного угла:

$G = \frac{4\pi}{\Omega}$	(2.3)
---------------------------	-------

Измерительные системы с большой площадью сбора A могут обнаруживать гораздо более слабые сигналы. Обратите внимание на вырождение между P и D – слабые передачи на близком расстоянии могут давать значение P_{Earth} , равное значению сильной передачи на гораздо больших расстояниях.

- **Время** – Мы должны вести поиск в момент, когда сигнал достигает Земли. Даже если передача непрерывна в течение значительного временного интервала (скажем, 300 лет), и этот интервал начинается в 1300 году, люди не смогут её принять. Передачи, достигающие Земли в современную эпоху, всё ещё могут страдать от плохой синхронизации. Энергоэффективные схемы передачи предпочитают импульсы, а не

непрерывные сигналы (Benford et al., 2010). Это добавляет ещё один фактор к аргументам о синхронизации — попытки прослушивания, которые полностью осуществляются в интервале между импульсами, не смогут обнаружить сигнал..

- **Поляризация** – Квант электромагнитного излучения состоит из связанных осциллирующих электрического и магнитного полей (см. Рисунок 2.2). В свободном пространстве электрическое и магнитное поля ограничены перпендикулярностью друг другу. Поляризация относится к ориентации электрического поля. Хотя многие детекторы нечувствительны к этой ориентации, поляризацию можно использовать для кодирования информации, и она действительно кодирует информацию о событиях рассеяния, которые фотоны могли получить на пути к детектору.




Рисунок 2.2 Электромагнитное поле излучения, состоящее из перпендикулярно колеблющихся электрического и магнитного полей.

Определение поляризации может иметь решающее значение для наблюдателей при определении того, является ли сигнал естественным или искусственным.

Рассмотрим фотон, движущийся в направлении оси z, с электрическим полем, заданным формулой

$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)}$	(2.4)
---	-------

А магнитное поле задано формулой

$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)}$	(2.5)
---	-------

(2.5)

Следует отметить, что компоненты E_x , E_y , B_x , B_y могут быть комплексными. Ориентация электрического поля как функция времени может быть закодирована в параметрах Стокса (I , Q , U , V):

$I = E_x^2 + E_y^2 $	(2.6)
$Q = E_x^2 - E_y^2 $	(2.7)
$U = 2\Re(E_x E_y^*)$	(2.8)
$V = -2\Im(E_x E_y^*)$	(2.9)

I — интенсивность излучения; Q и U обозначают степень линейной поляризации (в плоскостях, расположенных под углом 45° друг к другу); а V обозначает степень круговой поляризации (см. рис. 2.3). Мы используем $\Re$ и $\Im$ для обозначения действительной и мнимой частей вышеуказанных величин. В общем случае

$I^2 \geq Q^2 + U^2 + V^2$	(2.10)
----------------------------	--------

Если свет линейно поляризован (в данном случае $U = 0$), то две компоненты электрического поля можно представить следующим образом:




Рисунок 2.3 Схема различных форм поляризации с соответствующими значениями параметров Стокса (I, Q, U, V).

$E_x = \sqrt{\frac{1+Q}{2}}$	(2.11)
$E_y = \sqrt{\frac{1-Q}{2}} e^{i\phi}$	(2.12)

где φ — разность фаз.

Если разность фаз постоянна, то электрическое поле вынуждено колебаться в плоскости, и, следовательно, электрическое поле линейно поляризовано (либо параллельно оси x при $Q = 1$, либо перпендикулярно, если $Q = -1$). Если свет неполяризован, вектор электрического поля ориентирован случайным образом (или, эквивалентно, разность фаз φ изменяется случайным образом). Если разность фаз плавно изменяется во времени, то свет циркулярно поляризован (при этом левая и правая циркулярная поляризация обозначают, плавно ли увеличивается или уменьшается разность фаз).

Космическое излучение может быть как поляризованным, так и неполяризованным в зависимости от источника. Как правило, звездное излучение неполяризовано, хотя отраженный от звезд свет (например, от атмосферы планеты) обычно поляризован. Синхротронное излучение (которое возникает, когда электроны движутся по спиральным орбитам вокруг линии магнитного поля) может быть как линейно поляризованным, так и круговым в зависимости от точки зрения наблюдателя.

Детекторы могут быть нечувствительны к поляризации и принимать свет всех поляризаций без дискриминации. Другие могут быть чувствительны только к одной поляризации (или к одной поляризации в любой момент времени) или действовать как поляриметры, позволяя определять параметры Стокса входящих фотонов.

- **Частота** — Электромагнитный спектр охватывает множество порядков величины. Межзвездная среда, разреженная пылевая плазма, существующая между звездами, накладывает ограничения на частоты света, которые могут быть использованы для связи. Это ограничение вряд ли полезно — допустимый диапазон частот составляет приблизительно 10^5 – 10^{29} Гц (или, эквивалентно, длины волн приблизительно 10^{-10} нм–3 км). Как мы увидим, определенные полосы в этом обширном диапазоне предоставляют значительные преимущества для передачи, и поэтому ученые, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций (SETI), как правило, проводят наблюдения именно в этих полосах.
- **Модуляция** — Фактически это второе, отдельное параметрическое пространство, ограниченное скорее изобретательностью передатчика, чем другими факторами. Модуляция сигнала является основным средством кодирования информации. «Маяк» может быть таким же простым, как мощная узкополосная передача, но содержать очень мало информации. Модуляция сигнала позволяет кодировать информацию. Успешная схема кодирования требует от приемника способности декодировать сигнал —

что еще важнее, он должен распознавать сигнал как сигнал. По мере того, как в сигнал кодируется все больше информации, он начинает напоминать шум, и его становится сложно отделить от фона.

Для того чтобы наши наблюдения были полными, мы должны эффективно и точно исследовать все девять измерений этого параметрического пространства. Масштаб этого предприятия предполагает, что действительно полное исследование внеземных цивилизаций (SETI) находится в далеком будущем, и это может указывать на то, что любая попытка окажется бесплодной. Часто встречающийся аргумент пессимистов, выступающих против контактов (тех, кто не считает обнаружение внеземных цивилизаций вероятным), заключается в том, что SETI — это проект, обреченный на провал, а значит, это пустая трата времени и денег.

Я бы отнес себя к контактным пессимистам, однако я вижу очевидные причины для проведения тщательных, детальных исследований внеземных цивилизаций в Млечном Пути. Во-первых, мы должны помнить о научном методе. Недостаточно просто выдвинуть гипотезу и не проверить ее ни наблюдением, ни экспериментом. Есть те, кто утверждает, что наши наблюдения на сегодняшний день достаточно полны, чтобы отвергнуть гипотезу о том, что люди не одиноки в Млечном Пути, но мне кажется очевидным, что это не так.

Неполный поиск все же предоставляет нам данные для ограничения наших теорий. Прекрасным примером являются самые последние ограничения, наложенные на цивилизации типа III Кардашева в результате инфракрасных исследований далеких галактик (Гарретт, 2015). Этот обзор исключает значительную область пространства поиска из наших расчетов и заставляет нас переосмыслить возможное поведение развитых сверхцивилизаций.

Как и в большинстве современных научных экспериментов, приближение к «ответу» происходит постепенно. Моменты озарения редки и происходят нечасто в крупных наблюдательных обзорах или гигантских экспериментальных установках. Скорее, вероятность того, что нулевая гипотеза верна (т. е. что внеземных цивилизаций не существует), увеличивается со временем. Конечно, вероятность не равна уверенности, и одного контрпримера достаточно, чтобы отклонить нулевую гипотезу. Как мы увидим в конце этой книги, нынешняя эра обзорной астрономии может и предоставит SETI значительные возможности для охвата больших участков девятимерного пространства параметров.

Вторая причина существования SETI (внеземного чужеземного цивилизации) — это последствия для человечества, если нам не удастся обнаружить внеземные цивилизации. Если вероятность нулевой гипотезы будет продолжать расти бесконтрольно, это будет не менее важным результатом, чем если бы внеземные цивилизации были обнаружены. Растущая вероятность того, что мы одиноки, проливает свет на вероятную траекторию развития наших цивилизаций и на предстоящие риски, что повлияет на наши дальнейшие действия как вида (см. раздел 1.3).

2.1 Радио SETI

Радио-SETI — старейшая из всех дисциплин SETI. Её формальное начало связано с проектом Дрейка «Озма» в Грин-Банке, но существует значительное количество обзоров (хотя и с очень неполным пространственным и временным охватом). Радиоастрономия имеет много преимуществ перед астрономией в оптическом диапазоне. Атмосфера Земли очень прозрачна на таких длинных волнах, поэтому наземные наблюдения легко достижимы с помощью относительно недорогого оборудования.

Радиояркость Солнца также относительно невелика, поэтому радиоастрономы обычно работают в дневное время. Кроме того, объекты, которые сильно излучают в радиодиапазоне, обычно демонстрируют нетепловые спектры. Проще говоря, мы ожидаем, что энергия тепловых спектров будет уменьшаться с увеличением длины волны. Энергия нетепловых спектров увеличивается с увеличением длины волны в результате различных высокоэнергетических астрофизических процессов.

2.1.1 Водное окно

Хотя относительная зашумленность длинноволновой Вселенной чрезвычайно полезна для радиоастрономов, на самом деле это создает проблему для межзвездных средств связи. К счастью, это палка о двух концах, поскольку ограничивает диапазон полезных длин волн для передачи сигналов. Существуют некоторые диапазоны длин волн, где атмосфера прозрачна — видимый спектр находится в одном из этих частотных окон. Эта прозрачность для оптического света является непосредственной причиной того, что наши глаза адаптированы к работе в этом диапазоне длин волн. (Рисунок 2.4).

Существует еще одно окно на гораздо более низких частотах (более длинных волнах). Известное как микроволновое окно, оно простирается примерно от 1 ГГц до 10 ГГц (приблизительно от 3 до 30 см по длине волны).

На частотах выше 10 ГГц излучение поглощается атмосферами планет земной группы, в частности водой (H_2O) и кислородом (O_2). На низких частотах Млечный Путь излучает значительное количество синхротронного излучения (образующегося при вращении электронов вокруг галактического магнитного поля). Это можно параметризовать следующим образом (Mozdzen et al., 2017):

$$T_{\text{synchrotron}} =, \quad (2.13)$$




Рисунок 2.4 Атмосферная непрозрачность как функция длины волны. Области с низкой непрозрачностью подходят для наземной астрономии. Радиоизлучение в диапазоне от 1 см до 10 м хорошо наблюдается с поверхности Земли. (Источник оригинального изображения: NASA)

где мы рассматриваем интенсивность излучения с точки зрения его яркостной температуры (см. раздел 2.1.4). Дополнительные ограничения получены из космического микроволнового фона, испускаемого Вселенной, когда она впервые стала прозрачной для собственного излучения, что приводит к (фактически постоянной) яркостной температуре $T_{\text{CMB}} = 2,725$ К (Fixsen, 2009). На очень высоких частотах квантовая природа света приводит к дробовому шуму на детекторе:

$$T_{\text{shot}} = \frac{h\nu}{k_B}, \quad (2.14)$$

где h — постоянная Планка, а k_B — постоянная Больцмана. В диапазоне 1–2 ГГц (где окно наиболее прозрачно) находятся две заметные эмиссионные линии. Первая — одна из наиболее распространенных эмиссионных линий в астрономии, линия HI (с длиной волны 21 см или приблизительно 1420 МГц). Эта эмиссионная линия образуется атомами водорода и соответствует изменению ориентации спина между протоном и электроном. Поскольку водород является наиболее распространенным элементом во Вселенной, а излучение 21 см используется для картирования атомарного водорода в огромных масштабах, ученые SETI обычно предполагают, что разумные

цивилизации, занимающиеся астрономией, в конечном итоге откроют радиоастрономию и широко распространенную линию 21 см.

Вторая линия, на частоте 1,66 ГГц (и третья на частоте 1,712 ГГц), соответствует гидроксильному радикалу ОН. Присутствие линий Н и ОН сразу же наводит на мысль о воде, поскольку фотодиссоциация воды дает:




Рисунок 2.5 Земное микроволновое окно (широко известное как «водяная дыра»). На низких частотах в измеренной интенсивности преобладает галактическое синхротронное излучение. На высоких частотах преобладает атмосферное поглощение. Также указаны положения линий водорода (Н) и гидроксила (ОН).

Вода, пожалуй, является наиболее биологически активным химическим веществом на Земле, будучи важнейшим растворителем для химических реакций, а также ключевым элементом клеточной инфраструктуры. Если жизнь на Земле — типичный пример жизни во Вселенной в целом, то вполне вероятно, что инопланетные астрономы заинтересованы в признаках воды и её составляющих.

Сочетание этих фактов предполагает, что человекоподобные астрономы будут естественным образом тянуться к диапазону 1–10 ГГц для изучения Вселенной. В 1971 году, во время проекта «Циклоп», Бернард Оливер, тогдашний вице-президент по исследованиям и разработкам в корпорации Hewlett Packard, предположил, что линии Н и ОН представляют собой четкие маркеры для любой инопланетной цивилизации. Это может быть

элегантным решением проблемы выбора диапазона волн — выбор частоты, связанной с этими линиями (например, $\pi \times \nu_{\text{HI}}$), будет проще для инопланетян (и для нас), чтобы её угадать..

Именно Оливер ввел термин «Водяная яма» (Morrison et al., 1977, Colloquy 4), имеющий двойное значение: частотное пространство, где излучаются линии, относящиеся к воде, и место, где могут собираться различные виды.

Передача в Водяной яме (см. рис. 2.5) значительно сокращает пространство поиска, но не решает проблему полностью, поскольку у нас по-прежнему остается огромное количество вариантов длин волн. Блэр и Задник (Blair and Zadnik, 1993) определили по меньшей мере 55 безразмерных физических констант и арифметических комбинаций частот H и OH , которые можно использовать для идентификации частоты ($C \times \nu_{\text{HI}}$).

Если эти предположения верны, потенциальные передатчики и приемники будут фокусироваться на довольно узкой полосе электромагнитного спектра. В результате большинство поисков SETI (и межзвездных сообщений, передаваемых с Земли) были сосредоточены на Водяной яме, и, в частности, на частотах вокруг линии HI ..

2.1.2 Эффект Доплера

Почти наверняка относительно наших приёмников будет двигаться любой инопланетный радиопередатчик. Если это так, то мы должны учитывать эффект Доплера в радиосигнале. Если приемник движется со скоростью v_r к передатчику, а передатчик или источник движется к приемнику со скоростью v_s , то частота сигнала ν смещается от его излучаемой частоты ν_0 на

$$\nu = \nu_0 \frac{c + v_r}{c - v_s} \quad (2.16)$$

Если сигнал передается с поверхности планеты (и принимается с поверхности нашей планеты), то *радиальная скорость* (т. е. скорость передатчика и приемника относительно друг друга) будет плавно изменяться в зависимости от периода обращения каждой планеты. Ожидается, что частота сигнала будет изменяться в диапазоне, связанном со скоростью орбит этих тел.

Рассмотрим стационарный передатчик ($v_s = 0$), излучающий в направлении Земли в плоскости своей орбиты. Радиальная скорость Земли по направлению к цели будет изменяться в течение года между своим минимальным и максимальным значениями

$$v_r = \pm \frac{2\pi a_{\oplus}}{P_{\oplus}} \approx 29,840 \text{ m s}^{-1} \quad (2.17)$$

Следовательно, частота передатчика будет меняться между значениями

$$v = [0.9999, 1.0001]v_0 \quad (2.18)$$

Для передачи на частоте 1.4 ГГц это приводит к дрейфам в сотни кГц за период обращения Земли в 1 год. Это относительно медленный дрейф – мы, конечно, можем представить себе передатчик на планете с гораздо более коротким орбитальным периодом (возможно, всего несколько недель) или передатчик, вращающийся вокруг планеты каждые несколько часов, добавляя небольшое, но быстрое изменение в частоту.

2.1.3 Радиочастотная интерференция

Как ни парадоксально, самым большим препятствием для обнаружения искусственных сигналов является постоянный фоновый шум искусственных сигналов, поступающих в телескоп из наземных источников.

Как мы увидим, почти каждый сигнал, обнаруженный радио-SETI-миссией, в конечном итоге идентифицируется как радиочастотные помехи (РЧП). Это могут быть радиосигналы, которые отражаются от ионосферы и достигают боковых лепестков телескопа (см. следующий раздел), или эторадиоизлучение, отразившееся от небесного объекта (Луны или спутника) и вернувшееся на Землю.




Рисунок 2.6 Радиочастотные помехи (РЧП), измеренные на радиотелескопе Very Large Array в Нью-Мексико в L-диапазоне (1–2 ГГц). Пики в приведенном выше спектре указывают на сигналы от таких источников, как спутники GPS и метеорологические спутники, радиолокационные импульсы от близлежащих установок и передачи модемов на площадке VLA. Данные предоставлены NRAO.

В результате многие ключевые диапазоны для поиска внеземных цивилизаций сильно загрязнены (см. рис. 2.6). Критически важным компонентом обработки/сокращения данных потенциальных сигналов внеземных цивилизаций является исключение радиопомех как источника.

2.1.4 Радиоастрономия с одной антенной

Потребность в эффективных радиолокационных антеннах во время Второй мировой войны, к счастью, подтолкнула к развитию радиоастрономии (кульминацией чего стало обнаружение межзвездного водорода I ван де Хулстом в 1944 году). Это открытие (и понимание того, что его картирование приведет к значительному прогрессу в нашем понимании структуры галактик) послужило толчком к строительству все более крупных радиотелескопов, таких как антенна Грин-Бэнк и Джодрелл-Бэнк в Великобритании. Интенсивность излучения, принимаемого радиопередатчиками, легко связать с температурой, используя соотношение черного тела в пределе Рэлея-Джинса:

$$I = \frac{2k_b v^2 T_b}{c^2} \quad (2.19)$$

где k_b — постоянная Больцмана, v — частота, а c — скорость света. Радиоастрономы обычно обсуждают яркостную температуру T_b измеряемого источника. На практике необработанные данные, полученные с радиотелескопа, называются «антенной температурой». Это свертка яркостной температуры с диаграммой направленности луча, которая формируется при попадании фотонов на различные объекты, где области антенны сходятся в фокусе. Эта диаграмма направленности определяет угловое разрешение θ :

$$\theta = \frac{k\lambda}{D} \quad (2.20)$$

D

где λ — длина волны наблюдения, а D — диаметр параболической антенны. k — константа порядка единицы, зависящая от того, как форма волны воздействует на приемник, что сильно зависит от геометрии антенны. Параболические антенны с круговой симметрией создают отклик мощности, который также симметричен относительно углового расстояния цели от вектора линии визирования и. Фактически, этот отклик описывается функцией Бесселя нулевого порядка (Рисунок 2.7). В этом случае $k = 1,22$, поскольку это указывает на положение первого минимума отклика (пунктирные линии на рисунке).




Рисунок 2.7 Зависимость мощности кругового параболического радиотелескопа от смещения относительно центра поля зрения. Первичный луч формируется в пределах $1.22\lambda/D$ от центра, где мощность равна нулю (обозначено пунктирными линиями). Обратите внимание на боковые лепестки (нормированный пиковый отклик 0.0174) по обе стороны от первичного луча.

Важно отметить, что после первого минимума отклик антенны снова возрастает. Эти дополнительные максимумы называются боковыми лепестками и обычно приводят к приему сигналов вне оси, которые необходимо удалить в процессе деконволюции.

Для наблюдений на длине волны 21 см при диаметре антенны 100 м это соответствует угловому разрешению около 0,15 градуса. Астрономы обычно используют угловые секунды (d) для описания очень малых углов, где угловая секунда равна 1/3600 градуса (угловая минута равна 1/60 градуса, что составляет 60 угловых секунд), и, следовательно, в этом сценарии. Это намного выше, чем типичное размытие, вызванное атмосферными движениями (так называемая «видимость»), но в то же время этого недостаточно для разрешения объектов на больших межзвездных расстояниях.

Предел углового разрешения одноантенных радиотелескопов (для фиксированной длины волны) — это просто размер антенны, которую можно создать. По мере увеличения D это становится инженерной проблемой.

Самые большие одноантенные телескопы представляют собой не традиционные тарелки, а чаши, установленные внутри уже существующих отверстий или кратеров. Например, телескоп Аресибо — это сферическая тарелка диаметром 305 м, расположенная в карстовой воронке (образованной кислотной эрозией известняка). Поскольку основная тарелка не может управляться, вторичная установлена на серии порталов, позволяющих ей перемещаться. Аресибо известен своим использованием как в качестве радиоприемника, так и в качестве радиолокационного передатчика.

Место Аресибо как крупнейшего в мире одноантенного радиоинструмента недавно занял сферический телескоп с апертурой 500 метров (FAST). FAST также расположен в карстовой воронке, но его основная отражающая поверхность состоит из нескольких тысяч панелей с соответствующими приводами, преобразующими сферическую тарелку в параболический отражатель.

Чувствительность радионаблюдений в значительной степени зависит от шума, присутствующего в самом телескопе. Системная температура определяет этот шум, включая фоновое и атмосферное излучение, излучение от земли (которое проникает через боковые лепестки), потери в системе питания и приемника, а также сигналы калибратора, которые, возможно, потребуются ввести.

2.1.5 Мультиантенная радио интерферометрия

Альтернативой созданию одной большой антенны является изготовление большого количества более мелких антенн и использование интерферометрии для корреляции сигнала. В общих чертах, это эквивалентно созданию одной антенны с максимальным угловым

разрешением, равным максимальному расстоянию между антеннами (базовая линия, В):


$$\theta_{max} = \frac{1.22\lambda}{B} \quad (2.21)$$


Рисунок 2.8 Схема двухэлементного интерферометра. Сигналы попадают на оба детектора с временной задержкой, определяемой разностью хода L . Затем напряжения, индуцированные в обоих детекторах, коррелируются, образуя единственную фурье-компоненту распределения яркости неба.

Интерферометрия основана на временной задержке δt между двумя детекторами, когда излучение падает на них (см. рис. 2.8). Если представить себе радиоволны одной частоты, достигающие детекторов, то два принимаемых сигнала будут в фазе, если разность длин пути, который должен пройти свет, L , равна целому числу длин волн ($L = n\lambda$, где $n = 0, 1, 2$), и аналогично, если $L = (n - \frac{1}{2})\lambda$, то два принимаемых сигнала будут в противофазе.

Рассмотрим источник с вектором направления (единичным) $\hat{r}_s$, направленным от интерферометра, и вектором базовой линии $\mathbf{b}$, соединяющим две антенны. Тогда разность длин пути равна

$$L = \hat{r}_s \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta. \quad (2.22)$$

Каждая антенна регистрирует выходное напряжение V . Если сигнал имеет частоту $\nu = \omega/2\pi$, сигнал колеблется с этой частотой, и регистрация обоих напряжений покажет геометрическую временную задержку $t_g = \hat{r}_s \cdot \mathbf{b}/c$:

$$V_1 = V \cos(\omega t) \quad (2.23)$$

$$V_2 = V \cos(\omega(t - t_g)). \quad (2.24)$$

Затем выходные напряжения с обеих антенн сопоставляются. Сначала два выходных напряжения перемножаются.:

$$V_1 V_2 = \frac{V^2}{2} \cos(\omega t) \cos(\omega(t - t_g)) = \frac{V^2}{2} \cos(2\omega t - \omega t_g) \cos(\omega t_g) \quad (2.25)$$

Процесс корреляции завершается усреднением сигнала за достаточно длительный временной интервал, чтобы устранить высокочастотные колебания, вызванные членом ($t \gg 2\omega^{-1}$):

$$V_2 = \langle V_1 V_2 \rangle = \frac{1}{2} \cos(\omega t_g) \quad R \quad (2.26)$$

Если плоская волна исходит из точечного источника, напряжение пропорционально плотности потока, умноженной на $\sqrt{A_1 A_2}$, где A_i представляет собой площадь приемной области антенны i . Процесс корреляции эффективно удаляет некоррелированный шум из восстановленного сигнала, что является дополнительным преимуществом интерферометрии по сравнению с наблюдениями с использованием одной антенны. Отклик R изменяется синусоидально в зависимости от положения источника на небе. Эти синусоиды известны как интерференционные полосы, фаза которых

$$= \phi + \frac{\omega b}{c} \cos\theta \quad (2.27)$$

По мере движения источника по небу фаза изменяется следующим образом:

$$\frac{d\phi}{d\theta} = 2\pi \frac{b \sin\theta}{\lambda} \quad (2.28)$$

Таким образом, радиоисточник на небе может быть обнаружен с высокой точностью (при условии, что $b \sin\theta$, проекция базовой линии на небо, значительно больше длины волны).

Этот пример с двумя антеннами чувствителен только к сигналам с угловым периодом на небе $b \sin\lambda \theta$ – иными словами, интерферометр может обнаружить только одну фурье-компоненту распределения яркости неба. Если мы хотим получить доступ к другим фурье-компонентам, то потребуется больше базовых линий с различными значениями b и $\sin\theta$. Этого можно достичь, добавив больше антенн, или, если источник относительно стабилен, проведя несколько наблюдений и позволив движению объекта на небе вращать объект относительно базовой линии.

На практике источники протяженные, а не точечные. Если распределение яркости неба имеет вид $I_v(r^{\wedge}s)$, то отклик будет следующим:

$$R_c = \int I_v(\hat{\mathbf{r}}_s) \cos\left(\frac{2\pi \nu b}{c} \hat{\mathbf{r}}_s \cdot \mathbf{b}\right) d\mathbf{b} \quad (2.29)$$

Этот «косинусоидальный отклик» представляет собой неполное измерение I_v , поскольку будут восстановлены только четные части I_v . Для восстановления нечетных частей используется «синусоидальный отклик».

$$R_s = \int I_v(\hat{\mathbf{r}}_s) \sin\left(\frac{2\pi \nu b}{c} \hat{\mathbf{r}}_s \cdot \mathbf{b}\right) d\mathbf{b} \quad (2.30)$$

Также вычисляется (с использованием второго коррелятора с фазовой задержкой в 90 градусов). Комбинация обеих частей представляет собой комплексную видимость:

$$V_v = R_c - i R_s \quad (2.31)$$

что можно более кратко описать как

$$V_v = \int I_v(\hat{\mathbf{s}}) \exp\left(i \frac{2\pi \nu b}{c} \hat{\mathbf{r}}_s \cdot \mathbf{b}\right) d\mathbf{b} \quad (2.32)$$

Это одномерная видимость, измеряемая вдоль оси доступных базисных линий. Интерферометрическая визуализация требует двумерного обобщения вышеизложенного. Мы определяем плоскость uv как плоскость, содержащую векторы вдоль базисной линии восток-запад (u) и базовой линии север-юг (v). Если мы также определим l и m как проекции $\hat{\mathbf{r}}_s$ на u и v , то

$$V_v = \int I_v(\hat{\mathbf{s}}) \exp(-2\pi i (ul + vm)) dl dm \quad (2.33)$$

который поддается двумерному преобразованию Фурье для получения распределения яркости неба I_v .

2.1.6 А История радионаблюдений SETI

В Таблице 2.1 представлена краткая история исторических и недавних радиоопросов, от их начала в рамках проекта «Озма» до современных усилий. Большинство из них сосредоточили свои усилия на частотах около 1420 МГц, используя множество целевых звезд, а в некоторых случаях слепые обзоры или обзоры всего неба без конкретных целей. Этот список далеко не исчерпывающий, но он дает представление о ключевых игроках на радио SETI. В истории доминируют команды США и

СССР (с некоторым вкладом радиоастрономических обсерваторий Великобритании и Западной Европы).

2.2 SETI в оптическом диапазоне

Когда Дрейк и другие начали радиоастрономические наблюдения SETI, концепция оптического SETI уже находилась на ранних стадиях формирования.

Во время и после Второй мировой войны союзники были полностью убеждены в необходимости и ценности радаров и общего манипулирования радиодиапазонами электромагнитного спектра. Развитие квантовой теории между Первой и Второй мировыми войнами (в первую очередь, открытия Эйнштейна об эмиссионном излучении фотонов) побудило физиков манипулировать светом на все более коротких длинах волн в попытке исследовать молекулярную и атомную структуру.

В то время радиолокационные системы основывались на резонаторных магнетронах — вакуумных трубках, которые пропускали поток электронов через ряд открытых резонаторов. Приложение магнитного поля к аппарату возбуждало радиоволны внутри резонаторов. Такие системы подходили для радаров сантиметрового диапазона, но были нежизнеспособны на более коротких длинах волн.

Table 2.1 *Избранные исторические и недавние радиоисследования SETI. This table does not include an extensive list of one-off and opportunistic targeting of potential sources.*

Survey Name/Observers	Site/Instrument	Size	Search	Frequencies (MHz)	Spectral Resolution (Hz)	Flux Limit (Wm^{-2})
Ozma	Green Bank Telescope	26m	1420	1420,1667,33000.05(33)1	± 500	4×10^{-22}
Kardashev & Sholomitskii	Crimea Deep Space Station		92010		N/A	
METAI Institute for Radioastronomy	Argentina					$\times 10^{-23} - 7 \times 10^{-25}$
SERENDIP IV	Arecibo	305m	1420	± 505	$\times 10^{-24}$	
Southern SERENDIP	Parkes Telescope	64m	1420.4	$\pm 8.820.07-12004$		$\times 10^{-24}$
Troitskii, Bondar & Starodubtsev	Gorky, Crimea, Murmansk, Ussuri	53m	1420101			$.5 \times 10^{-21}$
Wielebinski & Seiradakis	Max Planck Institute for Radioastronomie	100m	14202		$\times 10^6$	4×10^{-23}
ARGUS Multiple	(30 amateur-driven)		11420–1470 m		$\sim 1 \times 10^{-21}$	
SIGNAL	Westerbork Synthesis Radio Telescope	3000 baseline		1420.4120010 dual		-24
Phoenix	Arecibo (Lovell, Jodrell Bank)	305m (76 m)		1420,3600 (polarisation)	0.671	$\times 10^{-26}$
-(<i>Kepler</i> Targets, Siemion et al. 2013)	Green Bank Telescope	1500		± 8000.32		$\times 10^{-18}$
VLBI SETI Rampadarath et al. 2012	Australian Long Baseline Array		1230–15441	$.9 \times 10^3$	$\sim 5 \times 10^{-26}$	

Чарльз Таунс, работавший в то время в Колумбийском университете, обнаружил, что микроволновое излучение можно использовать для стимуляции дальнейшего излучения от группы молекул. Это привело в 1954 году к изобретению мазера (микроволновое усиление путем стимулированного излучения). В нем использовались возбужденные молекулы аммиака внутри резонатора для испускания первоначального импульса микроволнового излучения, которое затем стимулировало дальнейшее излучение от молекул, поглотивших первоначальный импульс. Непрерывная подача возбужденных молекул обеспечивала самоподдерживающуюся цепную реакцию стимулированного излучения (Gordon et al., 1954). Шавлов и Таунс (Schawlow and Townes, 1958) быстро предположили, что технологию можно расширить на гораздо более короткие длины волн, особенно на инфракрасный диапазон, где преимущества для высокоразрешающей спектроскопии молекул были очевидны. Их замысел — лазер — был быстро реализован. (Maiman, 1960).

Концепция лазера вскоре стала понятной как выгодное средство для связи на больших расстояниях. Коллимация лазера обеспечивает сохранение высокой интенсивности принимаемого потока от лазера на больших расстояниях. Поскольку оптическое SETI заинтересовано в обнаружении относительно небольшого количества фотонов, мы должны переписать уравнение (2.3) через поток фотонов F :

$$F = \frac{PGA}{4\pi h\nu D^2} \quad (2.34)$$

где ν — частота фотона, а h — постоянная Планка. Поскольку мы имеем дело с лазерной связью, коэффициент усиления G относительно высок. Длина волны лазера обычно намного короче, чем у радиоволн (как оптических, так и инфракрасных), и поэтому луч может кодировать гораздо больше бит в секунду (см. раздел 21.1). Переход к более коротким длинам волн (или более высоким частотам) уменьшает количество фотонов, передаваемых при заданной мощности передатчика и временном интервале. В результате предполагается, что оптическая связь SETI будет использовать более высокую мощность передатчика с короткими временными интервалами (импульсами) при приемлемых общих затратах энергии.

Недостатки оптического SETI

Разумеется, у попыток связи в оптическом диапазоне есть очевидные недостатки. Во-первых, на этих частотах Вселенная невероятно шумная, а

фоновый сигнал в некоторых конфигурациях может быть чрезвычайно сильным, что значительно снижает отношение сигнал/шум при передаче.

Во-вторых, оптические фотоны легко поглощаются межзвездной пылью (Рисунок 2.9) и переизлучаются, как правило, в инфракрасном диапазоне. Это особенно верно для света с более короткой длиной волны (синего), который в других обстоятельствах мог бы быть предпочтительнее из-за его большей способности концентрировать информацию в импульсе, чем красные лазеры. Фотоны, излучаемые в диапазоне континуума Лаймана ($\sim 50\text{--}90\text{ нм}$), преимущественно поглощаются для ионизации водорода. Сигнал оптического импульса от близлежащей галактики, такой как М74, будет уменьшен примерно в два раза из-за поглощения межзвездной пылью.




Рисунок 2.9 Доля пропускаемых оптических фотонов через межзвездную среду (см. Draine 2003). Заштрихованная область представляет собой континуум Лаймана, который непрозрачен даже для близлежащих объектов из-за своей способности ионизировать нейтральный водород. Данные любезно предоставлены Майклом Хиппке (личное сообщение).

Эти проблемы отнюдь не непреодолимы. Для передатчика их, как правило, можно преодолеть, выбрав максимально возможную длину волны (обычно выше 10 $\mu\text{м}$), чтобы уменьшить поглощение пыли в пять раз, и излучая сильно коллимированный импульс для максимизации передаваемой

мощности в направлении приемника (и, следовательно, принимаемого потока).

В контексте OSETI, пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает вопрос синхронизации. Очевидно, что импульсы — наиболее энергоэффективный способ передачи информации (Benford et al., 2010), и совершенно ясно, что без удачи (и намерения внеземных цивилизаций подать сигнал Земле) большинство наблюдений будут совпадать с моментами, когда внеземные цивилизации будут обмениваться сигналами друг с другом с помощью сильно коллимированных импульсов, которые фактически невидимы для нас (Forgan, 2014) и не будут передаваться в нашу сторону. Случайность имеет ключевое значение, и это не то, о чем можно договориться до первого контакта.

Обнаружение оптических сигналов SETI

Существуют две взаимодополняющие стратегии поиска внеземных цивилизаций (OSETI). В ходе поиска рассматриваются либо (а) узкополосные сигналы, которые могут быть непрерывными или импульсными, во многом аналогично радио-SETI, либо (б) широкополосные импульсы, которые значительно мощнее фонового излучения, генерируемого Вселенной.

Узкополосные оптические импульсы доступны практически любому астрономическому телескопу диаметром более 1 м без необходимости существенной модификации приборов, при этом очень малая полоса пропускания сигнала достаточна для подтверждения его искусственного характера. С другой стороны, широкополосные импульсы, как ожидается, будут иметь очень короткую длительность (по соображениям энергоэффективности). Импульс, длящийся всего несколько наносекунд или меньше, в диапазоне полос, где небесные объекты испускают большое количество фотонов, не может быть обнаружен без специального оборудования.

В оптических системах SETI обычно используются наносекундные счетчики фотонов при проведении исследований SETI в этом режиме. Эти приборы наблюдают Вселенную с наносекундным временем экспозиции, что значительно уменьшает количество фотонов, принимаемых естественными источниками. Наносекундный счетчик фотонов, наблюдающий Солнце, измерит приблизительно один фотон за экспозицию. Оптический сигнал SETI, полученный с использованием технологий, подобных человеческим, даст в сотни раз большее количество фотонов!

Эта оценка основана на довольно старых исследованиях импульсных лазерных технологий XX века, использовавшихся в лабораториях, изучающих ядерный синтез (Howard et al., 2004). Эти эксперименты по

инерциальному термоядерному синтезу основаны на мощных лазерных импульсах, падающих на небольшие мишени. Несколько лазеров располагаются вокруг мишени, а синхронизированные импульсы создают чрезвычайно высокое давление и температуру во внешних слоях мишени. Ударная волна, возникающая в мишени, дополнительно сжимает и нагревает внутренние слои в надежде, что мишень достигнет условий, необходимых для зажигания.

Стандартное значение в 100 фотонов в наносекунду получено на основе импульсного лазера, созданного в LLNL, мощность которого составляет 1015 ватт в пикосекундных импульсах (с частотой импульсов один в час). Современные импульсные лазеры, такие как лазеры Национального комплекса зажигания в LLNL, по-прежнему достигают петаваттной мощности, но теперь ориентированы на поддержание импульса в течение более длительных периодов времени и улучшение поглощения энергии мишенью.

Таким образом, оптическая SETI представляет собой относительно простую стратегию наблюдений. Она не требует значительных объемов обработки данных, необходимых для радиоинтерферометрии. Не требуется даже особо большой телескоп. Если бы мы наблюдали звезду, пока внеземное цивилизация (ВТО) передавало импульс с вращающейся вокруг нее планеты, мы могли бы ожидать, что широкополосное излучение звезды в данном фильтре увеличится до шести порядков! Наблюдение нефильтрованного звездного излучения все равно дало бы увеличение в 30–100 раз (отсюда цифра в 100 фотонов в наносекунду). Эти цифры, очевидно, можно еще больше увеличить, повысив энергию пучка и уменьшив телесный угол пучка.

На практике для наблюдений OSETI требуются два независимых счетчика фотонов для измерения количества отсчетов как на источнике, так и вне его. Снижение цен на электронику позволило OSETI эффективно работать на телескопах класса 1–2 м.

2.2.1 Артефакт SETI

Одним из заметных ответвлений оптического/инфракрасного SETI является поиск физических артефактов, которые либо излучают, либо отражают свет в этих диапазонах. Существует два основных типа артефактов, которые составляют большинство попыток SETI с использованием артефактов (иногда это называют поиском внеземных артефактов или SETA).

Наиболее известной из них является предполагаемая сфера Дайсона. Концепция Фримена Дайсона основана на более общей концепции макроинженерии или *астроинженерии*, согласно которой развитые цивилизации строят сооружения в масштабах, сопоставимых с масштабами небесных тел, и обязана своим происхождением более ранним идеям Стэплдона, Циолковского и Холдейна (CirkoVIC, 2006).

Сфера Дайсона — это сфера диаметром порядка астрономической единицы и толщиной в несколько километров, полностью охватывающая звезду. В большинстве концепций сфер Дайсона диаметр сферы выбирается таким образом, чтобы её внутренняя поверхность получала радиационные потоки, аналогичные потокам Земли. Если бы эта сфера была построена как единая твёрдая конструкция вокруг звезды, подобной Солнцу, то внутренняя поверхность сферы обеспечила бы обитаемую поверхность, во много раз превышающую общую площадь поверхности Земли

$$\frac{A_{\oplus} : A_{\text{sphere8}}}{\text{---}} \left(\frac{1 \text{ AU}}{\text{---}} \right)^2 = \approx 5.5 \times 10 (2.35) A_{\oplus} \quad 1 R_{\oplus}$$

Это также наиболее эффективный способ сбора звездного излучения, поскольку сфера может поглотить весь луч звезды, а не только ту его часть, которая излучается в телесном угле, содержащем отдельную планету, такую как Земля. Альтернативная конструкция (иногда называемая «роем Дайсона») основана на большом количестве небольших коллекторов, расположенных в той же сферической конфигурации, с единственной целью сбора звездной энергии.

Поскольку ожидается, что равновесная температура сферы/роя Дайсона будет настроена на температуру, подходящую для биосферы (около 300 К), она должна излучать приблизительно как черное тело с аналогичной температурой (с пиком излучения порядка 10 мкм). Точная температура тела, конечно, зависит от предпочтительной температуры его обитателей и термодинамической эффективности сферы при переизлучении в окружающую Вселенную.

Table 1. Selected historic and recent optical SETI surveys. This table does not include observations and opportunistic targeting of Copernicus

Survey Name	Observers	Site	Instrument	Size	Search Wavelengths	Wave lengths
Wise (1973)				m2.83	stars	
Witte (1980)		Columbus	Optical			
Kingsley (1995)		Perth-Lowell		12–100		Excess from Sphe
Blair and Zuckerman (2002)		SETI Observ. Special Astrophysical		mOptical	Search for Optical	stars (nanos
Beskin et al. (1997)		Lick Observatory		0.25 m	0.55–704,605 stars for laser	short sources
Timofeev et al. (2000)		Carri-Oak Ridge				>250 search for D
Stone et al. (2005)		IRAS 0.57 m				000 spheres
Howard et al. (2007)		0.61 Observ		mOptical	80% of the sky	hoursto

Сферы Дайсона были бы крайне необычными небесными объектами, поскольку их эффективные температуры и, как следствие, спектры схожи с температурами коричневых карликов (маломассивных субзвездных объектов, занимающих промежуточное положение между планетой и звездой), но с радиусом в несколько тысяч раз большим.

Следовательно, сферы Дайсона были бы достаточно хорошо видны в любом крупномасштабном обзоре Млечного Пути в инфракрасном диапазоне, особенно в обзорах, ищущих объекты, подобные коричневым карликам. Простота этого поиска привела к тому, что поиск артефактов SETI также часто называют «дайсоновским SETI».

Другие основные поиски артефактов происходят в нашей собственной Солнечной системе, где различные наблюдатели пытаются обнаружить посещающие нас межзвездные зонды на далеких орбитах вокруг нашего Солнца (мы рассмотрим это подробнее в разделе 25.1).

2.2.2 История оптических наблюдений SETI

В таблице 2.2 представлен выбор прошлых и настоящих оптических обзоров SETI. Как и таблица 2.1, это не исчерпывающий список, но он снова дает представление о ключевых участниках оптического SETI.

3 Классификация сценариев и объяснений парадокса

3.1 Сценарии контакта и Rio Scale

Очевидно, что существует множество различных способов, с помощью которых инопланетный разум может предстать перед нами. Мы можем получить передачу или сообщение из близлежащей звездной системы (или даже из другой галактики, что не выходит за рамки законов физики, но все же крайне маловероятно). Мы можем видеть непреднамеренные сигналы разума, такие как астроинженерия или изменения в планетарной атмосфере из-за промышленной деятельности. Межзвездный зонд без экипажа может войти в Систему (или обнаружить, что находился там миллионы лет). Наконец, возможно, наименее вероятный из всех сценариев такой: корабль инопланетян приземлится на лужайку перед Белым домом.

Следует отметить, что именно последний сценарий первоначально заинтересовал Ферми и послужил поводом для тех отвлекающих дискуссий в Лос-Аламосе. С годами парадокс Ферми разросся и теперь охватывает все сценарии, при которых человечество узнает о существовании других разумных цивилизаций. Риск или вероятность этих событий, а также масштаб таких событий с точки зрения реакции общества, привели к дискуссиям о том, как классифицировать подобные ситуации.

В ответ на это обсуждение Альмар и Тартер определили шкалу Рио (Shostak and Almar, 2002; Almár, 2011), где индекс шкалы Рио (RSI) для данного события определяется следующим образом:

$$RSI = Qd \quad (3.1)$$

где Q оценка последствий открытия, а d оценка достоверности открытия. Очевидно, что при высадке инопланетян на Землю показатель Q был бы высоким, и многие описывают подобные события очень ярко, но эти открытия без исключения имеют низкий показатель d , а следовательно, и низкий показатель RSI..

Оценка Q определяется суммой трех факторов:

1. Класс явления
2. Тип открытия
3. Расстояние

Table 3.1 *Rio Scale 1.0: Несколько примеров сценариев обнаружения и результирующее значение Q (где $RSI = Qd$, а d — вероятность обнаружения).*

Явление	Тип обнаружения	Расстояние	Q
Следы астроинженерии	Данные из архива, не поддающиеся проверке	1000 световых лет	3
Утечка излучения	Любительское наблюдение, неподтвержденное, не повторенное	10 световых лет	5
Сообщение, относящееся к Земле	Подтвержденное наблюдение, которое невозможно повторить	30 световых лет	12
Артефакт с общим сообщением	Подтвержденное наблюдение, которое можно повторить	В пределах Солнечной системы	13

Полную таблицу для каждого из этих факторов можно найти в работе Альмара (Almár, 2011). В таблице 3.1 мы приводим несколько репрезентативных сценариев (и соответствующее значение Q). Значение Q может варьироваться от 1 до 10, а показатель достоверности d — от 0 до 1.

Недавно эта шкала была пересмотрена (Rio 2.0), чтобы отразить новые реалии потребления новостей общественностью и социальных сетей (Forgan et al., 2018c). Структура шкалы Q/d сохранена, и RSI по-прежнему находится в диапазоне от 0 до 10. Основные изменения коснулись вычисления d , что является главной проблемой для большинства специалистов по SETI.

Новая шкала предъявляет гораздо более высокие требования к тому, как был зафиксирован сигнал; сколько раз он был зафиксирован различными группами и приборами; а также к вероятности человеческой ошибки, антропогенного воздействия или просто того, что сигнал является мистификацией. Более конкретно, d теперь вычисляется по формуле

$$d = 10^{\frac{A+B+2C-30}{10}} \quad (3.2)$$

где A, B и C — оценки достоверности сигнала, вероятности того, что он является инструментальным, и вероятности того, что он не является природным или антропогенным сигналом. Значения A, B и C (и Q) получаются путем заполнения короткого онлайн-теста, а полученные значения затем отображаются с соответствующим контекстом. Полезно также использовать логарифмическую шкалу достоверности

$$J = A + B + C - 20 \quad (3.3)$$

В качестве средства сравнения сигналов с более широким диапазоном, чем у линейной шкалы:

$J < 1$:	Интерес не гарантирован
$J = 1-4$:	Интерес к проекту SETI потенциально оправдан; интерес со стороны прессы не оправдан
$J = 5-6$:	Интерес к проекту SETI, вероятно, оправдан; интерес к нему со стороны научно-технической популярной прессы также может быть оправдан
$J = 7-8$:	Интерес к SETI, безусловно, оправдан; интерес к технической популярной прессе, вероятно, тоже; возможно, это будет нетипичная новость для широкой прессы, если она будет изложена с соответствующими оговорками. Даже если это не инопланетяне, всё равно очень интересно
$J = 9$:	Значительный интерес со стороны ведущих СМИ вполне оправдан, широкое освещение в научно-популярной прессе. Широко распространено мнение, что сигнал мог быть вызван инопланетянами
$J = 10$:	Инопланетяне. Первая полоса всех крупных газет

Возможно, это обсуждение немного отходит от основной темы, но важно помнить, что само обнаружение разумной жизни имеет значение для парадокса Ферми, однако, чтобы применить его к проблеме, обнаружение должно быть достоверным. И, что еще важнее, масштаб влияния обнаружения на общество сильно варьируется в зависимости от его природы.

В Международной академии астронавтики (IAA) действует Постоянный комитет по SETI, который принял два протокола для ученых SETI в случае успешного обнаружения ETI.

Первый протокол, «Декларация принципов, касающихся деятельности после обнаружения внеземного разума», в просторечии известен как Первый

протокол, или Протокол после обнаружения, и дает ученым руководство относительно того, как действовать в случае обнаружения. Документ предусматривает соответствующие шаги для подтверждения обнаружения, например, путем привлечения других групп к повторному измерению сигналов с использованием других приборов и методологий. Как только обнаружение ЕТІ подтверждено, протокол описывает, как об этом следует объявить всему миру.

Второй протокол, *«Проект декларации принципов, касающихся отправки сообщений внеземному разуму»*, в просторечии известный как протокол ответа. В нём предлагаются соответствующие шаги, которые необходимо предпринять при отправке обратных сообщений (подробнее об этом см. в разделе 21.4.1).

3.2 Три типа цивилизаций – шкала Кардашева

Если предположить, что человеческая цивилизация выживет и будет процветать еще как минимум тысячу лет, то как будет выглядеть эта цивилизация? Учитывая огромный технологический прогресс, достигнутый с 1000 года, как мы можем начать рассматривать, как могла бы мыслить или действовать цивилизация, намного более древняя, чем наша?

Кардашев (1964) предлагает нам путь, основанный на физических законах. Законы термодинамики накладывают жесткие ограничения на манипулирование энергией, которые, насколько нам известно, должны применяться ко всем разумным видам. Мы можем определить три закона термодинамики следующим образом:

3.2 Три класса цивилизации – шкала Кардашева

1. Для замкнутой системы с внутренней энергией U происходит дифференциальное изменение

$$dU = dQ + dW \quad (3.4)$$

где dQ — дифференциальное изменение теплоты, а dW — дифференциальная работа, совершаемая над системой. Это утверждение эквивалентно закону сохранения энергии.

2. Энтропия S замкнутой системы не может уменьшаться:

$$dS = \frac{dQ}{T} \geq 0 \quad (3.5)$$

Энтропия имеет несколько определений, в зависимости от того, рассматривается ли она с точки зрения термодинамики или статистической механики. В термодинамике энтропия связана с рассеиванием тепла в системе ($dQ = TdS$). В статистической механике энтропия измеряет количество возможных состояний системы (микросостояний) при заданных её макроскопических свойствах (макросостояниях). Системы с высокой энтропией могут быть расположены во множестве микросостояний для данного макросостояния, что показывает энтропию как меру неопределенности или беспорядка в системе.

Например, энтропия Гиббса

$$S = -k_B \sum_i P(i) \log P(i) \quad (3.6)$$

где k_B — постоянная Больцмана, i обозначает возможные микросостояния системы, а $P(i)$ — вероятность того, что система находится в состоянии i .

Таким образом, второй закон термодинамики эквивалентен утверждению «беспорядок в замкнутых системах имеет тенденцию к увеличению».

3. По мере приближения температуры замкнутой системы к абсолютному нулю, изменение энтропии обратимого процесса также стремится к нулю. Иными словами, система не может достичь температуры абсолютного нуля за конечное число шагов.

Эти законы иногда довольно разговорно формулируются с использованием терминологии азартных игр:

1. Вы не можете выиграть, то есть вы не можете получить что-то даром, поскольку энергия всегда сохраняется.
2. Вы не можете выйти в ноль — вы не можете вернуться к предыдущему энергетическому состоянию, поскольку энтропия увеличилась, истощив доступную свободную энергию (например, свободная энергия Гиббса определяется как $G = U + PV - TS$).
3. Вы не можете полностью извлечь всю энергию из системы.

Короче говоря, термодинамика — это набор экономических принципов, где валютой является свободная энергия. Мы видим применение этих принципов во всех физических системах, от атмосферы Земли до внутренних механизмов организмов.

Предложение Кардашева заключалось в том, чтобы рассматривать потребление энергии цивилизациями как меру их развития. Потребление энергии можно рассматривать как показатель как их способности передавать мощные коммуникационные сигналы, так и их потенциальной обнаруживаемости посредством непреднамеренной утечки энергии. Его классификационная система выделяет три типа цивилизаций:

Тип I: цивилизация, потребляющая энергию со скоростью, эквивалентной излучаемой энергии на её родной планете за единицу времени. Другими словами, цивилизация, потребности которой в энергии равны энергии, вырабатываемой Солнцем на поверхности её планеты.

Тип II: цивилизация, потребляющая всю энергию своей звезды, то есть её потребности в энергии за единицу времени равны светимости Солнца.

Тип III: сверхцивилизация, потребляющая всю энергию галактики, то есть светимость нескольких сотен миллиардов звёзд.

Саган (Sagan, 1973) определил простое выражение, которое интерполирует между типами, давая нецелое число Кардашева K :

$$K = \frac{\log_{10} P - 6}{10} \quad (3.7)$$

где потребляемая мощность P измеряется в ваттах. Цивилизация I типа в этой схеме потребляет энергию со скоростью $P = 10^{16}$ Вт, а цивилизации II и III типов обладают $P = 10^{26}$ и 10^{36} Вт соответственно. В 2012 году Земля потребила приблизительно 100 000 тераватт-часов энергии (из общего объема примерно 150 000 тераватт-часов, выработанных в общей сложности). Это дает среднее потребление энергии приблизительно $P = 10^{13}$ Вт, что дает человечеству число Кардашева $K = 0.7$.

Было предпринято несколько попыток расширить шкалу Кардашева. Барроу (Barrow, 1998) рассматривал нашу возрастающую способность манипулировать все меньшими пространственными областями как индикатор развития (так называемая шкала Барроу, призванная дополнить шкалу Кардашева), но это вряд ли позволит получить представление о наблюдениях явлений на межзвездных расстояниях. Саган расширил определение до двух измерений, рассматривая как информацию, так и энергию. Шкала Сагана определяется следующим образом:

$$S = K\{I\} \quad (3.8)$$

где I — одна из 26 букв римского алфавита, причем каждой букве присваивается определенное количество битов в зависимости от ее позиции, например, $A = 10^6$ бит, $B = 10^7$ бит, $C = 10^8$ бит и так далее.

По оценкам, по состоянию на 2007 год объем данных, хранимых человечеством, составлял приблизительно 10^{21} бит (Hilbert and López, 2011). С учетом нашего энергопотребления человечество можно было бы отнести к категории 0.7% населения Земли.

3.3 Три класса возможных объяснений Парадокса Ферми

Как должно быть ясно из законов термодинамики, информация и энергия связаны посредством понятия энтропии. Это можно показать, сравнив термодинамическую энтропию и информационную энтропию, определенную Шенноном как

$$S^{\text{inf}} = - \sum_i P(i) \log P(i), \quad (3.9)$$

Изменение информационного содержания системы всегда приводит к большему увеличению энтропии (Brillouin, 1953). Однако эта связь не обуславливает однозначной зависимости информации от энергии, и, следовательно, цивилизации должны быть способны достигать высоких уровней классификации информации, не обязательно являясь при этом большими потребителями энергии.

Если мы рассмотрим уравнение Дрейка, мы сможем использовать его для вывода простого математического выражения для Великого фильтра:

$$f_i f_l f_c L \ll 1 \quad (3.10)$$

Точное положение фильтра эквивалентно вопросу о том, какая из переменных в левой части уравнения мала. В конце концов, для истинности приведенного выше уравнения достаточно, чтобы любая из этих переменных была малой. Таким образом, мы можем получить три класса решений, которые мы будем использовать дальше.

Поскольку Большой Фильтр представляет собой произведение трех слагаемых, не обязательно, что только одно из них мало. Мы можем представить себе ситуации, когда комбинация слагаемых мала. Это делает попытку классификации решений таким образом довольно сложной. Однако обычно, даже если несколько слагаемых малы, одно из них значительно меньше и, как следствие, является определяющим слагаемым в Большом Фильтре. Поэтому я буду придерживаться этой схемы классификации, но

читателям следует учитывать это предостережение и помнить, что это не единственная возможная схема классификации. Другие авторы в этой области выбрали различные схемы классификации решений, следуя традиции, восходящей к Харту и его классификации временных, социальных и физических ограничений.

3.3.1 Версии об уникальности Земли (U)

В этой парадигме f_i (и, возможно, даже f_l) мало. В результате число планет в Млечном Пути, пригодных для разумной жизни, невелико. Следует отметить, что это не делает никаких заявлений о количестве *обитаемых* миров, но делает заявления о количестве обитаемых миров.

3.3.2 Версии Катастрофизма (D)

Пожалуй, наиболее печальным является то, что, возможно, цивилизации, способные к общению, имеют короткий срок существования, и, следовательно, L мало. Рассмотрев различные экзистенциальные риски для человечества, мы увидим, что список катастрофических решений тревожно велик, и многие в сообществе SETI считают, что Великий Фильтр — это лишь вопрос нашего недалекого будущего.

3.3.3 Версии о Коммуникабельности (C)

Если f_c мало, то число разумных цивилизаций может быть большим, но их доступность для нас крайне ограничена. Как мы увидим, эта классификация представляет собой сложную с эпистемологической точки зрения задачу, поскольку требует от нас формулировать утверждения о явлениях, которые по определению мы не можем измерить.

3.3.4 Жесткие и мягкие решения

С самого раннего изложения было ясно, что не все решения парадокса Ферми одинаковы. Харт был одним из первых, кто заметил, что решения могут быть распределены по категориям в зависимости от того, как они связаны с физическими, временными или социологическими факторами, и что эти решения могут по-разному зависеть от уровня развития цивилизации.

В современной терминологии решения делятся на «жесткие» и «мягкие». Жесткие решения применимы ко всем возможным разумным цивилизациям (или предписывают их поведение). Как правило, жесткие решения мотивированы фундаментальными физическими или биологическими принципами, которые препятствуют возникновению разумной жизни или изобретению средств коммуникации.

«Мягкие» решения применимы лишь к ограниченному подмножеству разумных цивилизаций. Они часто пытаются предписать определенное поведение или мотивы, опираясь на политические или социологические аргументы. Такой подход может частично объяснять существование Великого Молчания, но мягкие решения не могут быть единственной причиной. Мягкие решения позволяют одной цивилизации отклониться от шаблона: одной «отступнической» цивилизации, не соответствующей шаблону, навязанному мягким решением, достаточно, чтобы нарушить Молчание. Брин (Brin, 1983) называет такие решения «неисключительными». Доля «отступников» в популяции галактических цивилизаций может быть невелика, но в большинстве случаев она, вероятно, не равна нулю, и поэтому эти решения считаются «мягкими».

Сводный список решений парадокса Ферми можно найти в Приложении А. Классификация разбита на три категории, как описано выше: Уникальность (U), Катастрофизм (D) и Коммуникабельность (C). При необходимости на них даются ссылки в основном тексте (например, Решение U.x, x-е решение в категории Уникальности в Приложении А).

4. Обитаемые миры встречаются редко

Наиболее очевидное объяснение, связанное с решением в рамках гипотезы Редкой Земли (Rare Earth), заключается в том, что количество мест обитания — теплых каменистых поверхностей с умеренной гравитацией, жидкой водой и соответствующими химическими/электронными градиентами — крайне ограничено. До конца XX века это объяснение оставалось практически неизученным. Лишь в последние несколько десятилетий у нас появились данные, позволяющие начать решать этот вопрос.

4.1 Обитаемые миры - не редкость

Появление методов обнаружения экзопланет открыло нам путь к пониманию распределения экологических ниш для форм жизни, подобных земным. Используя различные методы наблюдений, стало всё более очевидно, что количество планетных систем в Млечном пути действительно очень велико. Учитывая нашу возрастающую способность обнаруживать экзопланеты в окрестностях Солнца, мы должны сделать вывод, что доля звёзд с планетными системами f_p стремится к 1! Но как нам найти эти планеты?

4.1.1 Первые экзопланеты – Pulsar Timing

Первые экзопланеты были обнаружены вращающимися вокруг пульсара PSR 1257+12. Пульсары — это особый класс нейтронных звезд, остатков массивных звезд, которые перестали синтезировать водород в своих ядрах. После прекращения синтеза водорода звезда пытается синтезировать другие элементы, чтобы обеспечить тепловую поддержку и предотвратить гравитационный коллапс. Как только звезда пытается синтезировать железо, синтез становится энергетически невыгодным, и обычно происходит взрыв сверхновой, оставляющий после себя нейтронную звезду (см. раздел 10.5).

Закон сохранения углового момента гарантирует, что по мере сжатия звезды от примерно 10^5 км до ~ 10 км скорость вращения значительно возрастает. Первый обнаруженный пульсар (Jocelyn Bell Burnell and Antony Hewish, работавшие в Кембриджском университете в 1967 году) имел измеренный период вращения 1.33 секунды. Пульсары сильно намагничены, и поэтому они излучают свет преимущественно вдоль оси своего магнитного поля. Для наблюдателя, находящегося в соответствующей ориентации

относительно пульсара, этот быстро вращающийся объект излучает импульс света при каждом обороте в направлении наблюдателя, подобно маяку.

Чрезвычайно высокая частота пульсаций, а также поразительно точный период, первоначально заставили некоторых назвать её «звездой LGM», где LGM означает «маленькие зелёные человечки». Хотя это объяснение было быстро отвергнуто в пользу естественного объяснения (Penny, 2013), пульсары остаются полезным инструментом в поиске экзопланет.

Действительно, именно точность пульсара полезна для астрономов, пытающихся обнаружить экзопланеты. Вольщан и Фрейл (Wolszczan and Frail, 1992) исследовали пульсар PSR 1257+12, измеряя время прихода (TOA) импульсов. Пульсары обычно демонстрируют очень регулярные импульсы, и поэтому преобразование Фурье данных TOA должно отражать один период — период вращения пульсара, в данном случае 6 миллисекунд. Вольщан и Фрейл смогли показать, что TOA 1257+12 плавно изменяется со временем. Эти изменения были аппроксимированы как период пульсара плюс комбинация двух периодов, один из которых составлял 66.6 дня, а другой — 98.2 дня.

Было высказано предположение, что эти периоды обусловлены двумя планетами массой в несколько земных масс ($M_{\oplus}$), вращающимися вокруг пульсара. На время прихода пульсара влияет гравитационное поле планет, поскольку все тела в системе, включая пульсар, вращаются вокруг центра масс (подробнее см. в следующем разделе). Это означает, что пульсар постоянно движется к наблюдателю и от него в соответствии с гравитационным взаимодействием с другими телами. Это движение вызывает периодические изменения расстояния между пульсаром и наблюдателем, и, следовательно, изменения времени прихода. Эти изменения невелики, но не по сравнению с периодом вращения пульсара, поэтому их легко различить.

Хотя измерение времени появления пульсаров позволяет обнаружить захватывающие, экзотические планетные системы, статистически значимого количества экзопланет пока не удалось выявить. Кроме того, пульсары — это «звездные трупы» — конец ядерного синтеза звезды и, в некоторой степени, конец ее способности излучать биологически благоприятное излучение (хотя см. Patruno и Kama, 2017).

В поисках обитаемых планет мы больше склонны искать экзопланеты вокруг звезд главной последовательности, на начальной стадии ядерного

синтеза, когда водород превращается в гелий в ядре звезды. Это означает, что нам необходимо обратиться к другим методам.

4.1.2 Метод радиальных скоростей

Первая экзопланета, обнаруженная вокруг звезды главной последовательности, была найдена с помощью метода *радиальных скоростей*. Этот метод основан на том факте, что гравитационное поле звезды оказывает силу не только на планету, но и наоборот — гравитационное поле планеты оказывает силу на звезду. В результате оба объекта вращаются вокруг центра масс или барицентра системы..

Рассмотрим астрономов, наблюдающих за системой звезда-планета с Земли. Массы тел равны M_* и M_p соответственно. Планета движется по кеплеровской орбите вокруг центра масс. Кеплеровские орбиты являются эллиптическими и, следовательно, описываются шестью параметрами. Форма орбиты определяется её большой полуосью, a , и её эксцентриситетом e . Период обращения орбит обоих тел определяется третьим законом Кеплера:

$$P^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_* + M_p)} a^3 \quad (4.1)$$

Ориентация орбиты описывается тремя углами, определение которых зависит от нашей системы координат. Определим опорную плоскость с нормальным вектором, равным декартовой оси z (другими словами, плоскость $x-y$). Орбита планеты определяет орбитальную плоскость, которая, как правило, не совпадает с плоскостью $x-y$.

Удельный (специфический) угловой момент орбиты определяется векторами положения и скорости тела $\mathbf{r}$ и $\mathbf{v}$, заданными относительно фокуса орбиты.

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \quad (4.2)$$

где $\times$ обозначает обычное векторное произведение. В результате h перпендикулярно плоскости $2\pi - \arccos(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}})$ орбиты планеты. Следовательно, мы можем определить наклон i как угол между нашей опорной плоскостью и плоскостью орбиты:

$$\cos i = \hat{\mathbf{h}} \cdot \hat{\mathbf{z}} \quad (4.3)$$

Мы используем обозначение $\hat{}$ для указания на то, что имеем дело с единичными векторами. Долгота восходящего узла, Ω , обозначает угловое

положение восходящего узла (где плоскость орбиты пересекает плоскость отсчета системы). определяется формулой:¹

$$\cos \Omega = \frac{(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}}) \cdot \hat{\mathbf{x}}}{|\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}}|} \quad (4.4)$$

Векторное произведение $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{h}} \equiv \mathbf{q}$ дает вектор, указывающий на восходящую вершину, что позволяет вычислить угол с помощью скалярного произведения с опорным направлением $\mathbf{x}$.

Третий угол ориентации — это аргумент перигентра, ω , угловое расстояние между точкой ближайшего сближения планеты с центром масс и долготой восходящего узла.




Рисунок 4.1 Кеплеровская орбита. Эллипс орбиты определяется большой полуосью a и эксцентриситетом e . Вектор эксцентриситета $\mathbf{e}$ направлен к точке перигентра, а вектор узла $\mathbf{q}$ — к восходящему узлу.

Для вычисления этого нам необходимо построить вектор, указывающий на точку перигентра. Речь идёт о векторе эксцентриситета (иногда называемом вектором Лапласа-Рунге-Ленца):

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{h}}{G(M_* + M_p)} - \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (4.5)$$

Это также дает нам эксцентриситет, который мы получаем из величины e . Аргумент перигентра равен

$$\cos \omega = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{q}| |\mathbf{e}|} \quad (4.6)$$

¹ Как обычно бывает со скалярными произведениями, необходимо тщательно определить желаемый угол, поскольку скалярное произведение всегда возвращает минимальный угол между двумя векторами. Это можно определить, взяв модуль векторного произведения и проверив его знак. Если модуль положительный, скалярное произведение возвращает «правильный» угол. В противном случае, подходящим углом является дополнительный угол, в данном случае — дополнительный угол. $\hat{\mathbf{x}}$. Единственным исключением в этом контексте является угол наклона, который обычно определяется как наименьший угол, получаемый, соответственно, с помощью скалярного произведения.

Наконец, для того чтобы поместить планету в определённую точку на этой орбите, необходим угол. Поскольку кеплеровские орбиты, как правило, эллиптические, угловая скорость планеты изменяется со временем. Действительно, второй закон Кеплера гласит, что тела на кеплеровских орбитах описывают равные площади эллипса за равные промежутки времени. В полярных координатах это эквивалентно

$$\frac{1}{2} r^2 \frac{d\phi}{dt} = |\mathbf{h}| = \text{const.} \quad (4.7)$$

Это свидетельствует о том, что кеплеровские орбиты сохраняют угловой момент, как и ожидалось. Второй закон Кеплера объясняет обоснование определения средней аномалии:

$$M = 2\pi \frac{nt}{P} \quad (4.8)$$

n обычно называют средним движением. t описывает время, прошедшее с момента последнего прохождения планетой перигентра. Этот угол сам по себе не представляет собой положение. Для получения позиционного угла необходимо вычислить истинную аномалию v . Лучше всего это сделать с помощью эксцентрисической аномалии E :

$$M = E - e \sin E \quad (4.9)$$

Решение для E нетривиально, поскольку не имеет замкнутой формы. На практике E обычно вычисляется с помощью итеративной численной процедуры.




Рисунок 4.2 Эксцентриситет и истинная аномалия кеплеровской орбиты. Тела вращаются по эллипсам вокруг фокуса (F). Эксцентрисическая аномалия описывает угол, который вращающееся тело образовывало бы с центром эллипса (C), если бы оно двигалось по круговой орбите. Следовательно, эксцентрисическая и истинная аномалия эквивалентны, когда орбита круговая.

Эксцентрическая аномалия — это угол между вектором положения тела, центром эллипса и аргументом перицентра (как показано на рисунке 4.2, где точка перицентра выровнена по оси x). Обратите внимание, что звезда находится не в центре эллипса, а в его *фокусе*. Истинная аномалия — это угол, образованный орбитой тела и направлением отсчета, центрированным в фокусе системы. Ее можно вывести из эксцентрической аномалии:

$$\cos E = \frac{e}{1 - e \cos E} \quad (4.10)$$

или из вектора эксцентриситета:

$$\cos E = \frac{\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{e}| |\mathbf{r}|} \quad (4.11)$$

Однако второй подход недействителен, если орбита круговая, поскольку аргумент перицентра не определен. Поэтому первое уравнение является в целом более безопасным подходом. При известной истинной аномалии система замкнута. Действительно, мы можем определить r из этих элементов, используя уравнение эллипса:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v} \quad (4.12)$$

Как мы уже обсуждали, звезда не зафиксирована в фокусе эллипса, а движется вокруг фокуса по своей собственной эллиптической орбите. Фактически, нам следует определить две большие полуоси:

$$\frac{M}{M_* + M_p} = \frac{p}{a} \quad (4.13)$$

$$a_p = \frac{M_*}{M_* + M_p} a \quad (4.14)$$

Как мы видим, расстояние от центра звезды до барицентра системы обычно очень мало. В случае Солнца и Юпитера, где $a = 5.2$ а.е., это дает $a^* = 0.0045$ а.е., или около 95% радиуса Солнца.

Движение звезды вокруг барицентра приводит к изменению радиальной скорости — то есть скорости вдоль линии зрения наблюдателя. Если орбита

планеты круговая и выровнена с линией зрения наблюдателя, то полуамплитуда радиальной скорости звезды, K , имеет особенно простую форму:

$$K = \frac{2\pi a_*}{P} \quad (4.15)$$

which can be deduced rather intuitively. As the orbit is circular, the angular speed of the planet and star are constant in time, and K is simply the circumference of the star's orbit divided by the duration of an orbit. The radial velocity of the star follows a simple sine curve with semi-amplitude given by K :

$$v_r = K \cos v \quad (4.16)$$

where v is the true anomaly as defined previously.²

If the planet's orbit is inclined and elliptical, then

$$K = \frac{2\pi a}{P} \sqrt{1 - e^2} \sin i \quad (4.17)$$

and the changing angular speed of both star and planet introduces new complexity into the radial velocity:

$$v_r = K (\cos(v + \omega) + e \cos \omega) \quad (4.18)$$

Observers measure the radial velocity via Doppler shifts in the star's spectrum. Given a sample of several robust absorption or emission lines, radial velocity curves are subsequently fitted to determine the planet's orbital properties. A more explicit definition of K can be made by invoking Kepler's Third Law on a_* :

$$K = \left(\frac{M_p \sin i}{M_* + M_p} \right)^{1/3} \left(\frac{2\pi}{P} \right)^{1/3} \quad (4.19)$$

² Strictly, the true anomaly is not defined for circular systems, and is usually replaced with a much simpler angular parameter that is equivalent to the mean anomaly if the inclination is zero.

$$= \frac{2\pi G}{P} \frac{M^*}{M_p^{2/3}} \sqrt{1 - e \cos i}$$

Обитаемые миры встречаются редко

Note that measurements of the radial velocity (and ultimately K) are degenerate in $M_p \sin i$. This means that radial velocities measure the ‘minimum mass’ of exoplanets, as $|\sin i| \leq 1$ always.

The presence of multiple planets in a system will result in a superposition of radial velocities. For relatively low-mass planets at moderate distances, this can be modelled by simply adding multiple versions of equation (4.18) together.

При попытке обнаружить планетарный сигнал в данных радиальной скорости строятся периодограммы. Однако этот подход требует непрерывного наблюдения за целевой звездой, что невозможно с Земли, если ищутся планеты с относительно длительными периодами. Пробелы в данных радиальной скорости могут приводить к появлению ложных сигналов при построении периодограмм. Для решения этой проблемы обычно используются периодограммы Ломба-Скаргла (Lomb, 1976; Mortier et al., 2015).

Для Солнца Юпитер создает K около 12 ms^{-1} . Земля создает K приблизительно 0.1 ms^{-1} . Первыми планетами, обнаруженными с помощью этого метода, были «горячие Юпитеры», вращающиеся близко к своим звездам и обладающие сильными сигналами радиальной скорости, т.е. $K \sim 50 \text{ ms}^{-1}$.

Эти горячие юпитеры вряд ли являются наиболее перспективными кандидатами на роль обитаемых миров. Газовые гиганты с температурой поверхности в несколько тысяч Кельвинов, вращающиеся настолько близко к своей родительской звезде, что приливные силы истощают угловой момент вращения планеты, пока она не станет псевдосинхронной со своей орбитой, то есть ее период обращения и период вращения не станут почти равными.

Обитаемые миры, как правило, будут менее массивными и находиться на большем расстоянии от своей звезды. Современные попытки обнаружения аналогов Земли требуют чрезвычайной точности, и эти уровни достигаются с помощью новейших приборов. Новейшим препятствием является звездный шум. Движения плазмы в Солнце создают сигналы радиальной скорости порядка земной. Характеризация и вычитание этой звездной активности является одним из наиболее важных и интенсивно изучаемых аспектов исследований радиальной скорости (see, e.g., Haywood, 2016, for a review).

4.1.3 Регистрация экзопланет по транзитам

Транзитный метод стал чрезвычайно популярным для обнаружения экзопланет благодаря появлению чрезвычайно стабильной фотометрии — то есть возможности измерять полный электромагнитный поток от источника с точностью до нескольких сотен частей на миллион (ppm). Обнаружение транзита основано на прохождении экзопланеты между звездой-хозяином и наблюдателем (иногда это называют первичным затмением), что вызывает небольшое затемнение звездного света (Рисунок 4.3).

Рассмотрим планету радиусом R_p , вращающуюся вокруг звезды радиусом R_* и массой M_* . Если эта планета проходит перед звездой относительно некоторой точки наблюдения, относительный уровень потока будет изменяться по мере движения планеты по звездному диску. Максимальное относительное изменение потока, получаемого наблюдателями при прохождении планеты между ними и звездой, составляет:

$$I \propto \left(\frac{R_p^2}{R_*^2} \right) \quad (4.20)$$

Если радиус звезды хорошо определен, то глубина транзита позволит наблюдателям узнать радиус планеты. Поскольку этот транзит будет повторяться один раз за каждый период обращения планеты, измерение интервала между транзитами даст P .




Рисунок 4.3 Транзит планеты по звёздному диску. Первичный транзит (верхний ряд) блокирует небольшую часть света звезды, в то время как затмение или вторичное затмение (нижний ряд) блокирует свет планеты. В

промежутках между транзитами и затмениями становятся видимыми небольшие участки поверхности планеты, что приводит к вариациям потока вне транзита (так называемая фазовая кривая).

Однако для наблюдения транзита необходимы строго ограниченные значения наклона. В общих чертах, вероятность наблюдения транзита составляет

$$P_{\text{transit}} \approx \left(\frac{1}{1 - e^2} \right) R_* (4.21) a_p$$

где мы предположили, что все наклоны относительно линии зрения наблюдателя одинаково вероятны, и что $R_* \gg R_p$. В случае Земли это уравнение дает вероятность транзита $\sim 0,005$. Даже если планета пройдет транзитом, маловероятно, что она пройдет через центр звездного диска. Параметр удара b указывает на минимальное расстояние, на которое планета приближается к центру звездного диска (в единицах радиуса звезды):

$$b = \frac{a_p \cos i}{R_*} \left(\frac{1 - e^2}{1 + e \sin \omega} \right) \quad (4.22)$$

More information can be gleaned by determining the epoch of four different contact times:

1. First contact of the planet and stellar disc (beginning of ingress)
2. End of ingress, where the transit depth reaches its minimum
3. Beginning of egress, where the planet begins to leave the stellar disc
4. End of egress, when the planet has completely left the stellar disc and the transit is complete.

These are usually labelled $t_I - t_{IV}$ respectively. If the orbital elements of the planet are completely known, then the total transit duration is given by integrating the following:

$$t_{IV} - t_I = \frac{P}{2\pi(1 - e^2)} \int_{v_I}^{v_{IV}} \left(\frac{r(v)}{a} \right)^2 dv \quad (4.23)$$

and so on for other combinations of the four contact times. In the case of circular orbits, the solution is:

$$\left\| t_{IV} - t_I = \frac{P}{\pi} \sin^{-1} \left[\frac{R_*}{a} \frac{1 + \frac{R_p^2}{R_*^2} - b^2}{\sin i} \right] \right\| \quad (4.24)$$

and the length of the full transit

$$-t_{II} = \frac{P}{\pi} \sin^{-1} \left[\frac{a}{i} \sqrt{1 - \left(\frac{R_p}{R_*} \right)^2} \right] \quad (4.25)$$

If the orbits are eccentric, an approximate solution can be obtained by multiplying the above by $\frac{\sqrt{1-e^2}}{1+e \sin \omega}$.

Occultations, or secondary eclipses, occur where the star passes between the planet and the observer. The impact parameter is then

$$b_{occ} = \frac{a_p \cos i}{R_*} \left(\frac{1 - e^2}{1 - e \sin \omega} \right) \quad (4.26)$$

and the occultation depth becomes

$$I_{occ} = \frac{I_{planet}}{I_{planet} + I_{star}} \quad (4.27)$$

где мы теперь используем усредненные по диску интенсивности I для звезды и планеты. Измерение суммарной интенсивности системы на протяжении орбитального периода дает нам доступ к излучению планеты, которое изменяется по мере того, как наблюдатель видит возрастающую и уменьшающуюся долю освещенной поверхности (астрономы обычно называют это фазовой кривой, как показано на рисунке 4.3).

Спектроскопические измерения транзитов позволяют определить глубину транзита при разных длинах волн света. По сути, это измерение способности атмосферы планеты поглощать или пропускать свет различных длин волн. При тщательном моделировании это может дать информацию о химическом составе атмосферы планеты. В сочетании с измерением радиальной скорости для определения массы планеты это может дать много информации о свойствах планеты.




Рисунок 4.4 Спектр суперземли GJ1214b, определенный путем измерения радиуса планеты по данным транзита на нескольких длинах волн. Отсутствие каких-либо особенностей в этом спектре указывает на то, что

облачность играет роль заслоняющей силы. Рисунок взят из (Bean et al., 2010).

Общей особенностью спектров экзопланет является их относительная плоскость. Отсутствие изменений в принимаемом потоке в зависимости от длины волны лучше всего моделируется наличием облаков в верхних слоях атмосферы. На рисунке 4.4 это показано для экзопланеты GJ1214b, суперземли, обнаруженной как по радиальной скорости, так и по транзиту. Её масса оценивается в $6,3 M_{\oplus}$, а радиус — примерно в $2,8 R_{\oplus}$. Различные попытки охарактеризовать измеренный радиус как функцию длины волны показали плоский, без особенностей спектр. Относительно низкая плотность GJ1214b привела многих к тому, что ее назвали «водным миром», и ранние модели ее спектра предполагали, что это может быть так, но пока наблюдения не смогут проникнуть сквозь эти облака, мы будем оставаться в неопределенности.

4.1.4 Гравитационное микролинзирование

В настоящее время общая теория относительности (ОТО) является наилучшим описанием того, как гравитационная сила действует в природе. Она представляет собой фундаментальный сдвиг по сравнению с классической ньютоновской гравитацией, поскольку требует, чтобы пространство и время не были отдельными сущностями, а являлись аспектами единой сущности — пространства-времени, которое искажается присутствием материи или энергии. Это искажение затем влияет на движение объектов в этом искривленном пространстве. Поскольку мы не можем воспринимать кривизну пространства-времени, нам кажется, что на тело действует сила, которую мы называем «гравитацией».

Если общую теорию относительности можно свести к одному уравнению, то это будет уравнение Эйнштейна для поля:

$$= - \frac{18\pi G}{2-g_{\mu\nu}R} = \frac{1}{4} T_{\mu\nu} - g_{\mu\nu} \quad (4.28)$$

где $G_{\mu\nu}$ — тензор Эйнштейна, а $R_{\mu\nu}$ — тензор кривизны Риччи, описывающий, как форма и геометрия пространства-времени отклоняются от плоского или евклидова пространства. Уравнение поля Эйнштейна разрешимо при разумном выборе метрического тензора $g_{\mu\nu}$. Метрика, по сути, определяет, как измеряются расстояния в пространстве-времени.

Например, если мы хотим смоделировать пустое пространство в декартовых координатах, мы выбираем метрику

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \quad (4.29)$$

Эквивалентный метрический тензор — это

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.30)$$

$T_{\mu\nu}$ — это тензор *импульса-энергии*, представляющий собой перепись всех источников материи и энергии в регионе. Это порождает классический афоризм:

*Материя указывает пространству, как искривлять свою форму, а пространство указывает материи, как двигаться.*³

В плоском пространстве-времени лучи света или фотоны движутся по прямолинейным траекториям. В искривленном пространстве-времени лучи света продолжают двигаться по прямолинейным траекториям, проецируемым на искривленную поверхность (геодезические линии). Таким образом, при наличии сильной кривизны не сходящиеся или расходящиеся лучи света могут быть сфокусированы в фокусной точке аналогично линзе..

Этот сильный эффект линзирования можно наблюдать вокруг скоплений галактик. Объекты, находящиеся на большом расстоянии от скопления, могут подвергаться линзированию испускаемых ими фотонов вокруг скопления и приниматься Землей, в некоторых случаях создавая множественные изображения объекта. В космологических масштабах изображения галактик слабо искажаются темной материей, находящейся между галактикой и Землей. Это слабое линзирование лишь незначительно влияет на увеличение или конвергенцию галактики и эллиптичность, выраженную как 2-компонентный сдвиг. Измеренные на небе поля конвергенции и сдвига кодируют информацию о действующих линзах — по сути, обо всем распределении темной материи между ними.

Исходя из некоторых предположений о типичной эллиптичности галактик (и их ориентации друг относительно друга), космологи могут вывести

³ This is attributed to John Wheeler, a Manhattan Project scientist and giant in the field of relativity. He would supervise record numbers of PhD students at Princeton that would go on to define the field of GR.

важные статистические свойства промежуточной темной материи, а также другие свойства Вселенной, такие как темная энергия (подробнее об этом можно узнать в Bartelmann and Schneider, 2001, and Schneider, 2005).

В случае обнаружения экзопланет наиболее важным явлением является микролинзирование. Речь идёт о линзах гораздо меньшей массы, таких как отдельные звёзды. Хотя микролинзирование имеет много общих черт с сильными гравитационными линзами, создаваемые им множественные изображения не разрешаются, поскольку расстояния между ними на небе малы.

Рассмотрим звезду, которая испускает фотоны приблизительно в направлении наблюдателя (звезды-источника). Если линия зрения между источником и наблюдателем содержит достаточно высокую плотность звёзд, линзирующая звезда пересечёт линию зрения. Поскольку множественные изображения, создаваемые линзой, не разрешаются, источник будет казаться увеличенным, становясь ярче и темнее с характерным временным масштабом порядка суток. Если линзирующая звезда содержит планету, то эта планета может действовать как вторая линза, создавая ещё одно увеличение, когда звёздная система пересекает линию зрения. Это вторичное событие может длиться всего час, но в кривой блеска этого микролинзирования закодированы как масса, так и большая полуось планеты. Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим проблему формально (Рисунок 4.5). Нам будет достаточно рассмотреть проблему в одномерном случае, но на практике линзирование — это двумерное явление на небе.

Источник излучения находится на расстоянии D_S от наблюдателя, а линзы на расстоянии D_L .⁴ Мы обозначим P_S и P_L как плоскость источника и плоскость линзы соответственно. Свет от источника отклоняется линзой под углом α к наблюдателю. Это отклонение приводит к тому, что изображения источника появляются на угловом расстоянии θ от линзы. Уравнение линзы описывает, как это кажущееся угловое расстояние связано с истинным расстоянием β , которое наблюдалось бы, если бы линзирование не происходило.

⁴ Обратите внимание, что это угловые диаметры. В общей теории относительности кривизна пространства-времени гарантирует, что различные методы измерения расстояния, такие как использование видимого углового размера при известном физическом размере или видимого потока при известной светимости, не будут согласовываться в своих результатах!




Рисунок 4.5 Геометрия линзирования. Источник (в плоскости источника, обозначенной S) излучает свет, который затем линзируется массой в плоскости линзы L. Затем из этой геометрии выводится уравнение линзирования для определения массы линзы.

Это уравнение линзы можно вывести с помощью простой геометрии и приближения малых углов. Физическое расстояние между линией зрения наблюдателя и местоположением источника (в плоскости источника), η , равно

$$\eta = D_S \tan \beta \approx D_S \beta, \quad (4.31)$$

где мы использовали приближение малых углов. Физическое расстояние между линзой и изображением в плоскости линзы, ξ , равно

$$\xi = D_L \tan \theta \approx D_L \theta \quad (4.32)$$

Мы можем переформулировать η следующим образом:

$$\eta = \frac{D_S}{D_L} \xi - (D_L - D_S) \hat{\alpha} = \frac{D_S}{D_L} \xi - D_{LS} \hat{\alpha}, \quad (4.33)$$

where we have defined $D_{LS} \equiv D_L - D_S$ for convenience. Dividing throughout by D_S gives us the lens equation:

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \hat{\alpha} \quad (4.34)$$

Теперь остается лишь вычислить угол отклонения α . Ньютоновская гравитация дает нам предсказание для этого отклонения, которое равно:

$$\hat{\alpha} = \frac{2GM}{c^2} \frac{1}{DL\theta} \quad \text{Newton} = c^2 \xi = c^2 DL\theta \quad (4.35)$$

Однако для получения угла отклонения из уравнений поля Эйнштейна необходимо выбрать метрику. Мы будем использовать метрику Шварцшильда, которая описывает кривизну пространства-времени — в сферических координатах (r, θ, ϕ) — одной невращающейся точечной частицы массой M :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2. \quad (4.36)$$

This yields an extra factor of two, and hence

$$\hat{\alpha}(\xi) = \frac{4GM}{c^2 DL\theta} \quad (4.37)$$

This yields the lens equation as:

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS} 4GM}{D_S D_L c^2 \theta} \quad (4.38)$$

If $\beta = 0$ (i.e., the lens and source are in perfect alignment), then the image forms an *Einstein ring* with angular radius equal to the *Einstein radius*, θ_E :

$$= \frac{4}{c^2} \frac{GM D_{LS}}{D_S D_L} \quad \theta_E \quad (4.39)$$

The lens equation can be divided by the above to make it dimensionless:

$$u = y - y^{-1} \quad (4.40)$$

which is a simple quadratic expression, and therefore typically has two solutions and hence two images are seen (if $\beta = 0$):

$$y^{\pm} = \pm \frac{1}{2} \left(\sqrt{u^2 + 4} \pm u \right) \quad (4.41)$$

Lensing produces a magnification of the source star in both images:

$$A_{\pm}(4.42) = \left| \frac{y_{\pm}}{u} \frac{dy_{\pm}}{du} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{u^2 + 2}{u\sqrt{u^2 + 4}} \pm 1 \right|$$

with a total magnification

$$A(u) = \frac{u^2 + 2}{u\sqrt{u^2 + 4}} \quad (4.43)$$

Обратите внимание, что на радиусе Эйнштейна $u = 0$, и увеличение не определено. Движение источника и линзы проще всего моделируется как плавное изменение углового расстояния между источником и линзой. Если нам известно собственное движение источника относительно линзы, т.е. скорость изменения углового расстояния $\mu_{\text{rel}} \equiv du/dt$, мы можем определить временную шкалу $t_E = \theta_E/\mu_{\text{rel}}$, и, следовательно

$$u(t) = \left(u_0^2 + \left(\frac{t - t_0}{t_E} \right)^2 \right)^{1/2} \quad (4.44)$$

where u_0 is the minimum angular separation, which occurs at time t_0 . Plugging this into equation (4.43) gives the classic ‘Paczynski curve’, as plotted in Рисунок 4.6.

Если присутствует планета, как в данном случае, будет наблюдаться возмущение кривой Пачинского, указывающее на её наличие. Обычно происходит следующее: одно из изображений, созданных линзирующей звездой, будет линзировано планетой во второй раз. Это дополнительное линзирование обычно длится около

$$t_{E,p} = \sqrt{\frac{M_p}{M_* t_{E,*}}} \quad (4.45)$$

Как правило, основное событие линзирования длится $t_{E,*} = 10\text{--}100$ часов. Это означает, что для планет земной массы вторичное событие линзирования может длиться всего несколько часов. Кроме того, поскольку для микролинзирования требуется точное выравнивание линзы, источника и наблюдателя, системы микролинзирования можно наблюдать только один раз.




Рисунок 4.6 Характерная кривая блеска, указывающая на событие микролинзирования экзопланеты. Звезда-линза создает главную кривую, причем вклад планеты относительно невелик по амплитуде и исключительно кратковременный.

С другой стороны, события микролинзирования удивительно нечувствительны к массе планеты и особенно чувствительны к планетам, вращающимся вокруг локального радиуса Эйнштейна $r_E = D_L \theta_E$, поскольку изображения, как правило, формируются вокруг или на кольце Эйнштейна. Это отлично дополняет поиски по радиальной скорости и транзитам, поскольку хорошо работает при обнаружении планет на больших расстояниях от звезды, как и наш последний метод обнаружения, который мы обсудим далее.

4.1.5 Прямое наблюдение

Хотя описанные выше методы являются относительно косвенными, недавние достижения в области визуализации позволили наблюдателям экзопланет использовать, пожалуй, наиболее интуитивно понятный метод

обнаружения — обнаружение планет путем прямого измерения излучаемого или отражаемого ими света, аналогично тому, как мы обнаруживаем почти все другие астрономические явления.

Хотя это наиболее простая с концептуальной точки зрения модель, она чрезвычайно сложна. Наблюдатель должен улавливать фотоны от планеты, в то время как гораздо более яркий объект (родительская звезда) находится очень близко к ней на небе. Мы можем определить контраст между планетой и ее родительской звездой (на заданной длине волны λ) как:

$$C_{\lambda} = \frac{F_{\lambda,p}}{F_{\lambda,*}} \quad (4.46)$$

где F — суммарный поток излучения, принимаемый каждым объектом, p и $*$ обозначают планету и звезду соответственно. Чем выше контраст, тем выше вероятность обнаружения рассматриваемой планеты. Как правило, с помощью этого метода предпочтительно обнаруживаются очень молодые планеты, поскольку они производят значительно больший поток излучения по мере возвращения к своей равновесной форме (и, следовательно, к своей равновесной температуре).

Длина волны наблюдения, λ , окажется важной, поскольку спектральное распределение энергии (СЭД) звезды и планеты будет значительно различаться, что сделает определенные длины волн предпочтительными для планет разного возраста, вращающихся вокруг звезд разных типов. Масштаб задачи уже очевиден: в видимом диапазоне контраст Земли составляет 10^{-10} ! По мере увеличения длины волны в инфракрасном диапазоне ($\lambda = 10$ мкм) контраст возрастает до 10^{-8} .

Эти трудности гарантировали, что первые прямые обнаружения экзопланет приведут к обнаружению молодых, горячих планет, вращающихся на больших расстояниях от своей звезды. Максимальное угловое расстояние между звездой и планетой на небе можно оценить, используя приближение малых углов:

$$\theta = \frac{a_p(1 + e_p)}{D} \quad (4.47)$$

где a_p и e_p — соответственно большая полуось и эксцентриситет планеты, а D — расстояние от наблюдателя до планетной системы. Астрономы

используют парсек в качестве удобной единицы измерения расстояния для подобных расчетов. Если орбита круговая, с большой полуосью, равной полуоси Земли ($a_p = 1$ а.е.), и расстояние до системы составляет 1 парсек (пк), то $\theta = 1$ угловая секунда, что равно $1/3600$ градуса.

Ближайшая к Земле система звезд главной последовательности, система Альфа Центавра, по счастливому совпадению находится примерно на расстоянии 1 ПК. Астрономы обычно используют расстояние в 10 ПК в качестве эталонной длины, и поэтому наше эталонное значение θ (опять же, предполагая $a_p = 1$ а.е.) составляет 0.1 угловой секунды, или 100 мс (милли-угловых секунд).

Вышеизложенное подчеркивает необходимость каким-то образом «защитить» наши телескопы от звездного света, оставив только свет планеты (как термически генерируемый, так и звездный свет, отраженный верхними слоями атмосферы планеты). В общих чертах, наблюдателям доступны два класса наблюдений:

1. методы коронографии, которые блокируют звездный свет с помощью непрозрачной маски, встроенной в оптику телескопа, и
2. методы интерферометрии, которые объединяют данные с нескольких телескопов с различной длиной пути до источника, чтобы компенсировать вклад звезды.

Приведенные выше описания, естественно, поверхностны, и оптика обоих методов заслуживает отдельного учебника. Действительно, в таком учебнике, вероятно, было бы сказано, что оба метода — две стороны одной медали: оба включают в себя объединение фазы и амплитуды входящих фотонов света для создания деструктивной интерференции и подавления звездного сигнала. Я не буду углубляться в сложные рассуждения об оптике, но кратко упомяну некоторые важные понятия, влияющие на нашу способность непосредственно получать изображения экзопланет.

Функция рассеяния точки (PSF) телескопа — это протяженная картина, возникающая при наблюдении точечного источника. При съемке звездной системы «пятно» PSF, создаваемое звездой, достаточно велико, чтобы полностью заглушить сигнал экзопланеты, если большая полуось планеты достаточно мала. В идеальной оптической системе PSF является функцией Эйри:

$$I(u) = \frac{1}{(1 - \epsilon^2)^2} \left(\frac{2J_1(u)}{u} - \epsilon^2 \frac{2J_1(\epsilon u)}{\epsilon u} \right) \quad (4.48)$$

I — поверхностная яркость как функция расстояния от максимума (измеряемого безразмерной величиной u , которая, в свою очередь, зависит от углового расстояния и диаметра главной апертуры). — радиус центральной маски затемнения, если она присутствует. J_1 — функция Бесселя первого рода. Эта функция приводит к образованию центрального

ядра излучения вокруг максимума («диска Эйри»), за которым следуют «кольца Эйри» с уменьшающейся интенсивностью.

Функция рассеяния точки (PSF) уникальна для каждого телескопа/инструмента. Астрономы и инженеры прилагают большие усилия для определения PSF оптической системы, чтобы ее можно было вычесть из исходного изображения.

Несовершенства в оптике телескопа приводят к появлению спеклов на результирующем изображении. Идеальная система фокусирует лучи фотонов с точной амплитудой и фазой, что приводит к идеальному волновому фронту, принимаемому детекторным чипом. Несовершенства в системе приводят к ошибкам в волновом фронте, что приводит к артефактам изображения, которые мы называем спеклами. Это главный враг прямой визуализации: спекл чрезвычайно трудно отличить от экзопланеты.

Спекл имеет множество источников и не ограничивается дефектами оптики. Для наземных телескопов турбулентность в атмосфере Земли также может искажать входящие волновые фронты и создавать собственные спеклы.

Атмосферный спекл можно скорректировать с помощью методов адаптивной оптики. Ошибки волнового фронта диагностируются путем наблюдения опорной звезды (реальной или искусственно созданной путем лазерного возбуждения атомов натрия в верхних слоях атмосферы). Затем ошибки, возникающие в реальном времени из-за атмосферной турбулентности, передаются на исполнительные механизмы в зеркале телескопа, которые деформируются, чтобы «скорректировать» турбулентность и уменьшить атмосферный спекл.

Однако спеклы никогда не могут быть полностью удалены, поскольку они могут быть результатом любого нежелательного рассеяния света в оптике телескопа. Для образования спеклов достаточно отдельных пылинок на зеркалах телескопа! Вместо этого астрономические изображения обрабатываются постфактум для выявления источников зернистости, которые впоследствии могут быть удалены.

Angular Differentiation Imaging Метод ADI (Advanced Display) использует тот факт, что если телескоп вращается вокруг оси, параллельной линии наблюдения, то оставшиеся после применения адаптивной оптики и т. д. спеклы будут вращаться вместе с ним. Если на изображении действительно присутствуют экзопланеты, они не будут вращаться вместе с телескопом, оставаясь неподвижными на небе. Путем соответствующего вычитания повернутого изображения из неповернутого изображения можно удалить спеклы, и экзопланета останется.

Simultaneous Spectral Differentiation Imaging Метод (SSDI) использует зависимость спекл-изображений от длины волны. Расстояние спекла от центральной звезды изменяется при изменении длины волны изображения, а положение планеты остается неизменным. Соответствующее масштабирование изображения позволяет идентифицировать спекл и впоследствии удалить его из изображения.

Первая система, обнаруженная методом прямого изображения, вращается вокруг звезды HR 8799 (Рисунок 4.7). Эта система содержит несколько массивных молодых газовых гигантов, вращающихся на расстояниях 24, 38 и 68 астрономических единиц. Это открытие стало возможным благодаря развитию адаптивной оптики и метода ADI на телескопах Keck и Gemini в инфракрасном диапазоне (1,1–4,2 мкм).

Метод прямого изображения позволил обнаружить несколько планет юпитерианского типа на расстояниях 10 астрономических единиц и более от своих звезд-хозяев. Планеты, потенциально пригодные для жизни, вряд ли находятся на таких расстояниях (см. следующий раздел), и будущие инструменты должны будут уметь разрешать гораздо меньшие угловые расстояния и гораздо меньшие контрасты. (Males et al., 2014).

4.1.6 Обнаружение жизни на экзопланетах

Биосигнатуры

Растущие возможности человечества по изучению природы экзопланет, особенно их атмосферного состава, в конечном итоге могут привести к обнаружению внеземной жизни. *Биосигнатуры* (иногда биомаркеры) — это признаки в данных об экзопланетах, указывающие на наличие у данной экзопланеты биосферы.




Рисунок 4.7 Обнаружение нескольких экзопланет методом прямой съемки вокруг звезды HR 8799. Артефакты на изображении вокруг звезды обусловлены методом угловой дифференциации изображения (ADI), используемым для удаления спеклов с изображений. Два верхних изображения представляют собой изображения в одном диапазоне длин волн, а нижнее изображение — трехцветное изображение в трех инфракрасных диапазонах длин волн. Взято из Marois et al. (2008).

Атмосфера Земли находится в состоянии термодинамического неравновесия, которое обычно измеряется путем рассмотрения свободной энергии Гиббса текущего состояния и свободной энергии Гиббса конечного состояния равновесия. Совместное присутствие O_2 и CH_4 указывает на это неравновесие, поскольку оба вещества должны вступать в реакцию, удаляя по крайней мере одно из них из атмосферы:




Поскольку оба вещества все еще присутствуют в атмосфере, они постоянно пополняются — в случае Земли, за счет биологических организмов. Поэтому утверждается, что совместное присутствие CH_4 и O_2 (наряду с небольшим количеством CO_2) является наиболее убедительным доказательством — доступным с межзвездных расстояний — того, что Земля обладает биосферой. (Lederberg, 1965; Lovelock, 1965; Lovelock and Kaplan, 1975).

Конечно, это основано на наблюдениях за современной Землей. Атмосфера Земли в докембрийский период (более 500 миллионов лет назад) была гораздо менее насыщена кислородом, чем сегодня, и было доказано, что термодинамическое неравновесие Земли уменьшалось с уменьшением O_2 (Krissansen-Totton et al., 2018). Более тревожным моментом при использовании атмосферного неравновесия в качестве индикатора является то, что уровень атмосферного неравновесия на Земле почти полностью определяется уровнем кислорода — по сути, мера неравновесия — это мера кислорода, что, как мы увидим ниже, не обязательно гарантирует биологическую активность.

В любом случае, концепция изменения состава атмосферы Земли биологическими организмами заставила многих задуматься о том, как такие изменения в атмосферах экзопланет могут рассматриваться как биосигнатура. Основная проблема этого подхода заключается в растущем числе ложных срабатываний, когда биосигнатура образуется в результате абиотических процессов. То, что может считаться биосигнатурой на Земле, не обязательно является таковой на других мирах.

Например, значительные усилия на ранних этапах были направлены на обнаружение O_2 и O_3 , ключевых биоактивных молекул в атмосфере Земли (O_3 образуется в результате фотохимических реакций с O_2). Хотя это, безусловно, биосигнатуры для Земли, они не являются биосигнатурами в целом. Для планет земной группы, вращающихся вокруг маломассивных звезд типа М-карликов, повышенный уровень УФ-излучения позволяет проводить фотолиз H_2O с образованием O :



В результате трехчастичной рекомбинации может образоваться O_2 :



и O_3 по аналогичной реакции. Фотодиссоциация CO_2 , SO_2 и любых других кислородсодержащих газов также является источником атомарного

кислорода (Domagal-Goldman et al., 2014; Tian et al., 2014). Поэтому нам следует с крайней осторожностью относиться к O₂ как к биосигнатуре, не только как к ложноположительному результату, но и как к ложноотрицательному. На Земле ранние формы жизни не производили кислород в больших количествах до появления цианобактерий. Даже тогда производство кислорода посредством фотосинтеза, вероятно, предшествовало крупномасштабному насыщению атмосферы кислородом на миллиарды лет, поскольку различные геофизические процессы действовали, подавляя этот процесс (Meadows et al., 2017). Это означало бы обитаемую планету, которая не демонстрирует желаемой биосигнатуры.

Поскольку статус кислорода как биосигнатуры в значительной степени зависит от контекста, были предприняты значительные усилия по составлению списка потенциальных газов-биосигнатур. Систематические усилия нескольких исследовательских групп были направлены на составление списков атмосферных газов, которые, по-видимому, могли бы соответствовать критериям биосигнатур.

Наиболее широко обсуждаются работы Сигера и др. (Seager et al., 2013, 2016), которые попытались составить список возможных молекул путем комбинаторного исследования. В результате была создана база данных, содержащая около 14 000 молекул, содержащих до шести атомов (исключая водород), которые стабильны и летучи при стандартной температуре и давлении. Из них около 2500 состоят из классических биогенных элементов (NCHOPS), причем большинство представляют собой галогенированные соединения (содержащие, например, бром или хлор), а также небольшая часть неорганических соединений. Примерно четверть биогенных соединений образуется в результате жизни на Земле, а также небольшая часть галогенированных соединений.

Такой подход позволил выявить 622 соединения, которые вполне обоснованно можно было бы искать в атмосферах экзопланет в поисках доказательств существования жизни. Хотя многие из этих соединений присутствуют в атмосфере Земли лишь в следовых количествах, очевидно, что они могут присутствовать в больших количествах в атмосферах других планет земной группы, поскольку у них будет другой начальный состав атмосферы и термодинамическое состояние. Несмотря на это, проблемы с ложными срабатываниями и ложными отрицаниями остаются. Применяя байесовский формализм, мы можем описать эти события

- B – ‘Molecule B is detected in an exoplanet’s atmosphere’
- L – ‘Экзопланета имеет биосферу’

and ask what is the probability the planet has a biosphere, given that we detect molecule B, $P(L|B)$? We must then construct a likelihood $P(B|L)$, and hence

$$P(L|B) = \frac{P(B|L)P(L)}{P(B|L)P(L) + P(B|\neg L)P(\neg L)}$$

where $\neg$ indicates the negation, i.e., $\neg L$ = 'The exoplanet does not have a biosphere'. We should therefore be careful about the probability of a false positive $P(B|\neg L)$ when attempting to compute our posterior. The prior $P(L)$ will also play a significant role. The probability of a false negative is then:

$$P(\neg L|B) = \frac{P(\neg B|L)P(L)}{P(B|L)P(L) + P(\neg B|\neg L)P(\neg L)}$$

As priors play such an important role in this calculation, it is clear that any attempt to determine the presence of a biosphere will rely on attempts to find multiple coexisting biosignatures, with the findings from one signature being used to inform the prior of the next, and most likely the formation of conditional probabilities:

$$P(L|B_1, B_2) = \frac{P(B_1|L, B_2)P(L)}{P(B_1|L, B_2)P(L) + P(B_1|\neg L, B_2)P(\neg L)} \quad (4.54)$$

This will require careful modelling of how biosignatures interact with the atmosphere, surface and interior of terrestrial planets if appropriate likelihood functions are to be derived.

Биосигнатуры не ограничиваются спектральными линиями в атмосфере — Земля также производит поверхностные биосигнатуры, которые можно обнаружить в отраженном свете. Например, красный край спектра вегетативных организмов представляет собой резкое увеличение отражательной способности в диапазоне от 0,67 до 0,76 мкм, создаваемое фотосинтезирующими организмами, содержащими пигмент хлорофилл а. Существует множество других биологических пигментов, которые также создают различные картины отражения, но для их полной характеристики в целях наблюдения за экзопланетами необходимы дополнительные исследования (Catling et al., 2017; Schwieterman et al., 2017).

Техносигнатуры

Аналогичным образом, мы можем определить техносигнатуру как признак в астрономических данных, указывающий на наличие технологий. На практике это определение охватывает практически любой интересующий нас сигнал SETI, от радиоизлучения до сфер Дайсона и межзвездных зондов, и SETI вполне можно было бы переименовать в «Поиск внеземных техносигнатур».

Однако полезно дать более узкое определение и потребовать, чтобы техносигнатура непреднамеренно испускалась экзопланетой. Примерами могут служить загрязнение хлорфторуглеродами (ХФУ), не имеющими абиотического источника (Lin et al., 2014), искусственное освещение (Loeb and Turner, 2012) или тепловые отходы, производимые технологическими цивилизациями, как это было предпринято в рамках исследования GNAT (Wright et al., 2014).

Техносигнатуры, как правило, имеют одно существенное преимущество перед биосигнатурами: у них мало или совсем нет ложных срабатываний. Конечно, совершенно очевидно, что почти любая техносигнатура может давать ложноотрицательные результаты – не каждая цивилизация загрязняет окружающую среду или производит тепловые отходы..

4.1.7 Популяция экзопланет

На рисунке 4.8 показана известная на данный момент популяция экзопланет, отсортированная по их радиусу, и эквивалентное излучение, которое они получают от своей звезды. В настоящее время подтверждено существование около 3800 экзопланет, из которых примерно 1300 были обнаружены с помощью космического телескопа «Кеплер», что делает его нынешним лидером по обнаружению экзопланет.

Учитывая наше понимание различных методов обнаружения, сразу становится ясно, что необходимо учитывать систематическую ошибку отбора. Измерения радиальной скорости более чувствительны к более массивным планетам на более близких расстояниях от родительской звезды, поскольку величина гравитационной силы зависит от обоих факторов. Транзитные измерения более чувствительны к более крупным планетам и имеют более высокую вероятность обнаружения по мере уменьшения расстояния до звезды. Гравитационное микролинзирование чувствительно к промежуточным полуосям, а прямое изображение чувствительно к горячим

планетам на больших расстояниях — на практике прямое изображение в настоящее время эффективно только для обнаружения очень молодых планет, которые все еще обладают собственной светимостью из-за термического сжатия.




Рисунок 4.8 Зависимость количества экзопланет от массы планеты и большой полуоси орбиты, полученная с помощью Exoplanet Data Explorer (exoplanets.org, доступ от 10 августа 2018 г.). Треугольники обозначают экзопланеты, обнаруженные транзитом, круги — обнаруженные методом радиальной скорости, кресты — методом микролинзирования, а квадраты — методом прямого изображения.

На данный момент ожидается, что несколько космических миссий значительно улучшат как количество, так и качество данных об экзопланетах. Спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) уже исследует всё небо, хотя и звёзды для него несколько ярче тех, которые были обнаружены телескопом Kepler. Это решение позволит наземным миссиям, использующим метод радиальной скорости, проводить последующие наблюдения обнаруженных TESS объектов. Подход, охватывающий всё небо, также даст нам первое истинное представление о том, различается ли формирование планет в разных местах Млечного пути.

Миссию PLATO (PLanetary Transits and Oscillations of stars) можно охарактеризовать как преемника Kepler. Она должна изучать звёзды

значительно тусклее, чем TESS, и к концу своей миссии сможет охватить около половины неба. Как и TESS, она может значительно увеличить количество известных экзопланет.²




Рисунок 4.9 Радиус экзопланеты (в радиусах Земли) в зависимости от эффективного потока звездного излучения, где I = поток звездного излучения, принимаемый Землей. Пунктирные линии показывают значения для Земли. Данные предоставлены Архивом экзопланет НАСА.

CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) — это специальная миссия по изучению экзопланет. Запуск был запланирован на 2017 год, но не состоялся. В рамках миссии должна была использоваться транзитная спектроскопия (среди прочих методов) для исследования известных систем экзопланет с целью высокоточной оценки глубины транзитов. Это позволило бы получить данные об атмосфере планет от радиуса Нептуна до радиуса Земли вокруг относительно ярких звезд, а также о более крупных планетах вокруг более тусклых объектов.

Эта информация служит основой для таких миссий как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

На сегодняшний день подтверждено лишь несколько планет земной группы, получающих инсоляцию на уровнях, аналогичных земному

(Решение R.1, Рисунок 4.9). Как правило, они вращаются вокруг маломассивных звезд, поскольку планеты земной группы обеспечивают более интенсивные транзиты, а радиальная скорость создает более сильные сигналы транзита и радиальной скорости вокруг этих звезд. Среди известных современных кандидатов можно отметить Проксиму Центавра b, планету размером с Землю, вращающуюся вокруг ближайшей к нам звезды с периодом около 11 дней (Anglada-Escudé et al., 2016). Система TRAPPIST-1, представляющая собой звезду очень малой массы ($0,08 M_{\odot}$) с семью планетами, имеет три тела размером с Землю, удовлетворяющие некоторым условиям обитаемости (Gillon et al., 2017); Kepler-186f, планета массой $1,1 R_{\oplus}$, вращающаяся вокруг звезды массой $0,5 M_{\oplus}$, и LHS-1140b, сверхземля массой $6,6 M_{\oplus}$, вращающаяся вокруг близлежащей маломассивной звезды, наблюдались как транзитным методом, так и методом радиальной скорости, что является довольно редким явлением для объектов, которые сейчас обычно описываются как «потенциально обитаемые». Из-за существующей предвзятости отбора все эти объекты вращаются вокруг маломассивных звезд, что может представлять угрозу для их обитаемости (Решение R.9), как станет ясно в следующих разделах.

4.2 Обитаемые зоны

В предыдущем разделе было показано, что планетные системы чрезвычайно распространены во Вселенной, настолько, что в уравнении Дрейка $f_p \sim 1$. Однако мы по-прежнему пребываем в состоянии глубокого невежества в отношении многих из этих систем. Поиск транзитов дает нам силуэт планеты, и, если нам повезет, некоторую информацию о составе атмосферы (если наше моделирование хорошее и атмосфера не слишком облачная). Поиск радиальных скоростей дает нам оценку массы, которую можно использовать в сочетании с данными транзитов для оценки общего состава — но, как мы увидим, микроэлементы чрезвычайно важны для обитаемости, термина, который плохо определен и зависит от многих факторов.

Пока мы всё ещё пребываем на стадии неопределённости и глубокие знания о землеподобных экзопланетах будут оставаться нам недоступны в течение следующих десяти-двадцати лет, то что мы можем сделать, чтобы оценить обитаемость миров за пределами Солнечной системы?

Мы пока можем вернуться к классической парадигме обитаемой зоны, которая имеет глубокие корни.

4.2.1 Звёздные зоны обитаемости

Современная версия зоны обитаемости была впервые предложена Хуангом (Huang, 1959), который, как считается, дал концепции её название, но намёки на эту концепцию можно найти ещё в начале 1950-х годов (Strughold, 1953), когда несколько авторов интересовались «экосферой» или «поясом жидкой воды», что, оглядываясь назад, возможно, является более подходящим названием.

По сути, звёздная обитаемая зона (SHZ) определяется следующим образом. Если предположить, что данная планета похожа на Землю, то она вращается внутри SHZ своей родительской звезды, если получаемое ею излучение позволяет существовать жидкой воде на её поверхности. Поток излучения F , получаемый терранетой на орбитальном расстоянии r от звезды (которая излучает энергию со скоростью, определяемой её светимостью L), равен:

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} \quad (4.55)$$

Как только этот поток достигает верхних слоев атмосферы Земли, он либо поглощается, либо отражается обратно в космос. Атмосферное альbedo α — это мера вероятности отражения фотона. Поглощенный поток $F_{\text{absorb}} = (1 - \alpha)F$, где α обычно является функцией длины волны. Поверхность также имеет связанное с ней альbedo, и это необходимо учитывать при расчете ожидаемой температуры поверхности планеты.

Атмосферная непрозрачность κ — это мера вероятности поглощения фотона внутри газовой массы. Средняя длина пути, которую проходит фотон в среде с плотностью ρ , составляет:

$$= \frac{1}{\rho \kappa} \quad (4.56)$$

Непрозрачность также зависит от длины волны. Как и альbedo, она чувствительна не только к температуре атмосферы, но и к её составляющим. Молекулы, атомы и ионы, составляющие атмосферу планеты, будут взаимодействовать с фотонами по-разному в зависимости от свойств их составляющих (в случае молекул — атомов и связанных с ними связей).

Расчёты обитаемой зоны основаны на законе обратных квадратов, описанном в уравнении (4.55), но мы уже видим, что для расчёта пределов обитаемой зоны необходимо начать с подробного описания атмосферы. Это

накладывает жёсткие ограничения на то, что могут представлять собой пределы обитаемой зоны для большой и крайне неоднородной выборки экзопланет.

Как правило, обитаемые зоны определяются внутренней и внешней радиальными границами, и, таким образом, зона представляет собой кольцо. Уравнение (4.55) гарантирует, что внутри кольца получаемое излучение слишком велико, и Земля начнёт терять воду из-за неуправляемого парникового эффекта. В этом сценарии, по мере того как планета начинает нагреваться, увеличение содержания водяного пара в атмосфере повышает её непрозрачность, запуская положительную обратную связь испарения и увеличения непрозрачности до тех пор, пока океаны не испарятся. Этот пар проникает в верхние слои атмосферы и подвергается фотолизу под действием ультрафиолетового излучения, превращаясь в водород и кислород. Затем водород испаряется, и жизнь на поверхности планеты полностью исчезает в течение нескольких сотен миллионов лет (Barnes et al., 2013).

За пределами зоны конвергентного роста уровень радиации слишком низок для поддержания существования жидкой воды. На этом внешнем пределе даже образование облаков CO₂ недостаточно для поддержания тепла на планете. Фактически, при определенной плотности облаков альbedo планеты увеличивается, ограничивая способность облаков удерживать тепло, отсюда и название «максимальный парниковый эффект», применяемое к внешнему пределу зоны конвергентного роста. Как только планета превышает максимальный парниковый эффект, вся планета замерзает. Этот процесс замерзания также является частью положительной обратной связи, называемой обратной связью «лед-альbedo». Альbedo ледяных щитов выше, чем альbedo океанов. Следовательно, по мере того, как планета начинает замерзать, ее альbedo увеличивается, уменьшая чистый поток, поглощаемый на поверхности, ускоряя процесс замерзания до тех пор, пока не замерзнет вся поверхностная вода планеты.

Таким образом, у нас есть два крайних критерия, определяющих границы зоны конвергентного роста: при каком потоке происходит неуправляемый парниковый эффект и при каком потоке происходит неуправляемое замерзание? Именно в ответах на эти вопросы кроется истинная сложность расчета обитаемой зоны. Для определения того, какие предельные значения потока вызывают эти два события, нам необходимо сделать довольно масштабные предположения о составе атмосферы планеты (обычно N₂/O₂/CO₂), гравитации на поверхности планеты и высоте атмосферного масштаба, не говоря уже о профиле температуры и давления

в атмосфере и океаническом покрове. За очень немногими исключениями, расчеты обитаемой зоны предполагают наличие земного тела. С учетом этого предположения, расчеты переноса излучения могут взять звезду с заданным спектральным распределением энергии, вычислить влияние этого спектра на атмосферу планеты и сделать вывод о наличии жидкой воды на поверхности такой планет.

Методы расчета обитаемой зоны для Солнечной системы значительно эволюционировали за прошедшие годы. Переломный момент наступил с работами Кастинга и др. (Кастинг, 1988; Кастинг и др., 1993). Они попытались рассчитать внутреннюю и внешнюю границы обитаемой зоны, используя одномерную высотную модель атмосферы Земли. В каждом атмосферном слое излучение Солнца отражается, поглощается и переизлучается атмосферой Земли в зависимости от спектра звезды, зависимости атмосферного альбедо от длины волны и профиля давления и температуры планеты (предполагается, что он аналогичен земному). Зафиксировав желаемую температуру поверхности планеты, эта модель может вычислить необходимый звездный поток для получения этой температуры. Поскольку светимость звезды L известна, а модель выдает F , расстояние до звезды можно определить из уравнения 4.55, и это представляет собой одну из границ обитаемой зоны. По мере совершенствования моделирования атомной физики, связанной с поглощением и переизлучением фотонов молекулами, расчеты на границе обитаемой зоны улучшают и уточняют полученные результаты (Коррагару et al., 2013, 2014).

Однако мы также знаем, что светимость звёзд не постоянна. Светимость солнцеподобных звёзд увеличивается с возрастом — например, простое приближение к этому поведению, полученное на основе расчётов структуры звёзд, выглядит следующим образом (Schröder and Connon Smith, 2008):

$$L(t) = \frac{0.7 + 1.44(t - 4.55)}{L} \quad (4.57)$$

где $Gyr = 1$ миллиард лет, а L — современная светимость Солнца. Постоянно возрастающая светимость приводит к непрерывному смещению обитаемой зоны наружу. Непрерывная околозвездная обитаемая зона (SHZ) — это область, которая остается в обитаемой зоне в течение некоторого важного периода времени (например, время жизни звезды на главной

последовательности или предполагаемый временной масштаб развития биосферы; см. Решение R.10).

Внимательный наблюдатель заметит, что во всем вышесказанном определение «землеподобный» требует строгого определения. Стоит напомнить себе, что, согласно нашим современным знаниям, Земля уникальна и примечательна. Температура ее поверхности (а также доступная жидкая вода и другие необходимые для жизни компоненты) зависит от чрезвычайно сложной совокупности систем обратной связи и взаимодействий (см. Решение R.4). Действительно, биосфера играет важную роль в регулировании температуры посредством карбонатно-силикатного цикла, о котором мы поговорим позже. Обитаемый мир может настроиться на более высокую пригодность для жизни.

Кроме того, существуют и другие способы обеспечения обитаемых миров достаточной энергией для образования жидкой воды либо на поверхности, либо под слоем льда. Приливное нагревание может быть одним из таких способов. Если мир вращается вокруг более крупного тела на относительно близком расстоянии (например, спутник, вращающийся вокруг планеты), то разница в силе гравитации, которую он испытывает на своей поверхности, деформирует это тело. Эта деформация позволяет извлекать орбитальную и вращательную энергию, которая в конечном итоге рассеивается в виде тепла внутри, где типичный нагрев на единицу площади (приблизительно) определяется формулой:

$$U_{tidal} = 38 \frac{\rho_m}{\Gamma Q} \frac{R_m^5 e^2}{a_m^3} \left(\frac{GM_p}{a_m^3} \right)^{5/2} \quad (4.58)$$

где ρ_m и R_m — плотность и радиус спутника, a_m — большая полуось орбиты спутника, e_m — эксцентриситет спутника, M_p — масса планеты-хозяина, а Γ и Q — коэффициенты упругой жесткости и приливной диссипации соответственно.

Мы наблюдаем этот механизм нагрева в действии на спутниках Солнечной системы. Спутник Юпитера Европа имеет ледяную поверхность, но исследования гравитационных аномалий, проведенные зондом «Галилео» и другими миссиями, показали, что под льдом находится подповерхностный океан. В отличие от него, Ио испытывает настолько сильный приливный нагрев, что катастрофический вулканизм покрывает всю его поверхность, делая его чрезвычайно сложной средой даже для экстремофильной жизни (см. последующие разделы).

На момент написания статьи экзолуны еще не наблюдались – в настоящее время наиболее распространенными методами обнаружения являются анализ вариаций времени/длительности транзитов, обусловленных барицентром системы планета-спутник (Kipping, 2009a,b; Kipping et al., 2012, 2013), и микролинзирование (Bennett et al., 2014). Различные исследователи в настоящее время пытаются определить обитаемую зону экзолуны (ОЗЭ), которая учитывает звездное излучение, планетарное излучение (которое может быть значительным в инфракрасном диапазоне, если планета-хозяин является газовым гигантом), приливное нагревание и частые затмения звезды планетой в качестве источников и поглотителей энергии. (Heller and Barnes, 2013; Heller et al., 2014; Forgan and Kipping, 2013; Forgan and Yotov, 2014).

Хотя, вероятно, существует множество миров, внешне похожих на Землю по массе, радиусу и родительской звезде, очень немногие из них можно было бы назвать «двойниками Земли», как это часто пытаются внушить в пресс-релизах. Точное и постоянно меняющееся расположение биомассы, минералов и летучих веществ гарантирует, что наш мир, как и все обитаемые миры, останется уникальным и ценным. Так как же именно следует классифицировать «землеподобность» других планет? В соответствии с проверенными временем методами, я обойду стороной этот, казалось бы, неразрешимый вопрос и оставляю его на усмотрение читателя.

4.2.2 Галактические зоны обитаемости

Значительно менее развитая концепция обитаемости относится к галактическим масштабам. Вместо того чтобы рассматривать вопрос о том, содержат ли отдельные планетные системы обитаемые миры, мы можем рассмотреть вопрос о том, пригодны ли области космоса для формирования планетных систем, которые дадут обитаемые миры. Эти галактические обитаемые зоны менее строги и сосредоточены на двух аспектах: могут ли образоваться планетные системы с обитаемыми планетами и защищены ли они от астрофизических опасностей (Решение R.11)? Оба этих аспекта в значительной степени зависят от звездообразования (и последующего формирования планет), которое мы кратко опишем ниже.

Формирование звёзд

Газово-пылевой ресурс галактики (иногда называемый межзвездной средой или ISM) можно разделить на две фазы: горячую, низкоплотную фазу и холодную, плотную фазу. Звезды образуются из холодной, плотной компоненты. Газ может переходить из одной фазы в другую посредством

сжатия. Как только газ достигает критической плотности, он начинает эффективно охлаждаться, что позволяет ему становиться еще плотнее.

Это сжатие может быть достигнуто либо спиральными рукавами галактик (например, Bonnell et al., 2013), ударными волнами, генерируемыми сверхновыми, либо мощным ионизирующим излучением близлежащих звезд, которое создает сильное радиационное давление (например, Bisbas et al., 2011). В результате одного или нескольких из вышеперечисленных процессов газ образует молекулярное облако турбулентного газа, которое обычно принимает нитевидную структуру. Отдельные области облака (обычно в местах соединения волокон) начинают сжиматься до масштабов меньше локальной длины Джинса λ_{Jeans} , а затем могут начать коллапсировать под действием собственной гравитации:

$$\lambda_{\text{Jeans}} = \sqrt{\frac{\pi c_s^2}{G\rho}} \quad (4.59)$$

где ρ — локальная плотность газа, а c_s — скорость звука в газе. Эти дозвездные ядра, все еще погруженные в родительские филаменты (см. Nasa et al., 2013), коллапсируют, образуя протозвезды с околозвездными дисками. Эти диски существуют благодаря начальному угловому моменту газа, обеспечивающему центробежную поддержку против коллапса. Типичный размер диска зависит от углового момента исходного ядра (Lin and Pringle, 1990). Для сферического ядра массой M_c , начальным радиусом $R_c = \lambda_{\text{Jeans}}$, жестко вращающегося с угловой скоростью c , при условии сохранения углового момента и массы, получаем:

$$M_c R_c 2c = M_c r_{\text{disc}}^2 \omega_{\text{disc}} \quad (4.60)$$

где r_{disc} — радиус диска, а ω_{disc} — угловая скорость диска. Если предположить, что диск имеет кеплеровскую форму, то

$$\frac{r_{\text{disc}}^3}{R_c^3} = \frac{GM_c}{c^2} \quad (4.61)$$

Подставив это выражение в уравнение (4.60), мы можем перегруппировать его для r_{disc} :

$$r_{\text{disc}} = \frac{2c R_c^4}{GM_c} \quad (4.62)$$

$$GM_c$$

Обычно начальные условия в ядре описываются двумя безразмерными переменными:

$$\alpha_c = \frac{E_{therm}}{E_{grav}}, \quad \beta_c = \frac{E_{rot}}{E_{grav}}, \quad (4.63)$$

где E_{therm} , E_{rot} и E_{grav} — начальная тепловая, вращательная и гравитационная потенциальная энергия ядра соответственно. Для нашей жестко вращающейся сферы мы можем определить энергию вращения, вычислив момент инерции I :

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} M_c R_c^2 \omega^2 = \beta_c E_{grav} \quad (4.64)$$

Гравитационная потенциальная энергия сферы с однородной плотностью равна

$$3 GM_c^2$$

$$E_{grav} = - \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}.$$

We can now substitute β_c for c to give (4.65)

$$3 GM_c \beta_c R_c = \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c} \quad (4.66)$$

Типичные наблюдаемые значения β_c варьируются от 2×10^{-4} до 1.4, со средним значением 0.03 (Goodman et al., 1993), поэтому типичный диск будет иметь максимальный радиус около 10 процентов от первоначального радиуса ядра. Поскольку радиус ядра обычно составляет порядка 0.1 пк (около 25 000 а.е.), то радиус диска обычно меньше 2500 а.е. На практике не вся масса коллапсирует, и радиус диска может иметь верхний предел в 1000 а.е. или меньше, в зависимости от начальной массы ядра.

Если облако имеет относительно сильное магнитное поле, хорошо связанное с газом, это может отнимать угловой момент посредством процесса, известного как магнитное торможение. В идеальном МГД-пределе, где проводимость жидкости бесконечна, магнитное торможение чрезвычайно эффективно для извлечения углового момента из коллапсирующих дозвездных ядер и может полностью подавить образование дисков..

На практике проводимость не бесконечна. Связь поля с жидкостью не идеальна, и нам необходимо учитывать неидеальную MHD (Seifried et al., 2013; Tomida et al., 2015; Wurster et al., 2016) (подробности см. в рамке). Из наблюдений ясно, что диски формируются с типичными внешними радиусами от 100 до 1000 а.е., при этом радиус диска для звезд массой менее нескольких солнечных масс стремится к 100 а.е. или меньше. Большая часть материала в этих дисках теряет угловой момент из-за турбулентности диска или взаимодействия со спиральными рукавами и аккрецируется на звезду. То, что остается, становится исходным материалом для формирования планет.

Неидеальная MHD добавляет три дополнительных члена к уравнению индукции, связанных с относительным дрейфом положительных и отрицательных зарядов в жидкости, которые могут усиливать или рассеивать магнитное поле (см. Таблицу 4.1).

Уравнения магнетогидродинамики

В так называемой идеальной магнетогидродинамике (МГД) магнитное поле «вморожено» в жидкость, и связь по существу является идеальной. Уравнения Максвелла имеют следующий вид:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_0 c, \quad (4.67)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.68)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.69)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (4.70)$$

And the current $\mathbf{J}$ is given by

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\sigma_c} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.71)$$

In the ideal MHD limit, the conductivity $\sigma_c \rightarrow \infty$, and hence the electric field

$$\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (4.72)$$

And therefore the *induction equation* of ideal MHD is

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.73)$$

And

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (4.74)$$

Фактически, полный набор уравнений для идеальной МГД, предполагающий адиабатическую жидкость с отношением удельных теплоемкостей γ , выглядит следующим образом:

$$(4.75) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

$$+ \nabla P + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = 0 \quad (4.76)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{P}{\rho \gamma} \right) = 0 \quad (4.77)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (4.78)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.79)$$

где ρ — плотность жидкости, а P — давление жидкости.

Table 4.1 Дополнения к уравнению индукции обусловлены неидеальными МГД-эффектами. Омическое сопротивление зависит от удельного сопротивления, которое является обратной величиной проводимости $\eta = 1/\sigma$. Эффект Холла наиболее выражен в областях с низкой плотностью электронов n_e , а амбиполярная диффузия зависит от локальной плотности ионов ρ_i , а также от коэффициента сопротивления, описывающего связь ионов и нейтральных частиц.

Effect	Description	Term
Ohmic Resistivity $\frac{1}{\sigma} \mathbf{J}$	столкновения между электронами	$\nabla \times \frac{4\pi\eta}{2} \mathbf{J}$
Hall Effect	non-collisional electron drift	$\frac{en_i e}{c} \mathbf{J} \times \mathbf{B}$

Ambipolar Diffusion ion-neutral collisions $\frac{1}{c} (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}$

Формирование планет

Здесь мы лишь кратко изложим теорию формирования планет, чтобы обеспечить необходимый контекст: читателю рекомендуется обратиться к работе Армитаджа (Armitage, 2010) и приведенным в ней ссылкам для получения более подробной информации.

Теории формирования планет делятся на две категории, отражающие направление роста протопланет. Теория *аккреции ядра* — это иерархическая теория роста, идущая снизу вверх. Протозвездный диск первоначально состоит из газообразного вещества и межзвездных пылевых частиц, типичные размеры которых составляют один микрон (10^{-6} метров) или меньше, а распределение по размерам..

$$n(s) \propto s^{-3/2}. \quad (4.80)$$

Согласно теории аккреции ядра, эти зерна являются прародителями планет. Первоначально зерна растут в результате столкновений, когда первые сталкивающиеся частицы удерживаются вместе силами Ван дер Ваальса. В результате зерна на ранней стадии роста чрезвычайно рыхлые и пористые. По мере продолжения столкновений пористость зерен разрушается, в результате чего образуются более твердые зерна, способные удерживаться вместе за счет прочности материала на растяжение. На этом этапе размер зерен составляет приблизительно миллиметры.

По мере роста зерен газ в диске начинает оказывать все более сильное сопротивление:

$$F_D = -\frac{1}{2} C_D \pi s^2 \rho v^2 \quad (4.81)$$

где v — скорость частицы относительно газа. Коэффициент сопротивления C_D зависит от соотношения между размером зерна s и средней длиной свободного пробега $\lambda_m f_p$. Если зерна малы по сравнению с $\lambda_m f_p$, они находятся в режиме Эпштейна, и сопротивление можно рассматривать, учитывая отдельные столкновения между зернами и молекулами газа. Следовательно, коэффициент сопротивления равен

$$C_D = \frac{8}{3} \frac{v}{v_{\text{rms}}} \quad (4.82)$$

где $\bar{v}$ — средняя тепловая скорость газа, которая порядка скорости звука в газе, $\bar{v} = (8/\pi)^{1/2} c_s$. По мере увеличения размера зерен сопротивление переходит в режим Стокса, где газ необходимо моделировать как жидкость, а коэффициент сопротивления зависит от числа Рейнольдса Re , меры турбулентности в газе:

$$C_D = \frac{1}{Re} \quad v \ll L$$

$$C_D = 24Re^{-1} \quad Re < 1 \quad (4.84)$$

$$C_D = 24Re^{1/2} \quad 1 < Re < 800 \quad (4.85)$$

$$C_D = 0.44 \quad Re > 800. \quad (4.86)$$

Grain motion is suppressed by gas drag on the friction timescale

$$mv \, t_{\text{fric}} = \frac{mv}{C_D \rho v L} \quad (4.87)$$

$$Re, (4.83) \, v$$

where $L = 2s$ is a suitable lengthscale and v is the molecular viscosity. The drag coefficient decreases with increasing turbulence:

$$F_D$$

Это приводит к тому, что зерна одновременно оседают в направлении средней плоскости и смещаются радиально внутрь. Это смещение внутрь достигает пика, когда зерна достигают размеров от нескольких сантиметров до метра (на расстояниях в несколько астрономических единиц от звезды).

Вероятность столкновений, приводящих к успешному росту, также резко снижается, когда зерна начинают достигать размеров сантиметров/метров. Если мы рассмотрим зерно массой m , сталкивающееся с мишенью массой M , мы можем определить удельную энергию удара

$$Q = \frac{mv^2}{2M}, \quad (4.88)$$

То есть, кинетическая энергия на единицу массы мишени. Если это значение Q превышает критическое значение, столкновение больше не приведет к росту. Существуют два ключевых пороговых значения: критическая удельная энергия для разрушения, Q^*S , и критическая удельная энергия для рассеивания, $Q^*D > Q^*S$. Столкновение, приводящее к разрушению, но не к рассеиванию, все еще может привести к росту, если после столкновения образуется груда обломков, которая затем может сливаться. При Q^*S

столкновения с умеренной скоростью могут не привести к росту зерен из-за отскока (Windmark et al., 2012).

Both Q_s^* and Q_D^* vary greatly with impact angle and composition of the material, but a simple two-powerlaw parametrisation defines the key regimes (Leinhardt and Richardson, 2002; Korycansky and Asphaug, 2006):

$$Q_D^* = q_s \left(\frac{s}{1 \text{ cm}} \right)_s^\beta + q_g \rho_d \left(\frac{s}{1 \text{ cm}} \right)_g^\beta \quad (4.89)$$

При малых значениях s сопротивление рассеиванию обеспечивается прочностью материала, а энергия рассеивания уменьшается с ростом s ($\beta_s < 0$). По мере того, как гравитационное поле материала становится значительным, энергия рассеивания увеличивается с ростом s и обычно достигает своего минимума при $s = 0,1 - 1$ км. Это, конечно, не учитывает скорость удара, которая обычно влияет на q_s и q_g , не изменяя показатели степенного закона (see also Stewart and Leinhardt, 2009).

Увеличение относительной скорости сталкивающихся «камешков» приводит к увеличению числа столкновений, заканчивающихся фрагментацией, а не ростом, в то время как газовое сопротивление эффективно извлекает угловой момент и направляет «камешки» внутрь, к звезде. Большая часть современной теории аккреции ядра была сосредоточена на преодолении этих существенных барьеров для формирования планет, радиального дрейфа внутрь и роста за пределы режима фрагментации. Решения этой проблемы обычно предполагают локальные максимумы давления в газе, которые могут изменить направление дрейфа, например, спиральные рукава (Rice et al., 2004), или даже вихри, которые могут захватывать частицы и уменьшать их относительные скорости при соответствующих условиях (Barge and Sommeria, 1995; Lyra et al., 2009). Если радиальный дрейф создает пылевую жидкость с плотностью, сопоставимой с локальной плотностью газа, могут возникать потоковые неустойчивости (Youdin and Goodman, 2005; Johansen et al., 2007), где, по сути, газовое сопротивление изменяется под воздействием других пылевых частиц, позволяя другим частицам «скользить» и способствовать столкновениям с прилипанием.

Аналогично, недавние достижения в теории аккреции гальки позволяют газовому сопротивлению способствовать аккреции тел за счет гравитационного притяжения. Когда меньшие тела проходят близко к большему аккрецирующему телу, комбинированное действие аэродинамического сопротивления и гравитации может позволить меньшим

телам достаточно снизить свою относительную скорость для аккреции (см., например, Lambrechts and Johansen, 2012 и Ida et al., 2016 для подробностей).

Если камни смогут успешно преодолеть эти барьеры, собственная гравитация агломерата обеспечит образование обломков в результате столкновений, которые затем схлопнутся, превратившись в объект аналогичного размера. Это непрерывное фрагментирование и последующее схлопывание может позволить объекту превратиться в *планетезималь* — тело размером приблизительно в километр.

После образования значительной популяции планетезималов начинается настоящая эпоха формирования планет. В этом режиме столкновения, как правило, приводят к росту. Хотя столкновение может привести к разрушению одного или обоих тел, образовавшаяся груда обломков обычно обладает достаточно сильным гравитационным полем, чтобы снова собраться в тело, обладающее большей частью массы двух столкнувшихся тел. Газ в диске оказывает незначительное сопротивление планетезималам. При участии миллиардов тел в столкновениях и росте лишь небольшому числу тел сопутствует удача, и происходит более успешный рост. Это процесс положительной обратной связи, поскольку гравитационное поле более крупных тел способно фокусировать больше тел на своем пути для их аккреции. Сфера влияния тела M , вращающегося вокруг звезды массой M^* , может быть описана радиусом Хилла R_H :

$$R_H = a \left(\frac{M}{3M_*} \right)^{1/3}, \quad (4.90)$$

где a — большая полуось орбиты тела M . По мере увеличения массы тел их гравитационное поле начинает влиять на все большую и большую область диска. Как правило, лишь небольшое количество тел растет за счет остальных. В этой фазе неукротимого роста десятки и сотни протопланет могут достигать масс, близких к массе Луны или Марса.

Этот неукротимый рост продолжается до тех пор, пока либо не исчерпается локальный запас тел внутри радиуса Хилла, либо радиусы Хилла соседних тел не начнут перекрываться, и протопланеты будут вынуждены конкурировать за свой запас. Затем эти немногочисленные протопланеты участвуют в олигархическом росте, когда протопланеты продолжают расти, но их рост сдерживается соседями, поскольку каждая протопланета пытается питаться оставшимися планетезималами (Кокубо и Ида, 1998; Томмес и др., 2003). Более мелкие протопланеты обычно выбрасываются или уничтожаются в течение этой олигархической фазы.

По мере роста этих протопланет их сферы гравитационного влияния начинают перекрываться, возмущая орбиты друг друга. Когда их орбиты начинают пересекаться, начинается фаза гигантских столкновений. Протопланеты, теперь приближающиеся к массе Земли, начинают сталкиваться и ещё больше увеличиваться в размерах. Наиболее успешные ядра (достигающие примерно десяти масс Земли) начинают аккрецировать значительные объёмы газа из окружающего диска и, следовательно, становятся газовыми гигантами.

Вся эта активность происходит на фоне продолжающейся потери газа из диска. Звездное облучение верхних слоев диска приводит к фотоиспарению газа. Это, а также другие силы, разрушают газовую составляющую диска в течение 1–10 млн лет. Это говорит нам о том, что планетезималы должны формироваться быстро, если у них должно быть достаточно времени для образования газовых гигантов.

Вторая категория теории формирования планет обычно называется теорией дисковой неустойчивости или теорией гравитационной неустойчивости. На ранних стадиях жизни околозвездного диска масса диска сопоставима с массой протозвезды, и в результате собственная гравитация диска становится важной. Когда параметр Тумре

$$\frac{c}{\pi G \Sigma} \sim 1 \quad Q$$

(4.91)

Диск может стать гравитационно неустойчивым и, как следствие, породить крупномасштабные спиральные волны плотности (в процессе, очень похожем на тот, который генерирует спиральные рукава в галактиках). Эти волны плотности порождают слабые ударные волны в диске (известные как трансзвуковые ударные волны или ударные волны с низким числом Маха), которые нагревают диск, увеличивая Q и, следовательно, уменьшая амплитуду неустойчивости. Конкуренция между нагревом и охлаждением в диске может привести к состоянию предельной устойчивости, при котором неустойчивость саморегулируется. (Paczynski, 1978).

Однако эта саморегуляция может быть нарушена различными факторами, и неконтролируемая неустойчивость приводит к фрагментации диска (Gammie, 2001; Rice et al., 2011; Mejia et al., 2005; Boley et al., 2007; Rice et al., 2005). Большие куски газа и пыли диска массой в несколько масс Юпитера (Rafikov, 2005; Boley et al., 2010; Forgan and Rice, 2011; Rogers and Wadsley, 2012) коллапсируют в связанные объекты на довольно больших

расстояниях от звезды (обычно более 30 астрономических единиц) в течение нескольких тысяч лет.

В результате этого довольно легко образуются газовые гиганты (и маломассивные звезды), но эти фрагменты могут быстро мигрировать внутрь системы за счет газового сопротивления, поскольку диск еще очень молод и массивен. Это может привести к их полному разрушению или частичному разрушению внешней оболочки.

Фрагменты диска представляют собой, по сути, выборку пыли и газа из диска. Пыль будет дрейфовать к максимуму давления в центре фрагмента и может продолжать расти за счет столкновений при своем спуске. Это может привести к образованию твердого ядра в центре фрагмента. Если ядро может сформироваться до приливного разрушения, то внешняя оболочка может быть удалена, оставив относительно массивные планеты земной группы на орбитах, сопоставимых с планетами, образованными путем аккреции ядра (Nayakshin, 2010b, 2011, 2010a). Однако попытки моделирования, направленные на создание больших популяций планет путем фрагментации диска, показывают, что маломассивные каменные планеты, как правило, встречаются редко (Forgan and Rice, 2013; Forgan et al., 2018a). Кажется очевидным, что хотя оба механизма образования планет возможны и, вероятно, происходят в различной степени во Вселенной, аккреция ядра является процессом, посредством которого образуются обитаемые планеты..

Оценка обитаемости Галактики

Таким образом, химический состав этих дисков имеет решающее значение для окончательного формирования планет. Чрезвычайно горячая и плотная субстанция, существовавшая в первые минуты после Большого взрыва, позволила осуществить нуклеосинтез: образование более тяжелых химических элементов путем слияния более легких. Однако нуклеосинтез в результате Большого взрыва не создал полную периодическую таблицу элементов – в результате образовались лишь водород, гелий и очень небольшое количество лития и бериллия. Как мы увидим, для жизни на Земле требуется нечто большее.

Как мы подробно обсудим в разделе 10.2, звезды могут превращать более легкие элементы в более тяжелые посредством ядерного синтеза. Массивные звезды могут создавать все элементы периодической системы, вплоть до железа, а их предсмертные муки в виде вспышек сверхновых приводят к образованию еще более тяжелых элементов. Это означает, что

для того, чтобы в Галактике образовались пригодные для жизни планеты земной группы, ей должна предшествовать, по крайней мере, одна эпоха звездообразования. Это раннее поколение звезд может производить химические элементы, необходимые для жизни, а затем передавать их в близлежащие области космоса посредством взрывов сверхновых. Затем этот выброшенный материал может повторно коллапсировать, образуя новое поколение химически обогащенных звезд и планет. Исходя из показателей металличности звездных популяций, кажется очевидным, что Солнце относится по крайней мере к третьему поколению звездообразования со времен Большого взрыва.

Слишком большое количество сверхновых также может быть опасным для жизни. Планеты, находящиеся в той области Галактики, где поблизости часто взрываются сверхновые, столкнутся с катастрофической потерей озонового слоя в верхних слоях атмосферы и, предположительно, с массовым вымиранием или даже стерилизацией (см. раздел 11.3). Было подсчитано, что взрыва сверхновой на расстоянии 10 парсеков от Земли было бы достаточно, чтобы полностью уничтожить ее биосферу. К счастью, десять парсеков — это относительно небольшое расстояние с астрономической точки зрения, если вспомнить, что Млечный Путь имеет около 30 тысяч парсеков в поперечнике, а в радиусе десяти парсеков не обнаружено ни одной звезды-кандидата в сверхновые.

На основе простых расчетов ожидаемого изменения частоты сверхновых в Галактике с течением времени и описания содержания элементов в галактическом диске возникла простая кольцевая модель повышенной обитаемости Галактики (Gonzalez et al., 2001; Lineweaver et al., 2004). Эта модель все чаще подвергается сомнению по мере улучшения нашего понимания структуры Галактики и ожидаемого воздействия излучения сверхновых на озоновый слой (Gowanlock et al., 2011). Оценки размеров этой обитаемой зоны Галактики сильно различаются, причем некоторые авторы утверждают, что такой зоны вообще не существует (Prantzos, 2007).

Однако сверхновые — не единственная опасность для обитаемых планет. Гамма-всплески могут стерилизовать биосферы на расстоянии до тысячи парсеков от места взрыва (см. раздел 11.2). Они, по-видимому, преимущественно обнаруживаются в областях с низкой металличностью (Piran and Jimenez, 2014), что заставляет некоторых ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), предполагать, что они играют роль глобального механизма регулирования биосфер и разума, который

препятствовал развитию разумной жизни в больших количествах до настоящего времени (мы вернемся к этой концепции в разделе 18.2).

Локальная звёздная среда может снижать обитаемость планет без необходимости мощных взрывов. Тесные сближения между планетными системами могут нарушать орбиты далёких астероидов и протопланет, приводя к их столкновениям с обитаемыми мирами и разрушению их биосфер. Хотя исследования показали, что этот эффект не особенно разрушителен в таких средах, как окрестности Солнца (Jiménez-Torres et al., 2013), он может стать катастрофическим в плотных звёздных средах, таких как древние шаровые звёздные скопления.

Также стоит помнить, что галактики, подобные Млечному Пути, образуются в результате иерархических слияний, приводящих к вспышкам звездообразования и способных полностью изменить морфологию любой обитаемой зоны Галактики. Простые кольцевые модели вряд ли смогут это отразить, и окончательная картина обитаемости галактик всегда будет более сложной (Forgan et al., 2017). Ясно одно: модели обитаемости галактик остаются слишком упрощёнными, чтобы быть полностью эффективными, и в этой области требуется гораздо больше работы..

4.3 Земля как обитаемая планета

Даже если планетарное тело формируется в условиях, изначально благоприятных для жизни, нет никаких гарантий, что планета останется обитаемой. Как мы увидим на протяжении всей этой книги, существует множество внешних факторов, влияющих на энергетический баланс планеты, а следовательно, и на ее обитаемость (Решения R.2 и R.3).

Система Земля-океан-атмосфера подвержена как отрицательным, так и положительным обратным связям, которые могут регулировать или дестабилизировать температуру поверхности. Водяной пар в атмосфере Земли опосредует положительную обратную связь, влияющую на парниковый эффект. Если атмосфера охлаждается, давление насыщения водяного пара начинает снижаться. Если относительная влажность остается постоянной, то концентрация водяного пара в атмосфере также уменьшается, снижая парниковый эффект и позволяя атмосфере еще больше охлаждаться. И наоборот, если атмосфера нагревается, концентрация водяного пара в атмосфере увеличивается, усиливая парниковый эффект. Мы уже наблюдали этот эффект при рассмотрении околозвездной обитаемой зоны.

Мы также наблюдали положительную обратную связь между льдом и альбедо, где небольшое увеличение ледяного покрова повышает альбедо поверхности, позволяя поверхности охлаждаться и образовывать больший ледяной покров. Механизмы положительной обратной связи усиливают климатическую нестабильность, усиливая изменения температуры поверхности. К счастью, системы отрицательной обратной связи также действуют для противодействия таким нестабильным колебаниям. Простейшая из них — это связь между исходящим потоком и температурой поверхности:

$$F_{out} \propto T_{surf} \quad (4.92)$$

По мере увеличения T_{surf} увеличивается и F_{out} , что приводит к снижению температуры и установлению равновесия. Ключевой системой отрицательной обратной связи, в функционирование которой вовлечена биосфера, является карбонатно-силикатный цикл, регулирующий атмосферные процессы CO_2 (see Рисунок 4.10).




Рисунок 4.10 Карбонатно-силикатный цикл. Парциальное давление атмосферного CO_2 регулируется образованием угольной кислоты (H_2CO_3), которая выветривает силикаты и карбонатные ионы в океан, где они затем включаются в состав морских организмов. После смерти эти организмы возвращаются на морское дно, а карбонаты/силикаты подвергаются субдукции. В результате метаморфизма высвобождается CO_2 , который возвращается в атмосферу в результате вулканической активности, завершая цикл.

В начале цикла атмосферный CO_2 растворяется в дождевой воде, образуя угольную кислоту (H_2CO_3). Этот слегка кислый дождь выпадает на силикатные породы, выветривая их, перенося ионы силикатов и карбонатов в реки и, в конечном итоге, в океаны. Затем морские организмы включают карбонаты в свои раковины. Когда организмы умирают, их раковины возвращаются на морское дно (вместе с силикатами).

Затем этот материал транспортируется во внутренние слои планеты посредством субдукции тектонических плит. По мере того, как океанические плиты скользят под континентальные плиты, карбонатные и силикатные минералы могут рекомбинировать, высвобождая CO_2 в мантию. Затем этот CO_2 выбрасывается обратно в атмосферу посредством вулканизма, и карбонатно-силикатный цикл завершается. Полный атмосферный баланс CO_2 проходит через период примерно в 200 миллионов лет.

Карбонатно-силикатный цикл представляет собой петлю отрицательной обратной связи, обусловленную зависимостью процессов выветривания от температуры. При повышении температуры скорость выветривания увеличивается, что приводит к более быстрому удалению CO_2 из атмосферы, чем его замещению вулканической активностью, снижению парникового эффекта и понижению температуры. И наоборот, понижение температуры снижает скорость выветривания, позволяя вулканической активности повышать уровень CO_2 и восстанавливать температуру.

Карбонатно-силикатный цикл — одна из важнейших систем отрицательной обратной связи в климате Земли. По мере того, как светимость Солнца медленно увеличивалась с течением времени, цикл адаптировался к этому медленному увеличению получаемого потока, соответствующим образом регулируя уровни CO_2 . Это также важнейший фактор в спасении Земли от полного ледяного покрова. Если нет горных пород, доступных для дождевой воды, то выветривание прекращается. Вулканизм продолжает выбрасывать CO_2 в атмосферу, усиливая парниковый эффект до тех пор, пока лед не начнет таять.

Обратите внимание на роль организмов в связывании карбонатов в этом цикле. Существует также довольно обособленный органический круговорот углерода посредством фотосинтеза, где атмосферный углерод связывается в фотосинтезирующих организмах. Доля углерода в этих организмах невелика по сравнению с общей долей и в значительной степени контролируется уровнем кислорода, который на протяжении большей части истории Земли был слишком низок для эффективного регулирования климата.

Эта система отрицательной обратной связи может быть вызвана выбросами углерода из регионов, где он в настоящее время депонирован. Например, по мере вырубки лесов способность фотосинтеза фиксировать углерод из атмосферы локально ослабевает. Засухи и опустынивание также могут высвобождать давно депонированные запасы углерода из торфяников, которые используют анаэробные условия для улавливания углерода и предотвращают его высвобождение при контакте с фенольными

соединениями (особенно фенолоксидазой). Считается, что торфяники обладают запасами углерода, составляющими около 50% от текущего запаса в атмосфере (Freeman et al., 2001), и, следовательно, широкомасштабный выброс этого углерода приведет к значительному увеличению концентрации CO_2 в атмосфере.

Подобный, и даже более эффективный, выброс парниковых газов может произойти в результате таяния арктической вечной мерзлоты, содержащей клатраты CH_4 (метан, заключенный в кристаллах льда). По мере таяния льда CH_4 может высвобождаться в больших количествах, значительно уменьшая исходящее длинноволновое излучение Земли и приводя к быстрому потеплению.

Все, что мы здесь обсуждали, в значительной степени зависит от взаимосвязи между поверхностью Земли и ее внутренним строением (регулируемой тектоникой плит), а также от взаимосвязи между атмосферой Земли и космическим пространством (регулируемой в основном магнитным полем Земли). Перспективы тектоники плит и магнитных полей для других планет земной группы мы рассмотрим в разделах 9.1 и 9.2.

Таким образом, мы видим, что даже живая планета может подвергаться значительным климатическим потрясениям, независимо от наличия или отсутствия технологической цивилизации, просто в результате взаимодействия механизмов положительной и отрицательной обратной связи..

4.4 Хорошие и плохие соседи-планеты

Еще один аспект, делающий Землю «землеподобной», — это ее астрофизический контекст. Он распространяется не только на родительскую звезду, но и на ее планетных соседей. Как уже обсуждалось, планетные орбиты могут быть чрезвычайно эксцентричными. Когда в планетной системе более одной планеты, эволюцию их орбит невозможно рассчитать аналитически, и в системе может наблюдаться хаотическое поведение. Небольшое возмущение начальных условий может привести к совершенно иным результатам. Эволюция орбиты планеты под действием гравитационного притяжения ее соседей может иметь серьезные последствия для ее обитаемости (Решение R.5).

По сравнению с популяцией экзопланет, орбита Земли относительно близка к круговой, и ее ось вращения достаточно стабильна — угол, который она образует с плоскостью орбиты (наклон оси вращения), остается близким к 23 градусам. Большинство планет и карликовых планет Солнечной

системы вращаются с относительно небольшими эксцентриситетами, и поэтому их орбиты не пересекаются (за исключением Плутона и Нептуна).

Однако орбитальные элементы всех тел Солнечной системы, включая Землю, меняются со временем. Поскольку Солнечная система стабильна, изменения орбитальных элементов относительно малы и носят периодический характер. Эти изменения теперь очевидны для нас, поскольку мы можем запускать численные модели Солнечной системы и наблюдать миллионы лет эволюции орбит на ноутбуке, но они не были столь очевидны для тех, кто предполагал их существование и то, что эти циклические вариации ответственны за циклы эволюции климата на Земле.

4.4.1 Циклы Миланковича

Орбита и вращение Земли имеют четыре основных цикла (Гуди, 1992): первый — колебание эксцентриситета (с циклом колебаний приблизительно 96 000 лет), прецессия перицентра (с периодичностью 21 000 лет), колебание и прецессия наклона оси вращения с периодами 40 000 и 23 000 лет соответственно.

Влияние эксцентриситета на климат планеты относительно очевидно. Планеты на эллиптических орбитах приближаются к звезде и удаляются от нее на протяжении своей орбиты. Благодаря закону обратных квадратов, уровень инсоляции также изменяется. Перицентр и апоцентр орбиты с большой полуосью a и эксцентриситетом e равны:

$$r_{peri} = a(1 - e) \quad (4.93)$$

$$r_{ap} = a(1 + e) \quad (4.94)$$

Мы можем определить усреднённый по времени поток, получаемый от звезды со светимостью L

$$F = \frac{L}{4\pi a^2 \sqrt{1 - e^2}} \quad (4.95)$$

Другими словами, эксцентрические орбиты в среднем получают более высокий уровень потока (хотя мгновенный поток меняется на протяжении орбиты сильнее, чем для круговых орбит).

Прецессия перигелия не влияет на мгновенный поток, получаемый всей планетой, но влияет на время ближайшего сближения Земли с Солнцем. Более конкретно, она определяет сезон, в котором происходят самые близкие и самые дальние сближения. Мы можем определить орбитальную долготу, на которой Северное полушарие переживает зимнее солнцестояние

$\lambda_{solstice}$, и долготу перицентра λ_{per} .⁵ If $\lambda_{solstice} \approx \lambda_{per}$, В этом случае зима в Северном полушарии наступает тогда, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, и, следовательно, погода более мягкая. Если $\lambda_{solstice}$ не совпадает по фазе с λ_{per} , то зима в Северном полушарии может наступить, когда Земля находится значительно дальше от Солнца (при достаточно большом эксцентриситете).

Наконец, наклон оси вращения δ_0 определяет интенсивность сезонных колебаний на Земле. Инсоляция, получаемая на данной широте на орбитальном расстоянии r , равна

$$S = \frac{L \cos Z}{r^2}, \quad (4.96)$$

где зенитный угол Z (измеряющий высоту Солнца на небе) равен:

$$\cos Z = \sin \delta \sin h + \cos \delta \cos h \cosh. \quad (4.97)$$

h и δ — соответственно часовой угол и склонение Солнца, определяющие его положение на небесной сфере. Солнечное склонение как функция орбитальной долготы определяется формулой

$$\sin \delta = \delta_0 \cos(\lambda - \lambda_{solstice}) \quad (4.98)$$

Если $\delta_0 = 0$, В этом случае склонение Солнца фиксировано, и зенитный угол не меняется в течение года. По мере увеличения δ_0 изменение Z становится более выраженным в течение года, в результате чего Солнце проводит больше и меньше времени над горизонтом, что приводит к смене времен года, к которой мы привыкли.

Простое наклонение или «вращение» Земли приведет к увеличению и уменьшению δ_0 , но вектор вращения может свободно перемещаться в двух измерениях, что приведет к прецессии наклона оси вращения или «колебанию» (правая панель рисунка 4.11).

Хотя концептуальная связь между орбитой и оледенением зародилась благодаря более ранним авторам, в первую очередь Адемару и Кроллу (Crucifix, 2011), она была лучше всего сформулирована Миланковичем (1941), и поэтому после их подтверждения в данных кернов глубоководных океанических отложений (Hays et al., 1976) эти колебания обычно называют циклами Миланковича.

⁵ Обратите внимание, что это не аргумент перицентра, хотя они связаны через долготу восходящего узла: $\lambda^{per} = \omega + .$




Рисунок 4.11 Наклон оси Земли δ_0 . С наклоном оси связаны два цикла Миланковича. В первом цикле величина наклона оси может изменяться (слева). Во втором цикле наклон оси прецессирует (справа)

К настоящему моменту, надеюсь, ясно две вещи:

1. Циклы Миланковича взаимодействуют друг с другом, усиливая климатические изменения. Если изменения наклона оси вращения Земли совпадают с изменениями перигелия, то результирующая дихотомия между «мягким» и «экстремальным» полушариями может быть значительной, что подтверждается исследованиями сроков окончания ледниковых периодов.

2. Земная система также взаимодействует с циклами Миланковича, усиливая климатические изменения.

Например, если ледяные шапки начинают таять из-за увеличения инсоляции, в Северную Атлантику высвобождается большое количество пресной воды, что приводит к снижению солености, влияя на плотность и температуру океана, а следовательно, на модели циркуляции океана и процесс теплообмена с атмосферой. Изменение состава атмосферы, такое как колебания уровня CO_2 , также усиливает или ослабляет возмущения климата..

4.4.2 Планетарные соседи как щиты от астероидов

Планеты Солнечной системы оказывают большее воздействие, чем орбита Земли. Очень небольшой процент массы Солнечной системы, не относящейся к Солнцу, планетам или карликовым планетам, находится в виде ледяных/каменистых обломков, которые группируются в несколько семейств. Некоторые из этих семейств явно связаны с одной из планет, например, троянские семейства, находящиеся в точках Лагранжа гигантских планет.

Из тех, которые не связаны ни с одной из планет, можно выделить три основные группы (см. рис. 4.12):




Рисунок 4.12 Положения основных семейств астероидов и комет в Солнечной системе относительно восьми известных планет..

1. Главный пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером (2.2–3.3 а.е.)

2. Пояс Эджворта-Куйпера короткопериодических комет (КПК), расположенный в плоскости эклиптики за Нептуном, примерно между 20 и 40 а.е., и сопровождающий его рассеянный диск объектов на более эксцентричных орбитах в этом регионе.

3. Облако Оорта, сферически симметричное гало долгопериодических комет (ДПК), простирающееся от 20 000 а.е. до, возможно, 100 000 а.е. или более (т.е., на полпути к ближайшей звездной системе, α Центавра).

Динамические взаимодействия с планетами могут изменять орбитальные параметры этих тел, в результате чего они оказываются на пересекающихся орбитах с Землей и сталкиваются с ее поверхностью (см. главу 8). Учитывая, что эти тела могут достигать десятков километров в поперечнике, это, безусловно, опасно для любых организмов, присутствующих во время столкновения (Решение R.6).

Некоторое время (довольно повсеместно) считалось, что присутствие Юпитера является благом для биосферы Земли. Гравитационное поле Юпитера доминирует в Солнечной системе, в принципе позволяя ему захватывать, уничтожать или удалять кометы, выбрасываемые в сторону Земли из облака Оорта, по сути, действуя как щит. Если бы планеты такой массы, как Юпитер, не образовались, кометный материал не выбрасывался бы из внутренней части Солнечной системы, что также увеличило бы частоту столкновений. (Wetherill, 1994).

Дальнейшая численная интеграция эффективности Юпитера в удалении эксцентричных тел с орбитами, пересекающими зону обитаемости (Laakso et al., 2006), показала относительную неспособность Юпитера действовать в качестве щита. Более определенный вывод был сделан в серии работ (Horner and Jones, 2008a,b; Horner et al., 2010), в которых последовательно рассматривались три основные популяции. Для каждой популяции была проведена серия N-теловых симуляций, при этом масса Юпитера варьировалась для проверки его влияния на эти тела.

В случае пояса астероидов было обнаружено, что при отсутствии Юпитера в окрестности Земли выбрасывалось меньше тел. В случае объектов, возмущенных из пояса Койпера, эффект присутствия Юпитера сопоставим с эффектом его отсутствия. Для облака Оорта действительно более массивные планеты действуют как более эффективные щиты.

Во всех случаях Хорнер и др. обнаружили, что системы, в которых масса Юпитера уменьшилась до 20 процентов от его нынешней массы, демонстрируют значительно увеличенный поток ударов во внутреннюю часть Солнечной системы. Хотя их результаты зависят от сохранения всех остальных свойств планет неизменными, похоже, что если экзопланетные системы содержат значительное количество обломков, то точная конфигурация планетной системы будет оказывать сильное влияние на частоту столкновений с потенциально обитаемыми планетами.

4.5 Нужна ли Луна, чтобы Земля была пригодной для жизни?

Наши знания о спутниках (на момент написания статьи) ограничены исключительно Солнечной системой. Газовые гиганты обладают поразительным разнообразием лун, от разбросанных обломков неправильных спутников до гораздо более крупных обычных спутников. Несмотря на то, что обычные спутники могут быть довольно крупными (спутник Сатурна Титан превосходит Меркурий по размерам), соотношение масс спутников и планет-гигантов остается довольно малым для планет-гигантов (т.е. типичная масса спутника не превышает 0,01 процента от массы материнского тела; см. Рисунок 4.13). У планет земной группы гораздо меньше спутников, чем у их гигантских собратьев. У Меркурия и Венеры вообще нет спутников. Два спутника Марса, Фобос и Деймос, также довольно малы. Земная Луна необычайно массивна по сравнению со своим родителем, ее масса составляет почти 1 процент от массы Земли. Эта странность вызывает произвольную реакцию - является ли это уникальной особенностью Земли? Является ли наша необычная Луна необходимым

условием для того, чтобы наш мир был пригоден для жизни (решения R.7 и R.8)?

4.5.1 Какое влияние оказала Луна на обитаемость Земли?

Влияние Луны на Землю и её обитателей можно разделить на две категории: динамическое и радиационное. Гравитационное поле Луны постоянно воздействует на Землю. Эта сила вызывает приливы в недрах Земли и на её поверхности. Внутри Земли эта сила действует как тормозящий механизм для вращения Земли, замедляя его и воздействуя на ось вращения, которую мы определяем углами наклона и прецессии. Это уменьшение углового момента вращения Земли сопровождается увеличением орбитального углового момента Луны, в результате чего большая полуось лунной орбиты увеличивается со скоростью 3.8 см в год.⁶




Рисунок 4.13 Соотношение масс лун и планет для основных спутников Солнечной системы. Обратите внимание на различие между Луной Земли и крупнейшим спутником Плутона, Хароном, которые обладают соотношением масс порядка 10^{-2} , и обычными спутниками газовых и ледяных гигантов, у которых соотношение масс порядка 10^{-4} . Данные взяты из базы данных физических параметров планетарных спутников Лаборатории реактивного движения, <http://ssd.jpl.nasa.gov>

⁶ <http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html>

Замедление вращения Земли, по-видимому, оказало благотворное влияние на её климат. Более высокая скорость вращения подавляет струйные течения в тропосфере, а также другие крупномасштабные зональные потоки воздуха. Это, в свою очередь, препятствует перемешиванию вертикальных слоев океана этими ветрами, что впоследствии влияет на способность океана поглощать колебания температуры атмосферы, которые затем могут переноситься к полюсам. В целом, более быстро вращающаяся Земля была бы менее способна распределять тепло от экватора к полюсам, что может способствовать обратной связи лед-альbedo и вполне могло инициировать ледниковые периоды (Hunt, 1979). Мы видим это подавление широтных потоков на Юпитере — характерные полосы его атмосферы обусловлены его быстрым периодом вращения, составляющим приблизительно 10 часов.

Прямое влияние приливов на океаны Земли со стороны Луны имеет и другие преимущества. Постоянное перемещение воды к берегу и от берега создает постоянно меняющуюся среду обитания. Плавные, непрерывные изменения окружающей среды на побережье создают уникальное осциллирующее селективное давление на обитающие там организмы. Это можно наблюдать на примере огромного разнообразия видов, населяющих наземные береговые линии. Существует теория, что эта постоянно меняющаяся среда обитания могла сыграть ключевую роль в переходе жизни из океанов на сушу, предоставив «испытательный полигон» для амбициозных организмов, способных исследовать водную среду в течение нескольких часов и возвращаться в безопасное место, не затрачивая больших затрат энергии..

Существует даже мнение, что лунные приливы ответственны за происхождение самой жизни. Примерно 4 миллиарда лет назад лунные приливы были значительно сильнее, отводя большие водоемы от побережья и обнажая влажные солончаки. Биохимики утверждают, что эти среды обеспечивали благоприятную почву для сборки нуклеиновых кислот во время отлива и их разборки во время прилива. Регулярность этих приливов могла даже обеспечить рудиментарный циркадный ритм для самовоспроизводящихся реакций.

4.5.2 Что если бы не было Луны?

Как бы изменилось вращение Земли в отсутствие Луны? Длительность земных суток, вероятно, значительно сократилась бы из-за отсутствия приливного рассеяния. Солнечные приливы всё ещё существовали бы, но их сила составляла бы примерно 40 процентов от лунных. Солнечные и лунные приливы действуют в противоположных направлениях дважды в месяц, когда Солнце и Луна находятся в

положениях, перпендикулярных друг другу относительно Земли (первая и третья четверти лунного цикла). В результате малый прилив составляет приблизительно 60 процентов от типичной силы прилива (см. рис. 4.14). Соответствующий большой прилив (в новолуние или полнолуние) может составлять 140% от типичного прилива. Следовательно, следует ожидать, что Земля без Луны будет испытывать приливы, составляющие около 2/3 малого прилива, без изменений.

Этот слабый прилив не смог бы замедлить вращение Земли, обеспечив ей период вращения всего в 8 часов. Такое быстрое вращение препятствовало бы способности климата поглощать колебания температуры. Слабые приливы, возможно, способствовали образованию пребиотических молекул, но со значительно меньшей эффективностью. Распространение самовоспроизводящихся молекул по планете также могло быть затруднено из-за плохого перераспределения тепла..

А как насчет направления вращения? Ласкар и Робутель (1993) рассчитали эволюцию наклона оси Земли и угла прецессии как в присутствии, так и в отсутствии Луны, при различных начальных значениях наклона оси (от 0° до 170°).




Рисунок 4.14 Весенние и отливные приливы. В зависимости от относительной ориентации Солнца и Луны, лунные и солнечные приливы могут суммироваться, образуя весенний прилив, или суммироваться перпендикулярно, образуя отливной прилив.

С помощью анализа Фурье результирующих колебаний им удалось определить начальные значения ψ , которые приводили к плавным, регулярным колебаниям, подобным тем, которые мы наблюдаем сегодня при регулярных изменениях наклона оси Земли. Другие начальные значения приводили к хаотическому поведению, при котором наклон оси быстро менялся с большими амплитудами. Ласкар и Робутель (1993) обнаружили, что при наличии Луны углы наклона оси от 60° до 90° приводили к хаосу,

при котором наклон оси мог колебаться на 30° всего за несколько миллионов лет. Если Луна удалена, эта хаотическая зона простирается от 0° до 80° !

Это означает, что Земля без Луны подвергалась бы более сильным изменениям в смене сезонов. Эти изменения, скорее всего, усиливались бы более высокой скоростью вращения Земли из-за отсутствия приливного рассеяния, вызванного наличием Луны. Результаты Ласкара и Робутеля (1993) предполагают, что амплитуда этих возмущений наклона оси вращения могла быть большой, колебаясь от одного конца хаотической зоны до другого. Более поздние прямые интегрирования данных по безлунным Землям показали, что вариации наклона оси вращения не охватили всю эту хаотическую зону. Безлунные Земли все же достигали больших колебаний примерно на $20\text{--}25^\circ$ на протяжении сотен миллионов лет, но это гораздо меньше, чем можно было ожидать. Интересно, что ретроградно вращающаяся безлунная Земля испытывала еще меньшие колебания..

4.5.3 Часто ли встречаются крупные луны при формировании планет земной группы?

В настоящее время у нас имеются скудные наблюдательные ограничения на типичные свойства спутников планет земной группы. Пока что нам приходится довольствоваться теоретическими ожиданиями.

Формирование спутников имеет два основных пути, в зависимости от массы планеты-хозяина. Спутники газовых гигантов согласуются с формированием в диске, в микрокосме формирования планет (Mosqueira and Estrada, 2003a,b; Canup and Ward, 2006; Ward and Canup, 2010). Масса газового гиганта достаточна для поддержания околопланетного диска из вещества, которое поступает из окружающего околозвездного диска. Эти модели дают отношение массы спутника к массе планеты около 10–4, что соответствует основным спутникам Юпитера и Сатурна (см. рис. 4.13).

Считается, что спутники планет земной группы формируются гораздо позже в процессе формирования планет. На заключительном этапе сборки каменные протопланеты подвергаются серии гигантских столкновений, которые увеличивают их массу. Эти столкновения имеют различные последствия в зависимости от массы двух сталкивающихся тел, их входящего импульса и угла удара. В случае Земли считается, что Луна образовалась в результате гигантского столкновения с другой протопланетой, часто называемой «Теей» (Cameron and Ward, 1976). Это наглядно объясняет тот факт, что угловой момент вращения Земли и угловой момент орбиты Луны хорошо коррелируют.

Наше понимание конкретных деталей этого события столкновения значительно эволюционировало со временем. В первоначальной теории Тея имела приблизительно массу Марса и схожий состав. Другими словами, Тея должна была быть очень близко расположенной протопланетой, образованной, по сути, из того же материала протопланетного диска, что и Земля. Бельбруно и Готт III (Belbruno and Gott III, 2005) предполагают, что Тея могла образоваться в одной из точек Лагранжа Земли. Точки Лагранжа определяются (в системе отсчета, вращающейся вместе с Землей) как области, где гравитационные силы Земли и Солнца, а также центробежная сила, обусловленная движением Земли, компенсируют друг друга (см. рис. 4.15). Бельбруно и Готт III показывают, что марсианские ударные объекты могут аккрецировать либо в точках L4, либо в точках L5, а затем столкнуться с Землей с относительно низкой скоростью..

В качестве альтернативы можно предложить сценарий, в котором Тея была гораздо более крупным ударным объектом (массой около земной), столкновение тел происходило на высокой скорости, и в результате в обоих телах образовались схожие композиционные смеси, поскольку ударный объект отдает большое количество своего мантийного материала обоим телам (Сапир, 2012). Это привело бы к очень высокой системе углового момента по сравнению со случаем Земля-Луна, и, следовательно, потребовались бы дополнительные моменты для ее устранения. Например, резонанс эвекции между прецессией перицентра Луны и периодом обращения Земли может временно увеличить эксцентриситет орбиты Луны и уменьшить угловой момент вращения Земли. (Cuk and Stewart', 2012).




Рисунок 4.15 Точки Лагранжа системы звезда-планета (в системе отсчета, вращающейся вместе с планетой). Для иллюстрации масса планеты (P) составляет одну десятую массы звезды (S). Контуры обозначают эквипотенциальные поверхности, вычисленные на основе эффективного потенциала гравитации звезды и планеты, а также центробежной силы. L1, L2 и L3 являются номинально неустойчивыми точками (максимумами потенциала), хотя вокруг них можно успешно вращаться с минимальным поддержанием положения. L4 и L5 являются устойчивыми (минимумами потенциала). Предполагается, что Луна могла образоваться в одной из точек L4 или L5 Земли.

В любом случае, похоже, что для образования планет земной группы необходимо аккрецирование вторичного тела поблизости, которое в конечном итоге приведет к гигантскому столкновению. Существует вероятность того, что планеты с чрезвычайно быстрым вращением могут выбросить спутник благодаря центробежным силам (Binder, 1974). Хотя это не считается таковым для нашей Луны, это вполне может быть так в других планетных системах.

Можем ли мы сделать какие-либо выводы о вероятности существования больших лун у теплых, влажных планет земной группы? В лучшем случае мы можем провести ряд симуляций формирования нашей собственной Солнечной системы и определить, как часто формируется наша система Земля-Луна (O'Brien et al., 2014; Jacobson and Morbidelli, 2014). Из этой работы ясно, что движение гигантских планет во внутреннюю часть Солнечной системы (примерно на 1,5 астрономических единиц) и обратно к

их нынешним положениям (так называемый Большой маневр) играет жизненно важную роль в определении доступного материала для роста планет земной группы и характера последующих гигантских столкновений. Вполне возможно, что это явление является основной причиной того, почему наша внутренняя Солнечная система так сильно отличается от плотно упакованных, короткопериодических многопланетных систем, таких как Kepler-11 и TRAPPIST-1 (см. Batygin и Laughlin, 2015).

Может ли это также означать, что наша система Земля-Луна относительно уникальна? Пока мы не начнём обнаруживать экзолуны, мы будем вынуждены делать обоснованные предположения.

5. Жизнь редкое явление

Вполне возможно, что число миров, в целом пригодных для жизни, очень велико. Современные экстраполяции предполагают, что в Млечном пути, вероятно, существует много планет земной группы (например, Lineweaver, 2001; Zackrisson et al., 2016, и ссылки в них), и мы можем ожидать, что многие из них богаты водой и другими биологически активными соединениями.

Но всё же возможно, что сама жизнь встречается редко, и что простого наличия среды обитания недостаточно для того, чтобы такое место стало обитаемым. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны тщательно рассмотреть: как жизнь появилась на Земле? И почему она продолжает существовать?

5.1 Что такое жизнь?

Пожалуй, наиболее насущный вопрос заключается в том, что же именно представляет собой жизнь? Большинство попыток дать простые определения терпят неудачу, просто потому что они либо включают, либо исключают сущности или явления из категории «живых» таким образом, который интуитивно неудовлетворителен.

Например, простой критерий, согласно которому жизнь должна уметь двигаться, исключает растения и включает автомобили и дождь. Более сложные определения обычно включают следующие требования (Кошланд-младший, 2002):

1. программа (ДНК)
2. импровизация (т.е. реакция на окружающую среду и внешние стимулы)
3. компартментализация (например, клеточные мембраны)
4. энергия (метаболизм)
5. регенерация (и рост)
6. адаптивность
7. изоляция (контроль над локальной/внутренней химией)

Список должен быть как минимум таким длинным, чтобы обеспечить удовлетворительное исключение неживых сущностей, таких как огонь (который удовлетворяет многим из этих критериев, но не всем). Классическим опровержением этого определения является пример вируса, который обладает многими из вышеперечисленных свойств, но не метаболизирует.

Термодинамические определения жизни особенно популярны среди физиков (скорее всего, потому что их описание изложено на языке, который они легко понимают). Способность организмов уменьшать свою внутреннюю энтропию (за счет увеличения внешней энтропии) некоторыми исследователями, наиболее известным из которых является Эрвин Шрёдингер, рассматривается как явный признак того, что уменьшение энтропии (или, альтернативно, увеличение отрицательной энтропии или негэнтропии) является индикатором живых систем.

Простые тепловые двигатели могут использоваться для перераспределения энтропии из горячего резервуара в холодный. Эффективность этого обмена ограничена теоремой Карно. Если температура горячего резервуара равна T_H , а температура холодного резервуара равна T_C , то максимальная эффективность равна

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \quad (5.1)$$

Это справедливо как для сложных механизмов, так и для организмов, но тот факт, что искусственные конструкции могут уменьшать внутреннюю энтропию системы, делает это определение проблематичным. Конечно, это вполне подходит для ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), которые интересуются как естественными, так и искусственными потребителями негэнтропии!

Более простая эвристика требует применения теории эволюции, т.е.

Жизнь — это система, которая реплицируется, мутирует и изменяется в соответствии с дарвиновской эволюцией.

Астробиологи предпочитают этот метод из-за его простоты. Важно отметить, что описанные здесь определения жизни не дают никаких указаний на то, как наблюдать или обнаруживать внеземную жизнь. Термодинамическое определение является наиболее близким, отмечая, что биологические системы вносят энтропию в окружающую среду и что системы, находящиеся вне равновесия, со значительной энтропией, могут указывать на наличие разнообразной биосферы.

Если говорить более конкретно о земной жизни, мы можем определить некоторые фундаментальные компоненты/атрибуты всех живых организмов:

- Нуклеиновые кислоты, которые используются для хранения генетической информации.

- Аминокислоты, мономеры, которые объединяются, образуя короткие полимерные цепи, известные как пептиды, и в конечном итоге более длинные полимерные цепи, называемые белками, которые обладают уникальными и специфическими функциями.
- Запасы энергии в виде аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ также является ключевым мономером в синтезе РНК и ДНК.

Конечно, требовать от внеземных организмов наличия именно этих свойств, возможно, слишком строго, но важно отметить то, что является универсальным для всех известных в настоящее время форм жизни.

5.2 Происхождение жизни

Мифы о происхождении жизни и разумной жизни стары, как человечество, но полное научное описание того, как зародилась жизнь на Земле (абиогенез), в настоящее время является источником споров.

Ископаемые находки предоставляют неопровержимые доказательства существования микроорганизмов 3.5 млрд лет назад, то есть примерно через 1 млрд лет после образования Земли (Brasier et al., 2006). Геохимические данные (в основном высокие соотношения $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$) предполагают, что биологические процессы уже начались 3.8 млрд лет назад (Mojzsis et al., 1996) или, возможно, даже 4.1 млрд лет назад (Bell et al., 2015).

Мы также можем обратиться к последнему общему универсальному предку (LUCA) за подсказками. У нас нет образца LUCA – мы можем лишь вывести его свойства путем анализа филогенетического дерева жизни. В общих чертах, филогенетическое дерево строится путем сравнения физических и генетических характеристик видов – по сути, это попытка определить происхождение путем геномных сравнений. Подобные вычисления позволяют получить так называемые клады (группы, содержащие общего предка и всех его потомков). Большинство современных филогенетических деревьев являются кладистическими, поскольку они пытаются идентифицировать клады, чтобы привнести генетическую строгость в таксономию видов. В некотором смысле, мы можем рассматривать LUCA и всю жизнь на Земле как единую кладу (Рисунок 5.1).




Рисунок 5.1 Филогенетическое Дерево жизни с общими доменами жизни, начиная с верхнего левого угла и по часовой стрелке: археи, эукариоты и бактерии. Последний общий универсальный предок (LUCA) представлен выемкой в правом верхнем углу самой внешней границы. Это дерево было сгенерировано с помощью инструмента iTOL (Letunic and Bork, 2016).

LUCA находится в корне филогенетического дерева (положение корня определяется процессом, известным как филогенетическое сопоставление). LUCA вряд ли является первым организмом, когда-либо существовавшим, и, вероятно, находится довольно далеко от этого. Однако он предоставляет нам важную информацию об условиях, в которых, вероятно, процветали первые организмы (предки LUCA). Свойства LUCA остаются предметом жарких дебатов (Glansdorff et al., 2008). Большинство попыток реконструировать семейства белков, восходящие к LUCA, предполагают термофильную (теплолюбивую) физиологию, а недавние исследования показывают, что LUCA требовалась среда, богатая H_2 , CO_2 и Fe (Weiss et al., 2016).

Точный механизм, посредством которого «неживые» химические соединения начали организовываться в макромолекулярные структуры, отделяющиеся от окружающей среды посредством какой-либо мембраны, а затем начинающие самовоспроизводиться, неизвестен. В частности, нам неизвестен порядок, в котором различные подсистемы, составляющие живой организм, были «изобретены» природой. Мы можем разделить эти подсистемы на три категории:

1. Информационные – системы хранения данных, обеспечивающие наличие соответствующих инструкций для определения атрибутов и свойств дочернего организма в процедурах репликации.

2. Компарментнообразующие – системы, позволяющие организму изолироваться от окружающей среды и хранить его физические характеристики.

3. Метаболические – системы, извлекающие и хранящие энергию, генерируемую в окружающей среде, и производящие необходимые для выживания и репликации соединения.

Множество различных теорий происхождения жизни на Земле по-разному определяют время формирования каждой подсистемы. Мы не будем давать объяснение всем различным теориям, но стоит отметить, что многие из них в целом относятся к одному из двух классов, которые мы можем бойко назвать теориями «жерл» или «бассейн». Однако все современные исследования абиогенеза во многом обязаны теории Опарина-Холдейна и концепции, согласно которой соответствующий набор химических реагентов, суспендированных в соответствующем водном растворе, и разумная свободная энергия могут привести к самосборке, самореплицирующимся молекулам.

5.2.1 Теория Опарина-Халдейна и эксперименты Миллера-Урея

Теория Опарина-Халдейна, сформулированная в 1920-х годах, пожалуй, является наиболее известной «канонической» теорией происхождения жизни на ранней Земле. В то время считалось, что атмосфера Земли после своего образования была сильно восстановительной (то есть, она свободно отдавала электроны молекулам). Эта система должна была состоять в основном из органических молекул с большим количеством водорода (например, метана) и очень малым количеством свободного кислорода.




Рисунок 5.2 Схема эксперимента Миллера-Урея. Вода испарялась и добавлялась в искровую камеру, содержащую вещества, которые, как предполагалось, присутствовали в атмосфере ранней Земли. Через эту камеру пропусклся электрический разряд, а продукты конденсировались и собирались для изучения. В результате этого эксперимента были получены как аминокислоты, так и предшественники нуклеотидов RNA и DNA.

Считалось, что при умеренном воздействии ультрафиолетового излучения эти органические молекулы смогут легко образовать биологических предшественников, таких как аминокислоты.

В 1950-х годах Миллер и Юри развили эти идеи в новаторский эксперимент (Миллер, 1953, Рисунок 5.2). Их установка состояла из двух соединенных колб. В первую колбу добавляли некоторое количество жидкой воды и нагревали ее, имитируя океан Земли. Эта колба была соединена со второй, что позволяло водяному пару смешиваться с «атмосферой», имитируемой смесью водорода, метана и аммиака.

Пропуская электрический разряд через смесь воды, аммиака и метана, они получали аминокислоты и несколько предшественников нуклеотидов, составляющих РНК и ДНК. Эти результаты взволновали современных наблюдателей, но сейчас мы смотрим на них с меньшим оптимизмом.

Во-первых, следует отметить, что относительные концентрации некоторых ключевых пребиотических молекул были разочаровывающе низкими, особенно длинноцепочечных жирных кислот, которые сегодня составляют основу биологических мембран и отсутствовали в эксперименте Миллера-Юри. Сахар рибоза, являющийся основным компонентом как РНК, так и ДНК, присутствовал лишь в небольших количествах. Считается, что атмосфера Земли в этот ранний период уже не была настолько восстановительной, как предполагалось в 1950-х годах, однако существуют убедительные геологические доказательства, особенно полученные в результате фракционирования изотопов серы в древних отложениях (возрастом более 2,4 млрд лет), что атмосфера и океаны Земли были по сути аноксическими, бескислородными (Farquhar et al., 2014, и ссылки в работе).

Наряду с другими доказательствами, очевидно, что атмосфера Земли, скорее всего, была умеренно восстановительной, с периодическим метановым туманом (Zerkle et al., 2012), что обнадеживает для производства пребиотиков, таких как аминокислоты. Таким образом, теория Опарина-Халдейна является разумной первой итерацией на пути к окончательной теории абиогенеза, кандидатов на которую сейчас много.

5.2.2 Теории ‘Курильщиков’

Теории вулканических трещин или «курильщиков» утверждают, что жизнь зародилась в гидротермальных жерлах (Wächtershäuser, 1990). Вулканические гидротермальные жерла представляют собой трещины в земной коре в форме дымоходов, обычно встречающиеся на подводных

границах тектонических плит. Это обеспечивает источник перегретой воды в непосредственной близости от магмы, где местная температура воды может достигать $\sim 400^{\circ}\text{C}$ из-за чрезвычайно высокого давления.

Теории, основанные на изучении гидротермальных источников, привлекательны по нескольким причинам. LUCA, по-видимому, является термофильным организмом, что предполагает его акклиматизацию к жарким условиям. Такие глубокие гидротермальные источники чрезвычайно хорошо защищены от столкновений с астероидами или неблагоприятных атмосферных условий. Кроме того, в источниках естественным образом возникают резкие градиенты температуры, pH и концентрации химических веществ, идеально подходящие для инициирования квазиметаболических процессов. В частности, окислительно-восстановительная реакция железа и сероводорода с образованием пирита, по-видимому, является способом фиксации углерода, а пирит, как предполагается, служит матрицей для полимеризации аминокислот.

Вкратце, теория вулканических гидротермальных источников предполагает, что сначала формируются метаболические системы. Это *автокаталитические* сети химических реакций, где реагенты, поступающие в сеть, в конечном итоге производятся в больших количествах, обеспечивая механизм, с помощью которого организмы могут расти и поддерживать себя. Метаболические системы также должны находить способы хранения и высвобождения энергии, что мы обсудим позже. По мере диффузии богатой пептидами жидкости в более холодные воды, за этим метаболизмом следуют информационные системы, и, наконец, формирование таких компартментов, как структуры протоклеток (протоорганизм использует углубления на морском дне в качестве «оболочки», пока не сможет сформировать собственные мембраны).

В последнее время щелочные гидротермальные источники стали многообещающим вариантом этой теории. Щелочные источники обычно находятся в непосредственной близости от границ тектонических плит (например, глубоководное поле щелочных источников, известное как «Затерянный город», расположенное в 20 км от Срединно-Атлантического хребта). Эти щелочные источники теплые, а не горячие (температура порядка 70°C), и обладают высокой пористостью, а не имеют дымоходообразную структуру. Это представляет особый интерес, поскольку эта губчатая система пор размером 10–100 мкм больше напоминает клеточную структуру. По мере смешивания океанической воды с сильно щелочной жидкостью внутри этой пористой сети возникают резкие

градиенты окислительно-восстановительного потенциала, температуры и pH. Вместе с обильными источниками H₂ и Fe, создаются благоприятные условия для очень перспективной пребиотической химии с заранее сформированными клеточноподобными контейнерами (Sojo et al., 2016).

5.2.3 Теории ‘Тёплых луж’

Идея о том, что жизнь зародилась в каком-либо поверхностном водоёме с обогащенной минеральными веществами тёплой водой, так называемом «первородном бульоне», существует уже давно. Наиболее захватывающая современная интерпретация этой теории принадлежит группе Джона Сазерленда из Кембриджского университета. В их моделях рассматривается повторяющийся процесс высыхания-увлажнения водоёма или потока для синтеза многих предшественников биохимии. Было показано, что аминокислоты цитозин и урацил (ключевые компоненты РНК) могли синтезироваться на ранней Земле, используя в качестве сырья только ацетилен (C₂H₂) и формальдегид (CH₂O) (Powner et al., 2009). Это предполагает, что если бы могли образовываться и другие нуклеос основания РНК (аденин и гуанин), то сборка РНК могла бы происходить в первородном бульоне. Ацетилен был обнаружен в межзвездном пространстве, хотя это лишь слабое доказательство его присутствия на ранней Земле.

В более поздних разработках, с использованием еще более простой установки, были получены прекурсоры рибонуклеотидов, аминокислот и липидов с помощью комбинации цианистого водорода (HCN), сероводорода (H₂S) и ультрафиолетового излучения с длиной волны приблизительно 250 нм (Patel et al., 2015). Для этого синтеза требуются только исходные материалы, которые, вероятно, были в изобилии на ранней Земле, хотя он и требует схождения различных путей синтеза (т.е. смешивания различных продуктов после нескольких наборов реакций). Этого можно достичь путем смешивания различных потоков или путем смывания реагентов в лужи дождевой водой.

5.2.4 Многократное зарождение жизни?

Ископаемые и филогенетические данные не исключают возможности существования множественных событий абиогенеза на Земле. Учитывая наше незнание событий, предшествовавших LUCA, вполне возможно, что существовало до десяти отдельных событий абиогенеза, и, следовательно, десять филогенетических деревьев на Земле, из которых только одно сохранилось с докембрия до наших дней (Raup and Valentine, 1983). Не все эти деревья могли сосуществовать, и выживание нашего дерева

не гарантирует, что оно является лучшим из всех возможных деревьев – возможно, просто самым удачливым (Решение R.13).

5.3 Основные эволюционные переходы биоорганизмов

Как развивается эта система после появления организмов на планете и начала формирования биосферы? Следуя Смит и Сатмари (Smith and Szathmary, 1997), мы можем выделить несколько основных переходов в эволюции жизни на Земле. Общей тенденцией среди этих переходов является растущая потребность во взаимозависимости между изначально отдельными системами. Следует отметить, что эти переходы не обязательно происходят в «правильном» хронологическом порядке, и, как мы уже обсуждали, их природа и точная последовательность являются предметом многочисленных дискуссий.

На рисунке 5.3 показано деление геологического времени на зоны, эры, периоды и эпохи. После гадейского зона, в течение которого Земля завершила свое формирование и остыла из первоначального расплавленного состояния, самые ранние признаки жизни появились в архейском зоне.

Около 500 миллионов лет назад палеонтологическая летопись внезапно заполняется множеством форм многоклеточной жизни. Это событие называется кембрийским взрывом и знаменует начало доминирования более крупных и сложных форм жизни на поверхности Земли и в океанах. Правая панель рисунка 5.3 показывает геологические периоды, в которых происходили массовые вымирания, и перечисляет геологические эпохи (или подпериоды) с момента последнего крупного массового вымирания, которое привело к гибели динозавров и эпохе доминирования млекопитающих. Как мы увидим позже, анатомически современные люди появляются к концу плейстоценовой эпохи, а большая часть современной цивилизации сосредоточена в конце голоцена, который охватывает современную эпоху.

5.3.1 Свободно плавающие самовоспроизводящиеся молекулы в протоклетках

Перед формированием протоклеток (компарментов) саморепликаторы должны быть способны к самоподдержанию. Накопление популяций самореплицирующихся молекул в протоклетках позволяет осуществлять кооперацию между различными молекулами. Это позволяет действовать естественному отбору, обеспечивая как молекулярное сотрудничество, так и конкуренцию внутри протоклетки, поскольку саморепликаторы борются за доминирование.

Некоторыми подходящими кандидатами на роль первых протоклеток являются везикулы — простые заполненные жидкостью мембраны, которые обнаруживаются как внутри современных клеточных структур, так и в качестве средства транспортировки биологического материала от клеток. Везикулы могут образовываться спонтанно при добавлении липидов или других органических молекул в воду. Гидрофобные молекулы отталкиваются водой и образуют двухслойную мембрану, которая может поглощать и выделять органический материал, особенно если этот материал находится на поверхности зерен (например, вулканическая глина монтмориллонит, которая была повсеместно распространена на ранней Земле с высокой вулканической активностью).

На данном этапе интересно отметить, что клеточная компартментализация отнюдь не является универсальным переходом. Вирусы, по сути, представляют собой свободные нити РНК или ДНК, заключенные в белковую оболочку, и используют клетки для работы со своим внутренним механизмом..

5.3.2 Независимые репликаторы в хромосомах

Внутри любой протоклетки гены, представленные саморепликаторами, могут воспроизводиться независимо друг от друга, обеспечивая внутрикомпаратментальную конкуренцию широко распространенную.

Eon	Era	
Phanerozoic	Cenozoic	Extinction of Dinosaurs
	Mesozoic	Breakup of Pangea
	Paleozoic	Oldest large organisms (575 Mya)
Proterozoic	Neoproterozoic	
	Mesoproterozoic	Metazoans
	Paleoproterozoic	
Archaean	Nearchean	Eukaryotes sexual reproduction
	Mesoarchaeon	
	Paleoarchaeon	LUCA (3.5 Gya)
	Eoarchaeon	Abiogenesis (4.0-3.8 Gya)
Hadean	Formation of atmosphere and oceans (4.2 Gya)	
	Formation of the Earth & Moon (4.6 - 4.5 Gya)	

Era	Period (Sub Era)	Epoch (Subperiod)	
Cenozoic	Quaternary	Holocene	0.01 Mya - present
		Pleistocene	2 Mya - 0.01 Mya
	Tertiary	Pliocene	5 - 2 Mya
		Miocene	24 - 5 Mya
		Oligocene	34 - 24 Mya
		Eocene	55 - 34 Mya
		Paleocene	65 - 55 Mya
Mesozoic	Cretaceous	145 - 66 Mya	
	Jurassic	201 - 145 Mya	
	Triassic	252 - 201 Mya	
Paleozoic	Permian	299 - 252 Mya	
	Carboniferous	359 - 299 Mya	
	Devonian	419 - 359 Mya	
	Silurian	443 - 419 Mya	
	Ordovician	485 - 443 Mya	
	Cambrian	541 - 485 Mya	

Рисунок 5.3 Вверху: Геологические зоны и эры, охватывающие период от образования Земли до наших дней. Внизу: Геологические периоды и эпохи (подпериоды) и периоды, охватывающие период от кембрийского до наших дней. Массовые вымирания происходят в течение пяти выделенных периодов (ордовик, девон, пермь, триас, мел)..

Переход к хромосомам означает, что гены связаны между собой. Следовательно, если один ген реплицируется, то реплицируются и все остальные. Это усиливает взаимодействие между генами в компартменте и смещает конкуренцию на арену противостояния протоклеток.

РНК, ДНК и хромосомы. Нуклеиновые кислоты являются носителями информации в биологии. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) могут как хранить генетические данные, так и действовать в качестве фермента, в то время как дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) в основном является хранилищем, а белки играют роль фермента. Эта двойная

функция РНК заставляет многих исследователей думать, что РНК предшествовала ДНК. Эта концепция называется «Мир РНК», и мы рассмотрим ее подробнее здесь.

Для начала давайте рассмотрим структуру ДНК и РНК. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) состоит из двух нитей, объединенных в двойную спираль (см. рис. 5.4). Каждая нить состоит из дезоксирибозо-фосфатного остова, где сахарные и фосфатные группы связаны попеременно. К сахарам присоединены азотистые основания, или нуклеобазы. Четыре основания ДНК — это аденин (А), тимин (Т), гуанин (G) и цитозин (С). Сочетание дезоксирибозо-фосфата и основания называется нуклеотидом..

В конфигурации двойной спирали две нити соединены между собой основаниями, образуя пары оснований. Основания взаимодействуют посредством водородных связей, поэтому только пуриновые основания (аденин, гуанин) могут соединяться с пиримидиновыми основаниями (тимин, цитозин). Строго говоря, только аденин соединяется с тиминном (АТ, ТА), а гуанин — только с цитозином (GС, СG). Порядок расположения четырех оснований GСТА вдоль нитей является способом хранения информации в ДНК. Эти буквы считываются в триплетах, известных как слова. Эти слова способны кодировать $4^3 = 64$ возможных аминокислоты (истинное число кодируемых аминокислот составляет всего 21).




Рисунок 5.4 Химическая структура нити ДНК. Показаны четыре основания ДНК: аденин (А), тимин (Т), гуанин (G) и цитозин (С).

Примечательно, что пары оснований АТ и GС геометрически эквивалентны (Оргель, 1973). Эта точность действует как своего рода контроль ошибок — попытки сформировать структуру двойной спирали, скажем, с парой оснований АG, немедленно терпят неудачу из-за этого свойства. В клетках весь геном обычно хранится в наборе хромосом. Пloidность — это число наборов хромосом в клетке — гаплоидные

организмы содержат только один набор хромосом. Как и большинство организмов, человек является диплоидным — его хромосомы парные (всего 23 пары = 46 хромосом). Мы определяем ген как участок последовательности ДНК, кодирующий белок или молекулу РНК. Человек несет две (обычно различающиеся) копии каждого гена, по одной от каждого родителя (известные как аллели).

РНК во многом похожа на ДНК, но имеет важные отличия. Это одноцепочечная молекула, в основе которой используются рибозофосфатные группы вместо дезоксирибозофосфатных групп. Она также содержит четыре нуклеос основания, но заменяет тимин на урацил (U).

Генетическая информация, хранящаяся в ДНК, не может быть напрямую преобразована в белки и ферменты. РНК выступает в качестве посредника — посредством транскрипции слова в матричной нити ДНК преобразуются в комплементарный набор слов на нити матричной РНК. Триплетные слова на нити мРНК называются кодонами. Затем эти кодоны подвергаются трансляции в желаемые аминокислоты, которые затем могут быть собраны в полипептидную цепь.

Эксперименты с очень короткими цепями ДНК (6 пар оснований) показывают, что она может реплицироваться без ферментов (фон Кнедровски, 1986), но они значительно короче даже самых коротких цепей, обнаруженных в современных организмах. ДНК может производить множество сложных ферментов, используя РНК в качестве посредника, но она не может реплицироваться без достаточно сложных ферментов.

Это лежит в основе гипотезы о мире РНК: ДНК страдает от проблемы курицы и яйца, которая решается, если РНК будет яйцом. Это оставляет отдельную проблему, которая крайне уместна в контексте нашего обсуждения вероятности существования жизни.

Изомер полимера (например, РНК) — это молекула, обладающая той же химической формулой, но имеющая другое расположение компонентов. Например, мы можем создать изомер любой молекулы РНК, поменяв местами две аминокислоты. Сразу должно быть ясно, что для пептидов, содержащих даже небольшое количество аминокислот, число изомеров огромно. Учитывая 20 встречающихся в природе аминокислот, если наша пептидная цепь состоит из N аминокислот, то число изомеров равно 20^N . Для $N = 200$ число изомеров поразительно велико 10^{260} (!) (Jortner, 2006).

Это можно рассматривать как благословение или проклятие — само разнообразие «кодируемых» структур лежит в основе богатого


биоразнообразия, которое мы наблюдаем на Земле. Однако параметрическое пространство, занимаемое всеми пептидами на Земле, составляет лишь ничтожную долю от общего возможного. Для того чтобы РНК успешно выполняла функцию катализа/репликации, по оценкам, $N = 40$ мономеров. Если для достижения этой цели нити РНК генерируются случайным образом, то будет сгенерировано приблизительно 10^{48} нитей, общая масса которых будет близка к массе Земли!

Теперь ясно видна дилемма, с которой сталкиваются астробиологи и ученые, занимающиеся проектом SETI. С одной стороны, кажется, что исходный материал для жизни (особенно NCHOPS и аминокислоты) является общим как на Земле, так и в Солнечной системе, и что метаболические процессы могут быть задействованы в некоторых средах, которые мы ожидаем увидеть на ранней Земле.

С другой стороны, кажется почти непреодолимой комбинаторной пропасти, отделяющей случайную последовательность мономеров от функциональной нити РНК. К счастью, планетарное тело предоставляет возможность для проведения многих миллиардов отдельных «экспериментов» с различными реагентами, катализаторами и продуктами. Комбинаторика сработала для Земли, но мы должны быть осторожны, предполагая, что она сработает (или уже сработала) хотя бы раз во Вселенной.

5.3.3 От цианобактерий к фотосинтезу

Фотосинтез, пожалуй, является наиболее важным процессом накопления энергии в биосфере Земли, поддерживая подавляющее большинство её биомассы, прямо или косвенно, как часть пищевой цепи. Фотосинтезирующие организмы являются фотоавтотрофами – то есть они могут синтезировать собственные запасы пищи, поглощая фотоны для преобразования CO_2 в углеводы. Общая форма реакции (для химического вещества A) выглядит следующим образом:



where the H_2A molecule acts as an electron donor. In oxygenic photosynthesis, $\text{A}=\text{O}$ and hence



То есть фотосинтез является основным источником O_2 . Вода необходима в качестве реагента и также является продуктом реакции (хотя следует отметить, что реакция включает в себя чистую потерю одной молекулы воды)..

Реакция имеет два основных этапа: светозависимый этап, на котором пигмент хлорофилл поглощает фотон и отдает электрон. Этот электрон

передается через ряд других пигментов/молекул в транспортной цепи для образования молекул, запасających энергию: АТФ и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН). На втором, светонезависимом этапе, эти молекулы используются для поглощения CO_2 из воздуха и закрепления углерода в сахарах (фиксация углерода).

Возможны несколько различных метаболических путей фиксации углерода, все из которых основаны на ферменте RuBiSCo (рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа), катализирующем реакцию фиксации. Одним из таких путей является C3-фотосинтез, который непосредственно фиксирует углерод из CO_2 через цикл Кальвина-Бенсона. Это самый древний и наиболее распространенный путь.

В жарких и засушливых регионах двойная карбоксилазная / оксигеназная природа RuBiSCo означает, что часть RuBiSCo будет окисляться, что приводит к фотодыханию и снижению скорости фиксации углерода. Растениям приходится либо предотвращать потерю воды в таких засушливых климатических условиях, либо искать другие способы фиксации углерода. Фотосинтез C_4 начинается с синтеза 4-углеродных органических кислот (например, яблочной и аспарагиновой кислот), что позволяет регенерировать CO_2 внутри специализированных клеток обкладки сосудистых пучков, и этот CO_2 затем может быть зафиксирован с помощью RuBiSCo, как и в пути C3. Около 5% растений используют путь C_4 .

Свидетельства фиксации углерода обнаружены в окаменелостях архейских строматолитов возрастом около 3,8 млрд лет. Это не является неопровержимым доказательством того, что фотосинтез был причиной фиксации углерода, хотя и наводит на определенные мысли. Известно, что в атмосфере было недостаточно кислорода для существования оксигенного фотосинтеза. Другие восстановители могут играть роль H_2A в нашем общем уравнении фотосинтеза. Действительно, H_2 мог обеспечивать необходимые донорные электроны, или H_2S , которые, вероятно, были более распространены в архейскую эпоху.

К аноксигенным фотосинтезирующим организмам относятся Chlorobium (зеленые серные бактерии), Rhodobacter (пурпурные бактерии) и Chloroflexus (зеленые скользкие бактерии). Считается, что цианобактерии являются первопроходцами оксигенного фотосинтеза. Микроокаменелости, похожие на цианобактерии, датируются 3,5 млрд лет назад, но это, в лучшем случае, слабое свидетельство фотосинтеза в этот период. Кислородный фотосинтез, должно быть, существовал примерно до 2,6-2,7 млрд лет назад, в момент первого Великого кислородного события.

Эволюция бескислородного фотосинтеза произошла относительно рано, и тем не менее это нетривиальное событие, учитывая сложность светонезависимых реакций и необходимость RuBiSCo. Примечательно, что используемые сегодня фотосинтетические механизмы практически идентичны механизмам, созданным древнейшими водорослями. Эволюция фотосинтеза, скорее всего, потребовала случайного сочетания большого числа одноклеточных организмов с метаболизмом, который мало напоминал какие-либо фотосинтетические реакции!

Кислородный фотосинтез имел одно зловещее преимущество перед своими бескислородными конкурентами – он производил токсичные отходы, которые, скорее всего, уничтожали конкурентов. По мере того как популяция цианобактерий стремительно росла благодаря этому новому явлению, они вскоре лишились CO₂. Секвестрация углерода в результате тектонической субдукции позволила кислороду оставаться в атмосфере, доведя его уровень до примерно 7% (30–40% от его нынешнего значения). Это быстро остановило рост цианобактерий. Кислород оставался на этом низком уровне до появления эукариотических водорослей примерно миллиард лет спустя.

5.3.4 От прокариот к эукариотам

Ископаемые данные свидетельствуют о том, что эукариотические клетки существуют на Земле около 1,8–2 млрд лет, в то время как прокариотические клетки существуют уже 3,5 млрд лет (а возможно, и больше).

Ключевое различие между прокариотами и эукариотами заключается в сложности их внутреннего клеточного механизма. Эукариотические клетки обладают ядром и митохондриями, заключенными в собственные мембраны, тогда как содержимое прокариотической клетки, как полагают, смешано в одном компартменте (см. Рисунок 5.5).⁷

Наиболее популярной теорией развития эукариотических клеток является теория эндосимбиоза, согласно которой современная эукариотическая клетка образуется из совокупности примитивных прокариот.

⁷ There is evidence of protein structures inside cyanobacteria, which would indicate that prokaryotes possessed a similar form of organelle containment (Kerfeld, 2005).




Рисунок 5.5 Упрощенная схема эукариотической и прокариотической клетки. Прокариоты не имеют других органелл, кроме рибосом, мест синтеза белка. Нуклеоид представляет собой совокупность РНК, ДНК и белков, не заключенную в мембрану. В отличие от них, эукариотические клетки имеют ядро, заключенное в мембрану, и множество органелл в зависимости от того, относится ли клетка к растениям или животным. Почти все эукариотические клетки содержат митохондрии, которые производят большую часть запасов аденозинтрифосфата (АТФ) в клетке. Растительные клетки также содержат хлоропласты, которые осуществляют фотосинтез.

Митохондрии, хлоропласты и другие родственные органеллы, скорее всего, были поглощены более крупным прокариотом, либо в качестве добычи для переваривания, либо в качестве внутренних паразитов. По мере того, как хлоропласты и фотосинтез начали насыщать Землю кислородом, прокариоты получили бы огромное преимущество, обладая встроенной системой переработки кислорода для производства АТФ (митохондрии), а в некоторых случаях (например, у растений) и вторичной системой генерации энергии (фотосинтезирующий хлоропласт). Со временем новая гибридная клетка адаптирует свое поведение в отношении производства энергии к своим новым «инструментам» и в конечном итоге становится полностью зависимой от них для выживания.

Тот факт, что все эукариотические клетки имеют митохондрии, но не все эукариоты имеют хлоропласты (или пластиды в целом), указывает на то, какое поглощение произошло первым. Действительно, сам факт того, что митохондрии и пластиды до сих пор сохраняют собственные механизмы построения ДНК и белков, является убедительным доказательством того, что когда-то они были независимыми организмами..

5.3.5 От одноклеточных к многоклеточным организмам

Переход от одноклеточных к многоклеточным организмам происходил по меньшей мере 25 раз в истории эукариотической жизни на Земле (не говоря уже о прокариотах, Parfrey and Lahr, 2013). Это подтверждается рассмотрением многоклеточного поведения организмов в различных кладах.

Существует два основных типа многоклеточного поведения. Агрегативное многоклеточное поведение (АМ) возникает, когда несколько одноклеточных организмов сотрудничают для образования одного «плодового» тела. Делительное многоклеточное поведение (ДМ) — это деление отдельных клеток, распространенное у животных, растений и грибов. Клетки должны уметь имитировать несколько типов поведения, чтобы быть способными к многоклеточным действиям — клеточная адгезия, коммуникация и дифференциация. Эти типы поведения, по-видимому, относительно легко воспроизвести, например, у зеленых водорослей, если применяется соответствующее селективное давление, что предполагает, что генетическая изменчивость/мутация, необходимая для возникновения АМ, относительно низка.

Одноклеточные организмы обладают впечатляющим разнообразием биохимических процессов, намного большим, чем у многоклеточных организмов. Ключевое преимущество многоклеточности заключается в совершенно новых организационных возможностях, предоставляемых эффективным разделением труда. Специализация типов клеток (все они обладают одной и той же генетической информацией) — это мощное нововведение, позволяющее функционировать гораздо более крупным организмам, и оно, по-видимому, имеет решающее значение для интеллекта и инноваций.

Конечно, существует промежуточная стадия между одноклеточностью и многоклеточностью, что подтверждается колониями одноклеточных организмов. Бактериальные маты демонстрируют дифференциацию экспрессии генов и метаболизма в зависимости от местоположения бактерии внутри мата. Слизевики (такие как *Dictyostelium discoideum*) являются одноклеточными в периоды обилия пищи — в периоды нехватки пищи плесень стремится объединиться, образуя многоклеточную колонию, при этом происходит дифференциация клеток внутри и на поверхности плесневого слизня.




Рисунок 5.6 Основные таксономические ранги. Для каждого из трех доменов жизни (эукариоты, бактерии и археи) организмы подразделяются на царства, типы, классы, отряды, семейства, роды и виды.

Такой уровень специализации клеток требует общего направления для эффективной организации. В результате эволюция сформировала множество различных планов строения тела, характерных морфологических особенностей, которые обеспечивают организму базовую структуру, на основе которой он может развиваться и модифицироваться. Полезно рассмотреть наиболее широко принятую таксономическую систему ранжирования организмов, которая представлена на рисунке 5.6. Виды со схожим планом строения тела обычно принадлежат к одному типу, хотя это не является строго соблюдаемым правилом и зависит от того, определяется ли тип филогенетически или нет.

В животном царстве насчитывается приблизительно 33 признанных типа – человек относится к хордовым, что означает, что, помимо прочих свойств, он обладает хордой, жестким хрящевым стержнем, простирающимся от головы до хвоста. У подтипа позвоночных эта хорда образует центральное ядро межпозвоночных дисков (то есть позвоночника).

Энергетические потребности крупных форм жизни

С точки зрения массы и численности, подавляющее большинство организмов на Земле — это микроорганизмы. Называть их «примитивными» или «простыми» — это большая несправедливость, но эти слова часто произносят специалисты по поиску внеземной жизни (SETI), поскольку они, как правило, стремятся обнаружить другие формы жизни.

Как мы увидим, то, что мы называем «разумной» жизнью, требует минимального размера мозга для выполнения высших когнитивных функций. Даже технологические и социологические инновации «маленьких» организмов, таких как муравьи и термиты, требуют, чтобы животные были многоклеточными, то есть на много порядков крупнее бактерии.

Существует относительно сильная корреляция между массой тела млекопитающего и его потребностями в энергии, что отражено в следующем степенном законе.:

$$BMR = AM_b^x, \quad (5.4)$$

где BMR — это скорость основного обмена веществ, скорость потребления энергии, необходимая для выполнения основных физиологических функций (за исключением пищеварения), выраженная в килокалориях в сутки, а M_b — масса тела в килограммах. Коэффициент пропорциональности составляет приблизительно 70 килокалорий в сутки на килограмм, а показатель степени x — приблизительно 0,75 (Клейбер, 1932), хотя значения обоих обычно выражаются без погрешностей, а истинные значения для разных животных являются предметом дискуссий (см., например, Уайт и Сеймур, 2003). Это соотношение хорошо работает для современных людей и шимпанзе, с отклонениями не более нескольких процентов.

Если мы будем рассматривать энергетические бюджеты, то увидим, что более низкая скорость основного обмена веществ в условиях, где местное энергоснабжение примерно постоянно, дает конкуренту больший запас энергии. Потребляемая энергия расходуется на две основные категории функций: поддержание жизнедеятельности, которое включает восстановление тканей, скорость основного обмена веществ и другие физические действия, необходимые для добычи пищи, и производство, которое включает рост тканей и размножение.

Очевидно, что для генетического происхождения чем больше энергии выделяется на рост и размножение, тем лучше. Поэтому, по-видимому, существует преимущество в несколько более низком базальном метаболизме и, следовательно, в меньшей массе тела.

Мы можем рассматривать большую часть траектории развития человечества через такую призму. Прямохождение предлагает аналогичные энергетические преимущества по сравнению с ходьбой на четвереньках (Sokol et al., 2007), и постоянное совершенствование этого навыка с помощью биомеханики очевидно, если мы рассмотрим изменения скелетов человека за последние несколько сотен тысяч лет.

Действительно, производство трудосберегающих устройств может значительно снизить энергетические затраты. Инструменты и технологии могут обеспечить важные преимущества в плане калорийности, и эти преимущества в конечном итоге перевесили затраты на энергоемкий мозг, который их придумал.

Но какие химические реакции могли бы производить и накапливать такую энергию? На этом основании мы можем исключить большое количество реакций. Большое количество кислорода в атмосфере Земли обеспечивает обильный источник энергии. Источником относительно большого запаса кислорода на Земле являются фотосинтезирующие организмы. Когда фотосинтетические механизмы появились на Земле примерно 2,7 млрд лет назад, уровень O_2 в атмосфере увеличился в 10 000 раз (примерно до 10% от современного уровня).

Многие формы прокариотической жизни сочли эти значительно возросшие уровни кислорода враждебными, поскольку окисление может извлекать электроны из химических связей, подавляя и разрушая клетки и ферменты. Анаэробные среды сохранились, сохранив прокариотические формы.

Эукариотические клетки в полной мере воспользовались этой новой кислородсодержащей средой, разработав кислородное дыхание как источник генерации энергии. Действительно, эукариоты, поглотившие хлоропласты, были активными участниками этого второго Великого кислородного события, которое повысило концентрацию O_2 примерно до 20% от нынешнего уровня, судя по данным об увеличении концентрации сульфатов в океане (Catling and Claire, 2005), но причина этого неясна. С этого уровня концентрация кислорода в атмосфере неуклонно росла до наших дней.

5.3.6 Переход от бесполого размножения к половому размножению

До появления полового размножения передача генетической информации была в значительной степени хаотичной. Горизонтальный перенос генов позволяет организмам обмениваться и расширять генетические данные с чрезвычайно высокой скоростью. Как только в популяции начинается половое размножение, может происходить вертикальный перенос генов, что позволяет начать процесс видообразования. Скрещивание между особями начинает разделять их, до такой степени, что две особи с общим предком больше не могут успешно производить плодовитое потомство, что является строгим определением принадлежности этих особей к разным видам.

На данном этапе важно дать краткое изложение нашего понимания генетики и эволюции. Специалисты по астробиологии и SETI часто допускают критические ошибки в использовании эволюционной теории. В частности, они допускают фундаментальные ошибки в ее применении к психологии человека. Область эволюционной психологии подвергается

сильной критике и страдает от неправильного понимания того, что делает признак «адаптивным». Современная теория эволюции опирается на несколько ключевых концепций.

Мутации

Когда родительские организмы производят потомство, репродуктивный процесс не является совершенным. В процессе размножения возникают ошибки, либо во время репликации, либо в результате повреждения ДНК. Мутации в ДНК принимают различные формы. Точечные мутации — это просто изменения одной пары оснований на другую в некотором месте последовательности ДНК. Напомним, что пары оснований состоят из пурина (G, A) и пиримидина (T, C). Точечные мутации, которые заменяют пурин на пурин или пиримидин на пиримидин, называются транзициями. Точечные мутации, которые заменяют пурин на пиримидин (или наоборот), называются трансверсиями. Другие мутации могут увеличивать или уменьшать количество пар оснований в данном месте последовательности ДНК. Если увеличение или уменьшение не кратно 3, это приводит к мутации со сдвигом рамки считывания. Триплетные слова, считываемые из последовательности ниже по течению от мутации, сдвигаются, аналогично тому, как два английских слова неправильно разделяются (т.е. «two words» становится «t wow ords»).

Целые участки ДНК могут быть дублированы и вставлены в последовательность потомства (тандемная дупликация). В крайних случаях могут быть дублированы целые геномы или хромосомы.

Экстремальные события дупликации могут изменить ploidy организма. Как правило, добавление дополнительной хромосомы к данной паре приводит к летальному исходу для человека (за исключением хромосомы 21, которая отвечает за синдром Дауна)..

Рекомбинации

Рекомбинация — это процесс образования новых комбинаций генов. Чаще всего это достигается посредством полового размножения. У человека это происходит за счет образования мужских и женских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток, оба гаплоидные), которые затем объединяются, образуя оплодотворенную диплоидную зиготу. Это один из многих различных циклов рекомбинации, наблюдаемых у наземных эукариот, но он служит достаточным примером того, как наследуемые признаки передаются из поколения в поколение, обеспечивая при этом источник генетической изменчивости, помимо мутаций.

Случайный генетический дрейф

Представим себе популяцию организмов данного вида, где мы можем определить общее количество заданных аллелей гена g в этой популяции (частота аллелей P_g). Мутации, очевидно, могут влиять на частоту аллелей, а также на рекомбинацию.

Носители генов (организмы) редко остаются на одном месте. Животные перемещаются в поисках пищи и партнеров; семена, пыльца и бактерии распространяются ветром и дождевой водой (или другими организмами). Генный поток относится к изменению местоположения генов между поколениями.

Генетический дрейф относится к стохастическому изменению частоты аллелей, которое гарантированно происходит, даже если эти изменения не дают преимущества индивиду. Это явление гарантированно происходит, поскольку индивиды оставляют после себя различное количество потомства, и, следовательно, в эволюции всегда будет присутствовать случайный элемент. Это подтверждается тем фактом, что большая часть эукариотической ДНК не кодирует белки и, по сути, не обладает какой-либо специфической функцией. Сочетание мутации и случайного размножения (т.е. рекомбинации без предпочтений) часто называют нейтральной эволюцией..

Естественный (и искусственный) отбор

Краеугольным камнем современной эволюционной теории является отбор — концепция, согласно которой гены, дающие преимущество своему обладателю, с большей вероятностью будут передаваться будущим поколениям. Более строго это можно представить, определив приспособленность W как количество потомков, оставленных индивидом (после одного поколения). Таким образом, приспособленность любого аллеля — это средняя приспособленность всех индивидов, обладающих этим аллелем. Обычно приспособленность не измеряется в абсолютных величинах, а нормируется относительно некоторого среднего значения в популяции.

Естественный отбор предпочитает унаследованные вариации, повышающие приспособленность. Поэтому это единственный аспект эволюции, приводящий к адаптации — появлению признаков, функция которых заключается в повышении приспособленности, и которые, следовательно, (в широком смысле) были «эволюционированы» для этой функции. Мутации, генный поток и генетический дрейф статистически с большей вероятностью снижают приспособленность, чем повышают её,

поскольку их действия случайны и не способствуют повышению приспособленности.

Точный механизм повышения приспособленности естественным отбором можно рассмотреть с помощью одной из двух концепций: фундаментальной теоремы Фишера или адаптивного ландшафта Райта. Основная теорема Фишера гласит, что темп роста средней приспособленности ($\bar{W}$) равен аддитивной генетической дисперсии приспособленности.⁸

$$\bar{W} = \frac{V(W)}{2N_e}$$

To understand Wright's adaptive landscape, imagine a species with two alleles A and B . If we plot the fitness $W(A, B)$ as a function of A and B , we can produce a contour map, with probably multiple peaks and troughs of fitness. Generally speaking, selection results in allele frequency shifts that move towards peaks in W . This is an appealing image, especially to physicists used to understanding motion of particles in a potential in a similar fashion, but there are important complications to this metaphor.

Of course, populations have many thousands of alleles, and many peaks of fitness as a result. But even in a two-allele system, there are assumptions underlying this picture that must be examined. A key assumption is that alleles A and B are randomly associated in organisms (this is also known as *linkage equilibrium*). In practice, the presence of one allele is often conditional on the presence of another (an example of linkage disequilibrium). When linkage disequilibrium occurs, an allele that has little effect on fitness can find itself boosted in the population.

A most important assumption is that $W(A, B)$ is constant in time. Both the physical and biotic environment will evolve, and also the surrounding genes. A given allele can be beneficial if partnered correctly, say with a distinct counterpart (heterozygous), and yet be damaging to the organism if it is paired with itself (homozygous). All these factors ensure that W will change with time.

Natural selection has no specific purpose – artificial selection has an agent guiding the selection (humans), and therefore assumes the purpose of said agent.

⁸ The additive genetic variance is not the total variance of the population, which is biased by random, noninherited differences in reproductive success of individuals, but rather the variance that can be attributed to the *average* effect of each allele in the population.

Unsurprisingly, rather than executing the ‘random walks’ associated with natural selection, genomes undergoing artificial selection undertake more direct paths towards peaks in Wright’s adaptive landscape. Essentially, this is achieved by humans (knowingly or otherwise) artificially inflating the fitness of specific alleles relative to the mean.

Горизонтальный перенос генов

The appearance of vertical gene transfer does not end the action of horizontal gene transfer. This remains an important process in evolution, especially for, e.g., the development of antibiotic resistance in bacteria (Burmeister, 2015). There are three principal modes of horizontal gene transfer:

- Transformation – Bacteria absorb DNA from the local environment.
- Conjugation – Bacteria directly transfer DNA between each other.
- Transduction – An intermediate organism conducts a transfer of DNA from one organism to another (e.g., a bacteriophage between two bacteria).

Горизонтальный перенос может быть быстрым и усиливать последующий вертикальный перенос генов, приводя к необычайной изменчивости бактериальных геномов (Ochman et al., 2000).

Фактически, теперь кажется очевидным, что горизонтальный перенос (иногда латеральный перенос генов) гораздо более распространен, чем считалось ранее, и не ограничивается бактериями – гены могут переноситься между доменами, даже между бактериями и животными (Dunning Hotopp, 2011), и вполне вероятно, что эволюция эукариот была бы совершенно иной без горизонтального переноса (Keeling and Palmer, 2008).

5.3.6 Эволюция как взаимодействие мутаций, рекомбинаций, генного потока, дрейфа и отбора.

Каждый компонент эволюционной теории необходим для того, чтобы она обладала объяснительной силой. Например, мы можем понять феномен закрепления вредных аллелей в малых популяциях только в том случае, если признаем, что случайный генетический дрейф более эффективен в таких малых количествах (т.е. лишь небольшое количество особей с рассматриваемым аллелем может привести к закреплению, имея больше потомства). И наоборот, полезные мутации, повышающие приспособленность, могут быть утрачены в малых популяциях по тому же принципу. Генные потоки имеют решающее значение для формирования дивергентных популяций, которые приобретают различные благоприятные

мутации в результате географических различий, что приводит к видообразованию.

Это подчеркивает ненаправленный характер эволюции. У эволюции нет «цели» или «задачи» — это стохастическое явление, где стохастические изменения частоты аллелей усиливаются до различных уровней в зависимости от относительной силы отбора по сравнению с другими силами, действующими на геном. Таким образом, виды могут обладать признаками, которые не являются адаптивными, а скорее следствием периода сильного дрейфа и слабого отбора, или коррелятом отбора другого, адаптивного признака. Мы рассмотрим это подробнее в будущих главах..

5.3.7 Развитие мозга

До появления мозга обработка информации представляла собой пространственно распределенную деятельность, охватывающую большую часть тела, как это можно наблюдать у современных медуз и актиний. Эволюция центральной нервной системы позволила организмам более эффективно организовывать и обрабатывать информацию.

Формирование специализированных скоплений нервов и нейронов вблизи органов чувств становилось все более выгодным, и первые мозги выросли из скоплений, расположенных вблизи рта и глаз. Мозг животных представляет собой в основном сети нейронов, состоящие из одного аксона и множества дендритных связей. Основные различия между мозгами животных заключаются в общем количестве нейронов, локальной плотности нейронов, типичном количестве связей (синапсов) на нейрон и общей структуре сети. Мозг человека в основном состоит из:

- the *cerebral cortex*, which is primarily responsible for the most complex aspects of human intelligence, including our aptitude for reason, imagination and language;
- the *cerebellum*, which is principally concerned with sensory-motor coordination;
- the *thalamus* and *hypothalamus*, which act as routing stations between the various brain regions. The hypothalamus also regulates the production of hormones and neurotransmitters, and appears to be the master control centre for emotions;
- the *limbic system*, the earliest form of the forebrain to develop. Its components include the *hippocampus*, which plays an important role in learning and

memory, and the *amygdala*, which controls fear responses, as well as sexual and aggressive behaviour.

Together with the spinal cord (and the brain stem which connects the two), this constitutes the human central nervous system. But how can a system like this, the ultimate quest for SETI searches, be developed through evolution?

Determining the evolution of brains from the fossil record is highly challenging. Brains are soft tissue, and do not fossilise easily. We are forced to rely on *endocasts*. Fossil skeletons can be retrieved when the animal in question is buried in such a fashion that the bone can become mineralised. In an endocast, the soft tissue interior to the skeleton decays and is replaced by an inblown matrix of sands, mud, clays and pebbles. If this matrix remains undisturbed for a sufficient period of time, it too can harden into sedimentary rock.

Endocasts of brains require the cranium to remain uncrushed when the organism is buried, and for complete fossilisation. Depending on the skeleton's journey through the upper crust, the entire skeleton can be unearthed, and the cranium sectioned to extract the endocast, or in exceptionally fortunate cases, the cranium weathers under exposure to the elements, yielding the endocast brain like a nut from its shell.

Inferring brain properties from endocasts of 'lower vertebrates' can be challenging, as the endocast often includes extra cartilage and bone material, and can fill the entire cranium, which in general is somewhat larger than the brain.

The oldest endocast brain known to science is that of a *chimaeroid* fish, dating to some 300 Myr ago, showing that identifiable brains are already in place by the Carboniferous period. It is likely that the brain's origin actually goes all the way back to the Cambrian period, to the last common ancestor of all bilaterally symmetric animals, the urbilaterian (Hejnol and Martindale, 2008).

Determining precise brain volumes is crucial to studies of its evolution as an information-processing organ across species. In modern animals, we see (on average) a relation between the body weight P and the brain weight P :

$$E = kP^{2/3} \quad (5.6)$$

where k is a proportionality constant fitted to the clade of interest (for mammals, $k = 0.12$). The $2/3$ exponent suggests a relationship between surface and volume. Therefore, for a given species i with a body weight/mass described by P , we can use the above equation to compute an expected brain weight/mass E_e . We can then

compare this to actual measurements for the brain E_i , and compute what is known as the *encephalisation quotient*:

$$EQ_i = \frac{E_i}{E_e} \quad (5.7)$$

The EQ for humans is around 6.5, with bottlenose dolphins scoring around 5.5, macaques around 3.15, chimpanzees 2.63 and gorillas 1.75 (Cairo', 2011).

Taking these measures at face value is dangerous, and implies some odd results (thin humans are smarter than fat humans), but as an average for inter-species comparison, this points to a continuum of intelligence, connected to the relative brain size.

This makes some intuitive sense, as the volume of the cerebral cortex grows linearly with brain volume, and the total number of cortical neurons grows as $E^{2/3}$ (as larger brains have lower cortical density). Brains clearly confer an advantage relative to the demands of the organism's environment. In general, the higher the information-processing demands of the organism, generally the larger the brain (relative to its size).

This rule is imperfect, especially when we consider the cranial capacity of the *homo* genus. Over most of the 2 million years of the genus, the absolute brain size of hominids has increased, from a volume of around 600 cm³ for *homo habilis* to around 1,496 cm³ for *homo sapiens sapiens*. Whether this points to a **relative** increase in brain size (or EQ) is less clear, due to confusing factors such as sexual dimorphism (different body sizes for males and females), and the quality of endocasts or cranial samples. That aside, it is clear that through a combination of increased brain size and reduced body mass, there is a significant change in EQ between the *Australopithecus* and *homo* genii.

Neanderthal brain sizes are within the sampling uncertainties for *sapiens* brain sizes. Due to their larger bodies, Neanderthal EQ typically lags *sapiens*'s by about 1 or so (Mithen, 2011). We have two organisms with EQ and global brain size/body size properties that are difficult to distinguish, and yet *sapiens* dominates, despite being physically weaker.

We must therefore point to the internal brain structure as well as its total size. A fundamental rewiring of the brain, particularly the development of Broca's area in the frontal lobe (Cooper, 2006), is proposed as a cause for the sudden explosion in linguistic faculty around 70,000 years ago. This demonstrates that when it comes to intraspecies competition, it is not only size that matters.

5.3.8 От одиночных особей к социальным группам

Существа с мозгом, функционирующие в среде, окруженной существами того же и разных видов, должны принимать решения о том, как действовать, чтобы наилучшим образом соответствовать своим собственным интересам. С точки зрения дарвинизма, естественный отбор обеспечит процветание организмов, которые эффективно обрабатывают информацию и принимают решения, приводящие к оптимальному количеству выживших потомков.

В этой картине каждый организм конкурирует с каждым другим организмом (включая представителей своего собственного вида) за сохранение своего генетического наследия. Как может развиваться сотрудничество в условиях этой борьбы?

Эти вопросы можно формализовать, рассмотрев математику *теории игр*, изучающей игровой процесс с участием нескольких игроков. Каждый игрок i выбирает стратегию S_i , что приводит к числовому выигрышу $p(S_1, S_2 \dots S_n)$ для каждого игрока. Для игр с двумя игроками это можно представить в виде матрицы выигрышей p_{ij} , где i представляет стратегию игрока 1, а j — стратегию игрока 2. Самый известный пример формальной игры с двумя игроками — это дилемма заключенного (Table 5.1).

Table 5.1 Матрица выигрышей в «Дилемме заключенного».

Заключенные могут либо сотрудничать со своим товарищем (C), либо предать его (D). Равновесие Нэша в этой игре (D, D).

Prisoner's Dilemma	C	D
C	5,5	1,7
D	7,1	3,3

Представьте, что два заключенных совершили правонарушение и вызваны по отдельности в кабинет начальника тюрьмы. Начальник просит их рассказать правду о своих действиях. У каждого заключенного есть два варианта: либо сотрудничать со своим сокамерником, солгав начальнику тюрьмы ($S_i = C$), либо перейти на сторону начальника тюрьмы и обвинить другого в правонарушении ($S_i = D$). В этой формулировке максимальная выгода для любого из игроков составляет $p(C, D)$ или $p(D, C)$, то есть, если игрок переходит на сторону противника, а его товарищ сотрудничает. Действительно, если один из игроков переходит на сторону противника, то

наилучшей стратегией для другого игрока также является переход на сторону противника.

Равновесие Нэша в любой игре можно определить как комбинацию S_1, S_2 , такую, что ни один игрок не захочет изменить свою стратегию. Это вполне очевидно в дилемме заключенного. Равновесие Нэша — (D, D) — если любой из игроков решит сотрудничать, его выигрыш уменьшится с 3 до 1. Обратите внимание, что это не максимизирует общий выигрыш, который определяется (C, C) .

Дилемма заключенного может показаться надуманным примером, но структура матрицы выигрышей характерна для многих ситуаций в природе. Два организма могут либо сотрудничать, либо нет, и во многих случаях действительно безопаснее не сотрудничать. Мейнард Смит ввел концепцию эволюционно стабильной стратегии (ЭСС), которая является расширением концепции равновесия Нэша на популяции игроков. ЭСС — это стратегия, которая, если она принята популяцией, не может быть вытеснена или заменена другой, редкой стратегией. Другими словами, ЭСС останется широко используемой стратегией в популяции, а количество игроков, использующих стратегии, не являющиеся ЭСС, будет сокращено.

Как отмечает Аксельрод (1984), дилемма заключенного в своей простейшей формулировке игнорирует важный факт о реалистичном игровом процессе. Игроки могут играть в игру несколько раз и сохранять память о своих предыдущих стратегиях. В повторяющейся «Дилемме заключенного», разыгранной N раз, существует $2N$ возможных стратегий, то есть комбинаций из N выборов между (C, D) .

Фактически, вместо рассмотрения всех этих стратегий, мы можем рассмотреть три эвристических варианта: CC (всегда сотрудничать), DD (всегда предать) и TFT («око за око»). В TFT игрок играет тем же, что и противник в предыдущей игре.

Table 5.2 Матрица выигрышей для трех возможных стратегий в повторяющейся дилемме заключенного. Заключенные могут либо всегда сотрудничать (CC), всегда предать (DD), либо применять стратегию «око за око» (TFT), при которой игрок играет тем же, что и противник в предыдущей игре. В популяции игроков могут быть использованы две эволюционно стабильные стратегии: (DD, DD) and (TFT, TFT) .

Repeated Prisoner's Dilemma	CC	DD	TFT
CC	20, 20	40, 10	22, 19
DD	40, 10	30, 30	30, 30

TFT	19, 22	30, 30	30, 30
-----	--------	--------	--------

Если противник ранее играл С, игрок отвечает взаимностью, проявляя сотрудничество. Если противник предал, игрок играет D в качестве наказания. Из матрицы выигрышей для этой игры (таблица 5.2) видно, что (DD, DD) остается эволюционно стабильной стратегией, но также и (T FT, T FT), и она немного привлекательнее. Таким образом, мы видим, как простые стратегии могут строить сотрудничество между взаимодействующими игроками при достаточном количестве взаимодействий. Интересно отметить, что (CC, T FT) $\equiv$ (CC, CC), поскольку если один игрок всегда играет CC, то правила T FT означают, что другой игрок также должен всегда играть С.

Существуют три типичных явления, посредством которых может быть построено сотрудничество в популяции: альтруизм, направленный на родственников, принуждение и взаимная выгода. С генетической точки зрения, для организмов всегда предпочтительнее помогать своим родственникам против неродственных организмов, поскольку это увеличивает вероятность передачи генетического наследия индивида следующему поколению. Сотрудничество всегда может быть навязано доминирующим индивидом над просителем, но сохраняется только благодаря устойчивому доминированию.

Наконец, взаимная выгода может выходить за рамки родственных и даже видовых границ, создавая симбиотические отношения между организмами. Смит и Сатмари (1997) рассматривают взаимную выгоду в форме игры в «греблю». Если два игрока находятся в лодке, оба игрока всегда получают выгоду от совместной гребли по сравнению с греблей в одиночку. Стратегия CC тогда становится эволюционно стабильной стратегией (см. Таблицу 5.3).

Игра в греблю — хорошая аналогия для животных сообществ, где каждый индивид способен к размножению (например, львы, шимпанзе, бабуины, люди). Некоторые социальные группы состоят из одной размножающейся пары с группой других взрослых (использующих братьев и сестер размножающихся особей), которые помогают в воспитании потомства. Помощники остаются плодовитыми и могут стать размножающимися либо путем установления доминирующего контроля над текущей группой, либо путем создания новой группы.

Table 5.3 *The payoff matrix for the 'rowing game'. Two players are rowing a boat. Players can either co-operate (row) or defect (coast).*

Rowing Game	C	D
C	7,7	0,5
D	5,0	7,7

Эусоциальные общества содержат особей, которые являются стерильными и не размножаются. В результате в таких обществах естественным образом формируется кастовая система размножающихся и не размножающихся особей. За потомством ухаживают совместно. Насекомые — наиболее распространенный пример эусоциального общества — например, все муравьи являются эусоциальными. Эусоциальные общества также распространены среди пчел, ос и термитов.

Парасоциальные общества представляют собой промежуточный этап, когда организмы собираются вместе для взаимной выгоды (например, группа размножающихся самок). Эусоциальное общество может сформироваться, если количество фертильных самок начинает уменьшаться со временем.

Эусоциальность также может развиваться непосредственно из социальных групп «помощников», как описано в предыдущем абзаце. В зависимости от социальной динамики, помощники могут в конечном итоге эволюционировать и стать постоянно стерильными.

Точные причины этого явления являются предметом дискуссий. Распространенной теорией является альтруизм, обусловленный родственным отбором. В колониях медоносных пчел (*Aphis mellifera*) рабочие пчелы более тесно связаны с яйцами, отложенными маткой, чем с яйцами, которые иногда откладывают другие рабочие пчелы. Теория эгоистичного гена предсказывает, что рабочая пчела будет действовать в интересах яйца матки, а не яйца другой рабочей пчелы.

Теория родственного отбора альтруизма (или инклюзивной приспособленности) обычно опирается на гаплодиплоидию, специфический метод определения пола яйца. Самцы образуются из неоплодотворенных яиц и являются гаплоидными, самки — из оплодотворенных яиц и являются диплоидными. При гаплодиплоидии сестры разделяют больше генов со своими сестрами (75%), чем с матерью (50%). Поэтому для организма генетическое преимущество состоит в том, чтобы помогать матери в воспитании сестер, а не покидать гнездо, чтобы воспитывать дочерей. Многие эусоциальные организмы являются гаплодиплоидными, но многие

на самом деле являются диплоидными (например, термиты). Это подтолкнуло к появлению других объяснений эволюции эусоциальных обществ, которые отходят от концепции совокупной приспособленности. (Nowak et al., 2010).

Социальные структуры являются общей тенденцией для всех многоклеточных организмов, начиная от одиночного, но социального поведения ягуаров, до субсоциального поведения животных, воспитывающих потомство, и заканчивая парасоциальным и, на самом высоком уровне социальной организации, эусоциальной колонией. Мнение о том, что современные люди представляют собой эусоциальное общество, является несколько спорным. Фостер и Ратниекс (Foster and Ratnieks, 2005) утверждают, что «эффект бабушки», когда женщины в постменопаузе помогают своим детям воспитывать собственных внуков, удовлетворяет определению эусоциального общества как нерепродуктивного помощника. В сочетании с исключительно разнообразным разделением труда в человеческом обществе и распространенностью кастовых систем в человеческой культуре, существуют некоторые доказательства в поддержку их аргумента, хотя они свободно признают, что это определение несовершенно.

5.3.9 Социальные единицы цивилизации

В соответствии с нашей неспособностью определить жизнь и интеллект (см. раздел 6.2), единого общепринятого определения цивилизации нам не существует.

Некоторые общие критерии для определения сложного общества как цивилизации включают социальную стратификацию, урбанизацию и изоляцию от природной среды, а также средства символической коммуникации (например, письменность).

Рассмотрим термитник. Структура термитника содержит сложную систему кондиционирования воздуха, где внутреннее тепло циркулирует вверх, к капилляроподобным отверстиям на верхней поверхности термитника. Воздух внутри капилляров охлаждается и обменивает CO₂ на O₂. Будучи эусоциальной колонией, термиты демонстрируют социальную стратификацию. Имея несколько миллионов организмов в каждой колонии, они живут с плотностью популяции, которую человек легко мог бы определить как урбанизацию. У термитов отсутствует система символической коммуникации, но они обладают сложными системами химической передачи сообщений, дополненными виброакустической

коммуникацией, а также зрительными системами у высших каст (см. Bagnères and Hanus, 2015, и ссылки в нем).

Как и в случае с интеллектом, существует континуум между социальными структурами животных и цивилизациями. Термиты почти полностью соответствуют критериям цивилизации, несмотря на отсутствие даже элементарного самосознания. Можно даже утверждать, что колония действует скорее как суперорганизм, чем как общество, с потреблением энергии, дыханием, удалением отходов и внутренней физико-химической сигнализацией — атрибутами, на которые опираются все крупные организмы для функционирования.

Если мы проверим ряд животных сообществ по вышеуказанным общим критериям цивилизации, то наличие системы символической коммуникации, по-видимому, является отличительным фактором — именно язык делает человеческие социальные группы цивилизациями и может быть лимитирующим этапом в развитии внеземной цивилизации (Решение R.20, R.21). Как мы увидим в следующих разделах, появление языка совпадает со значительным изменением перспектив человеческой цивилизации.

5.3.10 *От биологии к постбиологии?*

Обычно утверждается, что развитые цивилизации будут постбиологическими — это может означать либо то, что внеземные цивилизации отказались от биологических ограничений и перенесли свой интеллект в механические контейнеры, либо то, что им удалось создать настоящий искусственный интеллект, отдельный от их собственного, либо, возможно, конвергенцию биологического и машинного интеллекта (см. главу 15).

Мотивы такого перехода весьма разнообразны. Для некоторых людей избавление от слабости и уязвимости тела чрезвычайно привлекательно, особенно если такой переход обеспечивает своего рода бессмертие. Что наиболее важно для ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций, переход к постбиологическому состоянию полностью меняет ожидаемые сигналы, получаемые от внеземных цивилизаций. Возможно, еще более фундаментальным является то, что определение «обитаемости» будет совершенно иным и, скорее всего, не будет соответствовать никаким биологическим стандартам. Поэтому мы можем ожидать, что биологические и постбиологические цивилизации займут разные места в Млечном Пути (см. главу 22).

Действительно, многие сейчас утверждают, что постбиологический разум, скорее всего, превосходит по численности биологический, учитывая, что он сможет успешно нейтрализовать многие риски, которым подвержены биологические системы. Если это так, то поиск биологически обитаемых планет, вероятно, будет неправильным подходом для SETI (Shostak, 2010).

Является ли постбиологическая трансформация гарантированным конечным результатом развития интеллекта? Dick (2003) argues for the Intelligence Principle:

Сохранение, совершенствование и увековечивание знаний и интеллекта являются центральной движущей силой культурной эволюции, и по мере того, как интеллект может быть улучшен, он будет улучшен.

Другими словами, как только развивается интеллект, культура немедленно следует за ним. По мере развития культуры она будет находить постбиологические решения биологических проблем, и, следовательно, общества будут становиться все более постбиологическими с течением времени. Поэтому общество с большей L с большей вероятностью будет постбиологическим. Если мы ожидаем, что усилия по поиску внеземных цивилизаций будут наиболее успешными в отношении наиболее долгоживущих цивилизаций, то можно утверждать, что наиболее вероятно, что наши первые свидетельства о внеземных цивилизациях будут постбиологическими.

Как отмечает даже Дик, предположение о принципе интеллекта требует ряда существенных сопутствующих допущений, главным образом, что внеземные цивилизации намного старше человечества и что культурная эволюция имеет целью повышение интеллекта/знаний (Дик, 2008, 2009). Можно привести слабый аргумент в пользу того, что цивилизация увеличивает свою негэнтропию, а следовательно, и свою способность хранить информацию, но он далеко не неопровержим.

Также широко распространено предположение, что на каком-то уровне можно создать сложные системы искусственного интеллекта общего назначения, что является предметом больших споров (см. главу 15). Даже промежуточная постбиологическая стадия (когда человеческий мозг находится в теле машины) представляет собой значительные допущения в отношении устойчивости интерфейсов «плоть-кремний».

6. Разум редкое явление

6.1 Аргументы эволюционистов против интеллекта

Самое известное возражение биологов-эволюционистов против преобладания разумной жизни (и усилий SETI) исходит от Джорджа Гейлорда Симпсона. В книге *«Нераспространенность гуманоидов»* (1964) Симпсон на вероятностной основе утверждает, что появление людей на Земле было весьма случайным событием, зависящим от «длинных цепочек неповторяющихся обстоятельств»..

Как мы видели в предыдущей главе, эволюция жизни с самого начала как совокупности самовоспроизводящихся молекул приобрела многоклеточность, половое размножение и крупные многоклеточные формы с мозгом, главным образом, в результате ряда экологических катастроф, вызванных отбором. Симпсон рассуждает в том же духе, что и Стивен Джей Гулд, который использует аналогию, согласно которой нельзя «перемотать ленту назад», т. е. если история Земли воспроизводится заново, любое незначительное изменение в окружающей среде вызывает каскадную серию изменений, приводящую к принципиально другой экосистеме (см. также Beatty, 2006).

Исходя из этого, нам, безусловно, не следует ожидать появления гуманоидов на других планетах, а наличие негуманоидного разума далеко не гарантировано. Это, конечно, не является конечной целью эволюции — у эволюции нет целей.

Dobzhansky (1972) проводит тщательное различие между происхождением жизни и эволюцией разума. Первичная жизнь, возможно, появлялась много раз, на многих разных планетах, весьма отличающихся по свойствам от Земли, но это не гарантия того, что они произведут разум. В то время на Земле было классифицировано около 2 миллионов видов. Добжанский утверждал, что в этом ограниченном наборе данных интеллект составляет, по оценкам, один феномен на 2 миллиона.

В качестве иллюстративного (и чрезмерно консервативного) примера он предложил организм с 1000 генами, обладающий десятью возможными аллелями каждого гена. Геномный ландшафт состоит примерно из 10^{1000} возможных геномов! Следовательно, если бы эти организмы были размещены на миллионах планет, можно сделать вывод, что была бы исследована лишь очень малая часть этого геномного ландшафта. Если разумные организмы занимают относительно небольшую область этого ландшафта (что, по-видимому, так и есть, учитывая, что на Земле

существует только одна технологическая цивилизация), то можно заключить, что интеллект — это исключительно редкое, случайное и удивительное явление.

Майр вернулся к этим аргументам и расширил их в серии коротких статей (Mayr, 1993; 1995), дополнительно отметив, что многие цивилизации существовали на Земле без радиотехнологий или других атрибутов, видимых на межзвездных расстояниях. Эти аргументы против SETI (Self-Engineering Entity) укоренились в общественном сознании, и в этот период проекты NASA SETI были лишены финансирования Конгрессом США.

Существует несколько контраргументов к этой критике. Описание Симпсоном физиков/астрономов как эволюционных детерминистов было довольно грубым обобщением, как быстро возразил Карл Саган. Поиск разума не требует, чтобы разум был человекоподобным — вспомним классический рассказ Фреда Хойла «Черное облако», в котором рассматривается разумный организм, эволюционировавший в межзвездном пространстве, а не на поверхности планеты. Саган также отмечает, что попытки определить вероятность разума $P(I)$ на основе числа разумных видов $N(I)$ (и неразумных видов $N(-I)$):

$$P(I) = \frac{N(I)}{N(I) + N(-I)}, \quad (6.1)$$

Давайте сделаем важные предположения, которые следует подвергнуть сомнению. Либо мы можем экстраполировать данные из нашей единственной выборки эволюции, и в этом случае, исходя из принципа посредственности, мы ожидаем, что разумные существа являются относительно распространенным результатом при наличии «достаточного» времени и эволюционной свободы; либо мы не можем использовать нашу единственную выборку, и, следовательно, приведенная выше оценка $P(I)$ недействительна.

Контраргумент в эволюционной теории выдвигает Конвей Моррис (Conway Morris, 2003a) — аргумент конвергентной эволюции. Во многих различных типах можно наблюдать, как одни и те же молекулярные или анатомические инструменты разрабатываются независимо для решения экологических задач. Самым известным примером является сложный глаз,

который независимо эволюционировал несколько раз у позвоночных, головоногих моллюсков и книдарий (например, медуз). Считается, что эта конвергентная эволюция обусловлена физикой фотодетектирования, которая накладывает жесткие ограничения на необходимый механизм (Fernald, 2006; Kozmik et al., 2008).

В условиях конвергентной эволюции геномный ландшафт остается очень обширным, но виды, как правило, следуют путям, которые приводят к схожим результатам. Другими словами, множество генотипов (участков генома, которые дают макроскопический признак или характеристику) воспроизводят определенный фенотип (указанный признак/характеристику). Это сводит обширный геномный ландшафт к более жестко ограниченной дорожной карте (Conway Morris, 2003b).

Если жизнь развивается в условиях, подобных нашим, то эволюция «изобретет» аналогичные решения для функционирования организмов в этих условиях (наиболее яркое выражение этой концепции см. в описании «космической конвергентной эволюции» Флореса Мартинеса (Flores Martinez, 2014). Конвергенция может применяться даже к социальным структурам, которые, как мы увидим позже, являются, возможно, важнейшим источником селективного давления, направленного на развитие интеллекта.

Это рассуждение предполагает, что планеты, подобные Земле, порождают организмы, подобные Земле. Это не является аргументом в пользу того, что планеты, подобные Земле, порождают людей как таковых. На фундаментальном уровне нельзя избежать случайной истории нашего вида, как мы увидим.

6.2 Что есть разум?

Как и концепция «жизни», концепция «интеллекта» также разочаровывает научное сообщество. Наивное определение, которое, по общему признанию, сохранялось на протяжении веков в академических дискуссиях, превозносит человечество как единственный разумный вид на Земле. Как мы увидим в последующих разделах, это определение интеллекта было в значительной степени отвергнуто, и концепция интеллекта как бинарного феномена «да/нет» больше не пользуется доверием в научном сообществе.

Специалисты по SETI склонны обходить этот вопрос стороной, сосредотачиваясь на технологиях, а не на интеллекте. Кажется более вероятным, что разумная жизнь будет обнаружена по ее способности преобразовывать материю и энергию в инструменты и информацию, а не

по ее биологическому следу, который в большинстве случаев трудно отличить от «примитивной жизни». В любом случае, если мы хотим однозначного обнаружения разумной жизни, а не обнаружения биологических систем, лучшим критерием, по-видимому, является технология.

Рабочее определение интеллекта в рамках SETI, хотя и несколько негласное, звучит так: «сущность, которая создает технологические артефакты, потенциально видимые с межзвездных расстояний». Учитывая, что наши первые хорошо видимые артефакты (т.е. радиосигналы) были созданы в двадцатом веке, поиски SETI не смогли бы обнаружить человеческий интеллект, если бы они обратились к Земле всего несколько сотен лет назад (даже незначительно повышенный уровень CO₂ и небольшое количество загрязнения в начале промышленной революции были бы в лучшем случае неубедительными).

Это определение явно неудовлетворительно, поскольку оно описывает людей только в том виде, в каком они существовали в недавнем прошлом. *Гомосапиенс* имеет происхождение, уходящее корнями как минимум на 200 000 лет назад, и анатомически эти предки неотличимы от нас.

Рабочее определение SETI также имеет нежелательные последствия для нечеловеческого интеллекта. Мы видим множество примеров использования орудий труда и языка в животном мире (как мы обсудим позже), и ученые SETI работали с такими животными, как дельфины, пытаясь преодолеть коммуникационные барьеры между видами, чтобы, возможно, узнать, как это можно сделать, если вид из другого мира захочет с нами поговорить. Ясно, что рабочее определение SETI подходит для астрономических исследований, но не для чего-либо еще.

С учетом этих оговорок, мы должны теперь рассмотреть единственный вид, который удовлетворяет текущим критериям SETI для интеллекта – *Homo sapiens*. Мы рассмотрим путь человечества к цивилизации с этой точки зрения, чтобы увидеть, что можно извлечь из развития внеземных цивилизаций.

6.3 Как люди стали разумными?

Современные люди (*Homo sapiens sapiens*) отличаются тем, что являются последним существующим видом в своем роде, *Homo*. На заре

существования нашего вида на Земле обитало по меньшей мере шесть других видов/подвидов человека. Показательно (особенно в контексте SETI) рассмотреть, почему до наших дней дожил только один «разумный» вид.

Самые ранние неоспоримые свидетельства существования рода *Homo* датируются примерно 2 миллионами лет назад и получены из ископаемых останков *Homo erectus*, найденных в Африке и Евразии, что предполагает ранний переход от первого ко второму около 1,8–1,9 млн лет назад (Кляйн, 2009). Предки *Homo erectus* – *Homo habilis* и *Homo ergaster* – присутствовали на африканском континенте за несколько миллионов лет до этого, наряду с еще более древним родом *Australopithecus*, от которого произошел весь род *Homo* (Spoor et al., 2007). It is important to note that bipedalism is already present in

Australopithecus.

Точное определение точек ветвления видообразования по определению представляет собой сложную задачу – эволюция является непрерывным процессом, и промежуточные формы не всегда легко обнаружить в ископаемых останках. В целом можно согласиться с тем, что миграция *H. erectus* через Евразийский континент в конечном итоге привела к видообразованию в *H. antecessor* (обнаруженный в Испании), *H. heidelbergensis* и *H. rhodesiensis*. Другие виды, такие как *H. floresiensis*, обнаруженный в Индонезии, имеют довольно загадочное происхождение (см. рис. 6.1).

The exact chain of speciation remains unclear, but it seems the case that *H. heidelbergensis* (and potentially *H. antecessor*) eventually speciated into the subspecies of *Homo sapiens*: *Homo sapiens neanderthalensis*, *Homo sapiens Denisova*, and the only surviving species – *Homo sapiens sapiens*.⁹ Extremely low genetic variation in our species compared to other primates sets a lower bound on the gene pool of approximately ten thousand adults. Note that this may not be the initial population size, which can be a good deal larger and still limit the available genetic material. In any case, such a limited stock suggests that our direct ancestors experienced an evolutionary bottleneck. This is most likely due to the migration of *H. sapiens sapiens* from Africa into Eurasia some 100,000 years ago.

⁹ Note that there is disagreement in the anthropological community regarding whether Neanderthals, Denisovans, etc. are a subspecies of *Homo sapiens*, or a distinct species within the *Homo* genus. We will stick with the subspecies convention in this book.




Рисунок 6.1 Схема эволюции и миграции видов гоминидов. Известно, что *Homo erectus* распространился из Африки через Азию и в Испании разделился на подвиды *antecessor*. Происхождение *Homo floresiensis* неясно, но он встречается в отдаленных регионах Индонезии. Место видообразования *Homo heidelbergensis* также неясно, но он распространился по всей Африке, Южной Европе и Южной Азии. *Homo sapiens sapiens* покинул Африку приблизительно 60 000 лет назад, встретившись и скрещиваясь с уже существовавшими подвидами *Homo sapiens*, *Homo sapiens ssp neanderthalensis* и *Homo sapiens ssp denisova*.

Это особенно запутанная цепочка наследования, чувствительная к географическим особенностям местности, которую пытались покорить наши предки, не говоря уже о гоминидах, уже присутствовавших там, когда появился новый вид. Доказательства скрещивания между подвидами сапиенсов очевидны в нашей ДНК сегодня, что указывает на то, что взаимодействие между различными разумными видами может быть как положительным, так и отрицательным.

В данном контексте мы говорим «интеллектуальные», потому что, по сути, все представители рода *Номо* можно считать технологически более развитыми, чем их родственники — шимпанзе и другие представители рода *Pan*, последний общий предок которых существовал около 4–5 миллионов лет назад, а род горилл — около 2–3 миллионов лет назад. Покровители рода, *Homo erectus*, использовали каменные орудия и вполне могли освоить огонь (Berna et al., 2012). Огонь, безусловно, был одним из инструментов в арсенале гоминидов уже 300–400 тысяч лет назад, а очаги с нагретым камнем и осадочными породами часто встречаются на стоянках неандертальцев (James, 1989; Roebroeks and Villa, 2011).

На пути от зарождения рода Номо до наших дней можно выделить несколько важных технологических и культурных этапов (Рисунок 6.2). Темпы культурной эволюции изначально были такими же медленными, как и темпы биологической эволюции – каменные орудия, изготовленные ранними Номо егectus, неотличимы от орудий, созданных неандертальцами десятки тысяч лет спустя. Этот крайне медленный темп, вероятно, был обусловлен неспособностью гоминидов эффективно общаться между поколениями.




Рисунок 6.2 Хронологическая таблица ключевых этапов развития человечества, от последних общих предков с гориллами и шимпанзе до эпохи Возрождения, а также технологических достижений, благодаря которым человечество стало видимым на межзвездных расстояниях.

Примерно 70 000 лет назад произошли фундаментальные изменения в поведении и останках людей. Первые свидетельства существования языка относятся к этому периоду, и культурное наследие человечества действительно начинается. Следует отметить, что физические характеристики *Homo sapiens sapiens* существенно не изменились с момента их первого появления около 250 тысяч лет назад. Размер мозга или ловкость рук этих людей не сильно отличались бы от наших с вами, но тем не менее мы можем проследить важную культурную границу и, возможно, начало того, что мы сейчас считаем цивилизацией.

Прибытие людей на каждый новый континент тесно связано с вымиранием так называемой «мегафауны», что является убедительным доказательством того, что люди истребили её в результате охоты. За искусством, земледелием и одомашниванием быстро последовало кузнечное дело, и развитие цивилизации стремительно ускорилось за последние 3000 лет до наших дней. Следует отметить, что большая часть человеческой деятельности была невидима на межзвездных расстояниях. Общепринято считать, что промышленная революция является переломным моментом между фактически невидимой человеческой цивилизацией и технологическим следом, который разумные виды могли бы обнаружить, используя методы, известные людям сегодня.

Сельское хозяйство обычно считается первым признаком того, что мы сейчас называем человеческой цивилизацией. Самые ранние свидетельства перехода от образа жизни охотников-собирателей к земледельческим методам получены из ископаемых останков, найденных в Леванте и датированных примерно 9500 годом до нашей эры. Обугленные плоды инжира относятся к числу первых находок, указывающих на культивирование. Хотя эти плоды, вероятно, принадлежат партенокарпическим (бессемянным) сортам, разумно предположить, что они выращивались путем целенаправленного черенкования вместе с другими культурами (Kislev et al., 2006). Переход от собирательства к земледелию начинается с появления основных культур (в их диком виде) вскоре после 9500 года до нашей эры – полбы и однозерновки, ячменя, чечевицы, гороха, нута, горькой вики и льна. Одомашнивание растений, судя по свидетельствам выращивания зерновых культур в Сирии (Willcox et al., 2008), завершилось, по крайней мере, к 7000 году до н.э., хотя существуют некоторые дискуссии относительно того, насколько быстрым был этот переход (см. Kennett and Winterhalder, 2006, и ссылки в нем).

Причины первоначального перехода являются предметом дискуссий и, вероятно, имеют разные причины и факторы в разных

регионах. Случайный посев сельскохозяйственных культур охотниками-собираателями во время собирательства вполне мог способствовать многократному получению урожая. Взаимодействие унаследованных знаний/поведения и непреднамеренного искусственного отбора более эффективных сортов привело к одомашниванию культур. Такое поведение могло усугубиться изменением климата. Длительные засушливые периоды в этот критический период благоприятствовали однолетним культурам, которые погибали, оставляя спящие (съедобные) семена и клубни.

В то же время одомашнивание животных продолжалось быстрыми темпами. Первым успешным примером одомашнивания стала собака. Волки естественным образом следовали за охотниками, подбирая добычу и добывая раненых. Кормление волков и выращивание щенков положили начало процессу искусственного отбора, который завершился появлением несколько причудливого разнообразия пород собак, которое мы видим сегодня. Кошки поняли, что земледелие привлекает большое количество мышей, на которых они охотятся, и вскоре стали верными друзьями людей (хотя и с гораздо меньшими изменениями). Одомашненные козы, овцы, коровы и свиньи появились в Плодородном полумесяце (восточная Турция, Ирак и юго-западный Иран) около 10 000 лет назад. Овцы и козы, по-видимому, появились первыми, возможно, из-за их способности обитать на более пересеченной и менее плодородной местности. Опять же, разные регионы демонстрируют большие различия во временных рамках одомашнивания, что можно объяснить биогеографией и наличием определенного генетического материала.

Была ли смена образа жизни с собирательства на земледелие адаптивной? Есть некоторые свидетельства, указывающие на обратное. В частности, данные о снижении роста взрослых после перехода к земледелию свидетельствуют о том, что земледелие скорее уменьшило, чем увеличило количество питательных веществ в человеческих обществах. Рацион охотников-собираателей никогда не был переполнен калориями, но необходимость добывать пищу побуждала людей употреблять разнообразные продукты, что впоследствии приносило пользу в плане питания. Можно утверждать, что земледельцы, сосредоточившие свои усилия на выращивании ограниченного набора продуктов, способствовали недоеданию. Кроме того, земледельцам требовалось больше калорий на каждую полученную калорию по сравнению с охотниками-собираателями, по крайней мере, в те ранние времена. Наконец, переход к земледелию обычно совпадает с увеличением

заболеваемости болезнями растений и животных и сокращением продолжительности жизни (см. Latham, 2013, и ссылки в нем).

Этот аргумент может навести на мысль, что земледелие — это «худшая ошибка в истории человечества», как назвал бы Jared Diamond свое эссе 1987 года. Конечно, приведенное выше повествование сильно упрощено. Не все популяции уменьшились в росте после начала земледелия. Болезни были побочным продуктом земледелия, но многократное воздействие приводило к иммунитету к самым тяжелым из них. Земледелие, возможно, требовало больше усилий для достижения того же количества калорий, что и охота и собирательство, но оно также привело к важнейшему социальному нововведению — специализации ремесел или разделению труда.

Поток продовольствия, получаемого в результате земледелия, был гораздо более предсказуемым, чем в результате собирательства. Урожай может погибать в неблагоприятные годы, но в целом производство продуктов питания теперь имело определенный график, на основе которого люди могли планировать свою деятельность. Это планирование освобождало некоторых людей от большей части работы, необходимой для производства пищи, — в некоторых случаях, полностью освобождая их от таких задач. Сытый человек мог продолжать заниматься собирательством и приносить группе разнообразные дополнительные калории для большей пользы, или же заниматься чем-то совершенно другим. Мастера, создающие предметы и идеи, находятся в центре всех цивилизаций, и теперь они могли свободно развиваться благодаря предсказуемости сельскохозяйственного производства. Конечно, политические структуры, которые сформировались вокруг земледелия, как правило, были строго иерархическими, с небольшой группой элиты, делящей самые ценные урожаи. На протяжении большей части существования человечества большинство его «граждан» составляли крестьяне-земледельцы. Мы вернемся к вопросу о политических структурах в разделе 6.7.

Со временем усовершенствование сортов сельскохозяйственных культур привело к увеличению размера семян (см., например, Kluyver et al., 2017), а также появление трудосберегающих устройств и технологий, позволяющих получать все больше калорий на затраченную калорию. Благодаря этому стало возможным содержать все большее количество людей, что позволило формировать плотные общины в плодородных регионах. В эпоху охотников-собирателей численность населения мира достигла примерно пяти миллионов человек. С появлением земледелия это

население резко возросло, и плотность населения значительно увеличилась. Группы охотников-собирателей, которым требовались большие владения для добычи достаточного количества пищи, вероятно, были вынуждены покинуть эти земли из-за огромного количества земледельцев, которые занимали все меньшие владения. Иммуитет к болезням, передающимся скотом, также давал преимущество земледельцам — по мере роста численности скота и расширения сельскохозяйственных угодий за счет территорий для собирательства, охотники, скорее всего, умирали от инфекций, от которых у них не было защиты.

Современные цивилизации теперь полагаются на исключительное разнообразие труда, что возможно только в том случае, если от людей не требуется производить собственную пищу. Подавляющее большинство граждан развитых стран полностью оторваны от производства продуктов питания и, как следствие, свободны производить другие товары, услуги и продукты для экономики. Можно ли утверждать, что ремесленная специализация необходима другим разумным видам? С термодинамической точки зрения, поддержание высокоупорядоченных структур и вычисления, связанные с мышлением и действием, требуют свободной энергии из окружающей среды. Сельское хозяйство позволило людям передать проблему поиска свободной энергии другим субъектам. Вероятно, можно с некоторой уверенностью сказать, что инопланетные цивилизации также осуществляли аналогичную форму аутсорсинга, природа которого может напоминать сельское хозяйство, а может и нет. Безусловно, человечеству было бы трудно достичь тех технологических успехов, которых оно достигло, без «свободы от необходимости выживания», которую большинство из нас принимает как должное.

6.3.1 Зачем вообще быть разумным?

Отнюдь не гарантируется, что больший размер мозга (или коры головного мозга) является преимуществом для организма. Приспособленность — это весьма относительное понятие, зависящее от обстоятельств, в которых оказывается организм. В статье с очаровательным названием «Эволюционные преимущества глупости» Робин (Robin, The Evolutionary Advantages of Being Stupid, 1973) рассказывает о том, как максимальное время погружения китообразных, ключевой показатель их способности ловить рыбу в глубокой воде, обратно пропорционально размеру мозга. Афаины, обладающие высоким коэффициентом мозговой активности, могут нырять всего около 5 минут.

Тюлень же, напротив, может нырять около 20 минут, поскольку соотношение массы его мозга к массе тела примерно в десять раз меньше.

Антропологи могут выявить множество аспектов возрастающего интеллекта гоминидов, которые были, по меньшей мере, дезадаптивными, если не откровенно опасными. Растущий мозг гоминидов потреблял всё больше энергии. Мозг современного человека составляет приблизительно 5% массы тела, но потребляет около 20% всей производимой энергии. В мире, где пища оставалась относительно дефицитной на протяжении тысячелетий, кажется довольно странным, что мозг гоминидов продолжал потреблять всё больше и больше энергии. Регулярное использование огня около 400 тысяч лет назад и изобретение кулинарии позволили ранним людям перерабатывать потребляемую пищу и накапливать энергию с меньшими усилиями, но это не полностью компенсировало ненасытные потребности мозга.

Непрерывный рост мозга потребовал аналогичного роста человеческого черепа. Без соответствующего роста родового канала риск материнской смертности при родах возрастал. Сопутствующая необходимость значительной подготовки младенцев в первые годы их существования также создавала всё большую нагрузку на родителей.

Все эти факторы могут указывать на то, что растущий интеллект гоминидов (по крайней мере, частично) шел вразрез с законом естественного отбора (Решение R.18). Пессимистический взгляд может предполагать, что из примерно полудюжины разумных гоминидов, существовавших на Земле, выжил только один, и, следовательно, интеллект приводит лишь к ограниченному улучшению приспособленности вида. Конечно, другие гоминиды больше не существуют, главным образом, из-за доминирования *Homo sapiens sapiens* над своими сородичами, но это говорит о том, что интеллект не является необходимой целью или конечной точкой эволюции. Согласно естественному отбору, следует ожидать, что неадаптивные признаки в конечном итоге исчезнут из популяции, если только они не коррелируют с адаптивными признаками (т.е. соответствующие аллели находятся в неравновесии сцепления) или (например) являются следствием низкой численности популяции и дрейфа генов. Следовательно, мы должны сделать вывод либо о том, что:

1. Особый тип интеллекта *Homo sapiens sapiens* был в высшей степени адаптивным, или

2. Интеллект — это побочный продукт эволюции — признак, являющийся результатом эволюции другой характеристики.

Успех людей в господстве над Землей и ее биосферой предполагает, что в конечном итоге должен был иметь место первый вариант. Однако вполне могли быть длительные периоды, когда интеллект или отдельные аспекты интеллекта были побочными продуктами эволюции (см. Pinker, 1999, например).

6.4 Какова роль языка общения?

Каким бы ни было наше определение интеллекта или цивилизации, общение между людьми, по-видимому, имеет фундаментальное значение для их развития. Закодированное сообщение от ЕТІ, предположительно, будет содержать некоторую форму синтаксиса или грамматики, и поэтому нам следует тщательно продумать язык, как с точки зрения его роли посредника между особями внутри вида, так и с точки зрения его возможной роли посредника между видами.

Обратите внимание, что мы используем конкретное определение языка как чисто человеческий рациональный метод передачи идей, эмоций и желаний с помощью произвольно созданных символов. (Sapir, 1921)

6.4.1 Происхождение человеческого языка

Удовлетворительная теория, описывающая происхождение человеческого языка, должна ответить на два ключевых вопроса: Как и почему люди, а не другие биологические виды, развили язык?

1. Как и почему язык развивался именно в своем нынешнем виде, а не в другом?

Читатель сразу заметит, что слово "язык" в том виде, в каком оно использовано выше, косвенно относится к человеческому общению, а не к другим формам общения, которые мы наблюдаем у нечеловеческих видов. Поэтому, прежде чем обратиться к этим ключевым вопросам, мы должны прояснить свойства человеческого языка, которые делают его уникальным в биосфере.

Трудно достичь универсального согласия по ряду свойств человеческого языка. Согласно Бушару (Bouchard, 2013), есть два отличительных свойства, по которым лингвисты могут прийти к единому мнению.

Во-первых, человеческий язык использует знаки Соссюра (Saussurean signs). 'Знак' может принимать форму слова, изображения, звука, запаха, жеста, действия, аромата или предмета. Эти вещи становятся "знаками", когда они наделяются значением. Другими словами, знак обозначает нечто отличное от него самого.

Определение и свойства этих знаков относятся к области семиотики. Соссюровская модель знака является одной из нескольких возможных моделей построения знака. В этой парадигме знак состоит из означающего (одной из приведенных выше форм, которые принимает знак) и означаемого (понятия, к которому относится знак). Существует философское различие между означающим как материальной сущностью (например, звуковой сигнализацией, воспринимаемой человеческим ухом как "дверь") и психологическим впечатлением (передача сигнала мозгом слушателю). В литературе принято рассматривать означающее как материальное и психологическое одновременно, хотя Соссюр подчеркивал, что психологическое впечатление является единственной сущностью означающего.

Второе общепризнанное свойство человеческого языка заключается в том, что он рекурсивен. Определение рекурсивности в данном контексте относится к лингвистике и не совсем соответствует понятиям рекурсии в математике. Это лучше всего описать на примере. Следующие предложения показывают, как может быть построено по-настоящему рекурсивное предложение:

- Кошка маякнула
- Кошка [за которой гналась собака] маякнула
- Кошка [за которой гналась собака [которую сбил мужчина]] маякнула.

В приведенном выше примере мы используем скобки, чтобы показать, как структура рекурсивно встраивается. В принципе, это встраивание может продолжаться до бесконечности — на практике же рабочая память не позволяет нам четко анализировать предложения, значительно превышающие эту длину, и многопредложения становятся нормой.

Эти два основных свойства — символическая система, устанавливающая некоторую основную семантику, и средство генерации бесконечных комбинаций символов — достаточны для выражения функционально бесконечного числа понятий, сценариев, эмоций или всего, что требуется человеку. Теперь нам следует задать три вопроса, а не два:

1. Как и почему язык развился у людей, а не у других видов?
2. Как и почему язык развился в виде знаков Соссюра?
3. Как и почему язык развился в виде рекурсии?

В теории происхождения языка существуют два основных направления. В одном лагере язык является продуктом культурной эволюции, а в другом – имеет биологическое, возможно, генетическое происхождение.

6.4.2 Возможные культурные истоки языка

Современным людям, как высококвалифицированным и эффективным коммуникаторам, совершенно очевидно, что язык является инструментом чрезвычайно высокой эволюционной полезности. Эффективная коммуникация позволяет людям выполнять задачи более эффективно. Ранние люди с улучшенными коммуникативными навыками добивались большего успеха в охоте и собирательстве. Обмен решениями сложных проблем дает ощутимый импульс развитию любой социальной группы.

Индивиды внутри социальной группы также испытывают улучшение своего положения. Ориентирование в социальной среде в собственных интересах (то, что Бушар (Bouchard, 2013) называет «макиавеллистским интеллектом в социальной жизни») явно приносит пользу генетическому наследию.

Данбар (Dunbar, 1998) дает более точное определение языка как формы голосового груминга. Ручной груминг распространен среди групп приматов и способствует укреплению доверия и поддержанию союзов. По мере роста групп ручной груминг становится все менее и менее осуществимым — голосовой груминг предоставляет полезную замену, хотя и менее надежную для потенциальных партнеров по размножению (Power, 1998). Взаимодействие между все более сложным голосовым грумингом, модифицированным и опосредованным стратегиями самок при выборе партнеров на основе информации, передаваемой голосовым грумингом, привело к эволюции груминга в символическую речь.

Язык вполне мог быть ключевым параметром для самок при выборе партнера (Bickerton, 1998) и, вероятно, играл роль в воспитании детей как инструмент для успокоения детей, когда физический контакт был невозможен (Falk, 2004). Неодарвиновская модель языка предполагает, что культурные репликаторы, подобно биологическим репликаторам, являются основными агентами эволюционных изменений, и что наличие этих репликаторов (мемов) обусловило их представление в символической форме на раннем этапе. Взаимодействие между репликаторами и их

символами в конечном итоге ответственно за появление развитого синтаксиса и языка на более позднем этапе.

Распространенная критика культурного происхождения языка заключается в том, что для того, чтобы язык был полезен для ранних людей, он должен сначала существовать. Большинство из описанных выше преимуществ требуют, чтобы какая-либо форма языка уже существовала. Если это условие выполняется, то это правдоподобные объяснения того, почему протоязык продолжал усложняться из простых исходных условий, чтобы удовлетворить растущие потребности все больших и больших социальных групп людей. Кроме того, аргументы, предполагающие, что язык является продуктом полового отбора, должны учитывать тот факт, что очень молодые, допубертатные люди являются высокоэффективными коммуникаторами задолго до наступления репродуктивного периода полового созревания.

Следует также признать большой коммуникативный потенциал выражений, не содержащих языка. Говорят (см. Мехрабиан, 2017), что когда речь идет о выражении чувств и отношения, примерно 7% передаваемого смысла выражается с помощью языка, а остальное передается паралингвистическими особенностями, такими как тон, и другими средствами, такими как жесты, мимика или другие телесные функции, такие как плач или смех.

Наконец, большинство из вышеприведенных решений не делают никаких предсказаний относительно природы человеческого языка, а лишь предполагают, что он достаточно сложен, чтобы представлять наш разум, разум наших собеседников и окружающий нас мир..

С точки зрения SETI (Secondary Entity Outit — внеземное цивилизация), это может не быть особым недостатком — возможно, инопланетные языки не основаны на знаках Соссюра и рекурсии. Язык в Млечном Пути может быть результатом распределения различных свойств. Если нам когда-нибудь удастся собрать образец инопланетных языков для сравнения, мы даже сможем использовать антропный принцип, чтобы доказать, что мы наблюдаем человеческий язык именно таким, потому что мы присутствуем и наблюдаем его.

6.4.3 Возможные биологические истоки языка

В этой категории считается, что раннее использование знаков в некотором смысле способствовало естественному отбору наших предков. Эти теории часто объединяют под общим названием Универсальной грамматики (УГ) — концепции, согласно которой язык является

врожденной функцией человека и отличается от всех других аспектов человеческого познания. В этой модели язык — это еще один сложный орган, подобно сложному глазу, но без очевидного физического представления. И зрительный орган, и языковой орган эволюционировали через ряд промежуточных стадий, причем каждая стадия давала преимущество своему носителю и передавалась посредством генетического наследования.

В зависимости от лингвиста/нейролингвиста, существуют некоторые споры относительно фактической природы языкового органа. В наиболее сильной форме УГ языковой орган «реален» в том смысле, что это определенная область мозга, которая управляет «языковым программным обеспечением». Обычно это область Брока, и это основано на исследованиях пациентов с повреждением мозга, локализованным в этой области. Другие теории УГ предполагают, что языковой орган на самом деле представляет собой распределение областей мозга. В своей самой слабой форме язык не локализован в головном мозге, и этот орган фактически является «виртуальным».

Независимо от формы органа — реального, виртуального или гибридного, сочетающего аппаратное и программное обеспечение — биологическое происхождение языка подразумевает, что символическая коммуникация оказала избирательное воздействие на наших предков. В форме, в точности аналогичной сложному глазу, люди начали с примитивных коммуникативных инструментов (иногда называемых «протоязыком»), а затем постепенно, дискретными, мельчайшими шагами, развивали их. В общих чертах можно выделить несколько ключевых элементов языкового органа, которые в приблизительном хронологическом порядке начинаются с дискретных символических сигналов, необходимых для всех человеческих языков. По мере роста лексикона символов, с последующим нововведением, заключающимся в возможности объединения самих символов для создания новых, более совершенных символов, протоязык развивает символы, описывающие отношения («на», «перед», «лучше, чем»). Начало грамматики включает разделение символов на семантические категории (существительное, глагол), а затем более глубокий синтаксический комплекс.

Каждое из этих нововведений является результатом постепенных изменений как в программном, так и в аппаратном обеспечении. Подобно тому, как более эффективный орган зрения приносит организму очевидные преимущества, более эффективный орган языка позволил

нашим предкам все успешнее ориентироваться как в физическом, так и в социальном ландшафте. По мере усложнения человеческих социальных структур язык становится важнейшим органом для принятия и выживания, так же как эффективные органы передвижения и острота чувств имеют решающее значение для быстрого спасения от хищников.

Последовательность эволюции языка до сих пор является предметом дискуссий – Пинкер и Джекендофф (Pinker and Jackendoff, 2005) придерживаются градуалистской точки зрения на усвоение языка, начиная с протоязыка, состоящего из символических знаков, и постепенно добавляя к нему функциональность. Бикертон наиболее известен своей двухэтапной теорией, согласно которой протоязык, состоящий из существительных и глаголов, расположенных бесструктурно, сохраняется в течение длительной эпохи, пока мозг проходит ряд предадаптаций. Как только мозг подготовлен к его восприятию, в язык внезапно вводится синтаксис. Главный аргумент Бикертон в пользу двухэтапной теории заключается в том, что селективное давление на символы отличается от селективного давления на синтаксис.

В этой теории явно важную роль играет селективное давление, о чем свидетельствует пример бонобо, демонстрирующих чрезвычайно сложные социальные структуры без необходимости использования символов. Гоминиды явно были более склонны к развитию знаков, главным образом из-за нестабильности источников пищи. Охотники-собиратели, работавшие в быстро растущих и распадающихся группах, чтобы добывать пищу, которая:

- была распространена на большой географической территории,
- из широкого спектра источников, каждый из которых мог оказаться неэффективным, оказывали повышенное селективное давление на гоминидов, заставляя их быстро обмениваться информацией о местных источниках пищи (не говоря уже о возможной опасности).

Недостатки ниши также могли способствовать развитию других черт, таких как предупреждающее познание (т.е. планирование будущего).

Селективные силы, которые привели к созданию синтаксиса, менее ясны. В конце концов, гоминид, передающий сложные синтаксические утверждения, может общаться только с другими синтаксически более выгодными гоминидами, которых на начальных этапах его эволюции, вероятно, будет немного. Хомский (Chomsky, 2005, 2007) утверждал, что

синтаксис является средством организации мысли, которое принесет преимущества независимо от того, будет ли оно непонятно кому-либо еще.

6.4.4 Что мы можем сказать о языке инопланетян?

Появление языка у гоминидов, по-видимому, было обусловлено либо естественным отбором, либо культурным отбором, либо эффектом самоподдерживающегося развития обоих факторов, причём культурный отбор приобретал всё большее значение по мере развития самого языка. Можно даже утверждать, что сам язык оказал обратное воздействие на человеческий интеллект. Способность выражать сложные понятия позволяет их уточнять, особенно в общении с собеседником. Языковой диалог уточнял теорию сознания наших предков, то есть их представление о мыслительных процессах собеседника.

Если язык у гоминидов возник в результате ряда факторов отбора, то кажется разумным исходить из этого предположения и для коммуникативных сетей всех внеземных цивилизаций. Структура любого инопланетного языка будет в значительной степени зависеть от среды, в которой он был создан. Человеческий язык в значительной степени зависит от социальных структур, которые предпочитают создавать люди, а также от взаимоотношений между людьми и окружающей средой.

Структура человеческих языков допускает функционально бесконечное количество выразимых утверждений с относительно ограниченным словарным запасом. По всей видимости, любой инопланетный язык будет обладать этим свойством. Можно даже предположить, что инопланетные языки будут состоять из конечного числа знаков/символов и связей между этими символами. Без примера подлинного инопланетного языка для изучения мы не можем быть уверены. В лучшем случае мы можем экстраполировать наши знания о коммуникации нечеловеческих существ..

6.4.4 Нечеловеческое общение

На базовом уровне коммуникация является важным компонентом спаривания для многих видов. Брачные ритуалы сообщают о готовности самца к спариванию с самкой, и качество ритуала (среди прочих факторов) определяет шансы самки на спаривание с этим самцом.

Такой ритуал нельзя назвать языком. Мы можем объяснить ритуал от начала до конца как серию стимулов и реакций на стимулы. Действия одного человека изменяют поведение другого.

Истинная коммуникация должна не только изменять поведение собеседника, но и его понимание. Когда два человека общаются, один человек активизирует представление в сознании другого. Например, описывая объект, слушатель формирует внутреннее представление об объекте, руководствуясь описанием говорящего.

Если мы теперь обсудим, например, крики верветок, увидим ли мы, как животные создают образы в сознании друг друга? Вербетки обладают тремя акустически различными сигналами тревоги, каждый из которых предназначен для определённого хищника. Если верветка слышит сигнал тревоги, соответствующий «леопарду», она убегает на деревья. Если сигнал тревоги соответствует «орлу», она прячется в кустах.

Является ли это примером простой реакции на стимулы (услышали определённый шум, убежали на деревья) или подлинного представления (услышали определённый шум, поняли, что приближается леопард, и действовали соответственно)? Эксперименты, кажется, больше указывают на первое, чем на второе (Shettleworth, 2010, Chapter 12).

Афалины (род *Tursiops*) используют серию импульсных звуковых сигналов, щелчков и свистков для общения друг с другом. Каждый дельфин обладает своим фирменным свистком, позволяющим идентифицировать себя. Эти свистки оттачиваются со временем в процессе обучения и настраиваются на свистки родительской группы (Frigg et al., 2005). Дельфины могут запоминать фирменные свистки своих сородичей на протяжении десятилетий. Хотя определённого дельфиньего языка не существует, примерно 100 звуков используются в зависимости от контекста, например, во время охоты или спаривания. Частота фирменных свистков коррелирует с самим спариванием или стрессом, в зависимости от окружающей среды. Копирование фирменного свистка другого дельфина коррелирует с укреплением социальных связей. (King et al., 2013).

Дикие шимпанзе, по-видимому, не обладают столь четкими навыками слуховой коммуникации, но демонстрируют богатый набор жестов, включающий, по меньшей мере, 66 различных жестов (Hobaiter and Byrne, 2011). Интересно, что около 24 из этих жестов также распространены у горилл и орангутанов. Они используются целенаправленно, что предполагает возможность более развитой коммуникации (которая предпринималась несколько раз; см. следующий раздел).

Другие способы коммуникации (феромонная сигнализация у муравьев и термитов, изменение цвета у каракатиц, влияющие танцы у пчел) не

представляют собой ничего большего, чем стимул и реакция, но, предположительно, это допустимые способы для более развитой коммуникации (при наличии соответствующего времени и селективного давления).

Короче говоря, мы можем ожидать, что коммуникация внеземных цивилизаций будет основана на символической системе коммуникации, очень похожей на нашу. Однако наши символы происходят из устной традиции, и природа нашей устной традиции сформировала нашу символику. Внеземной вид, имеющий более китообразные корни, может кодировать свои вспышки, свистки и щелчки совершенно иной системой, отличной от нашей письменности. В самом деле, наше первое сообщение от разумного вида может представлять собой электромагнитное кодирование запахов феромонов!

Попытки коммуникаций с нечеловеческим разумом

Общение приматов. Начиная с 1960-х годов, различные исследователи пытались обучить шимпанзе американскому жестовому языку (ASL). Этот акцент на жестовом языке был обусловлен более ранними попытками обучить шимпанзе человеческой вокализации, а также растущим пониманием того, что голосовой аппарат шимпанзе не приспособлен для генерации звуков, подобных человеческим. В 1965 году самка шимпанзе по кличке Уошо была выбрана для первых попыток обучения ASL. Уошо была пойманной шимпанзе, первоначально предназначенной для использования ВВС США в рамках космической программы.

Гарднер и Гарднер (Gardner and Gardner, 1969) взяли Уошо под свою опеку, пытаясь воспитать её в среде, максимально приближенной к среде младенца, насколько это возможно в случае с полудиким животным. Различные люди (свободно владеющие американским жестовым языком) участвовали в разных играх и развлечениях, чтобы побудить Уошо отвечать жестами. Любая голосовая коммуникация, которую Уошо не могла имитировать, была запрещена в её присутствии. С помощью своего рода жестового «лепет» и направленного «формирования» рук Уошо для формирования правильных жестов, она в конце концов начала последовательно использовать жесты, которые со временем превратились в отличительные знаки американского жестового языка, включающие существительные, такие как «шляпа» и «зубная щетка», а также более абстрактные знаки, такие как «извините», «чистый» и «внутри/снаружи».

За первые 22 месяца Уошо последовательно и спонтанно использовала 30 жестов без явных подсказок.

Последующие эксперименты с участием нескольких шимпанзе показали, что Уошо ни в коем случае не была исключительной в своей способности использовать американский жестовый язык (Fouts, 1973). В литературе до сих пор ведутся жаркие споры о том, действительно ли Уошо и её сородичи использовали американский жестовый язык как таковой, или же шимпанзе изучали набор стимулов для генерации реакции.

Эксперимент «Nim Chimsky», разработанный на основе философии, согласно которой шимпанзе, воспитанные как люди, будут вести себя как люди (учитывая их значительное общее генетическое происхождение), предъявлял более высокие требования к усвоению языка. Хотя Nim смог показать 125 жестов американского жестового языка, команда, стоявшая за проектом, больше интересовалась последовательностями жестов, которые он генерировал. Если бы Nim мог составлять предложения и демонстрировать понимание грамматики, это стало бы более веским доказательством того, что американский жестовый язык шимпанзе действительно является языком, а не просто «хитрым трюком» для получения награды. Их анализ показал, что количество жестов, которые Nim использует в каждом предложении, не увеличивается с ростом словарного запаса, что является распространенной чертой у младенцев, и отсутствует заметная лексическая структура, указывающая на грамматику (Terrace et al., 1979). Критики также предполагают, что Nim полагался на тонкие невербальные сигналы от восторженных экспериментаторов, чтобы создать правильный стимул для получения лакомства (так называемая «предвзятость умного Ганса»).

Коко, горилла, пожалуй, самая известная из приматов, использующих жестовый язык (Patterson, 1978). В конечном итоге Коко выучила более 1000 жестов и, что наиболее интересно, продемонстрировала способность общаться, используя отсутствующие объекты. Сообщается о способности Коко использовать жесты, обозначающие жестовый язык (метаязык), и изобретение новых знаков путем сочетания (кольцо = браслет на палец ¹⁰) являются более обнадеживающими признаками подлинных языковых способностей.

¹⁰ <http://www.koko.org/progress-plans>

В академическом сообществе существуют разногласия по вопросу о том, могут ли приматы действительно овладеть языком и использовать его для общения. Обе стороны указывают на проблемы в методологиях друг друга (см., например, Patterson, 1981), и очевидно, что люди хотят иметь возможность общаться с приматами. Будучи нашими ближайшими родственниками, общение с ними могло бы дать захватывающие и важные сведения о нас самих.

Общение дельфинов Дельфины демонстрируют высокие показатели по многим параметрам интеллекта, начиная от физических особенностей и заканчивая наблюдаемым поведением. Конечно, общение между человеком и дельфином затруднено из-за их совершенно разных физиологических особенностей и среды обитания.

В конце 1950-х годов Джон Лилли заметил, что дельфины, находящиеся в длительном контакте с людьми, стали всё чаще издавать звуки над водой. Затем дельфины, содержащиеся в неволе, начали имитировать человеческие вокализации, хотя и очень громко и с относительно высокой скоростью. Лилли (John Lilly, 1962) описывает пример, когда дельфин по кличке Эльвар намеренно брызгал водой на своего коллегу. На громкую команду «прекрати», Эльвар ответил высоким двухфразовым тоном, который, будучи замедленным, как будто означал «ОК». В ходе последующих обсуждений Эльвару посоветовали замедлить и снизить частоту своих звуков.

Вдохновленный этими экспериментами, он опубликовал очень успешную научно-популярную книгу «Человек и дельфин» (1961) и присутствовал на знаменитой встрече в Грин-Бэнк в 1961 году, на которой зародилось уравнение Дрейка. Участники встречи были известны как Орден Дельфина, в знак уважения к работе Лилли, которая в то время была самым близким к языковому общению человека с другим (достаточно разумным) видом.

Лили организовал частичное затопление дома на острове Сент-Томас, чтобы учитель, его научный сотрудник Маргарет Ловатт, и три ученика-дельфина, Питер, Памела и Сисси, могли жить и играть вместе. Лилли и Ловатт придерживались разных подходов к обучению, но оба видели динамику отношений между Ловатт и учениками как отношения матери и ребенка.

Питер, будучи молодым, полным сил мужчиной, недавно достигшим половой зрелости, не разделял эту точку зрения. Пытаясь

обойти эти отвлекающие факторы в процессе обучения, Ловатт часто «удовлетворял эти желания вручную».¹¹

Однако эксперименты Лилли с ЛСД и хаотичная атмосфера «Дельфинария» в конечном итоге сорвали эксперимент. Наследие Лилли в этой области продолжает жить благодаря его ученикам и сотрудникам, а способность дельфинов имитировать человеческую речь тщательно задокументирована. (Clarke, 2014).

Но подразумевает ли вокализация дельфинов лингвистические способности? И можем ли мы говорить на языке дельфинов, как надеялся Карл Саган?

Герман и др. (Herman et al., 1984) описывают, как двух дельфинов, Феникса и Акеакамай, обучали искусственно созданным акустическим и визуальным языкам соответственно. После обучения оба дельфина продемонстрировали понимание предложений как в их семантической, так и в синтаксической структуре. Дикие дельфины, хотя и не продемонстрировали использования или понимания синтаксиса, используют длинные последовательности свистков и щелчков. Недавно Рябов (Ryabov, 2016) заявил, что наблюдал двух общающихся дельфинов, издающих серию таких щелчков, не прерывая друг друга, и предположил, что это разговор без перекрытия, необходимое условие для рудиментарного языка. Однако методология и выводы этой работы подвергаются широкой критике со стороны экспертов в этой области. Читателю рекомендуется обратиться к Херзингу и Джонсону (Herzing and Johnson, 2015, глава 5) для получения более подробной информации.

Эти события вселяют небольшую надежду на то, что люди смогут общаться с дельфинами так, как они понимают, даже если сами дельфины не обладают внутривидовой коммуникацией, которую мы бы определили как язык. Учитывая, что люди и дельфины сотрудничают уже много сотен лет в рыболовстве, где дельфины загоняют рыбу в ожидающие сети, чтобы получить свою долю прибыли (Zappes et al., 2011), дельфины остаются одним из наиболее перспективных вариантов для языковой коммуникации (хотя и несколько односторонней) с другим видом.

¹¹ www.theguardian.com/environment/2014/jun/08/the-dolphin-who-loved-me

6.5 Какова роль искусства?

Раскопки

Около 17 000 лет назад пещеры Ласко в департаменте Дордонь на юго-западе Франции стали холстом для одних из самых поразительных доисторических произведений искусства, когда-либо обнаруженных. Их открытие в 1945 году потрясло и поразило современных людей, привлекая такое количество посетителей, что пещеры были окончательно закрыты в 1963 году из-за вредных загрязнений, занесенных посетителями.

С момента открытия Ласко было обнаружено около 350 европейских пещерных памятников ледникового периода, причем самые ранние (Шове) датируются примерно 30 000 лет назад. Общие темы, представленные на каждом из этих мест, включают отпечатки рук (взрослых и молодых) и изображения животных (либо нарисованные линиями, либо выделенные серией точек). Возраст этих памятников искусства гарантирует нам анатомическое сходство с художниками. Благодаря тщательному изучению различных мест мы также можем выявить особенности отдельных художников и даже проследить эволюцию используемых форм.

Наглядным примером этого является феномен «субъективного контурирования», когда мы видим замкнутую границу на рисунке, несмотря на то, что используемые линии никак не связаны между собой (простой пример показан на Рисунке 6.3). В экспозиции в Ла-Пасьеге (La Pasiega) представлено изображение бизона с головой и шеей, выгравированными с использованием этой техники субъективного контурирования.




Рисунок 6.3 Субъективное контурирование. Несмотря на то, что ни одна из линий не соприкасается друг с другом, человеческий мозг определяет неявную границу внутри этих линий.

Это подчеркивает решающее взаимодействие между рукой, глазом и мозгом в создании произведений искусства. Нейробиология зрительного восприятия поощряет использование определенных форм и препятствует использованию других.

Наскальная живопись

Наиболее поразительный пример доисторического культурного наследия, дошедшего до нас, и ее возраст указывает на то, что художником был *Homo sapiens sapiens*, но она далеко не является самой древней формой искусства из известных. Так называемое «переносное искусство» (гравированные орудия и украшения) сохранилось хуже, чем в запечатанной пещере, но отдельные экземпляры все же сохранились; например, недавнее открытие (Joordens et al., 2014) раковин с геометрической гравировкой, датировка $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ которых указывает на возраст около полумиллиона лет. Это позволяет предположить, что *Homo erectus* приписывает себе авторство этой работы, хотя на момент написания это единственное свидетельство того, что *erectus* обладал когнитивными способностями и нейромоторными навыками для выполнения такой тонкой резьбы.

Древняя резьба и живопись постепенно приобретают простой синтаксис, основанный на двух понятиях: симметрии и повторения. Двусторонняя симметрия встречается во многих примерах примитивного искусства. Эта симметрия, вероятно, унаследована от симметрии кремневых ручных топоров, которые гоминиды изготавливали (методом обработки камня) по меньшей мере за миллион лет до этого. Кроме того, двусторонняя симметрия встречается в строении тел огромного числа биологических организмов, включая гоминидов. Желание воспроизвести собственную симметрию в искусстве представляется вполне понятным. Тщательное симметричное включение окаменелостей двусторчатых моллюсков в ручные топоры, найденные в Англии и датируемые примерно 250 000 лет назад, демонстрирует тщательную работу гоминидов, обрабатывавших камень (McNamara, 2010).

Интересно отметить, что концепцию пространственной симметрии довольно легко запрограммировать в компьютер, несмотря на очевидный факт, что искусственный интеллект в настоящее время не способен «оценивать» искусство. Перцептивные «ярлыки», предлагаемые симметричными формами, имеют явные преимущества для приматов, обрабатывающих визуальную информацию из окружающей среды, чтобы избежать опасности. Возможно, поэтому современный человек

продолжает ценить простоту симметричных форм как в искусстве, так и в науке.

Повторение (и вариации формы) являются ключевым, возможно, ритуальным аспектом раннего искусства. Подобно симметрии, повторение обеспечивает интеллектуальный ускоренный путь к визуальному восприятию. Визуальная информация, полученная мозгом ранее, может быть обработана быстрее, чем совершенно новая информация. Вероятно, стремление к симметрии проистекает из этой процедуры, позволяя мозгу понять половину изображения, а затем быстро построить другую половину из ранее обработанных данных. Эта обработка лежит в основе многих устойчивых оптических иллюзий. (Sugihara, 2016).

Откуда взялось человеческое искусство? Почему люди занимаются искусством? У людей, под воздействием искусства, наблюдается явная физиологическая реакция, проявляющаяся в заметных изменениях артериального давления, частоты сердечных сокращений, потоотделения и даже мозговой активности (Zeki, 1999). Эстетически приятный эффект закатов, по-видимому, характерен для большинства людей, и есть некоторые свидетельства того, что даже шимпанзе разделяют этот эстетизм (как сообщает Адрианн Кортландт; см. стр. 101 Martinelli, 2010). После восстановления зрения слепые люди обычно описывают внезапное восприятие цвета как инстинктивное переживание. Сакс (Sacks, 1993) приводит одно такое описание, в котором цитируются слова: «Я почувствовал силу этих ощущений, как удар по голове».

Игровое поведение

В последнее время наблюдается всплеск попыток описать появление искусства у гоминидов как эволюционное следствие, возможно, вытекающее из игрового поведения, наблюдаемого у животных (которое само по себе, очевидно, является адаптивным)..

Аргумент в пользу адаптивности искусства (то есть наличия у него определенной эволюционной функции) наиболее убедительно приводит Бойд (Boyd and Richerson, 1988; Boyd, 2010). Связывая игру животных напрямую с искусством человека, они проводят параллель: подобно игре, искусство — это поведенческая практика. У молодых животных игра служит тренировочной площадкой для физических техник и поведенческих структур, которые при правильной практике приносят очевидную пользу взрослой особи. Бойд утверждает, что искусство само по себе является тренировочной площадкой для многих видов поведения,

полезных в человеческом обществе, например, для способности детально и относительно деликатно передавать концепции или для способности соответствовать ожиданиям (в примере с наскальной живописью — способность рисовать часто повторяющиеся формы, такие как бизон или зубр). Этот аргумент, как и многие аргументы в эволюционной психологии, основывается на трех свойствах:

1. «Хороший дизайн» или «Точная совместимость» — свойства адаптации хорошо соответствуют ее предполагаемой функции;

2. «Универсальность» — адаптация приживается у всех представителей вида;

3. «Надежность развития» — адаптация развивается с высокой точностью в организме, как в юном, так и в зрелом возрасте.

Этот аргумент не гарантирует, что искусство каким-либо образом адаптивно, и, возможно, является лишь вспомогательным элементом. Верпоотен (2015) приводит пример японских макаков, которые манипулируют камнями, демонстрируя довольно специфическое поведение, связанное с манипулированием и «стуком», без видимых преимуществ для их социального статуса или репродуктивных перспектив. Кроме того, определение эволюционной функции не гарантирует адаптивность признака. Полезные признаки могут возникать без предварительного отбора — этот процесс известен как экзаптация. Примером экзаптативного признака является способность водить автомобиль — доказуемо, что люди не были естественным образом отобраны для вождения, но умение водить имеет явные преимущества для людей в современном обществе.

Универсальность искусства кажется убедительным аргументом в пользу естественного отбора, но он подразумевает наличие «художественного импульса» с генетическими предрасположенностями, которые мы могли бы выделить. Это не согласуется с имеющимися данными и исключает любой вклад культурной эволюции, которая, безусловно, важна.

Музыка

В случае с музыкой ситуация может быть иной. Пение — это хорошо зарекомендовавшая себя черта животного мира, а песни животных обладают высокой коммуникативной ценностью. Граница между языком и музыкой сильно размыта — гоминиды эволюционировали в звуковом ландшафте, состоящем из естественных ритмичных шумов и песен животных. По мере развития коммуникации между людьми способность воспроизводить эти звуки (то, что Brown, 2000, называет «музыкальным

языком»)), вероятно, приносила пользу (подобно тому, как это было бы в случае с точным изображением животных на стенах пещер). Как и искусство, музыка является социальным клеем, который преодолевает биологические, интеллектуальные и культурные различия и, возможно, даже участвовал в половом отборе (см., например, обзор Cross and Morley, 2009).

Наконец, надежность развития художественных способностей, возможно, вызывает сомнения. Верно, что ролевые игры универсальны для людей (и многих других видов), но в какой степени родители поощряют творческий импульс у своих детей? Искусство — это природа или воспитание?

6.6 Какова роль науки и математики?

Истоки искусства гоминидов неразрывно связаны с истоками языка гоминидов. В своих первобытных формах оба явления в значительной степени сосредоточены на символах, и вполне возможно, что язык, искусство и музыка имеют общее происхождение в череде адаптаций, которые претерпел мозг гоминидов несколько миллионов лет назад. Обратная связь между созданием абстракций физического мира — посредством рисунков, песен и слов — и последующим соотносением этих абстракций с миром, вероятно, привела к своего рода самоподдерживающему эффекту, когда одна деятельность совершенствует другую, создавая все более сложные ментальные представления в мозге наших предков.

Наше понимание искусства, музыки, языка и связей между ними предполагает, что человеческий интеллект обязан своим существованием слиянию этих видов деятельности. Мы даже можем сказать, что это универсальная тенденция для технологических цивилизаций в целом, но мы не можем быть уверены. По мере того, как мы продолжаем изучать эволюцию искусства, музыки и языка у ранних гоминидов, наши предположения будут становиться более обоснованными..

Традиционно специалисты по SETI по образованию являются физиками. Хотя предвзятость неизбежна в группе людей, мыслящих в относительно узких дисциплинарных рамках (Райт и Оман-Риган, 2017), все же кажется вполне разумным полагать, что создатели технологий должны обладать методом получения и систематизации знаний, который мы называем наукой.

Строительство искусственных сооружений на базовом уровне опирается на понимание геометрии. Еще до того, как законы Ньютона

были полностью поняты, необходимые геометрические свойства здания были частью человеческих знаний на протяжении нескольких тысяч лет. Строительство успешно стоящей пирамиды, возможно, потребовало нескольких неудачных попыток, но каждая неудача способствует лучшему пониманию в сознании архитектора.

Можно с уверенностью сказать, что общества могут развиваться только тогда, когда их системы знаний хорошо организованы и эффективно хранятся. Действительно, хорошо организованная сложность, вероятно, является основным двигателем решения проблем и технологического прогресса. (Tainter, 1988).

Математика — привлекательная область знаний, поскольку она позволяет выводить теоремы, которые остаются неизменно истинными. Они также истинны вне зависимости от местоположения во Вселенной. Даже если обмен словами и понятиями затруднен, скорее всего, при сравнении нашей математики с математикой инопланетянина мы найдем точки соприкосновения. Эта концепция лежит в основе создания синтетических языков, таких как Lincos (Freudenthal, 1960).

Научная цивилизация, вероятно, измерила бы фундаментальные физические константы Вселенной. Конечно, маловероятно, что внеземные цивилизации будут использовать те же физические единицы, что и мы, но возможен обмен безразмерными трансцендентными числами, такими как $\pi = 3.141\dots$ или $e = 2.718\dots$, что станет ключевым моментом культурного обмена между любыми двумя внеземными цивилизациями. Общее соглашение о наборе физических единиц будет иметь решающее значение. ДеВито (DeVito, 1991) предлагает в качестве первого шага определить периодическую таблицу элементов (начиная с водорода). Затем, определив набор простых химических реакций, можно будет определить Кельвин и калорию. Это основано на согласии внеземных цивилизаций с нашей точкой зрения на химические элементы как на атомное ядро плюс электронное облако, что может быть не гарантировано.

Физические законы, которые могли бы записать внеземные цивилизации, будут математически эквивалентны нашим, но потенциально будут иметь совершенно иную структуру. Можно представить, например, что законы Ньютона, которые в основном касаются инерционной массы, ускорения и силы, были бы полностью переформулированы через импульс или движение центра масс системы. В этом примере все три версии относительно легко вывести друг из друга, но это, как правило, не будет так, если мы столкнемся с научными знаниями об инопланетных существах.

6.7 Какова роль политических структур?

Распространенным тезисом SETI является признание того, что если внеземные цивилизации — это исследователи, то они должны быть и учеными, поскольку именно научный прогресс является движущей силой человеческих исследований. Это игнорирует другие факторы, которые стимулировали исследования на протяжении всей истории человечества. Путешествие Дарвина стало возможным благодаря британскому Королевскому флоту, организации, сформированной в ходе боевых действий и политических интриг на европейском континенте за триста лет до этого.

Роль исследований в ускорении политического прогресса относительно современна. Её зарождение можно отнести к путешествию Колумба в 1492 году. Карты до этого периода не содержали пробелов — люди довольствовались горизонтом таким, какой он был. Возможно, Колумб не ставил перед собой цель открыть новый континент, но, сделав это, стало ясно, что за горизонтом скрываются богатства и политическая власть. Испанские завоевания Южной Америки были движимы жадой золота и других ценных ресурсов. Учёные стали участвовать в последующих исследовательских миссиях, поскольку это позволяло им улучшать навигацию флота, изучать и осваивать культуру коренных народов и выявлять перспективные ресурсы. Нельзя отрицать, что наше понимание Древнего Египта во многом обязано французам, которые стремились сохранить и понять исторические сокровища страны так же, как Наполеон стремился подчинить её народ.

Возможно, наиболее важной политической структурой являются деньги. Концепция денег является важнейшим компонентом, позволяющим функционировать гибкому обществу. Сложные социальные структуры зависят от разделения труда, а разделение труда успешно только в том случае, если плоды труда одного могут быть обменяны на плоды труда другого. Денежные системы обеспечивают средства для такого обмена.

Научные исследования — это форма труда, требующая значительных ресурсов. Следовательно, они зависят от получения финансирования, либо за счет инвестиций со стороны правительств, либо за счет монетизации собственных результатов. Таким образом, научные исследования и приобретение знаний ограничены политической волей.

Следует ожидать, что внеземные цивилизации также будут связаны аналогичными ограничениями по стоимости, которые можно проследить

до термодинамических принципов использования энергии. Мягкое решение парадокса Ферми — «иностранные политики ограничивают ресурсы для научных исследований и коммуникации». Сообщение вполне возможно, но его отправка политически нецелесообразна..

7. Сценарии апокалипсиса

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных катастроф, полезно рассмотреть некоторые аргументы, пытающиеся показать, что человечество недолговечно при использовании вероятностных, байесовских подходов.

7.1 Аргумент Картера-Лесли

Рассмотрим следующий мысленный эксперимент (Carter and McCrea, 1983). Полное количество когда-либо живших на Земле людей довольно большое (примерно 60 миллиардов, Olum, 2000), но недавний взрыв популяции человечества (см Chapter 12) означает, что выбирая человека случайным образом вы имеете примерно 10% шанс наткнуться на ныне живущего человека.

Представьте, что для человечества существует одна из двух возможностей, которые мы обозначим соответственно как S и L . Человеческая раса либо недолговечна (и общее число людей за всю историю составит $N_S = 200$ миллиардов), либо очень долговечна (и окончательное число составит $N_L = 200$ триллионов). В отсутствие данных о том, какой из вариантов будущего человечества сбудется, мы можем присвоить априорные вероятности $P(S)$ и $P(L)$ обоим исходам..

Но у нас не совсем нет данных — мы знаем, что являемся N -м человеком, появившимся на Земле, где $N = 6 \times 10^{10}$. Мы можем использовать теорему Байеса для получения обновленной апостериорной вероятности. Например, в случае гипотезы S :

$$P(S|N) = \frac{P(N|S)P(S)}{P(N)} \quad (7.1)$$

Аналогично и для гипотезы L . Более целесообразно вычислить отношение двух вероятностей:

$$\frac{P(S|N)}{P(L|N)} = \frac{P(N|S)P(S)}{P(N|L)P(L)} \quad (7.2)$$

155

Если предположить, что мы могли родиться в любой момент истории человечества, то функции правдоподобия будут просто равномерными по всем возможным значениям N , т.е.

$P(N|L) = 1/N_L$ и $P(N|S) = 1/N_S$.

Присвоим $R = N_L/N_S = 1000$, и, следовательно,

$$\frac{P(L|N)}{P(S|N)} = \frac{1}{R} \frac{P(L)}{P(S)} \quad (7.3)$$

Это означает, что если наша априорная вероятность долголетия по сравнению с коротколетием не велика, то, по-видимому, мы с большей вероятностью являемся короткоживущей цивилизацией, чем долгоживущей.

Гериг и др. (Gerig et al., 2013) расширяют аргумент Картера и Нильсена на множество всех возможных существующих цивилизаций. В том, что они называют универсальным аргументом Судного дня, они рассматривают долю всех цивилизаций, которые являются либо долгоживущими (f_L), либо короткоживущими ($1 - f_L$). Опять же, учитывая наше положение N в человеческой расе, мы можем обновить нашу априорную вероятность $P(f_L)$, чтобы получить апостериорную вероятность $P(f_L|N)$. Они показывают, что функция правдоподобия равна

$$P(N|f_L) = \frac{1}{1 + f_L(R - 1)} \quad (7.4)$$

Мы сразу видим, что эта функция правдоподобия обратно пропорциональна f_L , и поэтому можно ожидать, что апостериорная вероятность также будет аналогично пропорциональна. Этот анализ предполагает, что недолговечные цивилизации встречаются чаще, чем долгоживущие.

Таким аргументам легко противостоять. Гериг и др. (Gerig et al., 2013) отмечают, что детали их результатов очень чувствительны к выбору априорного распределения. Если мы вернемся к первоначальному аргументу о конце света, естественным первым подходом будет присвоение равномерных априорных распределений обоим исходам, что в данном случае означало бы, что $P(L) = P(S) = .$

Это отражает высокий уровень неосведомленности — мы можем не захотеть утверждать, что один исход более вероятен, чем другой, в свете столь скудной информации. Такой выбор априорного распределения явно подтверждает аргумент о том, что мы будем недолговечными.

Однако более подходящее априорное распределение отражало бы тот факт, что мы с большей вероятностью родимся в более многочисленной цивилизации, чем в менее многочисленной. Иными словами, вероятность моего существования при условии, что я нахожусь в сценарии s , равна

$$P(I|s) = P(s)N_{total}(s) \quad (7.5)$$

Следовательно, нам следует умножить наш предыдущий ответ для отношения вероятностей на коэффициент R .

$$P(L|N) = P(L) \quad (7.6)$$

$$P(S|N) = P(S)$$

что делает аргумент о конце света менее однозначным (Dieks, 1992; Olum, 2000).

Это лишь малая часть аргументов и контраргументов, составляющих подраздел философии, которые слишком объемны, чтобы перечислять их здесь. Единогласно было решено, что важна композиция соответствующих априорных вероятностей. Чтобы вычислить такие априорные значения, мы должны рассмотреть различные сценарии конца человечества, как мы это сделаем в следующих главах.

7.2 Аргумент Готта

Аналогичная концепция конца света была предложена Готтом (Gott, 1993), но её механика существенно отличается от аргумента Картера-Лесли, и обычно её называют «аргументом t». Рассмотрим любое событие, начинающееся в момент времени t и имеющее продолжительность, заданную T . Если предположить, что мы наблюдаем это событие в случайный момент времени t , то мы можем, например, вычислить вероятность того, что мы наблюдаем событие в течение первых или последних 2.5% его жизни. Более строго, если мы определим переменную r такую, что

$$r = \frac{t - t_{begin}}{T} \quad (7.7)$$

then

$$P(0.025 < r < 0.975) = 0.95 \quad (7.8)$$

Другими словами, 95% доверительный интервал определяется между $t = t_{begin} + 0.025T$ и $t = t_{begin} + 0.975T$. Если теперь мы определим $t_{end} = t_{begin} + T$, и нас интересует, сколько времени осталось до окончания события $t_{future} = t_{end} - t$, при условии, что нам известно, сколько времени уже прошло, $t_{past} = t - t_{begin}$, то мы можем перегруппировать приведенное выше выражение, чтобы показать, что

$$P\left(\frac{t_{past}}{39} < t_{future} < 39t_{past}\right) = 0.95 \quad (7.9)$$

В качестве примера Готт рассказывает о посещении Берлинской стены в 1969 году ($t_{past} = 8$). Стена пала 20 лет спустя, что дает $t_{future} = 2.5t_{past}$, что попадает в 95% доверительный интервал. Если теперь рассмотреть продолжительность жизни *Homo sapiens*, $t = 200\,000$ лет, то 95% доверительный интервал будет равен

$$5.1\text{kyr} < t_{future} < 7.8\text{Myr} \quad (7.10)$$

К такому рассуждению есть серьезные философские возражения – например, если мы выберем другой 5%-ный временной интервал, а не начальные и конечные 2.5%, мы сможем составить новый набор пределов. Например, если мы исключим центр, доверительный интервал станет

$$P\left(\frac{19}{21}t_{past} < t_{future} < \frac{21}{19}t_{past}\right) = 0.95 \quad (7.11)$$

Это приводит к несогласованности убеждений. Уравнения (7.9) и (7.11) выводятся, по сути, из одних и тех же предположений, и тем не менее, как утверждения убеждений, они не могут быть согласованы (Roush and Sherri, 2001). Кроме того, существует неявное предположение, что T не бесконечно, и что различные деления пространства возможностей (например, деление на короткие и длинные возможности в аргументе Картера-Лесли) приведут к различным доверительным интервалам, что также может быть противоречивым.

Ключевое различие между аргументами Картера-Лесли и Готта в пользу Судного дня снова заключается в выборе априорных положений. Аргумент Готта не зависит от личного априора и в некоторой степени враждебен трактовке в правильном байесовском формализме, тогда как аргумент Картера-Лесли по своей сути является байесовским и зависит от предварительного выбора. Заинтересованного читателя отсылают к обзорной статье Бострома, посвященной обоим аргументам.¹²

¹² www.anthropic-principle.com/preprints/lit/

9. Гибель от планетарных катастроф

9.1 Супервулканизм

В гипотезе Уникальной Земли мы отметили, что вулканизм является важнейшим компонентом циклов климатической обратной связи, которые поддерживают температуру Земли относительно стабильной, обеспечивая процветание жизни. Вулканизм, который мы видим на Земле, существует во многом благодаря свойствам земной литосферы. Хрупкая природа литосферы привела к ее расколу на набор жестких плит. Плиты могут свободно перемещаться по верхней части астеносферы (нижней мантии) в условиях ограничений, которые сами плиты накладывают друг на друга.

Наука о тектонике плит в первую очередь занимается границами стыка двух плит. На этих границах существует несколько возможных конфигураций:

- **Расходящиеся (конструктивные) границы.** Две плиты отходят от границы, обнажая мантию. Эта мантия может подниматься вверх, добавляя в литосферу новый материал. Типичными примерами являются океанические горные массивы, например Срединно-Атлантический Хребет.
- **Сходящиеся (деструктивные) границы.** Две плиты движутся к границе, при этом одна плита в конечном итоге погружается (подталкивается под) другую. Эти зоны субдукции приводят к разрушению литосферного материала по мере его плавления мантией. Обычно океаническая литосфера субдуцируется в пользу континентальной литосферы. Это может привести к поднятию гор (орогении).
- **Консервативные границы.** Две плиты движутся поперек границы, создавая трансформные разломы.

Главные границы плит являются местами большинства крупных сейсмических событий на Земле, при этом граница Тихоокеанской плиты является особенно активной. Срединно-океанические хребты обычно образуют гидротермальные жерла, поскольку частично расплавленная мантия подвергается воздействию морского дна, обеспечивая ценный источник энергии для глубоководных организмов. Зоны субдукции обычно сопровождаются дуговым вулканизмом. Погружающаяся плита доставляет воду в мантию, что снижает температуру ее плавления и образует магму. Вязкость магмы достаточно высока, чтобы удерживать ее в ловушке до тех

пор, пока повышение давления не вытолкнет ее на кору в виде извержения вместе с твердыми веществами (пеплом, пирокластическими породами и т. д.) и рядом газов (в основном CO₂ и H₂S). Повторяющиеся извержения в конечном итоге образуют вулканы с рядом свойств, зависящих от вязкости магмы и сопутствующего материала. Вулканические хребты образуются на земной коре на вершине перекрывающей плиты в виде горных хребтов или цепочек островов.

Вулканизм тесно связан с тектоникой плит, активной на Земле, но стоит отметить, что вулканическая активность Венеры вряд ли является результатом действия границ плит, поскольку её чрезвычайно горячая литосфера слишком пластична, чтобы раскалываться на плиты (Mikhail and Neap, 2017). Наблюдаемые там щитовые вулканы образуются из-за ослабления земной коры, позволяющего низковязкой магме выходить наружу.

Биосфера Земли зависела от вулканической активности, которая помогала регулировать атмосферу и действовала как универсальный перерабатывающий узел. Однако при определенных условиях вулканы могут избегать регулярных извержений и начинать накапливать очень большие объемы пепла и магмы. Эти так называемые супервулканы могут представлять значительную угрозу для существования Земли. Активность супервулканов измеряется индексом вулканической взрывоопасности (VEI), который является функцией объема выброшенного материала. E (in km⁻³):

$$VEI = \log(E) + 5 \quad (9.1)$$

Крупнейшие супервулканы в палеонтологической летописи (VEI 8) выбрасывают около 1000 км³ вулканической пыли. Самое недавнее извержение VEI 7 (и самое крупное с момента окончания последнего ледникового периода) — это извержение вулкана Тамбора, произошедшее в Индонезии в 1815 году. Считается, что выброс значительного количества вулканической пыли в атмосферу стал причиной «года без лета». Введение пыли в верхние слои атмосферы Земли увеличило её непрозрачность и уменьшило количество солнечного света, достигающего поверхности. Это уменьшение связано с падением среднемировой температуры примерно на полградуса и неурожаем по всему миру, что привело к голоду и беспорядкам.

Для сравнения, более известное извержение Кракатау в 1883 году классифицируется как VEI 6, и большинство извержений VEI 6 или выше связаны с необычно низкими температурами, поскольку вулканическая пыль увеличивает непрозрачность атмосферы.

Крупнейшее зарегистрированное извержение супервулкана за всю историю рода Номо — так называемое извержение Тоба, произошедшее в озере Тоба в Индонезии около 75 000 лет назад (согласно К-Аг датированию). Объём изверженного вулкана Тоба, по-видимому, превысил 2500 км³ (Роуз и Чеснер, 1990). В литературе существуют разногласия относительно влияния такого масштабного извержения на климат Земли: одни предполагают, что это извержение могло спровоцировать последний ледниковый период, другие же придерживаются более консервативных взглядов, признавая, что снижение средней глобальной температуры на 15 °С могло привести к апоптозу. Это продолжалось бы несколько лет, и для восстановления климата до его первоначального среднего уровня потребовались бы десятилетия (Робок и др., 2009). Даже этот консервативный сценарий имел бы разрушительные последствия для биосферы. Группы гоминидов также сильно пострадали бы в результате, что заставляет некоторых предполагать, что наблюдаемое у людей генетическое «бутылочное горло» было следствием сокращения численности популяции Номо *sapiens* в десятилетия после события на Тоба (хотя это вызывает бурные споры).

Вторичные последствия вулканических извержений нельзя недооценивать. Кумбре-Вьеха, один из самых активных вулканов на Канарских островах, вызывает опасения уже несколько десятилетий. Хотя зарегистрированные извержения достигают индекса вулканической активности (VEI) 1 или 2, существует вероятность катастрофического обрушения западного склона вулкана. В случае такого бокового обрушения в море будет выброшено несколько сотен кубометров породы (общей массой около 10¹⁵ кг). Это вызовет мегацунами, которое прокатится по Атлантическому океану. Первоначальные расчеты Уорда и Дэй (Ward and Day, 2001) предполагали волны высотой более 10 м, обрушивающиеся на восточное побережье Америки, хотя другие расчеты показывают, что высота волн будет значительно ниже, если обрушение вообще произойдет. (Gisler et al., 2006; Carracedo, 2014).

Совершенно очевидно, что супервулканизм может оказывать глубокое влияние на сельскохозяйственную пищевую цепь. Даже события VEI 7 могут привести к массовому голоду. Вероятно, еще одно событие VEI 8 приведет к широкомасштабному коллапсу человеческой популяции. По оценкам, событие VEI 8 по своему воздействию эквивалентно столкновению с астероидом диаметром 1 км, по крайней мере, с точки зрения образования атмосферной пыли и аэрозолей (Chapman and Morrison, 1994). Учитывая, что предполагаемая частота событий VEI 8 составляет примерно один раз в 50

000 лет, мы можем ожидать, что события VEI 8 будут происходить почти вдвое чаще, чем столкновения с астероидами диаметром 1 км, и, следовательно, такие события будут представлять большую экзистенциальную опасность (Рампино, 2002, и ссылки в нем).

Является ли вулканизм такой величины распространенным явлением на планетах земной группы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны уметь предсказывать тектонический режим на экзопланетах. В литературе существуют значительные разногласия относительно условий для тектоники плит (или, эквивалентно, тектонического режима с подвижной литосферной плитой). Вкратце, для устойчивой системы тектоники плит существуют два условия. Во-первых, литосфера (кора и верхняя мантия) должна подвергаться разрушению (т.е. растрескиванию) для образования отдельных плит. Во-вторых, эти плиты должны затем субдуцировать в мантию, что требует наличия отрицательной плавучести в зонах субдукции (т.е. средняя плотность плит должна быть больше плотности мантии).

Разрушение литосферы в основном зависит от двух ключевых факторов: способности плиты сопротивляться деформации и конвективных напряжений, воздействующих на плиту со стороны мантии. Сопротивление плиты деформации определяется главным образом толщиной плиты и прочностью её материала, а конвективное напряжение зависит от вязкости мантии. В целом, более вязкая мантия — это более медленно движущаяся мантия, и, следовательно, разрушение литосферы более вероятно при низкой вязкости. Вязкость мантии ν_{mantle} зависит от температуры. В большинстве исследований тектоники плит на экзопланетах предполагается соотношение типа Аррениуса. (Korenaga, 2010):

$$\nu_{\text{mantle}} = \nu_0 \exp\left(-\frac{E}{RT_p} - \frac{E}{RT_r}\right) \quad (9.2)$$

T_r — потенциальная температура мантии (она используется для коррекции эффекта адиабатического сжатия в зависимости от глубины). ν_0 — эталонная вязкость при $T_r = T_r$, а E — энергия активации. Когда T_r 750 К, вязкость становится настолько чрезмерной, что режим застойной литосферы практически неизбежен, и тектоника плит невозможна. Конвективное поведение мантии описывается числом Рэлея Ra , безразмерным свойством, определяющим, является ли теплопередача преимущественно кондуктивной или конвективной. Мантии с большим Ra могут создавать большие скорости

движения мантии и, следовательно, большее напряжение. Как только напряжение достигает критического предела текучести, плита разрушается. Предел текучести обычно имеет вид

$$\sigma_{\text{yield}} \propto \mu \rho g z \quad (9.3)$$

где μ — коэффициент трения, ρ — плотность плиты, g — ускорение свободного падения, а z — глубина. Вода может значительно увеличить гидростатическое поровое давление в породе, что указывает на ее решающую роль в возникновении тектоники плит (Korenaga, 2010):

$$\sigma_{\text{yield}} \propto \mu (\rho - \rho_{\text{H}_2\text{O}}) g z \quad (9.4)$$

Внутреннее число Рэлея суперземли с массой M можно определить по следующей формуле (Valencia et al., 2006; Korenaga, 2010):

$$Ra = Ra_{\oplus} \left(\frac{\Delta T_p}{\Delta T_{p,\oplus}} \right) \left(\frac{v_{\text{mantle}}}{v_{\oplus}} \right) \left(\frac{M}{M_{\oplus}} \right)^{1.54} \quad (9.5)$$

T_p представляет собой разницу температур между литосферой и мантией. Следовательно, на мирах с холодной поверхностью выше вероятность возникновения литосферных разломов и образования тектонических плит. (Foley et al., 2012).

Валенсия и др. (Valencia et al., 2007) первоначально предположили, что тектоника плит на суперземлях протекает легче, главным образом из-за их повышенного числа Рэлея (и уменьшенной толщины плит). О'Нил и Ленардик (O'Neill and Lenardic, 2007) быстро отреагировали, отметив, что доля конвективного напряжения, фактически вызывающего деформацию литосферы, уменьшается с увеличением массы планеты, что приводит к сценарию застойной литосферной крышки.

Дальнейшие исследования с тех пор выявили сложность оценки вязкости мантии и конвективного поведения. Определение критического предела текучести для разрушения литосферы также является нетривиальной задачей и требует глубокого понимания состава коры и природы образования разломов (Foley et al., 2012). Также очевидно, что вязкость мантии зависит как от давления, так и от температуры (Stamenkovic et al., 2012), что добавляет еще одну зависимость от глубины z :

$$v_{\text{mantle}} = v_0 \exp \left(\frac{E + zV}{T_p + T_0} - \frac{E + z_r V}{T_r + T_0} \right) \quad (9.6)$$

где V — активационный объем, который уменьшается с увеличением давления, а v_0 теперь измеряется при эталонной температуре и глубине (T_r , z_r). T_0 — температура поверхности.

Что наиболее важно, источники нагрева, ответственные за конвекцию мантии, меняются со временем, и было показано, что начальная температура планеты влияет на ее конечное состояние (Noack and Breuer, 2014).

По сути, вероятность тектоники плит на других планетах будет сильно зависеть от температуры поверхности, состава и толщины плиты, истории ослабления плиты, наличия воды, температуры и давления мантии, температуры на границе ядро-мантия, скорости радиогенного нагрева и, вероятно, многих других факторов. Это иллюстрирует огромную сложность прогнозирования тектонического поведения экзопланет земной группы, о которых мы обычно знаем только массу и радиус.

Моделирование также показывает, что тектоника плит — это лишь фаза в жизни земной планеты, и что в зависимости от радиогенного распада и охлаждения плиты и мантии большинство, если не все, земные тела первоначально начинают свою жизнь как горячее тело с неподвижной литосферой, переходя к эпизодическому режиму тектоники плит, прежде чем перейти к полностью тектоническому режиму и заканчивая холодным состоянием с неподвижной литосферой, при этом продолжительность каждой фазы сильно зависит от вышеуказанного списка ограничений (O'Neill et al., 2016).

Наконец, следует также рассмотреть возможность того, что экзопланеты, испытывающие приливный нагрев, могут генерировать значительный вулканизм даже в режиме неподвижной литосферы (Valencia et al., 2018). Утверждается, что тектоника плит (или, по крайней мере, значительный вулканизм) необходима для технологических цивилизаций (Stern, 2016). Если это так, то вулканы могут быть крайне важны для жизни и разума, но также и причиной их гибели.

9.2 Коллапс магнитного поля

Земля в значительной степени защищена от звездной активности сочетанием своей атмосферы и магнитного поля. Верхние слои атмосферы поглощают ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи, предотвращая их достижение поверхности. Фотоны очень высокой энергии могут генерировать «воздушные ливни» из фотонов и заряженных частиц, которые могут вызывать вторичную опасность, если начальная энергия достаточно высока.




Рисунок 9.1 Магнитное поле Земли. Магнитосфера в значительной степени ограничена солнечным ветром, который создает ударную волну в месте их встречи. Большая часть заряженных частиц не может проникнуть в магнитосферную оболочку непосредственно за ударной волной. Те, которые проникают, обычно находятся в радиационных поясах Ван Аллена и иногда выпадают на магнитные полюса, вызывая полярные сияния.

Заряженные частицы, испускаемые Солнцем (см. раздел 10.1) и другими телами, отклоняются магнитным полем Земли. Магнитосфера определяет область межпланетного пространства, в которой преобладает поле Земли (Рисунок 9.1). Солнечный ветер встречается с магнитосферой и образует ударную волну. Линии поля за ударной волной искажаются, приобретая форму хвоста (магнитохвост). В результате большая часть опасного потока заряженных частиц Солнца направляется вокруг Земли, при этом большая часть частиц никогда не проникает в магнитосферную оболочку — турбулентный слой между ударной волной и началом магнитосферы (магнитопаузой). Некоторые из этих частиц, движущихся внутрь, захватываются в радиационных поясах Ван Аллена.

Форма магнитного поля Земли (и защита, которую оно обеспечивает от всей звездной активности) в значительной степени определяется самим Солнцем. Изменения солнечного ветра приводят к движению ударной волны к Земле и от нее. Это движение деформирует магнитосферу, увеличивая выброс частиц в пояса Ван Аллена. Увеличение скорости выброса выталкивает частицы из поясов вдоль линий магнитного поля к северному и южному полюсам, вызывая северное и южное полярные сияния.

В Солнечной системе практически каждая планета земной группы в какой-то момент своей истории обладала магнитным полем, как и несколько её спутников (Шуберт и Содерлунд, 2011). Из планет только Земля сохраняет сильное магнитное поле около 40 мкТл. Меркурий сохраняет слабое собственное поле (0.3 мкТл), в то время как Венера, Марс (и Луна) демонстрируют признаки реликтовых полей, проявляющиеся в намагниченности пород земной коры.

Происхождение магнитного поля планеты в некоторой степени зависит от самой планеты, но, как правило, требует наличия динамо-машины для генерации достаточного тока. Это можно увидеть, пересмотрев уравнение магнитной индукции (уравнение 4.73), где мы теперь допускаем конечную проводимость жидкости.:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}, \quad (9.7)$$

где мы определили *магнитную диффузию*

$$\eta = \frac{1}{\sigma \mu} \quad (9.8)$$

где σ — проводимость, а μ — магнитная проницаемость жидкости. Заметим, что мы использовали приближение Буссинеска, где возмущения плотности, вызванные давлением и изменениями, относительно малы. В идеальной МГД-жидкости проводимость бесконечна, следовательно, $\eta = 0$. Однако конечная проводимость жидкости гарантирует, что второй член в правой части уравнения (9.7) действует как диффузионный член. Если мы положим $\mathbf{v} = 0$, то магнитное поле в конечном итоге рассеется за время, заданное формулой

$$t_{\text{diff}} = \frac{L^2}{\eta} \quad (9.9)$$

где L — типичный масштаб длины в жидкости. В случае Земли динамо-движение генерируется конвективными течениями в мантии. Закон сохранения импульса в приближении Буссинеска (в совращающейся системе отсчета угловой скорости) имеет вид:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v} + 2 \times \mathbf{v} \nabla = -\nabla \Pi + \frac{1}{\mu_0 \rho_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \alpha T \mathbf{g} + \nu \nabla^2 \mathbf{v} \quad (9.10)$$

Выше описаны отклонения от гидростатического равновесия (при постоянной плотности ρ_0). Силы, приводящие к гидростатическому равновесию (и центробежная сила), включены в эффективный градиент давления ∇ . Таким образом, мы видим, что поддержание магнитного поля (которое зависит от поддержания скорости жидкости) представляет собой комбинацию вязкости (представленной кинематической вязкостью ν), сил Кориолиса (указанных в левой части уравнения 9.10) и силы плавучести (αTg , где g — ускорение свободного падения). Сила плавучести возникает в результате температурных возмущений T , которые генерируют возмущения плотности порядка

$$\rho = \rho_0(1 - \alpha T) \quad (9.11)$$

В физическом смысле, жидкое внешнее ядро Земли генерирует конвекционные ячейки. Этому частично способствует градиент состава — по мере охлаждения ядра расплавленное железо затвердевает и прикрепляется к нему, уменьшая плотность жидкости, которую оно оставляет после себя. Эти конвекционные ячейки сворачиваются в трубки под действием эффекта Кориолиса, которые затем, как считается, (приблизительно) выравниваются с осью вращения Земли. При наличии начального поля этот динамо-механизм успешно создавал длительное магнитное поле (см. Kono и Roberts, 2002, подробный обзор моделей динамо-механизма и попыток моделирования магнитного поля Земли).

Если ядро полностью затвердеет, этот динамо-механизм выйдет из строя, и магнитное поле Земли рассеется со скоростью $\tau_{diff} \sim 10^4$ лет (Merrill et al., 1996; Chulliat and Olsen, 2010). По-видимому, это произошло с динамо-механизмами Марса и Луны. Ситуация с Венерой более запутанная, поскольку она должна обладать расплавленным ядром, но при этом не имеет собственного магнитного поля. Этому с бою приписывают несколько объяснений: от неспособности Венеры создать тектонические плиты, обеспечивающие достаточный температурный градиент для конвекционных ячеек, до возможности того, что ядро Венеры не полностью сформировано, оставаясь при этом слишком холодным для динамо-механизмов, работающих за счет тепла. (см. Schubert and Soderlund, 2011, and references within).

Таким образом, можно предположить, что создание долговременного магнитного поля не является гарантированным явлением для планет земной группы. Простая модель, в общих чертах описывающая поведение, наблюдаемое в Солнечной системе, дает магнитный момент экзопланеты следующим образом (López-Morales et al., 2011):

$$M \approx 4\pi R_{\text{core}}^3 \beta \left(\frac{\rho}{\mu_0} \right)^{1/2} (FR)^{1/3} \quad (9.12)$$

где R_{core} — радиус ядра, μ_0 — проницаемость свободного пространства, R — толщина вращающейся оболочки вокруг ядра, генерирующей конвекционные ячейки, и F — средний конвективный поток плавучести. Это можно выразить в терминах терранских значений:

$$\frac{F}{F_{\oplus}} = \left(\frac{Ro}{Ro_{\oplus}} \right)^2 \left(\frac{D}{D_{\oplus}} \right)^{2/3} \left(\frac{\Omega}{\Omega_{\oplus}} \right)^{7/3} \quad (9.13)$$

Конвективный поток сильно зависит от отношения инерции жидкости к силе Кориолиса, определяемой числом Россби Ro , и периода вращения планеты. Эта модель, примененная к данным об экзопланетах с некоторыми снисходительными допущениями относительно их состава, предполагает, что магнитные моменты, вероятно, намного больше, чем у Земли, при условии, что их скорости вращения достаточно высоки. Конечно, у планет земной группы, вращающихся вокруг маломассивных звезд, вероятно, значительно снижены скорости вращения из-за приливной синхронизации, и в результате они могут испытывать проблемы с поддержанием своих магнитных полей.

Таким образом, одним из возможных путей разрушения цивилизации является коллапс магнитного поля планеты, либо из-за охлаждения ядра, либо из-за какого-либо другого фактора, нарушающего работу конвекционных ячеек, необходимых для поддержания динамо-механизма.

Важно отметить, что даже магнитное поле Земли, существующее миллиарды лет, переживало периоды, когда его напряженность значительно снижалась.

Во время так называемой *геомагнитной инверсии* магнитное поле Земли меняет полярность, при этом северное поле сменяется южным. Этот переход легко обнаружить в зонах разломов морского дна, где инверсии можно наблюдать как изменения намагниченности земной коры, напоминающие «штрих-код», по мере удаления от зоны разлома.

Во время смены полярных витков напряженность поля может значительно снизиться, что приводит к периодам, когда атмосфера Земли

относительно незащищена от астрофизических опасностей (см. следующую главу).

Эти интервалы могут быть относительно продолжительными по человеческим меркам. Интервал между одной сменой полярных витков и другой обычно называют хроном (где хрон обычно используется в геофизике для обозначения временного интервала, разделяющего значимые события). Частота смены полярных витков сильно меняется со временем — несколько смен полярных витков могут произойти за миллион лет, или может пройти десятиллионнолетний интервал времени без смены полярных витков (так называемый суперхрон). Предсказать смену магнитного поля крайне сложно, поскольку статистически малое количество событий смены магнитного поля позволяет разработать модель. Отклонения от статистики Пуассона указывают на то, что смены магнитного поля демонстрируют коррелированное поведение на очень больших временных масштабах (Carbone et al., 2006).

В любом случае, смена магнитного поля может занять до десятков тысяч лет, при этом магнитное поле во время перехода истощается до 5–10% от своей силы (Glassmeier and Vogt, 2010). В течение типичного хрона расстояние от центра Земли до магнитопаузы, определяемое как расстояние от центра Земли до субзвездной точки магнитопаузы, составляет около $12 R_{\oplus}$.

Во время последнего перехода (переход Матуямы-Брюнхеса около 780 тыс. лет назад) расстояние от центра до относительно спокойного Солнца сместилось бы примерно до $5.9 R_{\oplus}$, что соответствует приблизительному местоположению геосинхронной орбиты (ГЭО). Можно предположить, что это окажет значительное влияние на нашу технологическую цивилизацию, поскольку спутники будут подвергаться бомбардировке разрушительным излучением..

Это усугубляется в периоды интенсивной звездной активности (следующая глава), когда расстояние до Земли может временно сократиться примерно до $3 R_{\oplus}$. Расстояние остается достаточно большим, чтобы Земля могла поддерживать свою атмосферную защиту, но топология поля значительно меняется во время перехода. Скорее всего, это приведет к выбросу частиц из пояса Ван Аллена, которые затем будут воздействовать на верхние слои атмосферы, вызывая потерю озона и повышение уровня ультрафиолетового излучения (см. раздел 11.3), а также влияя на другие климатические свойства, такие как облачность.

Имеющиеся на данный момент данные не подтверждают, что геомагнитная инверсия вызывает массовые вымирания (см. Glassmeier и Vogt, 2010, и ссылки в них, а также Courtillot и Olson, 2007). Однако очевидно, что геомагнитная инверсия (и ослабление магнитных полей в целом) скорее всего усугубит уже существующие проблемы. Во время инверсии Земля становится еще более подвержена разрушительному воздействию звездной активности, и можно ожидать, что экзопланеты, вращающиеся вокруг более активных звезд, будут еще более уязвимы, как мы обсудим далее.

10. Гибель от звезды

10.1 Звёздная активность

Звезды не являются устойчивыми, неподвижными источниками радиации. Интенсивная энергия, производимая термоядерными реакциями в их ядре, обеспечивает ионизацию солнечного газа в плазму с высокой проводимостью (т. е. содержащийся в нем водород обычно разделяется на составляющие его протоны и электроны).

Столь высокий уровень ионизации означает, что мы должны описывать поведение Солнца, используя законы магнитогидродинамики (или МГД). Наряду с давлением и гравитационным полем жидкости мы также должны интересоваться (существенным) магнитным полем Солнца. Движения в этой жидкости порождают токи (потоки электронов). Согласно уравнениям Максвелла, лежащим в основе теории МГД, эти токи индуцируют магнитные поля, которые, в свою очередь, действуют на заряженные частицы, генерируя движения, которые генерируют дополнительные магнитные поля.

На Солнце глобальное магнитное поле возникает благодаря так называемому α -динамо, происхождение которого связывают с работами Лармора и Паркера. Лармор (Larmor, 1919) предположил, что дифференциальное вращение Солнца (Солнце вращается быстрее всего на экваторе с периодом ~ 25 дней, в отличие от ~ 35 дней на полюсах) достаточно для сдвига полоидального магнитного поля (т. е. поля, исходящего от полюсов). Этот сдвиг создаст поле противоположной полярности в Северном и Южном полушариях Солнца, что наглядно объясняет наблюдаемые дихотомии между солнечными пятнами по обе стороны экватора.

Вскоре было замечено, что поле останется осесимметричным и, следовательно, не сможет поддерживать себя бесконечно при омической диссипации, т. е. потерях энергии от генерируемых токов. Паркер (Parker, 1955) отметил, что сила Кориолиса позволяет возникать циклоническим движениям в поднимающихся элементах жидкости, разрушая осевую симметрию и обеспечивая поддержание поля..




Рисунок 10.1 Внутреннее строение Солнца. Внутри ядра водород превращается в гелий в результате термоядерного синтеза. Две основные зоны звездной атмосферы — радиационная и конвективная — соединены в тахоклине. Фотоны, достигнув фотосферы, свободно вырываются из атмосферы, проходя через горячую хромосферу и за пределы корональной плазмы.

Теперь нам известно, что солнечная атмосфера имеет две основные зоны — внутреннюю радиационную зону, где энергия в основном переносится фотонами, совершающими случайное блуждание между электронами и протонами, и внешнюю конвективную зону, где плазма переносит энергию главным образом за счет конвекции (см. рис. 10.1). Конвективная и радиационная зоны вращательно разделены — радиационная зона вращается равномерно, а конвективная зона — дифференциально. Тонкий пограничный слой, тахоклин, расположен по обе стороны от этих двух зон. В тахоклине происходит значительный сдвиг, который является источником большей части того, что мы называем звездной активностью.

Прежде чем мы начнем исследовать эту активность и ее потенциальные опасности, давайте завершим наше изучение структуры звезд исследованием верхних слоев Солнца. Видимая поверхность конвективной зоны называется фотосферой — в этой области оптическая толщина плазмы (мера вероятности взаимодействия фотона со слоем вещества) начинает уменьшаться ниже критического значения, при котором фотоны свободно покидают Солнце. Именно в этой области определяется эффективная температура звезд. Эта температура определяет континуумный спектр звезды, то есть области спектра, в которых не преобладают эмиссионные линии. В случае Солнца эффективная температура составляет приблизительно 5800 К.

По мере того, как фотоны покидают фотосферу, они сталкиваются с хромосферой — слоем газа чрезвычайно низкой плотности толщиной 2000–3000 км. Этот газ низкой плотности значительно горячее фотосферы (около 20000 К). Наконец, за хромосферой находится солнечная корона —

диффузная аура плазмы, простирающаяся на миллионы километров в космос. Причины нагрева хромосферы и короны до конца не изучены, но, предположительно, важную роль играет нагрев, вызванный магнитным полем.

Гелиосфера обозначает сферу влияния Солнца на Вселенную, где солнечный ветер встречается с межзвездной средой (см. ниже).

Мы сосредоточимся на тех аспектах звездной активности, которые потенциально смертельны. Поэтому мы обойдем стороной многочисленные нелетальные аспекты звездной активности. Заинтересованному читателю следует обратиться к «обзорам», которые ведут Холл (Hall, 2008) и Хэттуэй (Hathaway, 2010), для получения дополнительной информации об этих явлениях.

10.1.1 Солнечный ветер

Частицы внутренней короны ускоряются магнитным полем Солнца до различных скоростей. Вследствие тепловых столкновений эти скорости хорошо описываются распределением Максвелла:

$$f_{\text{B}}^T(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (10.1)$$

где k_B — постоянная Больцмана, а T — локальная температура. Частицы в высокоэнергетическом хвосте распределения обладают скоростями, превышающими локальную скорость убегания, и улетают от Солнца. Электроны, увлекаемые солнечным ветром, могут затем генерировать электрические поля, которые усиливают ускорение других ионов.

Солнечный ветер состоит из быстрой компоненты, которая, по-видимому, возникает из корональных дыр — воронкообразных областей открытого поля, позволяющих частицам улетучиваться с высокими скоростями и более низкими температурами. Медленная компонента значительно горячее и более тесно связана с короной в целом..

10.1.2 Вспышки, протуберанцы и выбросы массы из короны

В 1859 году наблюдения Каррингтона за Солнцем в белом свете показали, что Солнце значительно увеличило свою яркость, и это увеличение длилось приблизительно пять минут. Нам повезло, что так называемое «событие Каррингтона» не произошло в нынешнюю эпоху освоения и исследования космоса. Через восемнадцать часов после наблюдения

Каррингтона магнитное поле Земли претерпело серьёзное нарушение, вызвав беспрецедентные геомагнитные бури. Эти бури привели к исключительно сильным полярным сияниям. Обычно такие сияния наблюдаются только в высоких широтах, но во время события Каррингтона они были зафиксированы даже на юге, в Карибском бассейне. Местные жители сообщают, что в южных широтах США полярные сияния были настолько сильными, что при их свете можно было читать газету.

Теперь мы понимаем, что то, чему Кэррингтон был свидетелем (и что Земля пережила), было особенно мощной солнечной вспышкой, сопровождавшейся выбросом корональной массы. Во время вспышки сильно закрученные и плотно упакованные петли магнитных силовых линий испытывают так называемое магнитное пересоединение. Магнитное поле перестраивается, чтобы достичь состояния с более низкой энергией, при этом соседние петли сливаются и соединяются друг с другом. Благодаря закону сохранения энергии, события пересоединения высвобождают энергию в окружающую среду. В случае Солнца эта энергия может быть значительной (хотя, возможно, составляет лишь миллиардную часть от общей энергии, излучаемой каждую секунду). Эта энергия вводится в фотосферу, хромосферу и корону, вызывая значительный нагрев окружающей плазмы. Этот внезапный приток энергии объясняет значительное увеличение яркости Солнца во время вспышек. Большая часть усиленного излучения от вспышки приходится на ультрафиолетовые и рентгеновские длины волн.

Если вспышка достаточно мощная, она может поднять с поверхности Земли большое количество плазмы (и пронизывающих её магнитных полей). Это корональный выброс массы (КВМ), который часто сопровождает вспышку (хотя эти два явления не всегда связаны). Коронографы в среднем регистрируют от 3 до 5 КВМ в день. Большинство этих событий не направлены на Землю — обычно один-два КВМ достигают Земли в месяц. Этот поступающий материал может создавать ударную волну при столкновении с магнитосферой Земли, активизируя магнитное поле Земли и вызывая геомагнитные бури. Такая космическая погода может оказывать крайне негативное воздействие на спутники и космические аппараты. Материал КВМ включает в себя как слабо, так и сильно заряженные ионы, которые разрушат электронное оборудование, если будут бомбардировать его в достаточном количестве. Очевидно, что астронавты в такой среде также пострадают от вреда для здоровья, если попадут под этот шквал. Чрезвычайно удачно, что особенно мощное событие с участием энергетических частиц произошло между миссиями «Аполлон-16» и

«Аполлон-17». Доза радиации, которую получили бы астронавты во время полета на Луну, почти наверняка представляла бы угрозу для жизни.

Космическая погода также может влиять на наземные системы. Геомагнитно-индуцированные токи (ГИТ) возникают, когда сильно заряженные частицы в верхней магнитосфере Земли выпадают вдоль силовых линий в верхние слои атмосферы. Этот рой зарядов создает ток в атмосфере, который, в свою очередь, индуцирует токи в земле. Любое устройство, использующее землю для заземления своих электрических систем, подвержено риску скачков напряжения и перегрузок по току. Часто упоминаемый случай выхода из строя критически важных систем из-за ГИТ — это отказ трансформатора Hydro-Quebec в марте 1989 года после сильной геомагнитной бури.

Нам еще предстоит увидеть, какие ГИТ могут быть вызваны событиями типа Кэррингтона. Единственным крупным электрооборудованием, которое, по-видимому, пострадало в 1859 году, были телеграфные системы. Если верить свидетельствам очевидцев, то ГИТ определенно имели место — телеграфисты сообщали о сильных электрических разрядах при прикосновении к своему оборудованию, и они могли отправлять и получать сообщения, несмотря на отключение своих систем от электропитания.

Какого ущерба следует ожидать от события типа Кэррингтона для нашей современной цивилизации? Любая система, состоящая из длинного проводящего материала, расположенного на поверхности или под ней, будет подвержена индуктивным токам. Силовые трансформаторы, такие как трансформатор Hydro-Quebec, склонны к перегрузкам — событие типа «Кэррингтон», скорее всего, вызовет отключения электроэнергии в глобальном масштабе, причем разрушительные события будут сосредоточены на более высоких широтах (поскольку магнитное поле значительно изменяется в направлении магнитных полюсов). Можно предпринять шаги для защиты критически важных систем от нежелательных постоянных токов, возникающих во время геомагнитно-индуцированных токов (см., например, Bolduc, 2002), но остается неясным, насколько эффективными окажутся эти попытки компенсировать скачки тока в случае такого мощного события, как «Кэррингтон».

Флот спутников, вращающихся вокруг Земли, вероятно, пострадает больше всего во время события Кэррингтона. Спутники подвергаются преждевременному старению, особенно те, которые находятся на высоких орбитах, таких как геостационарная орбита (ГСО), в зависимости от силы солнечного ветра и интенсивности бомбардировки спутника энергичными протонами. Вызывает тревогу тот факт, что, по-видимому, эра спутников

пережила значительно более спокойную солнечную активность, чем 400 лет до этого (хотя событие Кэррингтона удерживает рекорд по наибольшему потоку солнечных протонов за последние 500 лет). Супершторм уровня Кэррингтона приведет к значительным потерям спутников из-за бомбардировки протонами. Прогнозы экономических потерь в течение текущего солнечного цикла (2007–2018 гг.), если вспышка уровня Кэррингтона достигнет Земли, оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов (Odenwald and Green, 2007). Практически неизбежны сбои в работе систем отслеживания местоположения, таких как GPS, а также множества других сервисов, зависящих от быстрой связи по всей поверхности планеты. В сочетании с геомагнитно-индуцированными взрывами, повреждающими или разрушающими подводные кабели, наше современное общество, возможно, будет полностью лишено возможности говорить от мощной вспышки.

Наблюдательные данные о звёздной активности не ограничиваются Солнцем. Например, наблюдения маломассивных звёзд спектрального типа М показывают широкий спектр признаков активности, особенно в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Статистика указывает на то, что сверхвспышки, энергии которых в 10–100 раз превышают солнечные вспышки, довольно распространены среди карликовых звёзд типа М (Chang et al., 2015). Например, система TRAPPIST-1, имеющая три «потенциально обитаемые» планеты, испытывает вспышку уровня Кэррингтона раз в несколько недель (Vida et al., 2017).

Нынешняя тенденция поиска обитаемых (и населённых) планет в звёздах типа М должна учитывать повышенную склонность этих звёзд к особенно разрушительной звёздной активности. Планета, вращающаяся в пределах обитаемой зоны звезды типа М, вероятно, будет вращаться синхронно, то есть её период вращения будет близок или равен периоду её орбитального движения. Чрезвычайно медленное вращение, вероятно, предотвратит образование планетарной магнитосферы. В сочетании с тем фактом, что обитаемые зоны звезд типа М расположены гораздо ближе (порядка 0,1–0,2 а.е.), следует ожидать, что сверхвспышка нанесет значительный ущерб атмосфере планеты. Увеличенное ультрафиолетовое излучение от сверхвспышки будет способствовать фотолизу озона в верхних слоях атмосферы. Хотя текущие расчеты показывают, что истощение озона составит всего несколько процентов (Segura et al., 2010), повторные вспышки могут усугубить это снижение, лишив атмосферу способности экранировать органические вещества от вредного излучения. Исследования нынешнего количества экзопланет в обитаемой зоне показывают, что большинство, если

не все обнаруженные на данный момент, находятся под серьезной угрозой стать непригодными для жизни (Решение R.9) в условиях такой интенсивной звездной активности (Armstrong et al., 2016).

Похоже, что одной лишь звёздной активности достаточно, чтобы уничтожить цивилизацию столь же эффективно, как и самоподдерживающийся ядерный холокост (см. раздел 16.3). Это, безусловно, приведёт к серьёзным сбоям в обычной жизни на таких планетарных телах, как Земля, и к неминуемой гибели тех, кто работает в космосе.

10.1.3 Защита Земли от звездной активности

Магнитное поле Земли обеспечивает достаточную защиту для повседневной активности Солнца. Экстремальные события (например, событие Кэррингтона) могут пробить этот щит и вызвать вредные приземные токи, как было описано ранее, и спутники особенно подвержены этому.

Землеподобные планеты вокруг маломассивных звезд должны вращаться гораздо ближе к своей родительской звезде, чтобы поддерживать наличие жидкой воды на поверхности. Эти звезды также, как правило, более активны, поскольку эффективность звездного магнитного динамо возрастает с увеличением скорости вращения звезды и глубины ее конвективной оболочки. Звезды типа М-карликов действительно могут быть полностью конвективными, и поэтому при заданной скорости вращения они обычно будут гораздо активнее, чем звезды типа G. В результате, для обитаемости планет вокруг М-карликов требуются сильные планетарные магнитные поля для поддержания магнитосферы, сопоставимой по размеру с Землей. Расстояние до магнитопаузы Земли обычно составляет около $12R_{\oplus}$. Размещение Земли на орбите типичных звезд типа М-карликов уменьшает расстояние до $6R_{\oplus}$ (Видотто и др., 2013). Это расстояние может уменьшиться до $1R_{\oplus}$, если планета находится в синхронном вращении, что ослабляет магнитный момент планеты (Ходаченко и др., 2007). По мере уменьшения расстояния до планеты может происходить потеря большего количества верхней атмосферы, что приводит к разрушению пригодных для жизни сред.

10.2 Эволюция звёзд

Звезды не могут жить вечно, и их смерть имеет последствия. Чтобы понять эти последствия, мы должны рассмотреть жизненный цикл звезды, который начинается, когда коллапсирующая протозвезда начинает

синтезировать водород в своем ядре. Астрономы называют это «присоединение к основной последовательности». Основная последовательность описывает все звезды, которые синтезируют водород в своих ядрах. Звезды главной последовательности подчиняются ряду очень простых соотношений из-за относительной простоты их внутреннего строения. Это иллюстрируется положением главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рассела (или для краткости диаграмме HR). Обычно осями диаграммы HR являются эффективная температура звезды T_{eff} и ее светимость L . Эффективная температура — это температура, удовлетворяющая закону Стефана-Больцмана для звезды (с радиусом R):

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{SB} T_{eff}^4 \quad (10.2)$$

где σ_{SB} — константа Стефана-Больцмана.

Как правило, наблюдаемые диаграммы Герцшпрунга-Рассела строятся путем определения звёздной величины звёзд в различных диапазонах. Видимая звёздная величина m_b звезды в диапазоне b вычисляется на основе ее потока F_b :

$$m_b = -2.5 \log_{10} \frac{F_b}{F_{b,0}} \quad (10.3)$$

where we must first define a zero point for this filter $F_{b,0}$. The *absolute magnitude* M_b of the star is defined as its apparent magnitude observed at a distance of 10 pc:

$$M_b = m - 5 \log_{10} \left(\frac{d}{1 \text{ pc}} \right) + 5 \quad (10.4)$$

Затем можно определить несколько цветов для звезды, вычитая видимые звездные величины из двух полос фильтра. Эффективная температура звезды связана с ее цветом, а ее абсолютная звездная величина является мерой светимости, поэтому можно построить диаграмму Герцшпрунга-Рассела, используя график цветовой звездной величины (см. рис. 10.2).

Расстояние, на котором звезда находится на главной последовательности, указывает на ее массу, причем более массивные звезды занимают верхние левые области.

Слияние водорода в гелий происходит либо по протон-протонной цепи, либо по циклу CNO (где C, N и O обозначают соответствующие элементы углерод, азот и кислород). Основная протон-протонная (pp) цепь синтезирует

гелий непосредственно из водорода (образуя гелий-3 в качестве промежуточного этапа), в то время как три других пути рр-цепи основаны на присутствии следовых количеств бериллия и лития. Цикл CNO — это каталитический процесс, в котором углерод, азот и кислород непрерывно регенерируются по мере превращения водорода в гелий.

В период нахождения на главной последовательности звезда использует энергию, выделяемую в результате ядерного синтеза, для создания теплового давления, противодействующего гравитационному коллапсу, что приводит к стабильности звезды. Со временем, по мере того как звезда продолжает превращать водород в гелий, локальные запасы водорода в ядре начинают истощаться. Как только водород в ядре исчерпывается, звезда временно теряет свой основной источник энергии, который являлся важным балансом против силы гравитации. Именно на этом этапе звезда покидает главную последовательность.




Рисунок 10.2 Диаграмма Герцшпрунга-Рассела, построенная на основе данных Gaia Data Release 1. Обратите внимание, что эффективная температура (ось x, где в качестве показателя используется спектральный цвет) увеличивается справа налево. Большинство звезд расположены вдоль главной последовательности (центральная полоса), а более развитые звезды перемещаются в верхнюю правую часть диаграммы. Источник: ESO

Мы можем оценить продолжительность жизни звезды на главной последовательности, рассмотрев механизм генерации энергии (ядерный синтез) и доступное топливо. Если мы можем представить эффективную температуру T_{eff} и радиус R как функцию массы звезды, мы можем использовать уравнение (10.2) для вывода соотношения масса-светимость.

Упрощенный вывод будет выглядеть следующим образом. Рассмотрим сначала условие гидростатического равновесия, согласно которому сила давления, обусловленная тепловой энергией от ядерного синтеза, уравнивается силой гравитации:

$$dP - Gm(r)\rho(r)dr = -r^2 \quad (10.5)$$

Для простоты предположим, что звезда имеет равномерную плотность ρ , и будем рассматривать только пропорциональную зависимость. Мы можем сразу же подставить

$$m(r) = 4\pi r^3 \rho \quad (10.6)$$

и проинтегрировать уравнение (10.5) от ядра до внешнего радиуса R , получив среднее давление

$$\langle P \rangle \propto \frac{GM^2}{4\pi R^4} \quad (10.7)$$

Подставляя закон идеального газа:

$$P = nk_B T = \frac{\rho k_B T}{\mu m_H} \quad (10.8)$$

дает выражение для $T(R)$:

$$k_B T \propto \frac{GM\mu m_H}{R} \quad (10.9)$$

Приведенное выше выражение отражает, что система находится в равновесии, и что локальная тепловая энергия приблизительно равна локальной потенциальной энергии. Подставляя R и T в уравнение (10.2), получаем

$$L \propto M^{3.33} \quad (10.10)$$

Истинное соотношение осложняется градиентами плотности и температуры в звёздах, которые зависят от того, какие реакции ядерного синтеза происходят в ядре, и от наличия конвективных слоев. Наблюдаемые соотношения на главной последовательности следующие (Duric, 2004):

$$\frac{L}{M} = \left(\frac{M}{M}\right)^{L^4} \frac{M}{0.43M} \geq \quad (10.11)$$

$$\frac{L}{M} = 0.23 \left(\frac{M}{M}\right)^{2.3} \quad M < 0.43M \quad (10.12)$$

Продолжительность жизни основной последовательности можно оценить, используя простое соотношение между скоростью потребления и запасом топлива:

$$\tau_{MS} = \frac{M}{L} \quad (10.13)$$

где параметр отражает тот факт, что не вся масса звезды доступна для ядерного синтеза. Следовательно, соотношение масштабирования имеет вид:

$$\tau_{MS} = \left(\frac{M}{M}\right)^{\tau_{MS-3}} \frac{M}{0.43M} \geq \quad (10.14)$$

$$\tau_{MS-1.3} = \left(\frac{M}{M}\right) \frac{0.43M}{M} \quad M < \quad (10.15)$$

Более массивные звезды имеют более короткий период жизни на главной последовательности. Период жизни Солнца на главной последовательности τ_{MS} составляет ≈ 10 млрд лет. Следует отметить, что при критическом значении $M = 0,43 M_{\odot}$ период жизни на главной последовательности составляет 125 млрд лет, что соответствует почти десятикратному возрасту Вселенной! Напротив, при $M = 8 M_{\odot}$ период жизни на главной последовательности относительно короткий — 20 миллионов лет.

Поскольку температура ядра медленно повышалась на протяжении всего периода жизни звезды на главной последовательности, когда ядро прекращает термоядерный синтез водорода, оболочка ядра может

продолжать существовать. Повышенная температура в оболочке гарантирует, что энергия, производимая оболочкой, превышает энергию, производимую во время фазы главной последовательности. Большая часть этой дополнительной энергии поглощается внешней оболочкой, что приводит к ее расширению.

Это охлаждает звезду, снижая ее эффективную температуру. Для звезд массой менее $1 M_{\odot}$ это приводит к перемещению звезды вдоль ветви субгигантов к ветви красных гигантов (RGB). Более массивные звезды, как правило, очень быстро перемещаются вдоль ветви субгигантов, что приводит к разрыву на диаграмме Герцшпрунга (известному как «щель Герцшпрунга»; см. Рисунок 10.3).

По мере роста содержания гелия в ядре его масса в конечном итоге превышает предел Шёнберга-Чандрасекара, и оно больше не может поддерживать себя гидростатически, что приводит к немедленному коллапсу ядра. Дальнейшие действия зависят от силы гравитации звезды, то есть от её массы. Звёзды можно разделить на три группы:

Звёзды малой массы: $0.8\text{--}2M_{\odot}$. Образуется гелиевое ядро, поддерживаемое давлением электронного вырождения — квантово-механическим эффектом, который запрещает электронам в ядре занимать одно и то же квантовое состояние (принцип исключения Паули; см. раздел 10.5). Затем звезда переходит в фазу красного гиганта, прежде чем подняться по асимптотической ветви гигантов (AGB). После рассеивания внешней оболочки ветром и другими процессами конечным продуктом является белый карлик.

Звёзды промежуточной массы: $2\text{--}8M_{\odot}$. Будучи маломассивными звёздами, они также поднимаются по стадии асимптотической ветви гигантов, но эти объекты способны к термоядерному синтезу гелия, образуя вырожденное углеродно-кислородное ядро. Конечным продуктом является углеродно-кислородный белый карлик.

Звёзды большой массы: $>8M_{\odot}$. Они продолжают синтезировать углерод в невырожденном ядре. Возможно, они продолжают синтезировать более тяжелые элементы периодической таблицы до тех пор, пока не достигнут железа. Синтез железа требует энергии, а не производит её, поэтому необратимый коллапс ядра приводит к сверхновой типа II.

Звезды очень малой массы (от 0.08 до $0.3 M_{\odot}$) проходят совершенно иную эволюцию из-за наличия конвекции. Звезды массой менее $0,3 M_{\odot}$ полностью конвективны, поэтому они могут использовать конвекцию для полного перемешивания водорода и гелия. В этом случае ядро больше не истощает

свой запас водорода, а пополняет его из вещества оболочки и фактически никогда не покидает главную последовательность.




Рисунок 10.3 Эволюция звезды массой 1M (сплошная линия) и звезды массой 5M (пунктирная линия) на диаграмме Герцшпрунга. Мы начинаем движение с обеих звезд на главной последовательности (через ветвь субгигантов к ветви красных гигантов (RGB)). Звезда массой 1M эволюционирует вдоль главной последовательности и, начиная с главной последовательности, начинает термоядерный синтез гелия в своем ядре, затем опускается вниз и присоединяется к асимптотической ветви гигантов (AGB), которая точно следует за RGB. Достигнув вершины AGB (когда горение гелия в ядре прекращается), звезда эволюционирует в сторону фазы планетарной туманности/белого карлика (не показано на графике). Звезда массой 5M быстро перескакивает через «синюю петлю», прежде чем присоединиться к AGB, поскольку она способна начать термоядерный синтез гелия в углерод еще до того, как покинет RGB. Данные получены в рамках проекта MESA Isochrones and Stellar Tracks с использованием кода MESA для моделирования эволюции звезд.

Объекты с массой менее $0.08 M_{\odot}$ не способны завершить ни pp-цепь, ни цикл CNO, и, следовательно, не могут превращать водород в гелий. Однако они способны осуществить второй этап pp-цепи, где водород сливается с одним из своих изотопов, дейтерием (который содержит дополнительный нейтрон):



Объекты в этом диапазоне называются коричневыми карликами. Эти объекты намного холоднее звезд, и их атмосферы состоят преимущественно

из молекул, пыли и облаков, подобно газовым гигантам. Действительно, в настоящее время, по-видимому, существует непрерывный спектр объектов от нескольких масс Юпитера (т.е. $\sim 0.001 M_{\odot}$), через диапазон коричневых карликов массой в десятки масс Юпитера ($\sim 0.01 M_{\odot}$), вплоть до звёзд массой $0.1 M_{\odot}$.

Приведенное выше описание звездной эволюции, даже в кратком виде, является неполным, поскольку оно относится к одиночным звёздам. Считается, что примерно половина звёзд Млечного Пути существует в составе двойных систем (Duquennoy and Mayor, 1991; Raghavan et al., 2010). Если двойная система относительно компактна, то есть звезды находятся достаточно близко друг к другу, то они могут обмениваться массой. Поскольку свойства звёзд сильно зависят от их массы, этот перенос массы может значительно изменить траекторию эволюции звезды. Полное описание эволюции на стадии до главной последовательности, главной последовательности и после главной последовательности заслуживает нескольких учебников и выходит далеко за рамки данной работы, но мы выделим некоторые важные факторы звездной эволюции, которые могут повлиять на обитаемость планет.

10.3 Гибель от звёздной эволюции

Мы рассмотрели, как звезды развиваются за пределами главной последовательности, и читателю, вероятно, очевидно, что мощные звездные взрывы и резкие изменения в звездной структуре могут разрушить биосферы. Мы рассмотрим эти возможности в следующих разделах, но нам должно быть ясно, что среда обитания, вероятно, будет разрушена, даже если звезды остаются на главной последовательности.

Конечно, это было подробно исследовано на примере Солнца. Поскольку Солнце превращает водород в гелий в результате термоядерного синтеза, его температура (и светимость) неуклонно возрастают. Мы можем увидеть это, рассмотрев среднюю молекулярную массу μ в уравнении (10.9) – термоядерный синтез водорода в гелий увеличивает μ , следовательно, увеличивает T (и, соответственно, L согласно уравнению 10.2).

В этом кроется парадокс «слабого молодого Солнца» — вскоре после образования Земли светимость Солнца составляла лишь около 75% от её нынешнего значения. И наоборот, она определяет будущую судьбу жизни на Земле. Мы можем приблизительно оценить эту эволюцию светимости следующим образом (Schröder and Cannon Smith, 2008):

$$L(t) = 0.7 + 0.144 t L_{*,\odot}^{10.17} \text{ ГВт } L$$

Из наших расчетов обитаемой зоны в разделе 4.2 ясно, что обитаемая зона Солнечной системы со временем будет смещаться наружу, и поверхность Земли в конечном итоге станет слишком горячей для большинства форм жизни, включая человеческую цивилизацию.

В серии статей О'Малли-Джеймс и его коллеги исследовали то, что они называют «лебединой песней биосферы» Земли (O'Malley-James et al., 2013, 2014). По мере повышения температуры планеты увеличивается скорость выветривания силикатных пород, что приводит к поглощению большего количества углерода из атмосферы и снижению уровня углекислого газа. Фотосинтез требует минимального уровня CO₂ — как только этот нижний уровень достигается, производство кислорода окончательно прекращается, и содержание кислорода в атмосфере истощается. Это означает конец для большинства форм многоклеточной жизни, причем первыми исчезают крупные млекопитающие и птицы, за ними следуют их более мелкие сородичи.

Рыбы, амфибии и рептилии более устойчивы к повышению температуры, но по мере того, как океаны начинают превращаться в пар, эти позвоночные также начинают вымирать. В конце концов, насекомые и другие беспозвоночные тоже погибнут, оставив после себя микробный мир примерно через 0.1 млрд лет после того, как первые фотосинтезирующие организмы перестанут существовать.

С течением времени даже микробы достигают своего предела и перестают существовать, оставляя только экстремофильные организмы, которые в конечном итоге погибают, когда океаны переходят в фазу быстрого испарения. Водяной пар фотодиссоциирует под действием УФ-излучения, создавая водородно-кислородную атмосферу, которая существует (геологически) недолго..

Большинство исследований сходятся во мнении (см., например, Rushby et al., 2013), что конец биосферы Земли наступит примерно через 1.75 млрд лет, за 3.5 млрд лет до того, как Солнце покинет главную последовательность (Решение R.10). Это конец Земли как среды обитания для жизни, но можно утверждать, что разумная жизнь сможет создать новые среды обитания либо на других планетах, расположенных на большем расстоянии от родительской звезды, либо в межпланетном пространстве. Это может дать предприимчивым цивилизациям дополнительное время, но такие планы обеспечат существование только до тех пор, пока звезда остается на главной последовательности.

10.4 Гибель от красного гиганта

По мере того, как звезды малой и средней массы сходят с главной последовательности и начинают гореть водородной оболочкой, они переходят в ветвь красных гигантов (RGB) диаграммы Герцшпрунга-Рассела. Звезда начинает остывать, поскольку её основной источник температуры (ядро) становится неактивным. Оболочка звезды начинает расширяться благодаря зеркальному принципу. Это расширяющееся вещество может разрастись до огромных размеров по сравнению с размером звезды-прародителя на главной последовательности, что обеспечивает дальнейшее увеличение светимости звезды.

Как только в ядре звезды начинается термоядерный синтез гелия, температура звезды снова начинает повышаться, а её оболочка начинает сжиматься, уменьшая общую светимость. Характер этой фазы горения гелия зависит от массы звезды.

Например, как только Солнце достигнет стадии красного гиганта, ожидается, что его радиус увеличится с $1R$ до примерно $10R$ во время восхождения на стадию красного гиганта, а затем до $100R$ во время восхождения на стадию асимптотической ветви гигантов, при этом светимость увеличится до $30L$ (при этом эффективная температура снизится примерно до 2000 K ; см. рис. 10.3).

Другими словами, Солнце в конечном итоге расширится как минимум до орбиты Венеры, а скорее всего, до орбиты Земли на расстоянии 1 а.е. , при этом скорость потери массы из-за звёздных ветров будет возрастать. Как мы уже обсуждали в предыдущем разделе, биосфера Земли исчезнет задолго до того, как это произойдёт. Если люди всё ещё существуют в Солнечной системе в эту эпоху, они, должно быть, уже переместились на более благоприятные планеты/луны/среды обитания.

Обитаемая зона солнцеподобных звёзд в фазе красных гигантов, конечно, находится гораздо дальше, чем во время главной последовательности. Расстояние до внутренней и внешней границ обитаемой зоны можно легко оценить, если известен критический поток солнечной радиации на каждой границе (SHZ_{in} , SHZ_{out}), тогда внутренний и внешний радиусы обитаемой зоны определяются следующим образом:

$$r_{HZ,in} = \sqrt{\frac{L}{4\pi SHZ_{out}}} \quad (10.18)$$

Увеличение светимости в тридцать раз привело бы к расширению границ обитаемой зоны примерно в 5 раз, то есть до орбиты Юпитера и его спутников в Солнечной системе. Конечно, это упрощенный анализ, и для

получения правильного результата необходим полный расчет переноса излучения с учетом изменения температуры и спектра звезды. Важно отметить, что по мере эволюции звезды в новых областях планетной системы достигаются температуры, подходящие для жизни земного типа.

Однако эволюция звезды имеет последствия для орбитальной стабильности. Масса Солнца была относительно сконцентрирована в центре Солнечной системы во время фазы главной последовательности. Теперь эта масса перераспределяется по значительно большему объему, и значительная ее часть теряется в результате звездных ветров. Это перераспределение массы изменяет гравитационное поле, присутствующее в Солнечной системе.

Что произойдет дальше, можно определить с помощью компьютерного моделирования. N-Body модели планетных систем по мере потери звездой массы могут достигать новых уровней сложности — в зависимости от характера потери массы уравнения движения для N-Body расчета могут быть записаны как минимум 22 способами!

В качестве примера можно выбрать достаточно простой набор условий. Рассмотрим звезду с одной планетой, где оба тела способны терять массу. Типичный расчет для двух тел имеет следующее уравнение движения:

$r_{HZ,out}(10.19)$

$$\frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = -G(M_1 + M_2) \frac{\mathbf{r}_i}{r_i^3} \quad (10.20)$$

Аналогичный расчет можно применить и в этом случае, при условии, что M_1 и M_2 являются функциями времени. Если предположить, что потеря массы изотропна, то результирующее уравнение примет вид (Omarov, 1962; Hadjidemetriou, 1963):

$$\frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = -G(M_1(t=0) + M_2(t=0)) \frac{\mathbf{r}_i}{r_i^3} - \frac{1}{2(M_1(t) + M_2(t))} \frac{d(M_1 + M_2)}{dt} \mathbf{r}_i \quad (10.21)$$

Этот результат является прямым применением правила произведения при дифференцировании скорости d/dt . Первый член представляет собой стандартное ускорение, обусловленное изменением положения, а второй член описывает возмущение, вызванное изменением массы объекта. Если мы предположим, что тело 1 теряет массу, а масса тела 2 остается неизменной, то ускорение тела 2 медленно возрастает. В результате его большая полуось орбиты также увеличивается. Эволюция эксцентриситета не совсем гарантирована, но верно то, что расстояние перицентра $a(1-e)$ также увеличивается (see the review by Veras, 2016).

Этот результат легко применим и к нескольким телам (если мы снова предположим, что только одно тело теряет массу изотропно):

$$\frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = -G \frac{\sum_i M_i(t=0)}{r^3} - \frac{1}{2 \sum_i M_i(t)} \frac{dM_i}{dt} \quad (10.22)$$

Если потеря массы анизотропна, то ситуация ещё больше осложняется (хотя предположение об изотропии кажется относительно безопасным для планетных систем в пределах нескольких сотен астрономических единиц от звезды). Из приведённого выше уравнения можно сделать некоторые общие выводы о динамической стабильности планетных систем после главной последовательности. Каждое тело в системе будет увеличивать как свою большую полуось, так и расстояние до перицентра. Поскольку большая полуось каждого тела будет эволюционировать с разной скоростью в зависимости от его массы и расстояния от звезды, это, весьма вероятно, приведёт к пересечению орбит, что неизбежно вызовет сильные гравитационные взаимодействия. Вполне возможно, даже вероятно, что планеты будут выброшены из системы на этом этапе.

После фаз красной ветви гигантов (RGB) и асимптотической ветви гигантов (AGB) звезда потеряет значительную часть своей массы и перейдёт в фазу белого карлика. Белые карлики чрезвычайно плотны, содержат около солнечной массы вещества в радиусе порядка Земли. Это относительно стабильные объекты, обычно состоящие из углерода и кислорода, которые остывают с температурой 10^4 К за время, сопоставимое с возрастом Вселенной, благодаря давлению электронного вырождения (в отличие от давления нейтронного вырождения, которое поддерживает нейтронные звезды).

К моменту достижения фазы белого карлика планетные системы «распаковываются» в стабильные или нестабильные конфигурации в зависимости от исходной конфигурации системы. Система может стать нестабильной на очень поздних стадиях или «переупаковаться» в стабильную конфигурацию, которая сохраняется очень долго (по крайней мере, до возраста Вселенной). Обитаемая зона вокруг белых карликов эволюционирует очень медленно, хотя сейчас она находится на гораздо меньших расстояниях, чем во время фазы красного гиганта (Barnes and Heller, 2013).

Тогда главный вопрос: смогут ли разумные цивилизации пережить этот хаос? В литературе по SETI часто предполагается, что космические цивилизации покинут звезды, как только они покинут главную

последовательность, но нам следует пересмотреть возможность того, что некоторые виды могут предпочесть остаться. Хотя планеты в обитаемой зоне главной последовательности подвергаются серьезному риску поглощения звездой на стадии после главной последовательности или выброса из звездной системы в результате динамической неустойчивости, несложно придумать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, позволяющие крупномасштабным искусственным обитаемым станциям пережить этот кризис. Предполагая, что орбита, сильно наклоненная к эклиптике их звездной системы, снизит вероятность столкновения с другой планетой, необходимо будет тщательно контролировать эволюцию родительской звезды, чтобы обеспечить правильное поддержание орбиты станции и сохранение подходящей радиационной обстановки.

В рамках этого кризиса могут даже открыться новые возможности. Энергетическая отдача центральной звезды значительно возрастает, что всегда имеет преимущества при правильном использовании. Звездный ветер может стать ценным источником водорода, гелия и других высокоэнергетических частиц. Значительный нагрев астероидов и других тел усиленным радиационным полем может открыть новые возможности для добычи материала. Наконец, столкновение и разрушение планетных тел могут обеспечить доступ к материалу, который в противном случае был бы недоступен. Развитые цивилизации, возможно, смогут добывать ресурсы из ядер и мантий планет земной группы после катастрофических столкновений.

10.5 Гибель от сверхновой

Гибель относительно массивных звёзд приводит к потрясающим взрывам, известным как сверхновые. Эти взрывы не только приводят к образованию грандиозного остатка сверхновой, но и производят большое количество высокоэнергетических фотонов, космических лучей и нейтрино, которые могут воздействовать на планеты на довольно большом расстоянии. Сверхновые обычно делятся на два типа.

10.5.1 *Tun Ia* (Белые карлики Nova)

Истинные прародители сверхновых типа Ia остаются предметом жарких споров. Существуют два лагеря, оба предполагают, что за взрыв сверхновой ответственны белый карлик и его компаньон. Оба лагеря согласны с тем, что источником взрыва сверхновой является масса белого карлика, превышающая так называемый предел Чандрасекара. Другими словами, для возникновения сверхновых типа Ia необходимы маломассивные звезды и источник аккреционного материала.

За границей предела Чандрасекара давление электронного вырождения больше не может защитить белый карлик от коллапса. Это можно увидеть, оценив давление электронного вырождения при двух предположениях:

1. Принцип исключения Паули, который допускает наличие не более одного электрона в каждом квантовом состоянии, и
2. Принцип неопределенности Гейзенберга, который ограничивает наше одновременное знание положения частицы x и импульса p , которое может быть выражено через неопределенности каждой величины

$$xp \approx h \quad (10.23)$$

Предположим, что давление, создаваемое электронным газом, определяется стандартным результатом кинетической теории газов:

$$P = \frac{1}{3} n_e p v \quad (10.24)$$

Для простоты предположим, что все электроны имеют одинаковую скорость v , и мы можем просто связать плотность числа электронов n_e с положением: $x \approx n_e^{-1/3}$. Принцип неопределенности Гейзенберга тогда позволит нам оценить типичный импульс электрона

$$p \approx \hbar n_e^{1/3} \quad (10.25)$$

В нерелятивистском случае скорость $v = p/m_e$ равна просто $v = p/m_e$ и таким образом

$$P \approx \frac{n_e p^2}{3m_e} = \frac{\hbar^2 n_e^5}{3m_e} \quad (10.26)$$

Это дает соотношение $P \propto \rho^{5/3}$, которое, как можно показать, является динамически устойчивым, т.е. небольшое возмущение приведет к возвращению системы в динамическое равновесие. Однако это допустимо только в том случае, если скорость электрона намного ниже c . По мере увеличения массы белого карлика радиус уменьшается, и, следовательно, v продолжает увеличиваться, пока мы не достигнем релятивистского предела: $v = c$ и $P \propto \rho^{4/3}$ (10.27)

Это уравнение состояния $P \propto \rho^{4/3}$ не является динамически устойчивым, и любое возмущение приведет к коллапсу. Подробный расчет показывает, что это изменение уравнения состояния, предел Чандрасекара, происходит при $M = 1.44 M_\odot$, и, следовательно, любой белый карлик, превышающий эту массу, станет неустойчивым.

Среди астрономов широко распространено мнение, что белый карлик, превышающий этот предел Чандрасекара, взорвется как сверхновая типа Ia (Maoz and Mannucci, 2012; Wang and Han, 2012). Разногласия

возникают из-за того, как белый карлик аккрецирует вещество, необходимое для превышения этого предела.

Гипотеза единственного вырожденного (SD) объекта предполагает, что белый карлик аккрецирует вещество от невырожденного компаньона, такого как звезда главной последовательности или гигант. По мере того, как эта аккреция выводит массу белого карлика за пределы предела Чандрасекара, белый карлик взрывается в результате теплового разгона. Белый карлик может получать вещество либо за счет гравитационного притяжения, либо за счет ветров, генерируемых компаньоном. Критики этого процесса указывают на то, что процесс аккреции требует тонкой настройки – слишком интенсивный аккреционный поток приводит к ударному нагреву, который препятствует сжатию аккретора и достижению массы Чандрасекара. Аналогично, низкая скорость аккреции приводит к тому, что вещество остается на поверхности белого карлика. Медленное накопление этого вещества приводит к быстрому всплеску термоядерного синтеза водорода на поверхности белого карлика, удаляя массу посредством излучения и выбросов.

В противоположном сценарии двойного вырождения (ДВ) двойная система белых карликов теряет угловой момент и энергию, что позволяет двум звездам сближаться по спирали и сливаться. Конечным результатом слияния может стать один белый карлик, который значительно превышает предел Чандрасекара и воспламеняется, или один белый карлик разрывается другим под действием приливных сил. Затем остатки одного быстро аккрецируются другим, пока не достигнут предела Чандрасекара. Критики отмечают, что слияния белых карликов могут привести к образованию сверхновой с коллапсом ядра, а не сверхновой типа Ia (см. следующие разделы). Поиски двойных систем белых карликов, которые могли бы выступать в качестве прародителей сверхновых ДВ, пока не дали подходящих кандидатов, хотя эти поиски, как показывает практика, неполны и подвержены эффектам отбора.

10.5.2 *Tun II Supernovae (Core-Collapse)*

Такова судьба звезд массой 8M и более (Смартт, 2009). Эти массивные звезды могут продолжать производить все более тяжелые элементы посредством ядерного синтеза. Начиная с фазы главной последовательности, когда водород горит, образуя гелий, начинается горение гелия, в результате которого образуется преимущественно углерод, затем – углерод, в результате которого образуется преимущественно кислород, затем – кислород, в результате которого образуется

преимущественно кремний, и, наконец, кремний, в результате которого образуется преимущественно железо. По мере образования каждого более тяжелого элемента (наряду с другими элементами, такими как неон, натрий и магний), выделяется все меньше и меньше энергии на грамм реагента.

Как только в ядре начинается синтез железа, энергетический баланс ядерного синтеза изменяется: энергия, необходимая для синтеза железа, становится больше, чем энергия, производимая синтезом (эндотермическая реакция синтеза). Баланс между тепловым давлением от синтеза и гравитационными силами нарушается, и начинается коллапс, первоначально очень похожий на коллапс маломассивных звезд.

Однако массивные звезды обладают гораздо более разнообразным арсеналом элементов внутри себя. Ядра массивных звезд на этой стадии напоминают луковую шелуху: внешний слой из материала, сжигающего водород, скрывает гелий, а под ним находится оболочка, также сжигающая гелий, и так далее (Рисунок 10.4).

Вместо продолжения термоядерного синтеза железо может быть разрушено путем фотодезинтеграции, при которой фотоны стимулируют деление железа на гелий. Дальнейшая дезинтеграция приводит к образованию плотной плазмы из протонов и нейтронов.




Рисунок 10.4 «Лукообразная» структура звезды с массой более 800 мкг/м^3 состоит из различных элементов, подвергающихся «сжиганию оболочек», которые затем сливаются, образуя следующий слой M . Элементы располагаются в последовательности H , He , C , O , Si , Fe (другие элементы встречаются в относительно небольших количествах). Железо не может быть успешно синтезировано, поскольку реакция синтеза становится эндотермической.

Под сильным давлением ядра свободные электроны, которые поддерживали ядро за счет давления электронного вырождения, теперь соединяются с протонами, образуя нейтроны:



Ядро излучает значительное количество энергии в виде электронных нейтрино (ν_e) и полностью теряет поддержку давления электронного вырождения. Внутреннее железное ядро начинает коллапсировать, в конечном итоге превышая локальную скорость звука и отрываясь от остальных слоев ядра, напоминающих луковицу. В конце концов, принцип Паули препятствует занятию нейтронами идентичных квантовых состояний (давление нейтронного вырождения). Ядро отскакивает, посылая ударную волну вверх от ядра

Нейтрино, испускаемые во время коллапса, образуют нейтриносферу за ударной волной, обладающую суммарной энергией около 10^{46} джоулей. Примерно 1–5% этой энергии передается ударной волне, генерируя огромную кинетическую энергию и вызывая наблюдаемый взрыв. Около 10^{42} джоулей высвобождается в виде фотонов, что позволяет сверхновой на короткое время излучать в 100 раз больше, чем Солнце за все время своего существования.

Если начальная масса звезды меньше примерно $25 M_{\odot}$, нейтронное ядро стабилизируется, образуя нейтронную звезду. Обычно они сжимают около $1 M_{\odot}$ нейтронов в объект радиусом в несколько десятков километров. Нейтронные звезды обязаны своим существованием давлению вырождения нейтронов и не могут существовать с массой более примерно $3 M_{\odot}$. Если эта масса превышена, нейтронная звезда коллапсирует в черную дыру. Звезды с начальной массой более $25 M_{\odot}$ непосредственно образуют черную дыру во время сверхновой с коллапсом ядра. Эти сверхновые (иногда называемые гиперновыми) производят столь же большое количество нейтрино, как и их собратья, образующие нейтронные звезды. В зависимости от геометрии взрыва, гиперновые могут продолжать светить чрезвычайно ярко, если они образуют аккреционный диск из остатка звезды (см. раздел 11.2).

Осмелится ли цивилизация оставаться в непосредственной близости от такого взрыва? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько хорошо межпланетные обитаемые станции и космические аппараты смогут отражать и отклонять интенсивное излучение и космические лучи от сверхновой. Минимальные безопасные расстояния для планетных тел хорошо обсуждаются в литературе (см. раздел 11.3), но минимальное безопасное расстояние для космического аппарата изучено гораздо меньше.

Остатки звезды после сверхновой представляют интерес для космических цивилизаций. Нейтронные звезды являются потенциальными местами для довольно мощных сфер Дайсона (Osmanov, 2018, см. раздел 2.2.1). Частота пульсара может использоваться в качестве высокоточных

часов, образуя основу для относительно простой, но очень точной галактической навигационной системы (Downs, 1974; Becker et al., 2013). Их мощное излучение может использоваться в качестве средства связи для синхронизации направленной связи между ранее не общавшимися цивилизациями (Edmondson and Stevens, 2003). Межзвездные исследователи также могут использовать чрезвычайно мощное гравитационное поле в непосредственной близости от нейтронной звезды для ускорения космических аппаратов (см. раздел 19.3.7).

10.6 Тесное сближение звёзд

Эволюция орбит звезд в галактическом потенциале гарантирует, что расстояние между любыми двумя звездами может значительно изменяться со временем. Как мы обсуждали в разделе 8.2, наиболее вероятно, что кометы, прибывающие к Земле из облака Оорта, делают это из-за галактического прилива и возмущений от звезд, сближающихся с Солнечной системой. Галактический прилив, как правило, доминирует в вековой эволюции кометных орбит и является основным фактором столкновения со звездами во внутренней Солнечной системе. Однако стохастичность звездных столкновений позволяет облаку Оорта сохранять изотропную природу. Кроме того, галактическому приливу трудно выводить кометы с расстоянием $< 20\,000$ астрономических единиц во внутреннюю Солнечную систему — необходимы столкновения, и такие звезды должны приблизиться на расстояние менее 4×10^5 астрономических единиц, чтобы вызвать такое поведение.

Точная природа галактического прилива и вероятность сближений звезд на расстоянии менее 1 пк сильно зависят от положения звезды. Ситуация еще больше осложняется тем, что звезды могут совершать значительные радиальные миграции в галактическом диске. Например, недавние моделирования показывают, что Солнце могло сместиться на 5–6 кпк по радиусу от своего нынешнего положения. Мартинес-Барбоса и др. (2017) рассчитали частоту сближений звезд вдоль орбитальной траектории Солнца (для сближений менее 4×10^5 а.е.), которая составляет от 20 до 60 сближений в миллион лет в зависимости от точной природы траектории (миграция внутрь, наружу или ни то, ни другое).

Эти расчеты теперь можно сопоставить с растущим объемом данных о положениях и собственных движениях звезд. Астрометрический обзор *Hipparcos* выявил несколько звезд, которые пройдут на расстоянии менее 1 пк от Солнца (например, GL 710, которая приблизится на расстояние менее 0,34 пк, или 70 130 астрономических единиц от Солнца, примерно через 1

миллион лет). Совсем недавно было показано, что маломассивная двойная система, известная как «звезда Шольца» (WISE J072003.20-084651.2), прошла на расстоянии всего 52 000 астрономических единиц всего 70 000 лет назад. Эта орбита глубоко проникла бы в облако Оорта и, вероятно, вызвала бы значительный кометный дождь во внутренней части Солнечной системы (Mamaĵek et al., 2015).

Какие опасности может повлечь за собой особенно тесное сближение звезд? Основные угрозы обитаемости, связанные со сближениями звезд, заключаются в следующем:

1. разрушение протопланетных дисков, препятствующее или нарушающее процесс формирования планет;
2. возмущение орбит в планетной системе, которое может либо изменить орбиту обитаемой планеты и сделать её непригодной для жизни, либо вызвать сближения между соседними планетами. Эти взаимодействия планет могут привести к столкновению или даже выбросу планет из системы; и, наконец, как мы уже говорили,
3. возмущение кометных облаков, которое может выбросить большое количество потенциальных объектов столкновения во внутреннюю часть Солнечной системы.

Мы можем оценить последствия конкретного сближения, применив приближение импульса. Например, мы можем оценить изменение скорости Солнца при сближении, используя формулу:

$$v = \frac{2GM_s}{qv} \quad (10.29)$$

где M_s — масса сталкивающейся звезды, q — расстояние ближайшего сближения (иногда называемое расстоянием промаха), а v — относительная скорость между двумя звёздами. Затем мы можем сравнить это изменение скорости с типичной орбитальной скоростью, чтобы определить, достаточно ли силен результирующий импульс, чтобы нарушить орбиту.

Для столкновений звёзд с достаточно малым расстоянием промаха, чтобы нарушить планетные системы (т.е. q в несколько сотен астрономических единиц), нам требуются гораздо более высокие плотности звезд. Например, такие плотности существовали бы в скоплении, в котором Солнце образовалось вскоре после своего формирования. В течение жизни скопления существовала бы примерно 20% вероятность того, что произошло бы столкновение на расстоянии промаха в 200 астрономических единиц (т.е., в течение примерно 100 миллионов лет).

Мы можем оценить частоту сближений для заданного расстояния промаха q , рассмотрев цилиндр того же радиуса, окружающий траекторию нашей звезды по мере ее движения через скопление. Длина цилиндра будет пропорциональна vt , где v — скорость звезды, а t — рассматриваемый временной интервал, и, следовательно, его объем будет равен $\pi q^2 vt$. Среднее число сближений, происходящих за интервал времени t , когда звезда проходит область со звездной плотностью n , равно

$$N = \pi q^2 v n t \quad (10.30)$$

А временные рамки встречи можно определить, установив соответствующие параметры $N = 1$:

$$\tau(q) = \frac{1}{\pi q^2 v n} \quad (10.31)$$

Если нам известна продолжительность жизни скопления и мы зададим интересующее нас расстояние промаха, то мы сможем оценить количество столкновений за это время. Моделирование молодых рассеянных скоплений показывает, что среднее число столкновений с $q = 1000$ а.е. составляет 4 (Malmberg et al., 2011), при этом 75% звезд пережили 2 или более столкновений. Большинство столкновений происходит в течение первых 10 миллионов лет существования скопления. По мере испарения скопления плотность звезд уменьшается, и частота столкновений снижается.

Ситуация значительно хуже для шаровых скоплений, которые представляют собой более старые и массивные кластеры из 10^5 – 10^6 звёзд. Однако было показано, что значительное изменение орбит и выброс обитаемых планет являются редким явлением как в рассеянных, так и в шаровых скоплениях (Stefano and Ray, 2016).

Несмотря на это, столкновения на расстоянии тысяч астрономических единиц всё ещё разрушают пояса обломков и кометные облака, и мы должны тщательно учитывать эту опасность при рассмотрении перспектив существования жизни и разума в звёздных скоплениях.

11. Гибель в масштабе Галактики?

Возможно, самые «жесткие» механизмы естественного разрушения возникают в самых крупных масштабах. В конце концов, нас интересуют жесткие решения парадокса Ферми, а жесткие решения обычно исключают из существования всё большую и большую часть потенциальных цивилизаций. Если отдельные события смогут уничтожить технологии и биологию в масштабах тысяч световых лет, это приведёт к образованию областей Млечного Пути, которые одновременно замолчат, гарантируя, что молодые цивилизации, возникающие в таком объёме, не увидят никакой разумной активности – по крайней мере, пока нет (см. раздел 18.2)

11.1 Активное галактическое ядро

Наблюдения показывают, что каждая галактика содержит в своем ядре сверхмассивную черную дыру (СМЧД, SMBH). Это справедливо и для Млечного Пути. Радиоисточник, известный как Стрелец A*, исключительно яркий и компактный, с сильно переменной рентгеновской компонентой. Комбинация радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI) и инфракрасных наблюдений с использованием адаптивной оптики показала, что вокруг Стрельца A* вращаются ионизированные облака и звезды. Серия наблюдательных кампаний, проводившихся в течение двадцати лет, предоставляет убедительные доказательства того, что эти объекты вращались вокруг Стрельца A* с высокими скоростями, ограничивая массу центрального объекта массой около 4 миллионов масс Солнца. VLBI также показала, что угловой размер источника Стрельца A* составляет около 40 мкм (Doeleman et al., 2008), подтверждая, что это вещество находится в физической области размером не более трети парсека. Компактные размеры источника дополнительно подтверждаются изменчивостью рентгеновского излучения, которое изменяется в течение нескольких дней, что дает размер структуры $r \approx ct \approx 100 \text{ AU}$

Такое расположение материи должно коллапсировать, чтобы образовать сверхмассивную черную дыру. Радио- и рентгеновское излучение, которое мы наблюдаем в Sag A*, производится материей, окружающей черную дыру. Наши исследования других галактик показали, что сверхмассивная черная дыра Млечного пути относительно пассивна. Вместо относительно безобидного ядра эти галактики обладают активными галактическими ядрами (AGN).




Рисунок 11.1 Стандартная унифицированная модель активных галактических ядер (AGN). Центральная черная дыра окружена аккреционным диском размером в несколько сотен астрономических единиц, который заключен в пылевой тор. Этот тор пронизан мощными радиоджетами и ветрами, исходящими от черной дыры, которые освещают широкие и узкие области эмиссионных линий, причем ширина эмиссионных линий, исходящих из этих областей, сильно зависит от их расстояния от черной дыры (и, как следствие, от их орбитальной скорости вокруг нее).

На рисунке 11.1 изображена классическая «единая модель» активных галактических ядер (AGN). Непосредственно вокруг центральной черной дыры находится аккреционный диск, который непосредственно питает ее. Материал в аккреционном диске медленно теряет угловой момент из-за гравитационных неустойчивостей или магнито-вращательной неустойчивости и падает в черную дыру. Этот диск окружен пылевым тором, который заслоняет черную дыру (в зависимости от ориентации наблюдателя).

Магнитные поля на внутреннем крае аккреционного диска чрезвычайно сильно закручены и выбрасывают мощные струи ионизированной плазмы. Эти струи сильно излучают в радиодиапазоне и выбрасываются вдоль полярных направлений системы черная дыра-диск. Излучение от черной дыры освещает облака газа, которые испускают либо широкие, либо узкие спектральные линии, причем ширина линии пропорциональна относительной скорости их движения вокруг черной дыры.

AGN являются одними из самых эффективных производителей энергии в локальной Вселенной. Энергия, излучаемая чёрной дырой, связана с гравитационной потенциальной энергией, теряемой веществом при аккреции. Эта аккреционная светимость составляет

$$GMM'$$

$$(11.1) \quad \frac{L_{acc}}{2R} =$$

где M' — скорость аккреции, M — масса черной дыры, R — радиус аккреции, a — эффективность излучения, обычно составляющая около 10%. Типичная черная дыра может излучать около 10–20% этой энергии в виде высокочастотного излучения (ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения). Наблюдаемые активные галактические ядра могут значительно превосходить по яркости свои галактики-хозяева в периоды активности, в некоторых случаях как фактор 10^4 (!) (Krolik, 1999).

Считается, что этот колоссальный энергетический выброс имеет важное значение для эволюции галактики. Если предположить 10%-ную эффективность энергии, выделяемой при питании и росте черной дыры массой M_{BH} , то получим

$$E_{BH} = 0.1 M_{BH} c^2 \quad (11.2)$$

Энергию связи балджа галактики можно аппроксимировать как $M_{bulge} \sigma^2$, где σ — дисперсия скоростей звёзд в балдже. Существует относительно тесная связь между массой чёрной дыры и массой балджа (Hring and Rix, 2004; Fabian, 2012):

$$M_{BH} \approx 1.4 \times 10^{-3} M_{bulge} \quad (11.3)$$

And as a result

$$\frac{E_{BH}}{E_{bulge}} \approx \frac{1.4 \times 10^{-3} M_{bulge} c^2}{M_{bulge} \sigma^2} \times \quad (11.4)$$

Галактики редко имеют $\sigma > 400$ км/с. Это подразумевает отношение E_{BH}/E_{bulge} 100. Энергия, выделяемая растущими сверхмассивными черными дырами, на несколько порядков превышает энергию связи местной галактики.

Вероятно, лишь малая часть этой энергии повлияет на галактику-хозяина, и даже в этом случае она будет в основном влиять на запасы пыли и газа. Введение такой огромной энергии в газ достаточно для предотвращения звездообразования, поскольку значительный нагрев газа разрушил бы любой холодный, плотный материал. Тот факт, что пик

звездообразования во Вселенной тесно связан с пиком активности активных ядер галактик, вряд ли является случайным совпадением.

По мере того, как галактики аккрецируют большие объемы газа, этот материал в конечном итоге теряет достаточный угловой момент, чтобы по спирали превратиться в черную дыру. Если скорость аккреции слишком велика, обратная связь от активных ядер галактик подавляет рост галактики и останавливает звездообразование. Предложенное регулирование звездообразования одним единственным объектом в центре Млечного Пути будет иметь важные последствия для того, синхронизируются ли «биологические часы» далеких планетных систем (раздел 18.2).

Наше собственное галактическое ядро, Sag A*, остается неактивным, но вполне возможно, что оно было активным в какой-то момент в прошлом. Около 1% энергии, излучаемой типичным активным галактическим ядром (AGN), приходится на относительно жесткое рентгеновское излучение. Применяя типичные соотношения для массы и светимости черной дыры в фазе AGN, было рассчитано, что Sag A* был бы таким же ярким (или ярче) Солнца в рентгеновском диапазоне (Chen and Amaro-Seoane, 2014). Звезды, вращающиеся вокруг Галактического центра на расстоянии менее 8 кпк, скорее всего, подвергались значительному облучению и, возможно, атмосферным потерям (см. раздел 11.3).

11.2 Вспышки гамма лучей

Самые мощные события, обнаруженные во Вселенной, могут на короткий момент затмить даже активное ядро галактики. Гамма-всплески (или GRB) — это вспышки интенсивного гамма-излучения, регистрируемые с частотой несколько раз в день по всему небу. Сразу после гамма-всплеска (который длится от 0.01 с до 1000 с) обычно наблюдается послесвечение в широком диапазоне длин волн, от рентгеновского до ультрафиолетового, оптического, инфракрасного и радиодиапазона.

В целом, каждый обнаруженный GRB находится в одном месте с галактикой-хозяином, что становится очевидным после последующих наблюдений. Красное смещение галактик-хозяев варьируется от относительно локальных ($z \sim 0.1$, или расстояние светимости около 0.5 Гпк) до некоторых из самых далёких небесных объектов, когда-либо обнаруженных (таких как GRB090429B на $z = 9.4$, расстояние светимости около 100 Гпк [Cucchiara et al., 2011]). Их обнаружение в таком огромном космическом диапазоне указывает на потрясающую энергию, высвобождаемую в одном всплеске. Простые оценки изотропного энергетического излучения от типичных гамма-всплесков составляют порядка 10^{45} Дж, что сопоставимо с Мс^2 , то есть с полной массой-энергией Солнца, высвобождаемой за несколько минут!

Как и в случае с активными ядрами галактик, изменчивость излучения всплеска также даёт подсказки о типичном размере события, вызывающего гамма-всплеск. Гамма-всплески демонстрируют изменчивость в миллисекундных масштабах, что предполагает диаметр в несколько сотен километров.

Гамма-всплески (GRB) можно разделить на две категории в зависимости от длительности вспышки и её спектральной жёсткости. Длительность вспышек обычно измеряется с помощью параметра T_{90} , который определяет время, когда 90% излучения GRB было получено на Земле. Спектральная жёсткость — это отношение высокоэнергетического рентгеновского излучения к низкоэнергетическому рентгеновскому излучению, причём определение высокой и низкой энергии несколько зависит от используемых инструментов.

Две популяции: короткие GRB, длительность которых составляет $T_{90} < 2$ с, и которые обычно имеют более жёсткий спектр, и длинные GRB, длительность которых больше ($T_{90} > 2$ с), и которые имеют более мягкий спектр. Эта дихотомия предполагает наличие разных прародителей для каждого типа, хотя масштабы событий приблизительно соответствуют звёздам как для длинных, так и для коротких GRB.

Считается, что длинные GRB — это коллапсары, которые образуются в результате особенно мощных сверхновых с коллапсом ядра. Рассмотрим массивную звезду (скажем, $20 M_{\odot}$), которая демонстрирует поведение Вольфа-Райе (по сути, сбрасывает свою внешнюю оболочку под действием сильных звездных ветров). Ядро звезды все еще составляет приблизительно $10 M_{\odot}$, чего достаточно для начала процесса коллапса ядра, необходимого для сверхновой типа II.

Однако во время коллапса ядра, вместо образования нейтронной звезды, ядро продолжает стремительно коллапсировать, пока в центре умирающей звезды не образуется черная дыра. Угловой момент в системе препятствует немедленному поглощению черной дырой всего окружающего звездного вещества — она может получить доступ только к материи, расположенной вблизи оси вращения системы, которая находится вдоль двух воронок. Этого все еще достаточно для обработки за относительно короткий промежуток времени. По мере того, как это вещество поступает в черную дыру, оно оставляет область низкой плотности. Диск быстро аккрецирует на черную дыру, поскольку ее энергия может быть довольно эффективно извлечена посредством аннигиляции нейтрино или интенсивных магнитных полей, генерируемых во время коллапса. Воронки низкой плотности становятся идеальным местом для запуска струи, что и наблюдается астрономами во время длительных гамма-всплесков.

Считается, что короткие гамма-всплески возникают в результате слияния двух компактных объектов. Двойные системы нейтронная звезда-нейтронная звезда (или, точнее, черная дыра-черная дыра) обычно обречены на слияние, поскольку их орбитальная энергия излучается в виде гравитационных волн (см. раздел 21.2.2). По мере сближения объектов гравитационное излучение усиливается, что приводит к все более быстрому сближению, причем заключительные моменты, вызывающие вспышку, длятся менее секунды. Конечным объектом является черная дыра с аккреционным диском массой $\sim 0.1 M_{\odot}$.

Если эти модели верны для гамма-всплесков, то мы можем сделать некоторые основные предсказания об их типичном появлении. Длинные гамма-всплески являются следствием существования массивных звезд и, следовательно, должны возникать вблизи или в активных областях звездообразования (поскольку время жизни их прародителей на главной последовательности довольно короткое). Действительно, было обнаружено несколько случаев ассоциации длинных гамма-всплесков с явными сверхновыми, возникающими в результате коллапса ядра (Galama et al., 1998;

Stanek et al., 2003), но до недавнего времени это было возможно только при низком красном смещении.


Короткие гамма-всплески не ограничены какой-либо конкретной областью галактик. По-видимому, существует корреляция между низкой металличностью и увеличением частоты гамма-всплесков в целом, но это может быть эффектом отбора, поскольку галактики с низкой металличностью также коррелируют с несколько более высоким уровнем звездообразования. Это может быть просто следствием эволюции галактик от богатых газом, бедных металлами объектов к бедным газом, богатым металлами объектам, что согласуется с тем, что гамма-всплески были более частыми в прошлом.

11.3 Реакция атмосфер терранет на события сверхвысокой энергии

Как теперь ясно, сверхновая, активное ядро галактики или гамма-всплеск, происходящие вблизи планетной системы, способны причинить огромный вред её обитателям. Но какого рода ущерба можно ожидать? Большинство исследований в этой области использовали Землю в качестве образца. Большая часть этого применима и к другим потенциально обитаемым планетам, но следует отметить, что большая часть работы в этой области чувствительна к содержанию кислорода в атмосфере. Хорошей отправной точкой для дальнейшего изучения является работа Мелотта и Томаса (Melott and Thomas, 2011), но следует отметить, что с тех пор литература значительно продвинулась вперёд.

11.3.1 UV Радиация

Реакция атмосферы Земли на увеличение доз высокоэнергетического излучения в значительной степени зависит от содержания в ней озона (O₃). Озон поглощает ультрафиолетовое излучение, расщепляясь на молекулы и атомы кислорода:



Этот процесс обратимый: молекулы кислорода могут рекомбинировать, образуя озон, и, следовательно, устанавливается атмосферное равновесие между O₂ и O₃, при этом уровни каждой молекулы зависят от падающего УФ-излучения (в диапазоне от 200 до 310 нм). Эти реакции могут дополнительно катализироваться фотолизом других

кислородсодержащих молекул, в частности NO и NO₂. В этой сети фотодиссоциации участвует большое количество веществ (см., например, таблицу 11 в работе Thomas et al., 2005a), и поэтому для расчета истощения озона, вызванного облучением атмосферы, требуются сложные численные модели, позволяющие излучению распространяться через атмосферу планеты и отслеживающие множество реакций фотодиссоциации/других реакций.

Биологический вред, наносимый ультрафиолетовым излучением, может быть значительным. В частности, поглощение УФВ-излучения вносит существенный вклад в повреждение ДНК и белков. Одноклеточные организмы наиболее подвержены этим последствиям, поскольку у них отсутствуют механизмы защиты от такого излучения. В качестве тревожного примера можно привести фитопланктон, на долю которого приходится около половины мировой фотосинтетической активности, составляющей основу океанической пищевой цепи. Таким образом, значительная доза УФВ-излучения может привести к серьезному сбою в пищевой цепи с разрушительными последствиями для всей глобальной экосистемы. (Melott and Thomas, 2009).

В экстремальных случаях, например, если звезда вращается в непосредственной близости от активного ядра галактики (АГГ), экстремальное ультрафиолетовое (XUV) излучение (энергия фотонов выше нескольких десятков эВ) может привести к потере атмосферы за счет гидродинамического уноса. Более легкие атомы и молекулы отталкиваются от планеты термически обусловленным потоком, увлекая за собой более тяжелые атомы и приводя к значительным потерям атмосферы. Было подсчитано, что планеты земной группы, вращающиеся в пределах 1 кпк от нашей сверхмассивной черной дыры Sag A*, во время ее фазы АГГ могут потерять массу атмосферы, равную массе Земли (Balbi and Tombesi, 2017). Скорость потерь зависит от степени ослабления излучения тором АГГ. Планеты, вращающиеся значительно выше галактической плоскости, могут терять значительную часть своей атмосферы даже на расстоянии до 3–4 кпк от центра Галактики.

11.3.2 Гамма и рентгеновские лучи

Некоторые из описанных выше фотохимических процессов и атмосферных потерь также могут быть вызваны гамма-лучами и рентгеновскими лучами с более высокой энергией. Они в значительной степени поглощаются атмосферой, вызывая существенную ионизацию. Это также может разрушать озон, а также многие другие молекулы (хотя и не так

эффективно, как УФ-излучение, и время их рекомбинации довольно короткое, поэтому эффект носит кратковременный характер). Поглощенные фотоны рентгеновского и гамма-излучения также могут переизлучаться в виде фотонов УФ-излучения, увеличивая общую нагрузку УФ-излучения и скорость истощения озонового слоя.

Томас и др. (Thomas et al., 2005b) рассчитали реакцию атмосферы Земли на гамма-всплеск длительностью 10 секунд на расстоянии около 2 кпк. В этом сценарии результирующая флюенция (поток, интегрированный за временной интервал) составляет приблизительно 100 кДж/м², а озоновый слой истощается примерно на 35%, главным образом из-за ультрафиолетового излучения, связанного со всплеском (локально это истощение может достигать 70%). После того, как всплеск утих, началась рекомбинация кислорода, но для возвращения к довсплесковому уровню потребовалось около десяти лет.

Истощение озона такой величины приводит к тому, что на поверхность Земли достигает в два-три раза больше ультрафиолетового излучения, что, как правило, значительно превышает допустимый уровень для большинства биологических организмов.

Это также приводит к повышению атмосферного уровня NO₂, который сильно поглощает излучение в видимом диапазоне длин волн. Временный слой NO₂ действует как охлаждающая жидкость, его уровни могут привести к усилению оледенения, а также он реагирует с ОН, образуя азотную кислоту..



которые затем могут выпадать в виде осадков на поверхность. Первоначальное снижение pH почвы было бы вредно для большинства организмов, но этот эффект быстро бы исчез. Фактически, отложение нитратов в почве привело бы к последующему повышению плодородия. Начальная вредная фаза вряд ли нанесет значительный ущерб современной биосфере (Neuenswander and Melott, 2015), поэтому выпадение нитратов в виде осадков, скорее всего, принесет чистую пользу..

11.3.3 Космические лучи

Космические лучи могут оказывать воздействие на гораздо больших расстояниях, чем фотоны высокой энергии. Ионизация атмосферы, вызванная потоком космических лучей, может значительно увеличить частоту ударов молний (Erlykin and Wolfendale, 2010), а также ускорить

истощение озонового слоя и выпадение нитратов, и изменить процесс образования облаков (Mironova et al., 2015). Эта ионизация также, вероятно, повлияет на глобальную электрическую цепь, что приведет к обратной связи с магнитным полем планеты. Поток космических лучей от сверхновой или гамма-всплеска сильно зависит от магнитного поля, находящегося между источником и обитаемой планетой. Слабое поле неэффективно отклоняет космические лучи, и поэтому поток на энергиях ТэВ-ПэВ значительно больше. Мелотт и др. (Melott et al., 2017) предполагают, что даже на расстояниях в 50 пк поток космических лучей может привести к умеренному уровню вымирания – действительно, повышенный уровень вымирания на Земле около 2,6 миллиона лет назад согласуется со сверхновой, взорвавшейся в звездной группе Тук-Хор. (Vambach, 2006).

11.3.4 Мюоны и другие вторичные частицы

Поскольку фотоны высокой энергии воздействуют на верхние слои атмосферы, можно ожидать образования атмосферных ливней из высокоэнергетических частиц в виде вторичного излучения. В основном они генерируются в гамма-вспышках, поскольку энергии фотонов сверхновых недостаточно. Действительно, длинные гамма-вспышки имеют слишком мягкий спектр, чтобы генерировать значительное количество вторичных частиц. Для энергий входящих фотонов более 1 ГэВ можно ожидать, по меньшей мере, 10^3 мюонов на 10^7 фотонов для относительно сильной гамма-вспышки с жестким спектром (Atri et al., 2014). Это приводит к относительно слабой дозе облучения для организмов, находящихся на поверхности, и поэтому считается гораздо более слабым эффектом, чем воздействие фотонов высокой энергии.

Однако поток мюонов и нейтронов, создаваемый космическими лучами, может быть более значительным. Томас и др. (Thomas et al., 2016) подсчитали, что для сверхновой на расстоянии 100 пк, где только слабое магнитное поле может возмущать траектории космических лучей, поток мюонов может превышать обычный фоновый уровень более чем в двадцать раз. Это как минимум вдвое больше средней дозы облучения в мире сегодня. Глубокое проникновение мюонов означает, что такая доза будет доставлена практически во все океаны, кроме самых глубоких..

11.3.5 Роль гелиосферного экранирования

Большая часть вышеизложенного обсуждения основывалась на некотором уровне защиты, обеспечиваемом Земле её присутствием в гелиосфере Солнца. Эта магнитная защита оберегает нас от самых сильных галактических космических лучей (ГКЛ). Если бы гелиосфера каким-то образом депрессировалась и перестала охватывать Землю, этот экранирующий эффект исчез бы, и фоновый поток космических лучей мог бы стать существенным (даже в отсутствие близлежащей сверхновой или гамма-всплеска).

Такая депрессия гелиосферы может произойти, если Солнце проходит через молекулярное облако. По оценкам, Солнечная система за время своего существования около 135 раз входила в области плотных молекулярных облаков (Talbot Jr and Newman, 1977), причём примерно 10 таких событий произошло за последние 250 млн лет. Во время этих прохождений, если плотность атомов водорода превышает $\sim 300 \text{ см}^{-3}$, этого достаточно для коллапса гелиосферы. Это позволяет увеличить (или уменьшить) поток галактических космических лучей, а также вызвать аномальные события, связанные с космическими лучами, в местах соприкосновения молекулярного газа с границей гелиосферы (на ударной волне завершения).

Если прохождение этого участка займет несколько миллионов лет, магнитные полюса Земли могут изменить свою ориентацию (см. раздел 9.2), и поток космических лучей может вызвать истощение озонового слоя до 40% (Pavlov, 2005a). Гравитационный потенциал молекулярного облака также может разрушить облако Оорта, увеличивая поток ударных волн. Содержание пыли в облаке может уменьшить получаемую Землей солнечную радиацию, что приведет к образованию снежных шаров в результате оледенения (Pavlov, 2005b).

Смит (Smith and Scalo, 2009) обнаружил, что плотность молекулярного облака, необходимая для коллапса астросферы (гелиосферы других звезд), зависит от массы:

$$n_{\text{crit}}(11.7) \approx 600 \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{-2} \text{ см}^{-3}$$

Это предполагает скорость Солнца относительно межзвездной среды. Их анализ показывает, что полное дезэкранирование гелиосферы происходит примерно через 1–10 млрд лет для звезд солнечного типа и

значительно реже для звезд меньшей массы, до такой степени, что это действительно проблема только для планет, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу (или более крупных).

Определение переходов через облака в радиоизотопной летописи Земли представляет собой сложную задачу (Frisch and Mueller, 2013). Есть некоторые свидетельства того, что прохождение через облака произошло примерно 18 000–34 000 лет назад, и, возможно, еще 20 000 лет назад, но это требует тщательного моделирования местной межзвездной среды от ее нынешнего положения до недавнего прошлого, и широко распространено мнение, что для уменьшения неопределенностей в этом вопросе необходимы более качественные наблюдения.

11.3.6 Меры по смягчению последствий воздействия высокоэнергетического излучения

Что может сделать человечество (или внеземные цивилизация), чтобы противостоять воздействию таких мощных высокоэнергетических событий? Меры по смягчению последствий можно разделить на три категории:

- Смягчение на месте – прямое изменение или экранирование источника излучения.
- Локальное смягчение – строительство защитных экранов в месте расположения цивилизации, т.е. на поверхности планеты.
- Промежуточное смягчение – снижение потока излучения/частиц в космосе на пути к цивилизации.

Второй вариант наиболее приемлем для человечества в настоящее время. Простейшее решение проблемы космического излучения любого рода – это строительство подземных убежищ и укрытие на время радиационного события. Это наиболее практично для злокачественной звездной активности, продолжительность которой составляет несколько дней. Однако ожидается, что излучение от сверхновых/галактических вспышек будет восприниматься в течение гораздо более длительных периодов. Гамма-всплески излучения происходят в течение коротких промежутков времени, но послесвечение (в различных диапазонах длин волн, включая ультрафиолетовое и рентгеновское излучение) может длиться несколько дней, а интенсивность излучения космических лучей может сохраняться в течение месяцев и даже лет. Проникновение космических лучей настолько эффективно, что для

эффективной работы такого укрытия потребовалась бы глубина в несколько километров!

Кроме того, подземное решение сохраняет лишь отдельные участки поверхностной биомассы. Оно никоим образом не смягчает разрушение ОЗ, образование NO₂ и других оксидов азота, а также любые другие вредные атмосферные воздействия. Оно также делает любые космические объекты уязвимыми для серьезных разрушительных последствий. Это ставит такие цивилизации, как человечество, под угрозу сценария, подобного тому, который вызывает синдром Кесслера (см. раздел 13.5).

Циркович и Вукотич (Cirkovic and Vukotic', 2016) предлагают промежуточное решение — экранирование Земли с помощью природного обломочного материала. Добыча ледяных тел из пояса Койпера и окружение Земли гало из этого материала на высокой орбите увеличит эффективный коэффициент поглощения планеты. Если радиус этого щита равен R_{sh}, и щит должен ослаблять входящее излучение до доли μ , то родительское тело из пояса Койпера, необходимое для создания щита, должно иметь радиус

$$R = \sqrt{\frac{3R_{sh}^2(-\ln \mu)}{4\mu}} \quad (11.8)$$

где μ — линейный коэффициент затухания, т.е. интенсивность излучения через среду (толщиной L) равна

$$I = I_0 e^{-\mu L} \quad (11.9)$$

Коэффициент ослабления является функцией как свойств материала, так и энергии падающего излучения. Если предположить, что радиус экрана составляет $R = 2R_{\oplus}$, то для $\mu = 0,1$ нам потребуется тело из чистого льда радиусом $R = 25.4$ км при $E = 0.1$ МэВ и $R = 34.1$ км при $E = 1$ МэВ (Cirkovic и Vukotic', 2016). Для того чтобы наш экран безопасно охватывал геостационарные спутники, $k = 6.6$, и нам потребуются ледяные тела радиусом более чем в два раза больше.

Разрушение такого тела и размещение роя материала в оболочке вокруг Земли приводит к ненулевой пористости щита, зависящей от размера частиц роя. Вполне возможно, что оболочка даже состоит из «умной пыли» (Farrer, 2010), по сути, большого количества наночастиц, которыми можно манипулировать или которые можно программировать. Это позволило бы осуществлять коррекцию роя в реальном времени по мере того, как высокоэнергетическое событие обрушивается на Солнечную систему, а также передавать на Землю телеметрию об эффективности его работы.

Конечно, нанотехнологии в таком масштабе сопряжены со своими рисками (см. раздел 14.2).

Поддержание такого щита на орбите вокруг планеты-хозяина (а не вокруг звезды-хозяина) представляет собой энергетическую проблему. Поддержание положения щита требует ускорения против естественного кеплеровского потока – удержание такого щита поблизости в готовности к использованию может стать значительно дорогостоящим.

Существует и другая, гораздо более серьезная проблема: предсказание высокоэнергетического события. В настоящее время астрономы могут наблюдать за близлежащими сверхгигантами и делать очень приблизительные оценки того, в какой временной интервал они могут взорваться сверхновой – например, красный сверхгигант Бетельгейзе (находящийся на относительно безопасном расстоянии 197 пк) по прогнозам взорвется сверхновой в течение следующих 100 000 лет (Dolan et al., 2016). Если мы хотим защитить себя от близлежащей сверхновой, мы должны уметь предсказывать ее зажигание в течение нескольких лет, возможно, всего нескольких месяцев. Гамма-всплески практически непредсказуемы, и неясно, когда Sag A* пройдет еще одну фазу активного ядра галактики (если это вообще произойдет). Для противодействия подобным событиям инопланетным существам потребуется гораздо более глубокое понимание высокоэнергетической астрофизики, чем то, которым мы обладаем сегодня.

12. Гибель от неустойчивого роста

Со времен промышленной революции численность населения человечества увеличивалась приблизительно по экспоненте:

$$\begin{aligned} \overline{dN} & dt \\ & = \\ & rN \end{aligned} \quad (12.1)$$

где r — темп роста:

$$N(t) = N(t=0)e^{rt}. \quad (12.2)$$

Этот экспоненциальный рост оказал значительное давление на многочисленные экосистемы, составляющие биосферу Земли. На нескольких этапах новейшей истории высказывались опасения, что численность населения Земли превышает допустимую нагрузку на планету.

Пожалуй, самые известные опасения относительно неограниченного роста численности населения исходят от Мальтуса (или носят его имя). В «Очерке о принципе народонаселения» (опубликованном под псевдонимом в 1779 году) Мальтус отметил, что кажущаяся универсальной тенденция роста населения и создания богатства заключается в росте или поддержании нищеты бедных. Это прямо противоречило мнению многих его современников (таких как Адам Смит), которые предполагали, что создание богатства всегда имеет тенденцию «улучшать положение трудящихся бедняков». В крайнем случае, эта тенденция в конечном итоге приведет к разорению государства. Как описал это Мальтус (1798, «Очерк о принципе народонаселения», глава 7):

Способность населения к росту численности населения настолько превосходит способность Земли обеспечивать человека средствами к существованию, что преждевременная смерть в той или иной форме неизбежно постигнет человечество.

В разговорной речи это понятие называют мальтузианским сдерживающим фактором. Важно отметить, что представление Мальтуса о причинах «преждевременной смерти» не ограничивалось природными силами, вызванными переизбытком доступных ресурсов среди населения. Действительно, Мальтус считал, что стресс, испытываемый низшими слоями общества по мере исчезновения товаров и ресурсов, в конечном итоге приведет к падению цивилизации либо в результате войны, либо в результате революции.

Мальтусовские ограничения могут быть либо положительными, увеличивающими смертность, либо превентивными, снижающими рождаемость. Его скептицизм относительно возможности неограниченной оптимизации сельского хозяйства характерен для того периода. Возможно, если бы он стал свидетелем научно-технического прогресса в производстве продуктов питания, его скептицизм был бы сильно подорван.

Когда Мальтус писал свое эссе в конце XVIII века, население мира составляло всего около 1 миллиарда человек. До появления комбайна (гибрида жатки и молотильной машины) оставалось еще сто лет – полная механизация сельского хозяйства должна была дожидаться появления автомобиля. Впечатляющий рост сельскохозяйственной производительности также был достигнут благодаря селекционному разведению более выносливых сортов сельскохозяйственных культур. Например, агроном Норман Борлауг считает, что выведение высокоурожайной, устойчивой к болезням пшеницы спасло миллиарды жизней от голода.

Со времен Второй мировой войны численность населения Земли росла темпами, значительно превышающими любые другие периоды в истории. Всего за 40 лет население увеличилось примерно в 2,5 раза, с 2,5 миллиарда в 1950 году до примерно 6,1 миллиарда в начале XXI века. Текущие прогнозы на следующее столетие, сделанные Департаментом экономики и социальных дел Организации Объединенных Наций (2015), указывают на снижение темпов роста населения (Рисунок 12.1). Более ранние прогнозы, охватывавшие период до 2300 года, указывали на устойчивое значение около 8,9 миллиарда (ООН, 2004).

Это согласуется с классическими моделями роста популяции до состояния равновесия, ограниченного экологическими ограничениями. Кажущаяся экспоненциальная динамика в конечном итоге принимает форму «логистической» кривой (Verhulst, 1845). Управляющее дифференциальное уравнение имеет вид:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(\frac{K - N}{K} \right) \quad (12.3)$$

где мы теперь введем несущую способность K . Типичное решение выглядит следующим образом:

$$N(t) = \frac{K N_0 e^{rt}}{K + N_0 (e^{rt} - 1)} \quad (12.4)$$

where at very long times

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K \quad (12.5)$$

В этой демографической эволюции играет роль целый ряд факторов: снижение рождаемости во всем мире, сначала в развитых, а теперь все чаще и в развивающихся странах, а также выравнивание ожидаемой продолжительности жизни. Это сопровождается другими демографическими изменениями, включая старение населения (ожидается, что к 2300 году средний возраст удвоится с 26 до 48 лет)

214




Рисунок 12.1 Рост мирового населения (сплошная линия) и темпы роста (пунктирная линия), согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за 2015 год (вертикальная линия). Данные за период после 2015 года являются прогнозами.

Мы можем переписать уравнения роста популяции, включив в них стареющее население, рассмотрев популяцию особей в возрасте $(a, a + da)$ в момент времени t , $N(t, a)$. Эволюция популяции выглядит следующим образом

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial a} = d(a)N(t, a) - b(a)N(t, a) \quad (12.6)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \quad \frac{\partial}{\partial a}$$

где b и d — функции рождаемости и смертности, зависящие от возраста. Число особей определенного возраста изменяется в зависимости от рождаемости и скорости старения особей. Мы можем сразу упростить это, заметив, что

$$\frac{da}{dt} = 1, \quad (12.7)$$

Поскольку мы все стареем на один год в год, а рождаемость вносит вклад только в $N(t,0)$ (нельзя родиться в возрасте 1 года или старше):

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial N}{\partial a} = d(a)N(t,a) \quad (12.8)$$

Дано начальное распределение популяции $n(0,a)$ и источник индивидов $n(t,0)$:

$$n(t,0) = \int b(a')n(t,a') da' \quad (12.9)$$

Решения этих уравнений в момент времени t , при условии знания времени рождения индивида t_0 , можно найти, используя характеристики (подробнее см. Murray, 2004)

$$N(t,a) = N(t_0,0) \exp \left[- \int_0^a d(a') da' \right]_{a > t} \quad (12.10)$$

$$N(t,a) = N(t-a,0) \exp \left[- \int_0^a d(a') da' \right]_{a < t} \quad (12.11)$$

Легко посмеяться над предсказаниями Мальтуса о бедствиях для населения, составляющего лишь малую часть современной Земли, но нам следует быть осторожными, чтобы не совершать ту же ошибку и не возлагать слишком большую веру на подобные долгосрочные прогнозы. В основе истории лежат разрушительные события, по своей природе непредсказуемые и способные коренным образом изменить ход событий.

Что это значит для парадокса Ферми? Если наша способность увидеть внеземные цивилизации зависит от способности одной цивилизации расти и колонизировать галактику в масштабах Галактики, то мы можем разрешить парадокс, заявив, что либо они не могут, либо не хотят.

Распространенное направление рассуждений о расширении цивилизации за пределы родного мира строится следующим образом: зачатие цивилизации на одной планете либо успешно, то есть цивилизация созревает и может фактически существовать вечно, заселяя другие миры и

расширяя свою сферу влияния бесконечно; либо зачатие терпит неудачу, и цивилизация исчезает, не успев закрепиться более чем на одном мире.

В этой простой картине успешные цивилизации могут свободно распространяться по всей Млечному Пути и занимать все его обитаемые ниши. Это прямая аналогия с земной биосферой, где организмы занимают каждую нишу, к которой они могут адаптироваться, при условии, что она каким-то образом доступна.

По мере дальнейшего роста цивилизаций либо

1. их рост хорошо согласуется с их потребностями в энергии и ресурсах, например, они практикуют логистический рост с некоторым увеличением пропускной способности;

2. их потребности в энергии/ресурсах превышают их способность их усваивать;

3. их потребности в энергии создают нагрузку на окружающую среду до такой степени, что это приводит к коллапсу (см. главу 13).

Решение парадокса Ферми в области устойчивого развития (решение С.10, см. Naqq-Misra и Baum, 2009) предполагает, что существуют фундаментальные ограничения на темпы роста цивилизаций. Цивилизации, которые пытаются расти экспоненциально, скорее всего, станут жертвами сценария 2 и вымрут.

Человечество избежало сценария 2 благодаря технологическому прогрессу, позволяющему извлекать больше энергии из окружающей среды. Это повышение эффективности производства энергии позволяет повысить эффективность добычи ресурсов. Например, изобретение динамита и других взрывчатых веществ знаменует собой улучшение высвобождения энергии, что повышает эффективность горнодобывающих работ. Это, в свою очередь, создает риск полного истощения ресурсов, что приводит к сценарию 3.

Если концепция устойчивого развития верна, то мы вряд ли увидим огромные межзвездные империи. Успешные цивилизации смогут обеспечить более медленный рост населения. Конечно, замедление роста населения не означает замедление потребления ресурсов. Потребление ресурсов у людей почти в два раза выше, чем 30 лет назад (Fischer-Kowalski, 1997). Ожидается, что к 2030 году темпы потребления удвоятся по сравнению с 2005 годом, что значительно превысит темпы роста населения (Lutz and Giljum, 2009).

Таким образом, устойчивое развитие — это стремление как отдельного человека, так и общества. Общее потребление цивилизации зависит от множества факторов, включая общую численность населения и потребительские привычки отдельных его членов. Простое сокращение населения недостаточно для поддержания устойчивой цивилизации. Если

индивидуальное потребление будет продолжать расти, даже небольшое население в конечном итоге попадет в ловушку сценария 3.

Как и во многих наших размышлениях об инопланетных цивилизациях, мы неизбежно накладываем на них предположения о собственном поведении, которое остается неразрывно связанным с нашими биологическими ограничениями. Смогут ли постбиологические цивилизации расширяться без ограничений? Циркович (Cirkovic' 2008) утверждает, что крайне развитые цивилизации вряд ли будут движимы стремлением к экспансии, а вместо этого будут движимы оптимизацией потребления ресурсов. Галактика, скорее всего, состоит не из межзвездных империй, а из цивилизаций типа «города-государства», которые управляют как численностью населения, так и индивидуальным потреблением энергии. Такие цивилизации, вероятно, будут манипулировать окружающей средой для извлечения энергии с чрезвычайно высокой эффективностью.

Например, извлечение энергии аккреции из черных дыр дает эффективность во много раз выше, чем та, которая получается при термоядерном синтезе в звездах. Эти цивилизации не только уменьшают свое воздействие на Млечный Путь, но и не передают сигналы, снижая свою видимость за счет повышения энергоэффективности и сокращения отходов. Как мы уже говорили, численность мирового населения, по прогнозам, достигнет своего пика в этом столетии. Если наше становление как цивилизации будет успешным, то ключевым показателем этого успеха станет устранение одного из главных факторов экспансии: демографического давления. Многие современные представления о заселении человеком других планет не сводятся к стремлению к увеличению пространства, а основаны на эмоциях и знаниях, полученных благодаря индивидуальным достижениям. Колонизация Луны и Марса станет технологическим подвигом, достигнутым благодаря человеческим усилиям, по тем же причинам, по которым был покорен Эверест: «потому что он там».

Конечно, такие взгляды, похоже, недостаточны для преодоления политической инерции и бюджетных ограничений. Нынешняя ситуация предполагает, что разработка месторождений полезных ископаемых на месте и потенциально огромные запасы драгоценных металлов станут настоящим импульсом, который подтолкнет человечество в космос. Мы, возможно, и достигнем пика численности популяции, но наша ненасытная жажда энергии и минералов не показывает признаков ослабления.

13. Гибель от самопроизвольного изменения окружающей среды

Эмпирически доказано, что деятельность человека усилила парниковый эффект в атмосфере Земли, в результате чего температура планеты на несколько градусов Цельсия выше, чем была бы, если бы человека не существовало. В сочетании с другими факторами, человечество снижает способность Земли поддерживать свою нынешнюю биосферу.

Причины антропогенного глобального потепления (АГП, AGW) многочисленны. Для каждой из этих причин можно оценить так называемое антропогенное воздействие (в $\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}$), которое, в общих чертах, представляет собой увеличение нагрева, вызванное указанной деятельностью. Общее воздействие от всех видов человеческой деятельности со времен промышленной революции оценивается в $2,3 \pm 11,02 \text{ Вт}\cdot\text{м}^{-2}$ (IPCC, 2013). Если сравнить это с естественным воздействием от вулканических извержений, образования аэрозолей и изменений солнечной радиации, которое дает воздействие, близкое к нулю ($\pm 0,1 \text{ Вт}\cdot\text{м}^{-2}$), становится ясно, что деятельность человека оказывает существенное влияние.

13.1 Вред атмосфере

На первом месте среди факторов антропогенного воздействия ($2,83 \pm 0,29 \text{ Вт}\cdot\text{м}^{-2}$) находится увеличение концентрации так называемых хорошо перемешанных парниковых газов (WMGHG). Эта подгруппа парниковых газов относится к молекулам, которые относительно равномерно распределены по всей атмосфере Земли. Примеры включают CO_2 , N_2O , CH_4 , SF_6 и другие.

Некоторые парниковые газы не задерживаются в атмосфере в течение длительных периодов времени, но все же оказывают значительное воздействие и называются факторами, влияющими на климат в краткосрочной перспективе (NTCF). К этой категории относятся также метаносодержащие отложения (например, выделяющиеся при таянии вечной мерзлоты), озон и другие загрязняющие вещества, такие как хлорфторуглероды (CFCs) и другие аэрозоли.

CFCs наиболее известны своим вредным воздействием на озоновый слой. По мере подъема CFCs вверх, химическая стабильность молекул позволяет им оставаться неповрежденными до достижения стратосферы, где ультрафиолетовое излучение типа В высвобождает хлор, который затем вступает в следующую цепочку реакций:




Рисунок 13.1 Уровни CO_2 (в частях на миллион), измеренные на нескольких участках морской поверхности и подвергнутые скользящему среднему (с использованием семи смежных точек). Источник данных: Ed Dlugokencky and Pieter Tans, NOAA/ESRL (www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/)



Следует отметить, что хлор действует как катализатор в этой реакции, используя локальные свободные атомы кислорода для расщепления O_3 на O_2 с помощью единственного атома Cl , присутствующего в конце реакции. Как мы видели в разделе 11.3, уменьшение плотности озонового столба в атмосфере увеличивает поток вредного УФ-излучения на поверхность Земли. По мере увеличения количества ХФУ скорость истощения озонового слоя возрастала кумулятивно. Это привело к строгому контролю за их использованием, и озоновая дыра уменьшается — ожидается, что к середине XXI века озоновый столб вернется к уровню 1980 года (NOAA и др., 2010).

Несмотря на эти позитивные новости, уровень CO_2 продолжает расти (Рисунок 13.1), что обусловлено деятельностью человека, с доиндустриального уровня около 280 частей на миллион (ppm) до более чем 400 ppm. Согласно большому массиву модельных прогнозов, только это

246 *Гибель в результате самопроизвольных изменений окружающей среды*
угрожает повышением средней температуры Земли примерно на 2–3 °C в течение следующего столетия. Без существенного сокращения выбросов CO₂ это окажет значительное влияние на глобальный уровень моря. Около 40% всего населения Земли проживает в пределах 100 км от побережья, и, следовательно, значительная часть этого населения (около 150 миллионов человек) находится под угрозой повышения уровня моря на 1 м.

Поскольку CO₂ составляет львиную долю антропогенного воздействия, большинство усилий по адаптации к разрушительным последствиям изменения климата или их смягчению сосредоточены на сокращении его выбросов или удалении из атмосферы посредством лесовосстановления или технологий улавливания углерода.

На самом крайнем этапе стратегии смягчения последствий изменения климата находится геоинженерия — целенаправленное технологическое усилие по изменению радиационного баланса атмосферы. Одним из основных инструментов геоинженерии является увеличение содержания аэрозолей в атмосфере, что фактически имитирует эффект крупных вулканических извержений, которые, как было показано, вызывают кратковременные периоды глобального похолодания. Ежегодная доставка 2000–7000 тонн сульфатного аэрозоля в стратосферу была бы достаточной для смягчения потепления со скоростью 0.15 K в год (Eliseev et al., 2010), но, вероятно, имела бы множество предвиденных и непредвиденных косвенных последствий. После прекращения впрыскивания аэрозолей климат быстро возвращается к более теплomu состоянию, существовавшему до появления аэрозолей (Berdahl et al., 2014).

На нижних уровнях атмосферы можно увеличить отражательное альbedo облаков, засеяв их соответствующими химическими аэрозолями (подходят также аэрозоли морской воды). Однако это приводит к увеличению образования облаков в целом и к увеличению осадков в низкоширотных регионах, что может привести к увеличению ущерба от стока с суши.

Более радикальные попытки ограничить звездный поток в верхние слои атмосферы включают размещение больших солнцезащитных экранов на орбите. Размещение такого экрана (либо одного объекта, либо роя объектов) в точке Лагранжа L1 позволило бы цивилизации «настраивать» поток, получаемый от звезды. Расчеты показывают, что уменьшение болометрического солнечного потока примерно на 1.7% было бы достаточно для компенсации общего антропогенного воздействия. Пренебрегая давлением солнечного излучения, для достижения этой цели радиус одного экрана в точке Лагранжа L1 Земли должен составлять приблизительно 915 км (Sánchez and McInnes, 2015). Если необходимо внести конкретные

локальные изменения в солнечную радиацию, то тень можно наклонить или сместить в сторону от точки Лагранжа L1.

Хотя изменение атмосферного климата и геоинженерия, как правило, рисуют довольно мрачные картины, именно этот тип атмосферной эволюции наиболее подходит для астрономов, использующих данные об экзопланетах для поиска разумной жизни. Обнаружение загрязняющих веществ в атмосфере экзопланеты (Lin et al., 2014) или состава атмосферы, который, по-видимому, указывает на источники CO₂ и аэрозолей, не объясняемые естественными процессами, может быть ключевым признаком разумной жизни, пытающейся смягчить вызванные ею самими изменения климата. Обнаружение искусственной структуры на полустатической орбите относительно планеты также является очевидным признаком разумной инженерии (см. раздел 27.3.2).

13.2 Нарушение экологии и землепользования

Еще одно важное изменение, внесенное человеком, касается самой поверхности Земли. Растущее население планеты предъявляет все более высокие требования к производству продуктов питания. Технологические инновации продолжают увеличивать калорийность с гектара, но это не меняет того факта, что пахотные земли и пастбища в настоящее время являются одним из крупнейших биомов на планете, занимая около 40% ее поверхности, при этом около 35% антропогенного CO₂ образуется в результате различных форм землепользования (особенно сельского хозяйства) (Ramankutty and Foley, 1999; Foley et al., 2005).

Необходимость в высокоинтенсивном земледелии привела к значительному увеличению (примерно на 700% за последние 40 лет) использования удобрений. Сточные воды с сильно удобренных земель в конечном итоге достигают грунтовых вод, что приводит к ухудшению качества воды.

Это сопровождается растущей потребностью в ирригации. Эта жажда пресной воды трансформировала гидрологический цикл, поскольку люди откачивают все большие объемы воды и отводят естественные водоемы. Это уже начинает сказываться на реках в засушливых и полузасушливых регионах, где уровень воды начинает снижаться и даже полностью пересыхать.

Обширные площади пахотных земель, необходимые для пропитания населения Земли, были созданы в значительной степени за счет лесов планеты. Хотя тенденция к массовой вырубке лесов демонстрирует признаки замедления, а в некоторых регионах даже обратного развития, первые замещающие леса показали значительно сниженное биоразнообразие и устойчивость. К счастью, сейчас это признается

248 *Гибель в результате самопроизвольных изменений окружающей среды*
проблемой, и большинство схем управления лесами теперь производят значительно больше биомассы на единицу площади (в некоторых случаях улучшение на 40% за последние пятьдесят лет).

В городских районах покрытие земли бетоном и асфальтом меняет способность земли отводить избыточные дождевые воды. Это наиболее ярко проявилось в 2017 году после урагана Харви в Техасе. Несмотря на недавние попытки строительства дорожных систем, способствующих быстрому стоку ливневых вод в Мексиканский залив, районы, где не применялась эта продуманная философия строительства, с трудом справлялись с отводом огромных объемов воды, попавших в результате урагана (по оценкам, от 30 до 60 триллионов тонн за период шторма).

Слой бетона/асфальта также влияет на способность земли излучать тепло. Естественные поверхности обычно содержат растительность или влагоудерживающие почвы и, следовательно, могут эффективно отдавать тепло за счет испарения и транспирации. Добавление сверху слоя строительного материала, который обычно водостойкий и имеет низкое альбедо, препятствует охлаждению земли. Наличие высоких зданий также приводит к увеличению теплоудержания, особенно если эти здания сами генерируют тепло (например, за счет работы систем кондиционирования воздуха). Все это приводит к тому, что температура в городах обычно немного выше (на один-два градуса Цельсия), чем в сельской местности (так называемые «городские тепловые острова»).


Перестройка фундаментальной инфраструктуры, лежащей в основе среды обитания, почти всегда приводит к значительной потере биоразнообразия.

Несмотря на все наши усилия, почти половина всех мировых пахотных земель подвергается той или иной форме деградации, будь то эрозия почвы, снижение плодородия или чрезмерный выпас скота. Это истощение питательных веществ в сочетании с постепенным потеплением приводит к увеличению степени опустынивания земель, делая все большие участки планеты непригодными для жизни человека без значительных технологических усилий.

Наши возможности наблюдения за поверхностями каменистых экзопланет остаются ограниченными, но можно представить себе будущее, где картирование отражательной способности планетарного тела (например, посредством поляризации; см. Бердюгина и Кун, 2017) могло бы дать важные подсказки о том, влияет ли какая-либо цивилизация на землю аналогично нам.

13.3 Разрушение океанической среды

Океаны являются важнейшим источником биоразнообразия на Земле. Они обеспечивают важный буфер энергии по мере того, как планета продолжает нагреваться, а чистая вода является важнейшим компонентом любой здоровой экосистемы. Повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли также привело к увеличению растворения углекислого газа в океанах Земли:



Образование ионов водорода в результате этого процесса подавляет pH океана. Со времен промышленной революции концентрация ионов водорода увеличилась примерно на 30%, что эквивалентно снижению pH примерно на 0,1. Прогнозы показывают, что pH может стабилизироваться на уровне 0.7 ниже доиндустриальных значений.

В палеонтологической летописи мало примеров подобного закисления, к которым мы могли бы обратиться для сравнения. Единственным возможным кандидатом является палеоценово-эоценовый термический максимум (ПЭТМ), произошедший 55.8 млн лет назад. Глобальная температура в этот период повысилась на 5–9 градусов, что, несомненно, связано со значительным высвобождением органического углерода из отложений или клатратов. Это было обнаружено по резкому падению ^{13}C до ^{12}C отношения в карбонатные/богатые углеродом осадки (Kump et al., 2009).

ПЭТ-термический максимум (ПЭТМ) совпадает со значительным массовым вымиранием – крупнейшим из когда-либо зарегистрированных среди глубоководных организмов, известных как известковые бентосные фораминиферы. Эти организмы обитают на морском дне (бентосные) и имеют раковины из карбоната кальция (известковые). Неясно, было ли это событие прямым следствием закисления – вымирания меньшей величины часто происходят в результате потепления, вызванного CO_2 , без значительного закисления.

Что доказано, так это то, что по мере снижения pH океана уменьшается осаждение карбоната кальция. Более кислая вода требует большей концентрации карбонатных ионов для достижения насыщения и осаждения. Организмы, которые используют карбонат кальция для формирования внешних структур раковин, испытывают трудности с осаждением и подвергаются большему риску растворения своих раковин. Данные несколько противоречивы – некоторые известковые виды, как правило, лучше себя чувствуют в более теплых, более кислых водах, чем другие, – но более крупные метаанализы показывают, что совокупный риск

250 *Гибель в результате самопроизвольных изменений окружающей среды*
повышения температуры, повышения кислотности и снижения оксигенации ставит под угрозу значительные участки морской пищевой цепи..

Наибольшую угрозу для морских экосистем (по мнению Межправительственной панели по изменению климата) представляет собой феномен обесцвечивания кораллов. Здоровые кораллы зависят от симбиотических отношений с зооксантеллами — водорослеподобными простейшими, обитающими в тканях коралла. Зооксантеллы осуществляют фотосинтез и обеспечивают коралл энергией и питательными веществами, а коралл в свою очередь поставляет CO_2 и NH_4^+ , способствуя фотосинтезу.

Повышение температуры океана приводит к тому, что коралл не может адекватно обеспечивать зооксантеллы необходимыми веществами. В качестве защитной меры коралл вытесняет зооксантеллы, избавляясь от своего основного источника энергии. Зооксантеллы также отвечают за цвет коралла — их вытеснение приводит к обесцвечиванию кораллов. Если зооксантеллы не могут быстро вернуться к кораллу и возобновить фотосинтез, структура рифа разрушается.

Утверждается, что коралловые рифы являются наиболее биоразнообразными местообитаниями на Земле. Обесцвеченные рифы не могут поддерживать такое разнообразие — тысячи видов, зависящих от питательных веществ и защиты рифов, становятся уязвимыми в периоды обесцвечивания. Коллапс рифовой биоты может поставить под угрозу всю морскую экосистему (и другие связанные с ней экосистемы).

13.4 Деструкция биосферы

В истории биосферы Земли произошло пять крупных массовых вымираний (Raup and Sepkoski, 1982; см. также Таблицу 13.1). Многие утверждают, что шестое вымирание произошло с появлением человека (особенно индустриальной цивилизации) (Kolbert, 2014). Точное определение начала этого вымирания является предметом споров, не говоря уже о том, следует ли его называть голоценовым вымиранием или же индустриальная человеческая цивилизация представляет собой новую геологическую эпоху — антропоцен. В любом случае, серьезная потеря биоразнообразия ставит человеческую цивилизацию под угрозу голода и пандемических заболеваний (Решение С.12).

В истории вымирания видов в голоцене можно выделить две значимые эпохи. Первая — это корреляция между исчезновением видов в определенной области (особенно мегафауны) в плейстоцене около 12 000 лет назад и появлением человека в этой конкретной области.

Table 13.1 *Пять крупнейших массовых вымираний в истории Земли*
Barnosky et al. (2011)

Событие	Время	Оценка гибели видов
Ordovician	~ 443359 Myr ago	86%
Devonian		75%
Permian	~ 251 Myr ago	96%
Triassic		80%
Cretaceous	~ 200 Myr ago	76%
	~ 65 Myr ago ~	

Это особенно очевидно при рассмотрении островных экосистем, таких как экосистемы Тихого океана (Стедман, 2003), где около 2000 видов птиц вымерли в течение столетий после появления человека.

Вторая эпоха — это становление нашей современной цивилизации. Широкомасштабное внедрение сельского хозяйства коренным образом изменило баланс местной флоры и фауны. Отведение водных ресурсов от экосистемы, внедрение неместных, инвазивных видов и распространение новых инфекционных заболеваний также в значительной степени способствовали растущему вымиранию видов. Промышленная экспансия ускоряет разрушение местообитаний и ускоряет производство людей для заселения окружающей среды.

В докладе Всемирного фонда дикой природы «Живая планета» (2016 г.) указывается, что численность видов значительно сокращается. В период с 1972 по 2012 год Индекс живой планеты (ИПП) снизился на 58% среди позвоночных, причем основная угроза исходит от деградации местообитаний.

Из таблицы 13.1 ясно, что если человечество является причиной шестого крупного массового вымирания, то по масштабам потери видов оно еще не сравнялось с предыдущими пятью. Однако следует помнить, что вымирание длится несколько миллионов лет — у человечества было менее тысячи лет, чтобы вызвать потерю более половины видов, характерную для типичного массового вымирания. Колоссальное сокращение биоразнообразия в некоторых частях мира свидетельствует о том, что человечество более чем способно сравниться с природой в своей способности отрывать ветви от дерева жизни.

13.5 Разрушение космической среды (синдром Кesslera)

Первым пунктом назначения любой новой космической цивилизации является непосредственная орбита вокруг своей родной планеты. В случае с человечеством это началось всерьез с запуском «Спутника» в 1957 году. Орбитальная среда делится на три категории:

Table 13.2 *The classification of the Earth's orbital environment*

Orbit	Range
Low Earth Orbit (LEO)	160–2000 km
Medium Earth Orbit (MEO)	2000–35786 km
High Earth Orbit (HEO)	> 35786 km
Geostationary Orbit (GEO)	= 35786 km

Практически вся деятельность человека в космосе (за исключением программы «Аполлон») осуществлялась на низкой околоземной орбите (НОО) – Международная космическая станция вращается на высоте приблизительно 400 км. Среднеорбитальная орбита (СОО) в основном занята спутниками связи и навигации, такими как флотилия Глобальной системы позиционирования (GPS), которая вращается на относительно высокой высоте около 20 200 км.

Все объекты на высокоэллиптической орбите (ВЭО) находятся за пределами геостационарной орбиты (ГЭО). Период обращения на ГЭО (которая совпадает с экватором Земли) равен периоду вращения Земли. В результате, с точки зрения наземного наблюдателя, спутник находится в фиксированной точке на небе, что имеет очевидные преимущества для таких целей, как глобальная связь. Активность на ВЭО значительно меньше, чем на низкой и средней околоземной орбитах. Орбитальная среда Земли содержит естественный компонент – метеороиды. Они представляют незначительную или нулевую угрозу для космических операций – настоящая угроза исходит от нас самих.

Современные ограничения космических технологий гарантируют, что каждый запуск сопровождается значительным количеством космического мусора. Этот мусор варьируется по размеру от пылевых частиц и пятен краски до крупных вышедших из строя космических аппаратов и спутников. По данным Управления программы по космическому мусору НАСА, в настоящее время на низкой околоземной орбите отслеживается около 21 000 объектов размером более 10 см, а популяция объектов меньше 10 см значительно больше. Большая часть обломков, образующихся при запуске, как правило, откладывается без дополнительной скорости – поэтому эти объекты обычно следуют первоначальной траектории запуска, которая часто имеет большой эксцентриситет и наклон орбиты. Однако эти орбиты пересекаются с орбитами искусственных спутников Земли, что приводит к столкновениям, которые, как правило, порождают новые обломки.

Подавляющее большинство мелкого космического мусора составляют так называемые фрагментарные обломки. Они образуются в процессе

разрушения космических аппаратов, и в наибольшем количестве — при их распаде и столкновениях. Первое столкновение спутников произошло в 1961 году, что привело к увеличению количества фрагментарных обломков на 400% (Johnson et al., 2008). Наиболее примечательным является то, что существенным источником фрагментарных обломков стало преднамеренное уничтожение спутника Fengyun 1C Китайской Народной Республикой, в результате которого образовалось около 2000 фрагментов.

Как и в случае столкновений «природного мусора», столкновения обломков друг с другом, как правило, приводят к увеличению количества фрагментов. С конца 1970-х годов стало понятно, что созданный человеком мусор может представлять экзистенциальную угрозу для космических операций. Кесслер и Кур-Пале (Kessler and Cour-Palais, 1978), исходя из тогдашнего количества спутников, экстраполировали темпы образования мусора на следующие 30 лет. Частоту ударов о космические аппараты в любой точке, I , можно рассчитать, если известны локальная плотность обломков ρ , средняя относительная скорость v_{rel} и площадь поперечного сечения σ :

$$I = \rho v_{rel} \sigma \quad (13.5)$$

Каждое столкновение увеличивает ρ без существенного изменения v_{rel} или σ . Следовательно, следует ожидать, что частота столкновений (и, следовательно, плотность объектов) будет продолжать расти экспоненциально:

$$\frac{dI}{I} = \frac{d\rho}{\rho} = \frac{d \ln \rho}{dt} = \frac{d \ln I}{dt} \quad (13.6)$$

Кесслер и Кур-Пале (Kessler and Cour-Palais, 1978) предсказали, что к 2000 году ρ превысит критическое значение, необходимое для возникновения каскада столкновений. По мере возникновения новых столкновений, они начинают увеличивать $d \ln \rho / dt$, что, в свою очередь, увеличивает dI / dt , приводя к быстрой положительной обратной связи, при которой ρ и I достигают таких больших значений, что низкая околоземная орбита становится полностью непригодной для навигации.

Этого не произошло — низкая околоземная орбита остается пригодной для навигации, отчасти благодаря небольшому завышению прогнозируемого количества мусора, образующегося при отдельных запусках. Призрак каскада столкновений (часто называемого синдромом Кесслера) по-прежнему нависает над освоением космоса человеком, поскольку количество мусора продолжает расти. Без соответствующих целенаправленных усилий по сокращению этих показателей, будь то путем

254 *Гибель в результате самопроизвольных изменений окружающей среды*
смягчения последствий образования космического мусора во время запусков или путем удаления фрагментов мусора с низкой околоземной орбиты, мы не можем гарантировать защиту нынешней флотилии спутников, что подвергает наше общество, сильно зависящее от спутников, серьезному риску.

Какие стратегии можно использовать для удаления космического мусора? Почти все методы удаления мусора основаны на использовании атмосферы Земли в качестве системы утилизации отходов. Большая часть мусора достаточно мала, чтобы вход в атмосферу привел к его полному разрушению без существенных загрязняющих последствий. Вход в атмосферу требует замедления фрагментов мусора до тех пор, пока их орбиты не начнут пересекаться с более низкими атмосферными высотами. Как только достигается критическая высота, атмосферное сопротивление становится достаточно сильным, чтобы мусор начал неуправляемо замедляться и в конечном итоге разрушаться.

Существует несколько предложенных методов замедления космического мусора. Некоторые механические методы включают захват мусора с помощью сети или гарпуна и приложение умеренной обратной тяги. Они наиболее эффективны для крупных фрагментов, и особенно для целых спутников (Forshaw et al., 2015). Прикрепление парусов к обломкам также возможно, если орбита достаточно низкая для слабого атмосферного сопротивления.

Японское космическое агентство JAXA в рамках проекта Kounotori Integrated Tether Experiment (KITE) будет использовать длинный проводящий кабель. При прохождении тока через кабель и его перемещении в магнитном поле Земли, кабель будет испытывать силу магнитного сопротивления, которая приведет к сходу космического аппарата с орбиты.

Орбитальные и наземные лазеры могут замедлять космический мусор различными способами. Для мелких фрагментов мусора сопротивление может обеспечиваться давлением излучения, создаваемым лазером. Более мощный лазер может воздействовать на более крупные фрагменты мусора путем абляции. В процессе абляции лазером обломков возникающая отдача, вызванная вылетающим материалом, создает сопротивление и способствует сходу с орбиты.

Более радикальное решение заключается в том, чтобы запуски и общая космическая деятельность больше не генерировали космический мусор. Эти подходы предполагают использование механизмов запуска с меньшей энергией, не зависящих от мощного сгорания. Самым известным примером является космический лифт (см. Aravind, 2007). Первоначально разработанный Циолковским, лифт представляет собой чрезвычайно прочный трос, протянутый от точки вблизи земного экватора до точки

крепления, расположенной на геостационарной орбите (в большинстве концепций точка крепления предполагает астероид, находящийся на геостационарной орбите).

Космические лифты решили бы множество проблем, связанных с выходом на околоземную орбиту (и выходом с неё), существенно снизив стоимость доставки полезной нагрузки из атмосферы Земли. Технические сложности, связанные с разворачиванием кабеля длиной в десятки тысяч километров, огромны, не говоря уже о материаловедении, необходимом для производства кабеля с достаточной прочностью на разрыв и гибкостью. Гравитационная (и центробежная) сила, действующая на кабель, будет значительно меняться по всей его длине. По мере подъема кабин по кабелю сила Кориолиса будет перемещать кабину (и кабель) горизонтально, создавая дополнительную нагрузку на материал кабеля. Относительно медленное прохождение биологически опасного пояса Ван Аллена на пути к геостационарной орбите также является потенциальной проблемой для пилотируемых космических полетов.

Какими бы ни были средства, космическая цивилизация (или, по крайней мере, цивилизация, использующая свою местную орбитальную среду так же, как и мы) должна разработать экологически безопасное решение для космических путешествий, будь то строительство космического лифта, пусковой петли на магнитной левитации, рельсовой пушки или какой-либо другой формы неракетного ускорения. Если она не сможет осуществлять запуски космических аппаратов без загрязнения окружающей среды (или полностью очистить окружающую среду от загрязнения), то в конечном итоге она поддается синдрому Кесслера, что может иметь катастрофические последствия для будущего использования космоса и, вероятно, приведет к гибели цивилизации (Решение С.13).

14. Саморазрушение на микро и наноуровне

14.1 Генная инженерия

Человечество неосознанно модифицировало геномы многих видов посредством искусственного отбора (например, в стремлении к повышению урожайности сельскохозяйственных культур). По мере того как наши знания о генетических манипуляциях продолжают совершенствоваться, перспектива прямого редактирования генов открывает совершенно новые горизонты биологических инноваций и инженерии.

Недавно генные инженеры обнаружили новый мощный набор инструментов для редактирования генов, скрытый на виду в микробной ДНК. CRISPR (кластерные регулярно расположенные короткие палиндромные повторы) были открыты Ишино и др. (Ishino et al., 1987). CRISPR — это последовательности ДНК, содержащие короткие повторяющиеся субпоследовательности. Эти субпоследовательности содержат палиндромные повторы (которые читаются одинаково в обоих направлениях), перемежающиеся спейсерной ДНК.

CRISPR — это запись, жизненно важная для иммунной системы бактерий и архей. Когда бактериальная клетка сталкивается с вирусом, белок анализирует вирусную ДНК и записывает ее в собственную ДНК бактерии в локусе CRISPR. Затем будущие вторжения вируса в клетку могут быть распознаны ферментом Cas, направляющим его на атаку захватчиков (Horvath and Barrangou, 2010).

Вскоре стало ясно, что двухкомпонентная система может быть использована для очень точного редактирования ДНК. Система CRISPR-Cas9 состоит из фермента Cas9, который действует как пара молекулярных ножниц, и небольшой молекулы РНК, которая направляет ножницы к месту разреза. Тщательный выбор РНК позволяет Cas9 делать разрез практически в любом месте на нити ДНК. После того, как ДНК разрезана, стандартные инструменты восстановления ДНК в клетке вступают в действие, чтобы заделать повреждение. Во время этих процессов восстановления может быть вставлена новая ДНК, что позволяет модифицировать геном, делая инструменты CRISPR способными удалять любой ген и заменять его другим.

Эта система не только позволяет гораздо точнее редактировать ДНК, чем это было возможно ранее, но и позволяет биологам напрямую контролировать экспрессию генов. Если используется мутированный фермент Cas9, ДНК больше не разрезается, но фермент остается рядом с местом, куда он был направлен, и предотвращает транскрипцию. По сути,

ген остается неизменным, но выключенным. Затем ген можно активировать, связав фермент с белками, ответственными за экспрессию гена.

Также можно изучать эпигенетические эффекты. Эпигеном состоит из постоянно меняющейся пленки белков и молекул, которые прикрепляются к ДНК, влияя на экспрессию генов. Умелое использование Cas9 позволяет активировать и деактивировать эти эпигенетические компоненты по желанию.

Эти модификации не наследуются – потомки организма не будут разделять генетические изменения. Это можно обойти с помощью методов генного драйва. Системы CRISPR/Cas могут не только вставлять желаемый ген, но и вставлять гены, которые активируют саму систему CRISPR/Cas. Это позволяет нам модифицировать хромосомы организмов, удаляя нежелательные гены из эволюции (или добавляя новые). Когда эти организмы размножаются, система CRISPR активируется, обеспечивая распространение желаемого признака в популяции гораздо дальше, чем это позволило бы естественный отбор. Эти методы генного драйва успешно использовались для снижения плодовитости популяций комаров, которые являются переносчиками малярии (Hammond et al., 2015).

Короче говоря, мы теперь можем с уверенностью предвидеть будущее, где редактирование наследуемых генов станет дешевой и относительно простой технологией. Более того, некоторые утверждают, что во многих отношениях это будущее уже наступило. Ученые стремятся использовать методы CRISPR для изучения заболеваний, идентификации генов, связанных с целым рядом расстройств, и для дальнейшего углубления нашего общего понимания геномики (и эпигеномики, науки об изучении того, как геномы и экспрессия генов изменяются под воздействием внешних факторов).

Как и у всех технологий, у них могут быть аморальные применения. Болезни могут быть модифицированы для повышения вирулентности и патологического эффекта. Злонамеренная модификация геномов человека может привести к внедрению генетических заболеваний в организм жертв. Животных можно модифицировать, чтобы они стали сильнее и агрессивнее, с пониженной реакцией страха.

Здесь в полной мере проявляется закон непредвиденных последствий. Геном невероятно сложен, и большая часть его структуры еще не изучена. Только 2% генов кодируют белки, а функция остальных 98% остается неясной (некоторые из них кодируют РНК, некоторые просто «усиливают» экспрессию генов, но с загадочным уровнем успеха). Модификация или удаление генов может влиять на экспрессию других генов.

Эволюция посредством мутаций, дрейфа, рекомбинации и отбора уже чрезвычайно сложна. Искусственный отбор (в основном косвенными методами, такими как селекционное разведение) широко используется человечеством. Кажется разумным предположить, что внеземные цивилизации использовали бы аналогичные инструменты. Однако способность напрямую вмешиваться в генетическую структуру и экспрессию генов может стать последним актом любой цивилизации, поскольку она самоуничтожится в результате неудачной инженерной разработки.

14.2 Нанотехнологии, наномашин и серая слизь ‘Grey Goo’

Продолжающаяся миниатюризация технологий приносит огромные преимущества вычислительной технике и материаловедению, но сопряжена и с рисками. Нанонаука — это наука о явлениях в масштабах около 100 нм или меньше. Нанотехнология — это разработка систем, позволяющих манипулировать материей в этих масштабах. Концепции, лежащие в основе современной нанотехнологии, восходят, по меньшей мере, к докладу Фейнмана 1959 года «Среди молекул и атомов много места». Идея возможности манипулировать отдельными атомами была, безусловно, заманчивой (Фейнман представлял себе «Энциклопедию Британника», написанную на головке булавки), и вскоре стало ясно, что физика на наномасштабе обладает ценными свойствами, которые можно использовать.

Первоначальной движущей силой нанотехнологии стало производство интегральных схем все меньших и меньших размеров (электронно-лучевая литография в 1970-х годах позволяла вытравливать схемы на кремниевых чипах в масштабах 40–70 нм).

Изучение наноматериалов привело к важным достижениям в ряде областей. Углеродная нанотрубка имеет ширину всего несколько нанометров, но обладает чрезвычайно высокой прочностью на разрыв, примерно в 100 раз прочнее стали при массе около одной шестой. Ее теплопроводность и электропроводность сопоставимы (и превосходят) свойства меди.

Наночастицы имеют особенно перспективные области применения в медицине, от антимикробных свойств наночастиц серебра до точной доставки лекарств в определенные участки тела. Разработка нанопленок имеет аналогичные преимущества (а также замечательные «самоочищающиеся» окна, использующие супергидрофобные нанопленки).

В ставшей классической книге «Двигатели созидания» Эрик Дрекслер представил вершину нанотехнологий — молекулярный сборщик, способный индивидуально перестраивать атомы для создания наномашин.

Такой молекулярный сборщик в принципе может воспроизводить себя. Если этот цикл воспроизведения каким-либо образом будет нарушен, сборщик сможет начать производить неограниченное количество копий. Экспоненциальный рост числа ассемблеров быстро приведет к превращению значительной части массы планеты в ассемблеры. Это называется сценарием «серой слизи». Фрейтас (Freitas, 2000) далее подразделяет это на серую слизь (наземные организмы), серый лишайник (хемолитотрофы), серый планктон (океанические организмы) и серую пыль (воздух).

Предполагая, что молекулярные ассемблеры возможны, что можно сделать для снижения этого риска? Тщательная разработка может обеспечить наличие ресурса, ограничивающего скорость репликации. Если ассемблер может использовать для репликации широко распространенные материалы, то его рост неограничен. Если ассемблеру требуется какой-либо редкий элемент или соединение, то репликация прекратится, когда этот элемент будет исчерпан. Подобно биологическим репликаторам, можно предположить, что мутации или ошибки копирования могут найти шаблоны, которые обходят этот элемент, и экспоненциальный рост возобновится без остановки.

Фрейтас (Freitas, 2000) предложил ряд защитных механизмов, специально разработанных для демонтажа ассемблеров, которые активируются побочными продуктами сборки (например, отработанным теплом). Создание флота «хороших роботов» для демонтажа или удаления поврежденных ассемблеров — одна из таких стратегий.

Вероятен ли сценарий с «серой слизью» на Земле? В 2004 году Королевское общество опубликовало доклад о существовавшем тогда консенсусе — что молекулярная сборка сама по себе вряд ли станет технологически осуществимой в обозримом будущем из-за фундаментальных физических ограничений на локализацию отдельных атомов.

С другой стороны, молекулярные ассемблеры существуют в природе. Организмы зависят от молекулярной сборки для ряда фундаментальных процессов. Молекулярные машины, использующие эти биологические процессы, вполне возможны и в настоящее время производятся в исследовательских лабораториях. Создание молекулярного ассемблера из этих машинных компонентов остается сложной задачей.

Возможно, лучший способ снизить этот риск — просто не создавать автономные ассемблеры. Феникс и Дрекслер (Phoenix and Drexler, 2004) предполагают, что централизованно управляемые сборочные автоматы более эффективны в производстве, и, следовательно, стремление к

самовоспроизводству сборочных автоматов противоречит промышленным целям.

Конечно, молекулярный сборочный автомат может быть использован в качестве оружия. Возможно, нам следует рассмотреть «серую слизь» как сопутствующий риск в будущих конфликтах.

14.3 Оценка экзистенциальных рисков при манипуляциях на наноуровне

Природа риска на наномасштабе существенно отличается от рисков, создаваемых (например) ядерным оружием. Ядерные арсеналы Земли остаются под контролем очень небольшого числа людей. По мере развития генной инженерии и нанотехнологий как областей исследований, возможность манипулировать наномасштабом становится доступной всё большему числу людей.

Любой из этих людей может случайно (или преднамеренно) спровоцировать катастрофическое событие, которое уничтожит цивилизацию. Если существует E человек, имеющих доступ к потенциально разрушительным технологиям, и вероятность того, что человек уничтожит цивилизацию в любой данный год, равна P , то мы можем определить вероятность того, что цивилизация существует после времени t и может общаться, C , как набор независимых испытаний Бернулли, т.е.,

$$P(C|t, E, P) = (1 - P)^{Et}. \tag{14.1}$$

Therefore, we can compute the number of civilisations existing between $t = 0, t_0$ as

$$N(t_0) = \int_0^{t_0} BP(C|t, E, P)dt \tag{14.2}$$

where we have assumed a constant birth rate B . This can be easily integrated to show (Sotos, 2017):

$$N(t_0) = B \frac{1 - (1 - P)^{Et_0}}{\ln S}, \quad S = (1 - P)^E$$

At large t , this tends to the steady-state solution

$$B \frac{1}{S} \tag{14.3} \rightarrow$$

$$N(t) \rightarrow \frac{B}{E P} \tag{14.4}$$

i.e., there is an inverse relationship between the number of individuals in a given civilisation, and the number of civilisations remaining (Рисунок 14.1).

The generality of this solution to Fermi's Paradox – that the democracy of technology is the cause of its downfall – is particularly powerful. All we have assumed is that technology can be destructive, and that it eventually becomes accessible to a large enough number of individuals that the product $E P$ becomes sufficiently large.




Рисунок 14.1 Число цивилизаций, способных к взаимодействию, как функция времени, при условии, что E индивидов вызывают самоуничтожение с вероятностью P на одного индивида в год. Скорость рождаемости цивилизаций B фиксирована на уровне одного индивида в год.

Это достаточно общее решение, чтобы мы могли считать его сложным — наше определение интеллекта зависит от технологий, а почти все передовые технологии имеют разрушительное применение. Мы уже можем использовать Великое Молчание, чтобы исключить верхние кривые на Рисунке 14.1, которые дали бы данные о численности цивилизаций, видимые на Земле (см. также раздел 19.2). Это говорит о том, что если это решение парадокса Ферми, то примерно $E P > 10^{-3}$.

15. ИИ и Сингулярность

Распространенным источником экзистенциального страха у людей являются наши попытки создать компьютеры и машины, способные обрабатывать информацию в мире с той же (или даже большей) эффективностью, что и мы сами. Эти попытки создания искусственного интеллекта (ИИ) вызывают в памяти классические научно-фантастические образы, такие как разумные киборги из фильма «Терминатор» или машины-тираны из фильма «Colossus».

Компьютеры уже сейчас выполняют некоторые виды обработки данных, значительно превосходящие человеческие возможности, например, запоминание больших объемов текста, быструю оценку математических операций, а в последние годы и игру в стратегические игры, основанные на правилах, такие как Шахматы и игра Го. С другой стороны, люди традиционно лучше справляются с задачами, не требующими предварительных знаний, такими как навигация в сложной, постоянно меняющейся пространственной среде.

Искусственный интеллект можно определить следующим образом (Rich, 1983):

Изучение того, как заставить компьютеры делать то, что в данный момент лучше получается у людей.

Искусственный интеллект можно разделить на две категории: слабый и сильный, каждая со своими подобластями исследований. Системы слабого ИИ не обладают сознанием и могут применяться только к конкретным проблемам или задачам (например, игра в шахматы или го). Системы сильного ИИ, как предполагается, обладают сознанием и применимы к задачам общего назначения. Если рассматривать человеческий мозг как систему, выдающую набор выходных данных O из набора входных данных I с помощью некоторой абстрактной функции F , т.е. $O = F(I)$, то система сильного ИИ сможет аппроксимировать F с высокой степенью точности для широкого спектра различных наборов входных данных.

Распространенный страх перед ИИ связан с предполагаемым событием, называемым Сингулярностью. Впервые описанная как «интеллектуальный взрыв» Гудом (Good, 1966) и популяризированная Рэем Курцвейлом в начале 1990-х годов, Сингулярность относится к ускоряющемуся прогрессу человечества, измеряемому приблизительно как временной интервал между технологическими инновациями. Вместо

линейного роста инноваций, достижения человеческой цивилизации, похоже, следуют парадигме экспоненциального роста.

Если мы распространим этот экспоненциальный рост на развитие ИИ и других систем, которые хранят и представляют информацию, то следует ожидать, что как только ИИ достигнет порогового уровня, он сможет участвовать в разработке своих преемников. Именно в этот момент начинается так называемая Сингулярность..

Искусственный интеллект А, обладающий человекоподобным интеллектом, модифицирует конструкцию ИИ В для повышения его эффективности и производительности. ИИ В способен вносить более сложные модификации в ИИ С, и так далее. Это приводит к экспоненциальному росту интеллекта до тех пор, пока системы ИИ не будут разработаны в соответствии со спецификациями, значительно превосходящими человеческое понимание. Создание так называемого сверхинтеллекта — сущности, которая быстро и значительно превосходит лучшие человеческие умы в любой задаче, — вызывает естественную озабоченность.

Если произойдет Сингулярность, машины навсегда выйдут из-под контроля человечества, а в некоторых мрачных сценариях это будет означать конец человечества. Поэтому мы должны спросить: может ли произойти Сингулярность? И что могут сделать биологические интеллекты, чтобы защитить себя?

Это, безусловно, обширная область исследований, и мы можем лишь кратко изложить ее некоторые части. Мы сосредоточимся на некоторых основных определениях и классификациях ИИ, существующих сегодня и которые могут существовать в будущем.

15.1 Машина Тьюринга

Давайте определим в самых общих терминах функции компьютера. Компьютеры — это класс машин Тьюринга. Представим себе такую машину (которую мы обозначим как Т), получающую последовательность входных символов I (учитывая эпоху, в которой Тьюринг определил свою машину, мы считаем, что эти символы расположены последовательно на ленте). Машина Т последовательно сканирует каждый символ на ленте. В соответствии с набором инструкций (программой R) Т либо изменяет считанный символ, либо перемещает ленту влево или вправо, либо останавливает вычисления.

Это описание, хотя и чрезвычайно простое, достаточно для описания любого алгоритма или функции, которые может выполнять компьютер (это следствие теоремы Гёделя о полноте для логики предикатов первого порядка). Его простота также означает, что он поддается теоремам, ограничивающим его возможности. Универсальную машину Тьюринга U можно описать как машину Тьюринга, способную эмулировать любую другую мыслимую машину Тьюринга T . Гениальность Тьюринга заключалась в том, что он понял, что U можно легко построить, позволив U считывать описание любой машины Тьюринга T с ленты, прежде чем выполнять T на последующих входных данных.

Проще говоря, компьютер может эмулировать любой другой компьютер, при условии, что он получил описание того, как работает другой компьютер (программа R , которая сама может требовать входных данных D). Это почти аксиома для современных пользователей компьютеров, но трудно переоценить, насколько важным оказалось это открытие для развития информатики. Если мы применим нашу аналогию с человеческим мозгом, где мозг обрабатывает входные данные I с помощью некоторой функции F для получения выходных данных O , это будет означать, что если бы человеческий интеллект был машиной Тьюринга, его можно было бы свести к программе, т.е. $R \equiv F$.

Универсальная машина Тьюринга, возможно, более мощна в абстрактном плане, чем в кремнии и пластике. Тьюринг и его последователи смогли вывести важные ограничения на вычислимость определенных типов задач, во многом так же, как физики могут накладывать ограничения на потребление энергии с помощью термодинамики.

Теорема Гёделя о неполноте демонстрирует, что в логике высшего порядка существуют истинные утверждения, истинность которых недоказуема. В результате связанного открытия Тьюринг смог показать, что не существует программы R , которая определяла бы, будет ли произвольная программа R (с входными данными D) работать в бесконечном цикле (известном как проблема остановки). Одновременно с этим Чёрч доказал аналогичный набор аксиом для арифметики, и поэтому это теперь называется тезисом Тьюринга-Чёрча.

15.2 Краткая история технологий AI

В истории ИИ можно выделить несколько областей технологических инноваций, которые проливают свет не только на наше понимание машинного интеллекта, но и на человеческий интеллект.

Методы ИИ можно классифицировать как числовые или символические. Из этих классификаций можно выделить три основных подхода к разработке ИИ. Хотя ни один из подходов не достиг совершенства в области ИИ, гибридные подходы постоянно совершенствуются, позволяя системам ИИ все глубже проникать в богатую данными культуру, которую развило человечество.

15.2.1 Искусственный интеллект, управляемый логикой: символические подходы

До того, как компьютер стал физической реальностью, символические подходы были необходимы, и работы Гёделя и Тьюринга определяют этот ранний период. Разработка языков символической обработки, таких как LISP и PROLOG, в течение 20 лет после Тьюринга совпала с периодом, возможно, ностальгического воображения. Теорема полноты для логики предикатов первого порядка (PL1) гласит, что каждое истинное утверждение, которое может быть представлено в такой логике, доказуемо, и обратное также верно (мы всегда можем определить исчисление таким образом, что доказуемы только истинные утверждения). Утверждения в PL1 преобразуют переменные в формулы. Например:

$$\forall x \text{ likes}(x, \text{cake}) \quad (15.1)$$

или по-английски: «Для всех x , x любит торт» или, проще говоря, «Всем нравится торт».

Большое количество программ ИИ первоначально было разработано для доказательства утверждений на языке PL1 с использованием так называемого «разрешительного исчисления» (называемого «автоматическими доказывающими теоремы»). Например, «Логический теоретик» (LT) Саймона и Ньюэлла, один из первых доказывающих теорем, предоставлял независимые доказательства различных теорем из «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда. Примечательно, что доказывающий начинал с конца, используя теорему в качестве отправной точки и ища соответствующие аксиомы и операторы для разработки доказательства.

Некоторые специалисты по ИИ придерживались мнения, что создание автоматических доказывающих теорем является предпоследним шагом в истинном ИИ — заключительным шагом является правильная формулировка всех задач на языке PL1. Маккарти (1960) предложил такую идеальную

программу, которую он назвал «принимающим советы». Такая программа могла бы выводить выводы из набора посылок. Если бы программа могла

[deduce for itself] a sufficiently wide class of immediate consequences of anything it is told and what it already knows

Тогда можно было бы сказать, что такая программа обладала «здравым смыслом». Историческая Дартмутская конференция 1956 года, широко считающаяся колыбелью ИИ как дисциплины, представила миру эти новые концепции, включая специализированный язык программирования LISP, специально разработанный для символической обработки.

Мечта Дартмута была затруднена тем, что часто называют «взрывом пространства поиска». Высококомбинаторный характер задействованных шагов вывода означает, что автоматический доказатель теорем может решить теорему за конечное время, но «конечное» обычно означает «непрактичное».

Это можно решить с помощью более совершенных алгоритмов поиска в пространстве решений. Например, большинство пространств решений можно организовать в виде деревьев решений, и алгоритм, используемый для навигации по дереву решений (которое может экспоненциально расти), может значительно сократить время вычислений и позволить доказательным системам функционировать в различных средах.

Человеческое познание также страдает от этого комбинаторного взрыва. Учитывая ограниченные ресурсы человеческого мозга (и зачастую чрезвычайно жесткие временные ограничения при принятии решений), люди применяют эвристики для поиска решения. По определению, эвристики просты и быстро вычисляются, и при правильном выборе могут обеспечить быстрые пути к решению, которое является более или менее оптимальным.

Классическим примером эвристики является алгоритм A^* для поиска путей. Алгоритмы поиска путей обычно применяются к таким задачам, как управление дорожным движением и маршрутизация коммунальных служб в городах. Определим множество вершин $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ и ребра, соединяющие вершины $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, причем вершины определяются их положением, а ребра — двумя вершинами, которые они соединяют (и последующими расстояниями между вершинами, которые мы будем обозначать как d_k для ребра e_k). Мы можем нарисовать путь между вершинами v_i и v_j , используя подмножество E . В идеале подмножество будет минимизировать сумму всех ребер в подмножестве

$$D = \sum_{e_k \in E} d_k. \quad (15.2)$$

The A* algorithm finds the shortest path from e_i to e_j , vertex by vertex, by calculating the following cost function at each:

$$C(v_k) = g(v_k) + h(v_k) \quad (15.3)$$

Здесь g — функция общей стоимости, вычисленная на основе всех предыдущих вершин до v_k , а h — эвристика. Обычно h устанавливается равным расстоянию между v_k и целевой вершиной v_j (Рисунок 15.1). На английском языке эвристика звучит как «выбрать следующую вершину так, чтобы расстояние до конца было наименьшим», и большинство людей узнают её, ориентируясь в окружающем мире. Эвристики, как правило, не гарантируют нахождение оптимальных решений, и в некоторых случаях они могут фактически увеличить время вычислений для задачи, а не уменьшить его. У людей эвристики являются причиной нескольких типов когнитивных искажений.

Кроме того, мы, вероятно, захотим решать задачи более высокого порядка логики. Например, следующее утверждение индукции само по себе является логическим оператором второго порядка (PL2), поскольку оно отображает как переменные, так и формулы:

$$\forall p \, p(n) \rightarrow p(n + 1) \quad (15.4)$$




Рисунок 15.1 Алгоритм A* в действии. Чтобы найти кратчайший путь между самой левой и самой правой вершинами этого графа (обозначены стрелками), алгоритм вычисляет функцию стоимости для всех возможных вершин, чтобы перейти к следующей вершине, используя расстояние между этой вершиной и пунктом назначения в качестве эвристики (уравнение 15.3).

PL2 systems are incomplete, that is, there exist true statements in PL2 that are not provable. Some PL2 statements can be reconstituted into PL1, but not all.

Предикатная логика в целом плохо приспособлена к учету неопределенности. Способность рассуждать, имея лишь частичную информацию, является ключевым аспектом интеллекта животных в целом, и любой машинный интеллект, вероятно, будет испытывать те же проблемы с нехваткой информации, что и все виды. Например, экспертные системы, используемые для постановки диагнозов, должны уметь выносить суждения на основе подмножества симптомов, проявляемых пациентом. Даже имея доступ к полному геному субъекта и подробной медицинской истории, любой диагноз должен быть выражен как вероятность, а не как достоверность

15.2.2 Биологически мотивированные подходы

Если мы хотим создать человекоподобный интеллект, можем ли мы просто запрограммировать мозг? Этот вопрос послужил толчком к разработке нейронных сетей — метода, ставшего возможным благодаря росту

вычислительной мощности, позволяющей моделировать большое количество элементов программирования. Нейронные сети находились в авангарде нового направления в ИИ, известного теперь как коннекционизм.

Человеческий мозг содержит приблизительно 10^{11} нейронов. Каждый нейрон состоит из аксона с дендритами, которые образуют связи с соседними нейронами. Каждый нейрон может накапливать и высвобождать заряд вдоль этих связей. Высвобождение заряда (известное как «срабатывание») происходит, когда напряжение нейрона превышает пороговое значение, и, следовательно, срабатывание любого нейрона коррелирует со срабатыванием других нейронов, связанных с ним. При срабатывании каждый нейрон увеличивает напряжение своих связанных партнеров до тех пор, пока они не смогут работать..

Тактовая частота отдельного нейрона составляет не более 1 кГц, что в миллионы раз ниже, чем у современного компьютера. Нейронная сеть мозга является массивно параллельной, что позволяет ей выполнять чрезвычайно сложные когнитивные задачи в реальном времени.

Огромное количество связей (каждый нейрон обычно имеет 10^{3-104} связей, что в сумме составляет около 10^{14-15} связей) и их трехмерное отображение в слоях мягких тканей не позволяют нам просто создать полную цифровую копию человеческого мозга. Это совершенно не связано с тем фактом, что нейронные связи находятся в постоянном состоянии изменений, образуясь по мере необходимости и распадаясь, когда перестают использоваться. Именно эта адаптация определяет место человеческого обучения как связь (синапс), а не нейрон. Электроны не могут свободно перемещаться от одного нейрона к другому, поскольку между ними обычно существует зазор. Вместо этого химические вещества, расположенные вдоль этого зазора (нейромедиаторы), могут быть ионизированы приложенным напряжением, перекрывая зазор. Проводимость синапса указывает на его использование: синапсы с высокой проводимостью обычно используются, и вся сеть зависит от поступления и концентрации различных форм нейромедиаторов.

Formally, a single neuron can be described by a sequence of n input values $\{x_j\}$, each describing the signal received from an individual synapse and a set of weights $\{w_{ij}\}$. The output signal w_i is given by the activation function f which acts as a function of the total weight:

$$x_i = f \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j \right) \quad (15.5)$$

If we propose a simple Heaviside step function for f :

$$f(x) = 0 \text{ if } x < 0, \quad (15.6)$$

$$1 \text{ otherwise} \quad (15.7)$$

then this is referred to as a *perceptron* with threshold. This neatly captures the essential behaviour of binary neurons.¹³

Подобно человеческой нейронной сети, искусственную нейронную сеть можно обучать, позволяя весам w каждого нейрона изменяться. Наиболее типичной моделью нейронной сети, используемой в машинном обучении, является трехслойная сеть обратного распространения ошибки (Рисунок 15.2). Сеть состоит из трех слоев нейронов: входного слоя из p^1 нейронов, скрытого слоя из p^2 нейронов и выходного слоя из p^3 нейронов. Каждый нейрон во входном слое соединен со скрытым слоем, а каждый нейрон во скрытом слое соединен с внешним слоем. Затем выходное значение выходного слоя $\{x_k\}$ сравнивается с целевым значением $\{t_k\}$.




Рисунок 15.2 Трехслойная нейронная сеть обратного распространения ошибки. Каждый нейрон i во входном слое соединен со скрытым слоем с помощью веса соединения w^1_{ij} . Затем каждый нейрон в скрытом слое соединен с нейроном в выходном слое k с помощью веса w^2_{jk} . Выходы x_k сравниваются с целевыми выходами t_k .

Initially all the weights w_{ij} are given random values. The network is then trained on a set of data, using a series of *forward propagation*. The inputs are propagated from the input layer, through the hidden layer to the output layer. Each neuron computes its x by equation (15.5), where n refers to the number of neurons in the layer below it.

¹³ If we wish to model neurons with non-binary activation, then f can be replaced with a sigmoid function.

The outputs in the output layer are then compared with the target, and the weights of the network are modified, beginning first with the hidden layer (*backward propagation*), so that the outputs more closely resemble the targets given as a training set.

The weights are modified according to the quadratic error function between the output layer and the target data:

$$(15.8) \quad \mathbf{w} = -\frac{1}{2} \sum_{k \in \text{output}} (t_k^2 - E_{xk})^2.$$

The weights of the network are adjusted at each backward propagation step to minimise E :

$$\mathbf{w}_{ij} = -\eta \frac{\partial E}{\partial \mathbf{w}_{ij}}, \quad (15.9)$$

where we introduce a constant parameter η as the *learning rate*. This is typically referred to as *gradient descent*, as one can imagine E being a potential surface of which the network is attempting to find minima. To avoid overfitting, one can perform the gradient descent with a random selection of neurons disconnected.

This basic model has had many successful applications in a variety of regimes, especially in pattern recognition, and other problems relating to robotics. Gradient descent can become challenging when there are a large number of local minima in E , or there are many thousands of weights and a significant tranche of training data. *Convolutional neural networks* are a common variant, with a convolutional filtering layer to reduce the inputs. This design is more fitting for analysing visual (i.e., pixel) data.

So-called *deep learning* neural networks use more than one hidden layer. This appears to allow better abstraction of a dataset into fewer distinct units, but obviously vastly increases the computational load to perform backpropagation.

15.2.3 Подходы, основанные на данных

Machine learning, originally a subfield of AI, has become immensely popular in the field of *data science*. Indeed, it is now a common misnomer to interchange AI and machine learning as labels.

At its core, machine learning is a discipline where computers use existing data to make predictions or responses to future data. Generally speaking, machine

learning algorithms construct an internal model of the data, and use this model as a predictor. Most machine learning algorithms lean heavily on statistical measures and optimisation.

We can classify most branches of machine learning into one of three categories. In *supervised* machine learning, the target outputs are clearly understood, and the system uses a *training set* to adjust its weights to correctly map from input to output. Neural networks are commonly used in this mode, as are *support vector machines*, which classify datasets into categories.

Unsupervised learning has no training set, and typically no prior target outputs. The machine is given a set of inputs and is expected to find structure inside the data, e.g., by classification or pattern matching. Neural networks can be used in an unsupervised mode – an example is the *self-organising map*, which rearranges multidimensional data points into a 2D grid such that similar data points are mapped onto adjacent grid points (Kohonen, 1982). Another is the generative adversarial network (GAN), which pits two neural networks against each other (Goodfellow et al., 2014). One network generates candidates, the other evaluates, with each attempting to ‘defeat’ the other in a zero-sum game, where the generator attempts to ‘fool’ the evaluator into thinking a generated item is in fact an authentic data point.

Reinforcement learning also has no training set, but the machine does have a concept of what is a ‘good’ outcome. An action a modifies the state s of the environment, and gives a reward $r(s,a)$, where the sign of the reward indicates positive or negative reinforcement. This is commonly used in robotics, where there are clear indicators of when a manual task is performed successfully or not.

15.3 Тест Тьюринга

Критической проблемой для большинства, если не для всех, из вышеописанных подходов является вопрос прозрачности. Это справедливо как для слабого, так и для сильного ИИ. Например, нейронную сеть можно обучить выполнять задачу — вождение автомобиля — с высокой эффективностью и точностью. Можно задаться вопросом: где внутри нейронной сети находятся инструкции машины по взаимодействию с детьми на дороге?

Ответ на этот вопрос на некотором уровне закодирован в весах нейронов. Извлечение ответа далеко не тривиально и становится экспоненциально сложнее по мере увеличения числа нейронов в сети. Такие продукты машинного обучения легко могут превратиться в «черные ящики»

— процессы, которые принимают входные данные и выдают выходные, при этом пользователь не может понять, как работает этот процесс.

Можно утверждать, что это вероятная особенность человекоподобного ИИ — в конце концов, мозг в некотором смысле является «черным ящиком». Нам повезло, что мы можем опрашивать биологические нейронные сети и получать лингвистические ответы с некоторым объяснением. Конечно, эти ответы несовершенны, но они проливают свет на работу нашего мозга. Если бы был разработан сильный ИИ, вполне возможно, что мы бы не до конца понимали его механизмы, так же как и не понимали бы человеческого собеседника.

Если это так, как же нам понять, обладает ли машина сильным ИИ? Тест Тьюринга на качество ИИ был прост. Человек ведёт разговор с анонимным субъектом. Если человек не может определить, что ответы исходят от машины, то машина считается прошедшей тест Тьюринга.

Этот тест подразумевает лежащую в его основе философию: всё, что кажется разумным, является разумным. За ужином я не могу определить процесс, посредством которого человек за столом напротив меня формирует ответы на мои утверждения. Всё, что кажется сильным ИИ, на самом деле является сильным ИИ.

Аргумент Сёрла о «китайской комнате» — убедительный ответ на это. Рассмотрим компьютерную программу, способную вести разговор на языке, которого вы не понимаете (Сёрл использует китайский), и которая проходит тест Тьюринга. В систему вводятся китайские иероглифы, а на выходе выдаются соответствующие китайские иероглифы.

Теперь представьте, что вы сидите с распечатанной копией исходного кода этой программы. Если вас поместили в комнату с двумя дверями, из одной из которых поступают китайские иероглифы, то в принципе возможно использовать программу для генерации ответа и отправки его через другую дверь. По сути, вы — компьютер, выполняющий программу. Но понимаете ли вы китайский язык? Нет!

Можно утверждать, что это всего лишь семантика, и что человек в «Китайской комнате» играет лишь механическую роль в интеллекте машины, подобно тому как если бы область мозга рассматривалась изолированно, сама по себе неспособная к сознанию, но являющаяся важнейшим компонентом сознания в целом. По сути, этот аргумент представляет собой подмножество многовековых споров о детализации человеческого сознания.

15.4 Is the Singularity Inevitable?

Kurzweil's vision of the Singularity is highly utopian – it signifies a major evolutionary transition, from the biological to the post-biological, with humans being able to either take complete control of their biological entity with nanotechnology and gene therapies, or to shed them and 'upload' their consciousness to a non-biological substrate.

Unsurprisingly, Kurzweil and his contemporaries share many detractors. First of all, for the Singularity to occur, artificial intelligence must be able to rise above a certain intelligence threshold, and we will show arguments at the end of this section that suggest this is impossible.

Much criticism is made of Singularity proponents' tendency to consider the timeline of technological progress on logarithmic scales. Critics note that presenting the time interval between significant events on log-log plots is likely to be biased in favour of a straight-line fit.

Perhaps more damningly, the concept of unending exponential growth has been touted in several different arenas of existential risk, and the trend has been shown not to hold (e.g., Malthusian theory for population growth, see Chapter 12).

Given similar datasets to Kurzweil's on other topics (world population, economic growth), one can fit exponential growth models to the data and claim a 'singularity' where one does not otherwise exist. This is especially easy to do if the latter half of the dataset is missing, which is true for the technological Singularity, as it lies in our future.

We can see from Bringsjord (2012) that the 'rational basis' for the Singularity is *logically brittle*. A natural statement S is said to be logically brittle if, once rendered into formal logic, it is either provably false or logically unsound. Let us consider

$S =$ 'The Singularity, barring external circumstances, is inevitable'.

We can render S into the following logical inference:

Premise 1 There will be human-level AI (created by humans)

Premise 2 If there is AI, it will create AI+ Premise

3 If there is AI+, it will create AI++ Therefore

There will be AI++.

Why is this argument brittle? We can investigate this by considering the classes of machine that can be produced by humans (and by machines). We can define three classes:

- M_1 : Push-down automata – more simplistic than the Turing machine, it can only read the input tape and the top element of a stack of data, as opposed to Turing machines which can read the entire stack
- M_2 : Standard Turing machines
- M_3 : Infinite-time Turing machines, which are able to calculate using the same method as M_2 , but at infinitely high speed (see Hamkins and Lewis, 2000)

It is easy enough to demonstrate by looking at the current status of machine learning, and other realms of AI, that human-developed AI is either at or below M_2 . Turing-Church theory demonstrates that a machine of class M_2 cannot produce a machine of class M_3 .

15.5 Controls on AI

We can see this by returning to the halting problem. Infinite-time Turing machines are in principle capable of solving the halting problem. If an M_2 machine can build an M_3 machine, in principle this would constitute a standard Turing machine that can compute and solve the halting problem, which is not possible.

This can be more generalisable (via complexity theory) to the statement that ' M_i is unable to produce M_j , where $i < j$ ', and there are hence definable roadblocks on the road to AI^{++} .

If we define human intelligence as M_p where $p > 2$, then by the above argument, AI cannot be raised beyond M_2 , and therefore human-level AI is not possible, thereby falsifying premise 1 and showing that S is unsound. Singularity pessimists hold this as strong evidence that the Singularity will never happen.

On the other hand, Singularity optimists can rightly argue that this in fact defines a clear condition for human-level AI to be possible: humans must be able to develop machines of class M_3 .

15.5 Контроль над ИИ

If the Singularity does occur, and superintelligent AI emerge, how can humans (and other intelligences) protect themselves?

Bostrom (2014) classifies the protective mechanisms available to biological intelligence into two categories: *capability control* and *motivation selection*. In the first, fail-safes are built into the AI before they become superintelligent. Such fail-safes can be physical (disconnection from the environment, quarantine from information systems, etc.), algorithmic (trip-wires that deactivate the AI if it exhibits dangerous behaviour) or simply stunting the AI's performance by restricting it to run on limited software or hardware.

In the second class, humans relinquish direct control of the AI's actions and capability, but instead attempt to imbue it with appropriate moral or ethical instructions, and trust its ability to make good decisions based on its own internal rules. Again, these protective mechanisms may be direct programming (such as Asimov's Three Laws of Robotics), behavioural training, programming the AI with rules for generating its own set of norms (*indirect normativity*) or augmenting the AI by adding a human component.

Alfonseca et al. (2016) argue that the halting problem itself places severe constraints on our ability to control superintelligent AI. The halting problem states that a function acting on machine T with input I , $Halt(T, I)$ is uncomputable. We can then define a function $HarmHumans()$ that harms humans in finite time, and write a further algorithm $HaltHarm(T, I)$, which first executes $T(I)$, then executes $HarmHumans()$.

This algorithm only harms humans if T executes without halting. If we can tell that this algorithm will harm humans, then we can determine that $T(I)$ will not halt, and hence we find a contradiction, proving that we cannot compute whether a machine will harm humans or not. We therefore cannot use an AI to determine if another AI is safe!

Following the 2017 Asilomar conference on AI, experts in the field became signatories to 23 guiding principles for future AI research.¹⁴ These principles address the day-to-day political issues of AI research, as well as the ethics and values that researchers should abide by, and some guidelines for assessing the risk of one's research. These are highly worthy aims for any attempt to develop machine intelligence – one can only hope that they are followed.

15.6 Is Strong AI Likely?

Given around seventy years of development, we cannot yet point to a convincing example of strong AI. We can point to several very powerful examples of weak AI (such as IBM's Watson), but these examples are not likely to evolve from their current limitations into a general artificial intelligence.

In a recent survey, experts gave a 50% probability that AI systems will eventually outperform human workers within the next 50 years at all tasks surveyed, with an effectively fully automated workforce within 120 years (Grace et al., 2017). This implies that AI development will itself become the province of

¹⁴ <https://futureoflife.org/ai-principles/>

AI, and a Singularity-like event could occur, although the survey respondents ascribed a low probability of this occurring (around 10%).

Those who believe strong AI to be unlikely often quote Fermi's Paradox: *if strong AI is possible, where are they?* We see no signs of strong alien AI, and hence they are either impossible or very short-lived.

We can consider several possible reasons as to why we see no sign of strong AI, human-made or otherwise:

1. Intelligence is not a one-dimensional property. As much as humans find the concept appealing, one cannot satisfactorily arrange animals in order from smartest to dumbest. Intelligence is instead a very high-dimensional combinatorial space. Weak AIs assume very small subsets of this combinatorial space (and now easily defeat humans in these regions). A strong AI would not necessarily be 'smarter' than humans, but merely operate in a different subset of intelligence space.
2. From reason 1, we can perhaps conclude that humans do not satisfy the conditions for strong AI either. We also only inhabit a small subset of the intelligence space. Our brains were evolved to permit our genetic legacy to endure, not to achieve fully rational cognition. A series of trade-offs has occurred to shape our minds to ensure their survival. It is quite possible an analogous set of tradeoffs will be made for AIs to function as required in human society. Will these trade-offs prevent strong AI?
3. Human-like intelligence is utterly wedded to its biological substrate. To produce a human-like AI, one might argue we must simulate an entire human, including its digestive and endocrine systems, to truly replicate a human mind. Of course, this does not rule out disembodied intelligence, but it remains unclear how such an AI would behave. Can a disembodied AI truly pass the Turing test?

Together, these arguments suggest that strong AI as we have described it is unlikely. Instead, we may find ourselves producing 'good-enough' AI – more general and flexible than weak AI, but not able to reproduce the level of flexibility and creativity of humans.

Even if strong AI is impossible, weak AI will continue to be installed into a multitude of institutions and products. Existential risks are still posed even if we are not confronted with a malicious intelligence. AI, like many tools developed by humans, is dual use. There are many ways that weak AI systems can be subverted by unfriendly actors. Exploiting vulnerabilities in digital security, interfering with black box models to alter the AI's predictions, or repurposing of airplane pilot AIs by terrorists are just a handful of threats posed by the increasing use of AI.

We must therefore remember: it may not be a superintelligence, but a hacked weak AI control system – the equivalent of a picked lock – that ends humanity (and other ETIs).

16. Звёздные войны

In 1986, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) released what is now known as the Seville Statement on Violence. In it, the undersigned scholars, from fields ranging from anthropology to neuroscience and psychology, were moved to make five propositions on the human propensity for violence and war.

1. It is scientifically incorrect to say we have inherited a tendency to make war from our animal ancestors.
2. It is scientifically incorrect to say war or any other violent behaviour is genetically programmed into our human nature.
3. It is scientifically incorrect to say that in the course of human evolution there has been a selection for aggressive behaviour more than other kinds of behaviour.
4. It is scientifically incorrect to say that humans have a 'violent brain'.
5. It is scientifically incorrect to say that war is caused by 'instinct', or any single motivation.

These are five bold propositions to make on the causes of war, violence and aggression in human civilisation. The factual accuracy of these statements has been roundly questioned in the intervening three decades, which we will address briefly, but they are an excellent place to begin our discussion of a potential solution to Fermi's Paradox – that there can be no civilisation without war, and with war there will eventually be no civilisation.

To address this solution – that civilisations destroy themselves through their own aggressive impulses and/or a political need to make catastrophic war – we must consider these five statements carefully, and decide whether war is inevitable in human civilisation, and indeed whether it is inevitable in any technological civilisation.

16.1 Истоки человеческих войн

What are the roots of warfare? We should first make a careful definition of warfare, as opposed to aggression, which is evident in many non-human species. A predator must show aggression if she wishes to eat her prey. In many cases, a male must use violence to defend his harem of breeding partners against competing males. A mother will answer an attack on her young with extreme prejudice. These are examples of instinctive response, in varying degrees essential to the life cycle of the organism. Defending one's young or breeding partner is obviously an adaptive trait, and often crucial if one's genetic material is to propagate.

A passable definition of war might be ‘collective killing for a collective purpose beyond consumption’. Hunting and predatory behaviour exists throughout the biosphere, and is heavily circumscribed by instinct and breeding – predators carve out territories to avoid encountering rivals, and if conflict occurs, it is brief and often marked by submission of one party before escalation.

Warfare clearly goes beyond hunting. Humans kill their own species with no intention to eat them, and not to protect their own reproductive partners. The genetic imperative of warfare is significantly diminished in comparison to the above examples. Systematically murdering competition may yield an advantage in breeding, but the cost of making war on the environment and fellow individuals may well nullify said advantage.

The development of increasingly advanced weaponry also dissociates us from our victims. Animal aggression is triggered by specific environmental stimuli, and can be suppressed by other stimuli. For example, primates can be stimulated into aggressive behaviour by appropriate manipulation of the limbic system with radio receivers, but will not attack dominant individuals even when stimulated thus (Delgado, 1969). The disgust response at seeing a fellow member of one’s species grievously hurt also acts as an inhibitor to further aggression. Hurling a spear from a distance weakens the disgust response – firing a missile from a computer terminal further so.

The origin of war as collective behaviour lies well down the family tree. Groups of chimpanzees have been observed to conduct campaigns of violence against other groups that bear all the hallmarks of modern conflict. The *casus belli* for such conflicts is typically resources. We should also note that insects from the *Hymenoptera* order (ants, bees, wasps) are also capable of waging what we would probably call war. When two ant colonies compete for resources, worker ants from both sides bite, sting and die in the hundreds of thousands. These are typically eusocial societies, so the genetic imperatives for worker ants going to war are extremely different (see page 124).

One could imagine that the earliest human warfare was conducted for similar reasons. A hunter-gatherer band happening on an agricultural settlement may have decided that killing the farmers and taking their crop and livestock was the easiest way to feed themselves. Hunting large animals as a group, using tools and weapons to level the playing field, may have quelled their fear response, and taught them the rudiments of military strategy.

It is important to note some distinguishing features of chimpanzee aggression compared to that of early human societies. In particular, there is a marked trend in in-group violence: chimp groups are thought to display non-lethal aggression between members around 200 times more frequently than, say, Australian Aboriginal groups of similar size (Wrangham et al., 2006). This suggests warfare

is a hijacking of internally aggressive behaviour by the social group, channelling violent behaviour outward. As human social networks grew denser and more complex, the concept of 'us vs them' allowed such dangerous impulses to be focused on external threats that could only be perceived by brains capable of sufficient abstraction.

This abstraction has allowed war to perpetuate even as humans have successfully vitiated their violent impulses. The continuing decline in violent crime and aggressive behaviour throughout the last few hundred years has been remarkable, and yet the casualties in the two World Wars reached distressingly high levels. The need for individual aggression has been superseded by the highly developed concepts of the nation-state, duty, honour and the belief that one's moral code and doctrine requires defending, even if such defence is the cause of individual trauma and horror.

This would seem to confirm the validity of statement 5. There are multiple causes of modern wars, and 'instinct' plays an extremely diminutive role. Military commanders cannot formulate strategy and tactics on instinct alone. One can point to many cases where soldiers cannot operate on instinct – for example, infantry personnel ascending a trench wall into a hail of machine gun fire must do so against every instinct afforded an animal with a strong drive for self-preservation.

16.2 Is Violence Innate to Humans?

Can we identify the source of violence in the human brain? There are indications that humans with a predisposition to violence possess markedly different brain structures to their 'normal' counterparts. These changes are most commonly associated with the prefrontal cortex, which regulates emotional behaviour. A study of 41 murderers that pleaded not guilty due to insanity were shown to have significantly reduced activity in the prefrontal cortex, as well as increased activity in the limbic system, which is associated with aggression itself. But are these genetically driven changes?

There is a good deal of debate regarding violence as an adaptive trait in early humans. As we have already noted, there are circumstances where aggression and killing may confer an advantage in primordial human societies, and there are many adherents to this 'homicide adaptation theory' (Buss, 2005; Durrant, 2009). Equally, killing may well be a by-product of achieving other goals, which are themselves adaptive. The human urge to achieve dominance or reproductive success, in what should be a non-lethal competition, can sometimes end in death, an accident against the wishes or desires of both parties. Given that most killing in peacetime is carried out by men of reproductive age in regions of high social inequality, both theories offer explanations to this observation. Equally, this observation is also strongly suggestive that nurture and environment play key

roles, reinforcing aggressive behaviour if and when it is successful in furthering an individual's goals.

While we may search for biological origins of aggression, and congratulate ourselves on the apparent decline in individual violence in society, we cannot ignore the fact that even if violence has a biological origin which might one day be mitigated by intervention, violence is also a tool of societal manipulation. Feudal monarchies, totalitarian dictatorships and tribal chiefdoms have used aggression to further their own ends. Violence without aggression is very real, and represents a disconnect between our biological drives and the demands of our ambient culture.

16.3 Ядерная война и оружие массового уничтожения

The ultimate example of politicised violence, absent personal aggression, is the use of nuclear weapons and other weapons of mass destruction. As I write these words, the Doomsday Clock, which measures the threat of global nuclear annihilation, has moved 30 seconds closer to midnight, where midnight symbolises the beginning of Armageddon.¹⁵ The Bulletin of the Atomic Scientists instigated the setting of the Clock in 1947, with the hands set at 7 minutes to midnight. Every year since, the Doomsday Clock has been set closer to and further from midnight. As additional threats to humanity have emerged, the Clock now takes into account several global risk factors, such as climate change and biosecurity risk.

In 2017, the Clock was set at two and a half minutes to midnight, reflecting the enhanced risk to our planet, particularly from nuclear attack. As of 2013, the Earth possesses 10,213 nuclear warheads, distributed between several nation-states, with a total destructive power of order 6 million kilotonnes (kt). Some 90% of the world's arsenal remains divided between the United States of America and the Russian Federation, with both states continuing to modernise their weaponry. Perhaps most concerningly, Pakistan and India continue to dispute the territory of Kashmir, and both states are card-carrying members of the nuclear club.

Between 2010 and 2015, some 58 'security events' have occurred, putting nuclear material at risk through loss, theft or other violations and lapses in procedures that contaminate the material. These events leave open the possibility that either rogue states or non-state actors such as terrorist organisations could gain access to radioactive material, causing significant destruction with low-yield 'dirty

¹⁵ <http://thebulletin.org/doomsday-dashboard>

bombs’, and potentially triggering World War III itself. Einstein is famous for having said

I know not what weapons World War III will be fought with, but the fourth World War will be fought with sticks and stones.

This seems to have been a common trope at the time, but whether it was Einstein who coined this phrase, or General Bradley, or an anonymous GI stationed in Germany during the postwar transition, its meaning is clear. If the nations of Earth chose to engage in total war, as they did between 1939 and 1945, and nuclear weapons are used, then human civilisation as we understand it is likely to end.

A nuclear explosion has two principal sources of radiation – directly from the nuclear explosion, and indirectly from radioactive fallout. This refers to the radioactive particles thrown into the upper atmosphere by the explosion, which then descend slowly to the ground. If the entire nuclear arsenal were to be deployed evenly across the entire Earth’s surface, this is roughly equivalent to 25 kt of explosive per square kilometre (Stevens et al., 2016), i.e., more than one Hiroshima bomb for every square kilometre. If we consider the radiation from the fallout alone, then nuclear tests conducted in Samagucha indicate that this would result in a radiation dose rate of approximately 1 milliGray/hour, which eventually decays to normal background levels over a period of a hundred days. A whole body dose of around 2–6 Grays is generally fatal, meaning that the fallout is likely to cause a fatal dose if the subject is exposed to these levels for a few weeks. Given that these estimates are based on a single test site, and do not take atmospheric currents into account, the entire terrestrial biosphere may be effectively extinguished in less than a month.

It would therefore seem that a strong solution to Fermi’s Paradox is that ‘civilisations cannot survive the invention of atomic power and nuclear weapons’. A worthwhile counter-argument to this is the fact that human civilisation is not yet extinguished. The Doomsday Clock is now 70 years old. The carnage visited upon Hiroshima and Nagasaki has stayed the hands of two superpowers through what some have called ‘the Long Peace’. Despite fighting proxy wars and engaging in vigorous subterfuge, the USA and USSR did not launch a nuclear attack against each other, despite some moments where it seemed likely. We have transitioned from trembling under a sword of Damocles, to being able to look through the steel. Nuclear weapons are a threat to our existence, but they have also been a bulwark against war. As much as the doctrine of Mutually Assured Destruction may seem indeed MAD, it has stayed the hand of people that would be otherwise willing to use it.

However, past performance is no guarantee of future competence.

16.4 Is War Inevitable amongst Intelligent Civilisations?

We must sadly answer this by giving no definitive answer. We might prevaricate and say that aggression is a common feature of metazoan organisms. Sentient creatures whose ancestors were predatory may develop those predatory instincts into warlike conflicts, but such a phenomenon is most likely conditional on external factors, especially the availability of resources.

We might also say that conquest can be adaptive under the right circumstances. It seems clear from human history that the military solution to hunger was discovered quite early, and a literal arms race began between attackers and defenders. Again, this might only establish competition over resources – if the highly ritualised nature of resource competition between animals was somehow imprinted into a sentient species, then the total war that humanity experienced in the twentieth century might not occur at all, and the alien equivalent of war is merely a sport where the winner takes all, and the loser's wounds are bloodless.

17. Социальный коллапс

The preceding chapters have outlined various stressors or pressures that can exert themselves upon a civilisation. A combination of these factors can result in a breakdown of the social and political contracts between individuals, and the disintegration of society.

Human history, in many ways, is the history of the genesis and death of societies. We should note that the death of a society is not guaranteed to be the death of the individuals that form this society. Much is made of the rise and fall of the Roman Empire, which saw a Mediterranean society grow from a single city to a state that stretched from Baghdad to the Atlantic coasts of Europe (in 117 CE, under Emperor Trajan), then tear itself apart through a raft of civil wars. The Western Roman Empire is considered by most historians to have effectively ended when Odoacer deposed the Western Emperor Romulus (although the emperor's hold on distant territory had long been nonexistent, and Roman territories would continue to raise emperors for decades afterwards).

However, the dissolution of the Western Empire did not destroy the Roman people, only their way of life. It is clear that many, especially the invading Goths, benefited enormously from what some would have considered an aggressive reorganisation rather than total destruction. In outlying territories, the demise of central bureaucracy did not require the demise of local bureaucracy, and Roman culture was deeply ingrained in the new states born from the Empire's demise.

From our point of view, we want to know what makes a society collapse so fundamentally that its constituent people are no longer capable of civilisation. We have very few examples of this, as humans still exist on the Earth. However, we can look to societies which have failed locally, and comment on how these failures could become a global phenomenon.

17.1 Общие причины социального коллапса

There are many schools of thought on the causes of societal collapse. There are dozens of ascribed causes for the collapse of the Western Roman Empire, and this is one among hundreds of extinct societies to which we have archaeological access.

Diamond (2013) notes five principal factors that form his framework of societal collapse:

- Self-inflicted environmental damage,
- Climate change,
- Hostilities with other societies,
- Trading relations with other societies,

- Cultural attitudes.

The first three factors are covered to varying degrees by the previous chapters of this part of the book. Indeed, we could generalise this framework as

- Self-inflicted stressors,
- External stressors,
- Relations with neighbouring societies, • Cultural attitudes.

We have listed many self-inflicted stressors in previous chapters (genetic engineering, nanotechnology), and external stressors indicate those factors over which civilisations have limited to no control (e.g., asteroid impacts or supervolcanism).

Joseph Tainter's seminal work *The Collapse of Complex Societies* interrogates the ability of societies to solve problems, a fundamental skill needed to weather the effects of the above factors, and adapt to an ever-changing environment. Tainter's view is informed by economics and complexity theory – as a society attempts to solve new problems, it designs institutions and bureaucracies to achieve this task.

This inevitably increases the complexity of a given society – i.e., it is composed of a greater number of parts, a greater number of differentiated types of part, and greater integration between parts of the same type and different types. More complex societies demand greater energy resources, in a strong analogy with the negentropy demands of organisms in biology. Complex societies rely on their complexity as a problem-solving tool, resulting in a positive feedback loop.

Tainter argues that each increase in complexity offers diminishing economic returns for the society. In particular, the flow of information becomes less coherent as it traverses a complex organisation. Decision making suddenly has unforeseen consequences, which add unexpected and possibly heavy costs. In general, as societies continue to grow in complexity, diminishing returns result in depleted resources, generating sufficient intersocial tension that drives the society to collapse.

Complexity therefore becomes a proximate cause of poor decision making, which itself is a cause of societal failure. Diamond proposes four categories of poor decision making:

- Failure to anticipate an imminent problem,
- Failure to perceive a current problem,
- Failure to attempt to find a solution,
- Failure to find a solution.

The above four failures depend on a society's previous experience with problem solving, the institutional memory of a society's dealings with previous problems, and the vigour of its institutions in responding to and solving problems.

The institutions a society builds are heavily influenced by its cultural values. Complex societies are predicated on the flow of information, and the education of its citizens becomes increasingly vital if this information flow is to be correctly manipulated. However, it can be stated with reasonable mathematical rigour that the productivity ascribable to new acquired knowledge is initially very high, but certainly begins to decline as the sum of acquired knowledge becomes very large (Tainter, 2000). As new challenges impact a society, the ability to generate solutions to the problem becomes prohibitively expensive.

Paraphrasing Toynbee in his (now largely ignored) thesis *A Study of History*, civilisations eventually find a problem they cannot solve. This statement could be construed as a solution to Fermi's Paradox. Whether this solution is hard or soft remains a matter for debate.

The Need for Social Capital Even in a society free from internal or external stressors, it is entirely possible that a society can collapse merely because its binding elements begin to fail. If the fabric of society itself has a finite lifespan, then this ultimately means a finite lifespan for civilisations themselves. Human societies are founded on mutual trust and co-operation, formalised by a variety of social and political institutions. We can quantify this via 'social capital', a concept that describes the intrinsic value of social networks.

The precise definition of social capital varies from author to author – Adler and Kwon (2002) present a range of definitions. Common to all these definitions is a recognition that goodwill generated between humans is the substance of social capital, which generates varying levels of influence and solidarity between individuals in the social network.

This capital can itself be divided into two principal types: internal or 'bonded' social capital, and external or 'bridging' social capital. Bonded social capital is derived from networks of people who are in some way similar or homogeneous: examples include close friends and relatives. Bridging social capital crosses divides in society, whether they are socio-economic, political, or otherwise. Examples of networks with bridging social capital might be playing for a local sports team, groups of hobbyists or enthusiasts, or fellow employees in a company.

The multiple definitions of social capital vary depending on the focus (internal/external), but they do agree on an important property that distinguishes social capital from other forms (such as economic, human or environmental capital). Like a sum of money subject to inflation, social capital needs continual maintenance. Relationships that are not tended will wither, and network contacts are unlikely to assist a colleague if they do not feel like the connection is valued.

Studies have shown that increased social capital is correlated with individual health benefits, better-functioning governments and more-productive economies (Helliwell and Putnam, 2004). Conversely, poor social capital correlates with increased rates of illness (especially illnesses caused by mental or emotional stress), increased crime rates (Sampson, 2012) and higher levels of institutional corruption (Putnam, 2000).

Social capital also feeds back into environmental capital, and the notion of sustainability. For one generation to care about the circumstances of the next requires social capital to link the two. A world rich in social capital is a world invested in its future inhabitants, and as such a world that would attempt to build and maintain environmental capital.

It is important to note that bridging social capital – the foundation of institutions – is key to societal success. Bonded social capital plays a role in maintaining individual health and well-being (e.g., having grandparents available for childcare, or a spouse to look after their sick partner), bridging social capital brings down barriers and dilutes the effects of segregation. A society with a preponderance of bonded social capital and a lack of bridging capital encourages an ‘us versus them’ mentality that can erode implicit trust in strangers and institutions, and encourage us to prioritise ourselves against others, to the detriment of all.

Нет никаких гарантий, что экономически успешное общество богато социальным капиталом. Общества, которые полагаются на иммиграцию для стимулирования экономического роста, в свою очередь, могут нанести ущерб источникам социального капитала, в частности, источникам связанного социального капитала (принадлежность, социальная солидарность) (Putnam, 2007; Ariely, 2014). Может быть даже верно обратное – люди в обществе, избыток связанного социального капитала, могут неспособны должным образом оценить навыки принятия решений своих сетевых связей из-за неявного доверия, порожденного социальными или этническими связями. Такие неудачи были выявлены, например, в ценообразовании акций, где этнически однородные рынки оказались более склонны к завышению цен и последующим «ценовым пузырям», которые могут нанести финансовый ущерб.

Мы могли бы предложить решение парадокса Ферми в следующем ключе: «Цивилизации имеют короткий срок жизни, потому что они не могут надежно генерировать здоровый социальный капитал». Цивилизации, которые следуют этому сценарию краха, распадаются, потому что исчезает негласное доверие между незнакомцами. Даже общество, богатое сплоченным социальным капиталом, может потерпеть неудачу из-за того, что Патнэм называет эффектом «затаивания». Семейные ячейки спланиваются вокруг друг друга и заботятся о своих. Концепция уплаты

налогов для помощи другим становится предосудительной, и общественный договор распадается..

17.2 Интеллектуальный коллапс

It is a common, almost hidden assumption amongst SETI scientists that any intelligent civilisation will contain curious, exploring individuals that are unsatisfied with their current level of knowledge about the Universe. It is partially a reflection of the scientists' own predilections – a hope that if another civilisation is found, they are a kindred spirit.

Like all assumptions, we must examine it carefully. Is there any guarantee that an alien civilisation will remain intellectually curious? We could imagine a civilisation that has achieved a perfect understanding of the Universe and its constituents (or it has decided that its understanding is sufficient). Such a civilisation could construct a high-fidelity simulation of the Universe as a more satisfying, pleasing alternative to our reality (see Chapter 24).

If ETIs retreat into leisure and forsake exploration, scientific research and communication, then their detectability is bound to decrease. The only conceivable signature such inward-looking creatures would produce would be the waste heat from their entertainment devices.

This could be thought of as the thin end of the wedge. A civilisation that becomes overly engrossed in leisure pursuits could do so to the detriment of a civilisation's other, more crucial functions: the storage and transmission of knowledge, the maintenance of environmental and social capital, and the survival of its citizens.

We can only speculate on what would happen if humans underwent such an intellectual collapse. A true mental regression is unlikely to occur – the *homo sapiens* brain has existed in its current form for millennia, and a few decades of idling is not going to change its configuration. If the transmission of knowledge failed – for example, if the skill of literacy was lost, and oral transmission ceased – most of civilisation would fall apart rapidly as essential equipment failed and was not maintained. Launching spacecraft and sending transmissions would certainly cease, and our visibility as a species would be reduced to atmospheric signatures.

Like other social solutions to Fermi's Paradox, this is soft. We are demanding all civilisations collapse or recede into their own fantasies because they simply stop trying – what does this say about our own civilisation? Or are we simply projecting our own fears about the trajectory of our species?

18. Разумная жизнь только появилась

На первый взгляд, эта группа решений, носящая временной характер, довольно неудобно вписывается в любую классификацию с использованием независимого от времени уравнения Дрейка. В своей простейшей форме это снижает ценность f_c , поскольку ни одна разумная цивилизация Млечного Пути еще не способна к межзвездному общению (или исследованию с помощью зондов). Но почему мы можем ожидать, что не существует древнего разума, несмотря на то, что, очевидно, существуют довольно древние звезды и планеты?

18.1 Аргумент Картера против SETI

Using a line of argument reminiscent of the Doomsday Hypotheses we discussed in Chapter 7, Carter and McCrea (1983) considered the apparent coincidence between the evolutionary timescale required for the genesis of intelligent life on Earth:

$$t_i \approx 0.4 \times 10^{10} \text{yr} \quad (18.1)$$

and the main sequence lifetime of the Sun:

$$t_{\text{MS}} \approx 10^{10} \text{yr} \quad (18.2)$$

Is this truly a coincidence? At first glance, these two timescales should be uncorrelated, and there are three possibilities:

1. $t_i \gg t_{\text{MS}}$
2. $t_i \approx t_{\text{MS}}$
3. $t_i \ll t_{\text{MS}}$

If the two timescales are uncorrelated, the second possibility should be *a priori* the least likely. Carter also dismisses the third possibility, as it appears to be at odds with our observation that $t_i \sim t_{\text{MS}}$. We are then forced to typically accept the first possibility, which is that the typical timescale required to produce intelligent life is extremely long compared to the constraints imposed by astrophysical considerations.

This might seem at odds with the fact that we are present to make these deductions. Carter invokes the *anthropic principle* in this case. The universe looks this way to us due to the selection effects that allow our existence. In general, $t_i \gg$

t_{MS} , but for us to be able to observe the Universe and find the Great Silence, we must be one of the few fortunate species where in fact $t_i \approx t_{\text{MS}}$.

This argument therefore seems to indicate that ETIs are extremely unlikely. Most civilisations fail to develop in advance of their host stars leaving the main sequence, which would most likely result in the destruction of non-technological civilisations. As a result, only a very small number of ETIs develop sufficiently rapidly to avoid this end.

One way to refute this argument is to argue that t_i and t_{MS} are in fact correlated, or that in a general sense astrophysical and biological evolution are more deeply interlinked. Global regulation mechanisms are one way in which this could be possible.

18.2 Глобальные механизмы регулирования и решение проблемы фазового перехода

In our study of the Catastrophist solutions, we came across galactic-scale natural disasters that could spell doom for civilisations within thousands of light-years of the event (Chapter 11). Habitable planets that exist within range of these catastrophic events may be subject to a ‘resetting’ of their biological clocks by these astrophysical events. These resetting events influence the biological timescale, by forcing regions of the Milky Way to recommence biological evolution at the same moment (Annis, 1999; Vukotic and Cirković, 2007; Vukotic and Cirkovic, 2008).

This is not proposing a direct link between the biological timescale and the *local* astrophysical timescale. What it does propose is a link between neighbouring biological timescales, and that biological timescales are forced by astrophysical constraints beyond the local environment.

Multiple mechanisms have been proposed, with several criteria that need to be satisfied. Firstly, the events must occur sufficiently regularly at early times that a quasi-equilibrium state can be achieved. Secondly, the event must be able to affect a sufficiently large spatial extent; and lastly, there should be some sort of secular evolution of the event rate.

The most obvious mechanism is gamma ray bursts. These extremely powerful explosions can be effective at distances in excess of a kiloparsec, and would have occurred much more frequently in the past than the present, due to gamma ray bursts being preferentially the fruit of low metallicity progenitors (Piran and Jimenez, 2014).

Other candidates may include the Galactic tide, which in the case of the Solar System perturbs the Oort Cloud and increases the impact rate on the inner terrestrial planets. In a similar vein, the passage of the Sun through a Galactic spiral arm can also perturb the Oort Cloud, and has also been claimed by some to affect

the Earth's climate through an increase in local optical depth between the Earth and Sun (although the strength of this latter effect is vigorously argued).

Whatever the cause, if these global regulation mechanisms are functional, they can synchronise biospheres over large regions of the Galaxy. As the rate of resetting events begins to decrease, the equilibrium state of astrobiological systems begins to shift. During the early, high-event-rate phase, intelligent life fails to appear as resetting events prevent life from achieving this phase. As the event rate drops below a critical value, habitats are given sufficient time to 'grow' a technological civilisation, and ETIs begin to appear in the Milky Way (Рисунок 18.1).




Рисунок 18.1 An example of global regulation mechanisms inducing a phase transition in a very simplified model of the Milky Way, as originally published in Vukotic and Cirković (2007). Multiple sites are assigned a timescale for producing an intelligent civilisation (selected uniformly between 10^8 and 10^{16} years). Given an appropriate distribution of ages, and a probability Q that a resetting event will destroy a given site's chance to grow a civilisation, one can produce a phase transition in the number of intelligent civilisations N . The number of sites with an intelligent civilisation is suppressed at early times due to a high frequency of resetting events. As the frequency of resetting events decays, more civilisations can eventually appear in this simple model.

This has given rise to the notion of a 'phase transition' solution to Fermi's Paradox – the Milky Way is emerging from a state in which the number of ETIs is low, to a new state where the Milky Way is populated with a large number of ETIs, all at a similar stage in technological development thanks to the resetting effects of

an increasingly weak global regulation mechanism. Fermi's Paradox is then resolved by saying that we are amongst the first (or indeed, we are the first).

19. Объяснения несовершенны

Если предположить, что внеземные цивилизации откроют Землю в ходе исследования Млечного Пути с помощью космических аппаратов, то жизнеспособным решением парадокса Ферми является то, что внеземные цивилизации по одной из многих причин либо не могли, либо еще не смогли исследовать Землю. В этой главе мы рассмотрим взгляды человечества на беспилотное исследование Млечного Пути и рассмотрим, почему оно может оказаться недостаточным для полного картирования.

19.1 Модели теории перколяции

Лучше всего начать рассмотрение концепции несовершенного исследования с основополагающей работы Джеффри Лэндиса (Geoffrey Landis, 1998), в которой теория перколяции используется для моделирования межзвездного заселения.

Теория перколяции, хорошо известная в физике конденсированных сред (и других областях), описывает рост объекта по ряду узлов решетки. Для того чтобы объект перешел с одного узла на другой, соседний узел, задается вероятность P . Модели перколяции устанавливают ряд занятых узлов решетки, а затем проверяют каждый узел на перколяцию к соседнему незанятому узлу. Если узел не занимает соседний узел, он прекращает свое движение.

Основная задача моделирования перколяции — определить критическую вероятность P_c , которая обычно является функцией связности узлов решетки или, проще говоря, геометрии моделируемой системы. Если вероятность перколяции $P > P_c$, то объект может пересечь все узлы решетки и заполнить систему. Если вероятность перколяции $P < P_c$, то перколяция в конечном итоге прекратится, и области системы останутся незатронутыми. Однако даже при $P > P_c$ небольшое количество узлов может остаться незанятым.

We can think of interstellar colonisation in this form. Star systems are our lattice sites, and inhabitants of these star systems can colonise nearby stars with a fixed probability P . Landis's original work considers a simple two-dimensional cubic lattice system.




Рисунок 19.1. Примеры перколяционной модели Ландиса (в 2D). Черные квадраты обозначают активные участки колонизации, белые квадраты — участки, колонизация которых прекратилась, а серые квадраты — участки, которые еще не исследованы. Вверху: $P = 0,4$, что немного ниже критического значения для 2D квадратных решеток. Видна нитевидная структура участков колонизации, а также большие области неисследованных участков. Внизу: $P = 0,6$, что немного выше критического значения, и вся область исследована.

Очевидно, это не отражает истинную звездную картографию, но у этого подхода есть преимущество в том, что P_c хорошо изучено для кубической решетки, и можно показать, что $P_c = 0.311$ (см., например, Wang et al. 2013). Если $P = 0.333$, то есть немного больше критического значения, то занятые места можно обнаружить на большей части области, но распределение занятых мест фрактальное, и существуют также значительные пустоты. Это приводит к довольно простому решению парадокса Ферми — мы существуем в одной из этих пустот, и пустота достаточно велика, чтобы либо исключить контакт, либо потребовать значительного времени распространения света для его возникновения.

В этой простой модели вероятность того, что мы находимся в «незанятом узле решетки», пропорциональна $P N_{adj}$, где N_{adj} — число смежных узлов, соединенных с любым данным узлом. Но модель упрощена в нескольких аспектах. Очевидно, что связность каждой звездной системы, вероятно, будет меняться (поскольку расстояния между звездными системами меняются со временем), но также меняется и вероятность колонизации другого места, поэтому можно ожидать, что P и N_{adj} будут эволюционировать в ходе моделирования перколяции.

Уайли (2011) отметил, что в модель Ландиса можно внести несколько уточнений. Во-первых, можно ожидать, что колонии будут умирать через некоторое время, позволяя новым фронтам колонизации продолжать движение через недавно освободившиеся системы. Во-вторых, колония, решившая прекратить колонизацию других систем, может передумать. Эта «мутация» мотивов колонизации кажется вполне приемлемой, учитывая меняющиеся цели и атрибуты человеческой культуры за последние несколько тысяч лет.

Наиболее подробное описание перколяции на трехмерных кубических решетках принадлежит работе Хайра и Хедмана (Haig and Hedman, 2013). В работе Ландиса предполагалось, что связь между узлами решетки может происходить только на гранях кубов, что давало $N = 6$. Хайр и Хедман предложили рассматривать все смежные кубы как узлы решетки, что давало $N = 26$. В несколько ином подходе они определяют величину, аналогичную P , и величину m , которая соответствует максимальному числу узлов, которые можно колонизировать из одного узла, причем $m \in [1, N]$. Они также обнаружили, что существуют критические пределы для полного исследования решетки. Если P или m слишком малы, то исследование конечно и не распространяется на ребра решетки. Если m достаточно велико, то решетка полностью исследована при условии, что $P \sim 0,5$. Скорость роста (измеряемая максимальным расстоянием между вершинами) не зависит от m , но является субэкспоненциальной, если $m < N$.

19.2 Исследование реальных скоплений звёзд

Совсем недавно в моделировании Bjørk (2007) рассматривался разделенный подход к зондовым исследованиям. В его работе был

предложен сценарий зондов и субзондов. Материнские зонды отправляются в определенный регион Галактики, а по прибытии отправляют несколько дополнительных зондов для исследования местной среды. По завершении исследования зонды возвращаются к материнскому зонду и перемещаются в новый регион.




Рисунок 19.2 Пример исследования зонда в симуляциях Бьорка (Björk, 2007).

Пытаться смоделировать всю Галактику сразу с вычислительной точки зрения требует огромной вычислительной мощности. Даже если сократить звёздную популяцию и удалить потенциально опасные массивные звёзды, а также короткоживущие двойные системы (и рассматривать звёзды лишь в кольце галактической зоны обитаемости, GHZ, между 3 и 11 кпс), то и тогда останется примерно 10^{10} звёзд, которые должны посетить зонды для поиска обитаемых (или необитаемых) планет. Björk начал с моделирования в кубическом объёме 40000 звёзд (рисунок 19.2), где каждый куб представлял часть галактического диска.

В этом регионе предполагается, что был запущен один основной зонд, а вспомогательные зонды исследуют 40 000 звезд. Эти первоначальные модели дают масштабирующие соотношения для времени исследования как функции положения относительно Галактического центра, при этом время исследования в пределах области остается неизменны

$$t_{box} = ae^{br}, \quad (19.1)$$

где a и b — подобранные параметры, а r — расстояние ячейки от центра Галактики. Положение ячейки определяет локальную плотность звезд. Учитывая, что плотность звезд в Галактике экспоненциально убывает с ростом r , форма t_{box} интуитивно понятна.

Эти масштабирующие соотношения затем можно применить к квадранту галактического диска, который моделируется как набор из 64 000 ячеек, при этом t_{box} рассчитывается на основе приведенных выше данных. Таким образом, можно запустить более крупную, грубую симуляцию, которая покажет, как набор материнских зондов исследует значительную часть Млечного Пути. Бьорк (Björk, 2007) был вынужден прийти к выводу, что подход с использованием зондов/субзондов, смоделированный здесь, не является жизнеспособным подходом для исследования Галактики за разумно короткий период времени. Даже с 8 зондами, каждый из которых содержит 8 субзондов, можно исследовать около 400 000 звезд за 292 млн лет, что приведет к общему времени исследования Галактики в несколько миллиардов лет.

В том же смысле, что и в примере с теорией перколяции, мы можем представить звёздное поле как сеть узлов (звезд), в которой следует связывать рёбрами (зонды выбирают кратчайшие пути по звёздному полю). Котта и Моралес (Cotta and Morales, 2009) отметили, что, поскольку это описание сети является полным, выбор пути для подзондов является примером пресловутой задачи «коммивояжера», которая пытается сократить полный размер пути, сложенного ребрами между узлами сети, где каждое ребро проходит один раз. Эта задача была определена как «NP-сложная», где NP означает недетерминированный полином.

В общем случае полиномиальная задача (или P-задача) определяется как задача, имеющая по крайней мере одно решение, алгоритм которой имеет число шагов N , а время выполнения алгоритма ограничено N в некоторой степени p . Обычно это обозначается как $O(N^p)$. Например, вычисление парных сил между N частицами (таких как гравитационная сила), если оно вычисляется явно для каждой пары частиц, масштабируется как $O(N^2)$. Приближения к этому методу (например, использование kd-деревьев для уменьшения вычислений пар частиц на больших расстояниях) могут улучшить этот масштаб вычислений до $O(N \log N)$. NP-трудные задачи (в общем случае) не могут быть решены за полиномиальное время. Они могут быть проверены за полиномиальное время, т.е., если нам представлено решение, мы можем подтвердить его достоверность за полиномиальное время.

Задача коммивояжера имеет алгоритм для получения точного решения — метод перебора всех перестановок пути коммивояжера, — но решение масштабируется как $O(N!)$, где N — количество остановок на пути. Такое масштабирование быстро становится непрактичным даже для небольшого числа остановок. В большинстве случаев можно добиться гораздо лучшего масштабирования, используя простые эвристики (как мы обсуждали ранее).

В работе Бьёрка (Björk, 2007) субзондам назначался набор звезд, занимающих заданный диапазон в вертикальном направлении, чтобы избежать перекрытия с их компаньонами-субзонами. После посещения цели субзонды выбирали следующую цель в соответствии с расстоянием до всех целей, выбирая ближайшую цель. Простые эвристики, такие как эвристика ближайшего соседа (NNH), имеют очевидные вычислительные преимущества, но они не гарантируют, что группа субзондов будет сотрудничать для создания оптимизированных маршрутов для всей группы в целом.

Котта и Моралес (Cotta and Morales, 2009) рассматривают два улучшения эвристики ближайшего соседа (NNH). Они начинаются с построения всего маршрута с использованием NNH, а затем вносят небольшие изменения в соединения на всем маршруте, проверяя, уменьшают ли они общее время в пути. Подход 1-орт рассматривает последнюю звезду на маршруте подзонды и пытается назначить ее другой подзонде, чтобы проверить, может ли это привести к сокращению общего времени в пути. Второй подход (известный как 2-орт) берет любые два ребра на маршруте, которые в данный момент не смежны, и пересоединяет их. Если этот модифицированный маршрут лучше предыдущего, он сохраняется. Эта процедура выполняется для всех возможных несмежных соединений, поэтому этот результат является оптимальным относительно любого изменения двух несмежных ребер.

Используя эти эвристические методы, Котта и Моралес разработали новые масштабирующие соотношения для субзондов, исследующих области, а затем применили их к галактическому квадранту очень похожим образом, как это сделал Бьорк (2007) (за исключением использования ячеек сетки в галактических масштабах, а не частиц). Эвристический метод NNH используется для зондов без изменений — только субзонды пытаются оптимизировать свое исследование

Подход с использованием ячеек решетки вместе с несколькими прогонами позволяет выполнить некоторые интересные вероятностные расчеты. Вероятность p того, что данную ячейку (i, j) (где индексы относятся к полярному углу ϕ и расстоянию r от центра соответственно) будет

посещена зондами, запущенными из ячейки (i, j) в момент времени t , определяется просто относительной частота возникновения этого события, установленная в результате нескольких запусков. Симметричное вращение в этих расчетах означает

$$P(i, j \rightarrow i', j') = P(i + k, j \rightarrow i' + k, j') \quad (19.2)$$

где k - целое. Эта вращательная симметрия позволяет добавить галактическое вращение в расчет, просто добавив значение k , соответствующее полному вращению за время t .

С помощью вычислений вероятности того, что любая ячейка сетки в Млечном Пути полностью исследовала ячейку сетки, содержащую Солнечную систему, Котта и Моралес могут затем вычислить дополнительную вероятность того, что ни один зонд не исследовал ячейку сетки Солнечной системы. Для этого требуется предположение о количестве исследовательских групп в Млечном Пути в любой момент времени, а также некоторые оценки ожидаемого времени жизни зондов и того, как долго, как ожидается, будут сохраняться остаточные свидетельства исследования Солнечной системы (см. главу 25)..

В этой работе был сделан вывод, что если бы более $10^2 - 10^3$ цивилизаций в настоящее время исследовали Млечный Путь, используя этот подход, статистически весьма вероятно, что мы увидим доказательства этого в Солнечной системе.

Картан (Cartin, 2013) продолжил оценку последствий исследования Солнечной системы внеземными цивилизациями. Проведя моделирование в меньшем масштабе и используя известные положения звезд в пределах десяти парсеков от Земли, он показал, что наша звездная система может существовать в неисследованном пространстве с относительно высокой вероятностью, в зависимости от максимального времени полета и общей устойчивости исследовательского флота, а также от общего количества зондов в его составе.

19.3 Проекты межзвёздных зондов

Вполне понятно, что временная шкала исследования, полученная в этих симуляциях, является функцией максимальной скорости зонда. В этой области довольно часто предполагается, что максимальная скорость составляет менее или равна 10% от скорости света. Но является ли это реалистичным значением? Нам следует рассмотреть некоторые из разработанных человечеством двигательных установок и исследовать эту максимальную скорость.

19.3.1 Химические ракеты

До настоящего времени все запуски космических аппаратов требовали использования ракетных двигателей, работающих на жидком кислороде и жидком водороде. Чтобы покинуть гравитационное поле Земли, ракеты должны разогнаться до скоростей, близких к скорости убегания:¹⁶

$$v_{\text{esc}} = \frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}} = 11.2 \text{ km s}^{-1} \quad (19.3)$$

Энергетические затраты на выход в космос вынуждают нас использовать топливо с высокой энергетической плотностью. Поскольку вещество выталкивается из ракеты, мы можем оценить ускорение, используя уравнение Циолковского для ракеты:

$$\frac{dv}{dt} = -v \frac{dm}{dt} \quad (19.4)$$

Изменение скорости (v) между началом и концом «режима горения» ракеты составляет

$$\Delta v = v_e \ln \left(\frac{m_i}{m_f} \right). \quad (19.5)$$

v_e — так называемая «скорость истечения», скорость, с которой топливо выбрасывается из аппарата, а (m_i, m_f) — начальная и конечная (полная) масса космического аппарата.

Если мы хотим достичь скорости $v = 0.1c$, то сколько топлива будет сожжено? Если предположить скорость истечения $v_e = 2.5 \text{ км/с}$, что типично для первой ступени ракеты «Сатурн V» программы «Аполлон», то

$$\frac{m_i}{m_f} = \exp \left(\frac{v}{v_e} \right) \approx 12,000 \quad (19.6)$$

Очевидно, что химические ракеты не способны достигнуть необходимых межзвездных скоростей. Более того, возможность запуска вещества на орбиту с использованием этой технологии становится все более сложной для более массивных планет земной группы и практически невозможной выше $M_p = 10M_{\oplus}$ (Hirpke, 2018).

¹⁶ Космические аппараты могут достичь скорости меньшей, чем вторая космическая скорость при постоянном ускорении.

19.3.2 Внешняя ядерная импульсная двигательная установка

Both nuclear fission and nuclear fusion have been proposed as potential external propulsion methods. Freeman Dyson's Project Orion design relied on a series of nuclear fission pulses.




Рисунок 19.3 Внешняя и внутренняя ядерные двигательные установки (верхняя и нижняя). Эти упрощенные схемы иллюстрируют конструкции кораблей «Орион» и «Дедал» соответственно.

По сути, это серия небольших атомных бомб, взрывы которых происходили бы вне космического корабля, а ударная волна от бомб воздействовала бы на толкающую пластину, которая толкала бы космический корабль вперед (Рисунок 19.3). Эта конструкция имеет два ключевых преимущества перед внутренним ядерным двигателем. Во-первых, большая часть ограничений ядерной двигательной установки связана с температурой плавления компонентов двигателя. Наличие «двигателя» вне космического корабля позволяет аппарату работать при более низких температурах при том же потреблении энергии.

Второе важное преимущество заключается в том, что «топливо» уже присутствует в мировом арсенале ядерного оружия. В первоначальном видении этого аппарата Дайсон представлял себе момент «превращения мечей в плуги», когда страны будут избавляться от своих бомб, взрывая их за межзвездными аппаратами. Осуществимость такого романтического видения была серьезно подорвана договорами о запрете ядерных испытаний, запрещающими подрыв ядерного оружия в космосе.

19.3.3 Внутренняя ядерная импульсная двигательная установка

В этой схеме для генерации плазмы используется контролируемая термоядерная реакция синтеза, которая удерживается лазерами. Выхлопное сопло пронизано сильными электромагнитными полями, которые заставляют плазму выбрасываться в качестве топлива (см. рис. 19.3). Эта

концепция лежит в основе межзвездного проекта «Дедал», который подробно описан Мартином и Бондом в серии статей в журнале Британского межпланетного общества (например, Bond, 1978). В качестве топлива для «Дедала» предлагалось использовать микрогранулы, состоящие из смеси ^3He и ^{17}H (дейтерий).²

The rocket equation is slightly modified for internal nuclear propulsion. Our spacecraft begins with total mass M and velocity v . The nuclear fuel dM_n is converted into energy, with some of this energy being used to drive electrical power, and some potentially being transferred to a nuclear-inert fuel dM_i to be used as exhaust (known as *working fluid*). Each component has its own exhaust velocity $v_{e,n}$ and $v_{e,i}$ respectively. Conservation of momentum gives:

$$Mv = (M - dM_n - dM_i)(v + v) + dM_n(v - v_{e,n}) + dM_i(v - v_{e,i}) \quad (19.7)$$

The exhaust velocity of each component can be estimated via energy conservation. The kinetic energy produced by the nuclear reaction $dK E_n$ depends on the conversion rate of matter into energy δ_n , and the efficiency of energy input into the exhaust n :

$$dK E_n = \delta_n dM_n c^2 = \frac{1}{2} dM_n v_{e2,n}^2 \quad (19.8)$$

and hence

$$v_{e,n} = \sqrt{2\delta_n c^2} \quad (19.9)$$

The kinetic energy of the inert material $dK E_i$ depends on the efficiency of nuclear energy to electric energy conversion e , and the efficiency of electric energy to exhaust kinetic energy i :

$$dK E_n = \delta_n e i dM_n c^2 = \frac{1}{2} dM_i v_{e2,i}^2 \quad (19.10)$$

The matter conversion rate for fission systems such as Orion is around $\delta_n = 0.00075$ (Shepherd, 1952). The exhaust velocity of Orion was never fully characterised thanks to legal obstacles, but it was estimated at around 200 km s^{-1} .

Dyson calculated that for a mass ratio of 4 (see later), an interstellar cruise with speeds of around $0.0035\text{--}0.035c$ could be achieved. The matter conversion rate for

¹⁷ The more easily ignitable fuel mix of deuterium and tritium (^3H) was discarded due to its overproduction of thermal neutrons, which cause long-term damage to the combustion chamber walls.

fusion systems such as Daedalus is around 0.004, giving an exhaust velocity of around $0.03c$ (Matloff, 2006).

19.3.4 Двигатель на антиматерии

По определению, двигатели работающие на антиматерии, являются наиболее эффективной формой ядерной двигательной установки. Аннигиляция протонов и антипротонов приводит (после нескольких стадий распада) к образованию гамма-фотонов и нейтрино. Эти фотоны могут либо выбрасываться в качестве топлива — опять же, с использованием мощных магнитных полей порядка 50 Тесла для конструкции типа «Дедал» (Morgan, 1982) — либо использоваться для нагрева рабочей жидкости, которая затем может быть выброшена в качестве источника тяги.

Если бы аннигиляция протонов и антипротонов была идеальной, вся материя была бы преобразована в энергию истечения. На практике около 40% энергии покоя протонов и антипротонов преобразуется в пионы. Эти пионы лучше всего подходят для нагрева рабочей жидкости (при этом небольшая часть гамма-излучения также вносит свой вклад).

Каково идеальное соотношение масс для этого антиматериального двигателя? Рассмотрим массу аннигилирующего вещества M_{an} , которая используется для нагрева рабочей жидкости M_w , что следует из уравнения ракеты

$$M_w = M_{\text{vehicle}} (e^{v/v_e} - 1) \quad (19.11)$$

Аннигилирующая масса преобразуется в энергию с определенной эффективностью и нагревает рабочую жидкость:

$$M_{an}c^2 = \frac{1}{2} M_w v_e^2 \quad (19.12)$$

This gives an expression for the annihilating mass

$$\frac{K}{M_{an}} = \frac{1}{x^2} (e^x - 1) \quad (19.13)$$

where $x = v/v_e$, and K is a collection of constants (for a given mission profile). Minimising M_{an} gives $x = 1.59$, and hence $M_w/M_{\text{vehicle}} = 3.9$, which holds true for any rocket (Crawford, 1990).

19.3.5 Межзвездный прямоточный двигатель

Despite achieving a much higher exhaust velocity than conventional chemical rockets, the rocket equation demands that the Daedalus mission plan contain a significant amount of fuel as payload. If this fuel could be collected en route, the mission duration could be significantly reduced. The *interstellar ramjet* concept proposed by Bussard (1960) uses the interstellar medium to feed the reactor. As the craft traverses between stars, protons from the interstellar medium are fed into the reactor to be used as reaction fluid.

Consider a ramjet vehicle moving with velocity v_0 and rest mass m_s , which ingests and expels a rest mass dm of interstellar medium (which is initially stationary). A fraction α of this mass fuels a nuclear reaction with energy release $\alpha dm c^2$, with the rest $((1 - \alpha)dm)$ being expelled from the vehicle at velocity v_e .

The nuclear energy is converted into kinetic energy with efficiency η (with the rest being lost as thermal radiation, which emits transverse to the vehicle's path). We can compare the energies before (the rest mass energy of the ISM gas and the relativistic energy of the craft) and after (the new relativistic energy of the craft, the gas accelerated to speed v_e and the thermal energy emitted):

$$E_{\text{before}} = \gamma m_s c^2 + c^2 dm \quad (19.14)$$

$$E_{\text{after}} = (\gamma + d\gamma) m_s c^2 + \gamma_e (1 - \alpha) c^2 dm + (1 - \eta) \alpha dm c^2 \quad (19.15)$$

Our vehicle's speed has increased. Equivalently the vehicle's Lorentz factor has increased from γ to $\gamma + d\gamma$, where

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (19.16)$$

It can be shown that the gas velocity v_e must satisfy

$$\frac{v_e^2}{c^2} < \frac{1 - \alpha(1 - \eta/2)}{1 - \alpha(1 - \eta)} \quad (19.17)$$

If the gas velocity is too large (relative to the lab frame, not the craft), then the vehicle begins to decelerate. Too much kinetic energy is injected into the interstellar gas, and not enough is injected into the vehicle to deliver thrust. The overall efficiency of the ramjet (energy added to ship as a fraction of energy released) is

$$\eta_{\text{overall}} = \frac{E_{\text{burned}} - E_{\text{rest mass}}}{E_{\text{lost}}} \quad (19.18)$$

$$E_{\text{released}}$$

Dividing out the common factor of dmc^2 gives

$$= \frac{-v_e(1-\alpha) - (1-\alpha) + \alpha(1-\eta)}{1-\alpha} \quad (19.19)$$

Approximately, this is (Bussard, 1960)

$$\approx \eta - \frac{1-\alpha}{2\alpha} \frac{v_{e0}}{c^2} \quad (19.20)$$

For low velocities, the efficiency is simply the thermal efficiency of the energy conversion. The pp -chain reaction delivers $\alpha = 0.0071$, and hence the velocity of the expelled ISM gas must be kept to a minimum to avoid decelerating the craft.

Although the ramjet does not require large amounts of fuel initially, the craft must be accelerated to the stage where the ramjet begins to operate. Variations in gas density will also affect the feeding rate of the ramjet, which affects v_e and the efficiency of the engine.

19.3.6 Солнечные паруса

The need for chemical and nuclear propulsion technologies to carry their fuel places severe constraints on the available payload of any interstellar craft (not to mention its maximum velocity).

Photon sails neatly avoid this problem by relying on radiation pressure as a source of thrust (Tsander, 1961). If we are aiming to travel between star systems, then our Sun and the target star are abundant sources of photons. For a uniform stellar disc, ignoring limb-darkening, the photon pressure at a distance r is (McInnes and Brown, 1990):

$$P(r) = \frac{L_*}{4\pi r^2} \left(1 - \left(\frac{R_*}{r} \right)^2 \right)^{3/2} \quad (19.21)$$

and the maximum force on a sail of area A is simply $P(r)A$. In practice, the sail normal $\hat{\mathbf{n}}$ will not be perfectly aligned with the separation vector between the sail and the star, $\mathbf{r}$. In this case

$$F(\mathbf{r}) = P(|\mathbf{r}|)A\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}}. \quad (19.22)$$

The maximum kinetic energy produced during initial acceleration can be found by calculating the work done on the sail:

$$K E = \int_0^r F(\mathbf{r}) dr \quad (19.23)$$

The sail undergoes a diminishing acceleration as the stellar flux falls away according to the inverse square law, resulting in a cruise velocity that depends principally on the sail area and mass (Рисунок 19.4). The acceleration (and survival of the sail) depends primarily on the reflectivity of the craft. If too many photons are absorbed rather than deflected, the sail will overheat and potentially be destroyed. Forward (1989) made a careful study of finite absorbency sails (so-called ‘grey sails’) and confirmed that the optimal course was to maximise the reflectance of the sail.

Rather than relying on stellar photons for acceleration, it was also proposed that powerful lasers provide the initial accelerative pulse (Marx, 1966). This has several advantages over broad spectrum solar sails, chief among these being that humans control the ‘wind’ the sail takes. The initial acceleration phase is initiated at the press of a button. The narrow bandwidth of the laser permits optimisation of the sail design – for example, the use of dielectric films rather than metallic sheets – to reflect the chosen wavelengths with high efficiency, resulting in more efficient conversion of photons into thrust.

The principal issues with laser sails in particular are (a) the diffraction limit of the laser, which sets a minimum size for the sail, and (b) stability of sail flight inside the laser beam. Manipulation of the beam structure (and careful design of the sail shape) can mitigate against these problems (Manchester and Loeb, 2017).

The ‘heavy sail’ concept was most famously captured by Forward (1984). A one metric ton lightsail is illuminated by a laser focused by a 1000 km diameter Fresnel zone lens. The laserlight provides a constant acceleration of 0.36 m s^{-2} over a three-year period, attaining a cruise velocity of $0.11c$. When the sail reaches its destination, a double mirror system allows the sail to reverse the laser light received from Earth and induce a deceleration (see Рисунок 19.5).




Рисунок 19.4 The position and velocity evolution of a 1 ton solar sail (area 1,000 m^2) as it accelerates away from the Sun, from an initial distance of 5 solar radii.




Рисунок 19.5 Schematic of Forward's (1984) two-sail concept for acceleration and deceleration phases. Laser light from the sail's origin (the Sun, thick arrows) impinges on both sails constructively during the acceleration phase, and destructively during deceleration, where the net momentum transfer on the rendezvous sail comes from photons deflected by the deceleration sail.

19.3.7 Гравитационные маневры

There are ways to accelerate probes to near-relativistic speeds that do not require significant energy input from engines, if one is initially rather patient. The approach is analogous to that of the Voyager probes' strategy for accelerating out

of the Solar System. These probes utilised *slingshot trajectories* around the planets, which relies on the planet's gravitational potential well to modify the probe's velocity. To satisfy momentum conservation, the planet's momentum is very slightly decreased. The decrease is essentially negligible due to the extreme difference in mass between the giant planet and the probe.

This procedure can be scaled up from interplanetary travel to interstellar travel, where stars are now utilised instead of planets (Gurzadyan, 1996; Surdin, 1986, see Рисунок 19.6).

Consider a probe moving towards star 1 with velocity $\mathbf{u}_i$ (in star 1's reference frame). After the gravitational assist, it will move towards star 2 with a velocity $\mathbf{u}_f$ in star 1's frame. The magnitude of the probe's velocity before and after the manoeuvre is constant:

$$|u_i| = |u_f|. \quad (19.24)$$

In the lab reference frame (which we take to be the frame where the Galactic Centre is at rest), the probe's speed is changed by the following (see bottom panel of Рисунок 19.6):

$$v = 2|u_i| \sin \frac{\delta}{2} \quad (19.25)$$

The maximum v achievable by this trajectory depends on the closest approach the craft can achieve before becoming captured by the star:

$$u_{2esc} = \frac{u_{2i} + u_i}{\sqrt{1 - \frac{u_{esc}^2}{u^2}}} = v_{max}, \quad (19.26)$$

where the escape velocity

$$u_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_*}{R_*}}, \quad (19.27)$$

and M_* , R_* take their typical meanings as stellar mass and stellar radius. Clearly, potential velocity boosts are greater around more compact objects (Dyson, 1963). Neutron stars have extremely high escape velocities near their surface – black holes possess the maximum possible escape velocity at the event horizon. These trajectories are clearly non-Newtonian, so the above analysis is invalid, but the conceptual principles remain similar.




Рисунок 19.6 The slingshot manoeuvre, or gravitational assist. Top: The gravitational assist in the rest frame of star 1. Beginning from star 0, the probe achieves a velocity $\mathbf{u}_i$ in star 1's rest frame, and leaves star 1 towards star 2 with velocity $\mathbf{u}_f$, with the same magnitude. Bottom: Comparing lab frame velocities ($\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_f$) to the velocity in the frame of star 1.

Simulations that use these dynamical shortcuts (Forgan et al., 2013; Nicholson and Forgan, 2013) show that even if the craft can only sustain a maximum velocity of $10^{-5}c$ under powered flight (i.e., Voyager's current speed), slingshots can eventually accelerate the probes to around $0.05c$. If a self-replicating probe fleet elected to use slingshot trajectories (see section 20.1), the Milky Way could be explored in around 10 Myr!

19.3.8 Релятивистские эффекты

We have largely ignored the effects of special relativity on interstellar travel. Chief among them is time dilation. During flight, system clocks onboard the craft would record the so-called *proper time interval*, τ_0 . An observer at rest with an identical clock would record a time interval

$$t = \gamma \tau_0 \quad (19.28)$$

where γ is the Lorentz factor. For a flight at $0.1c$, $\gamma \approx 1.005$, and hence a passenger may record a total journey time of 100 years, whereas observers on Earth will record a journey time of 100.5 years (i.e., there will be a six-month discrepancy between the craft's clock and mission control's clock).

The measured return signal from a craft will also be redshifted. If the craft moves at $\beta = v/c$, then the observed frequency ν_o will differ from the transmitted frequency ν_t according to the relativistic redshift

$$\frac{\nu_o}{\nu_t} = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}, \quad (19.29)$$

which takes the above form due to time dilation. For our flight at $\beta = 0.1$, this results in an observed frequency around 9.5% lower than transmitted.

Most bizarrely, if our craft is travelling at relativistic speeds, then we must also take account of relativistic aberration. This is related to the phenomenon of *relativistic beaming*, where an emitter's luminosity seems large if it is moving with relativistic speed towards the observer. Relativistic beaming is commonly seen, for example, in the jets driven by AGN and gamma ray bursts.

Let us assume a reference frame where the emitters are stationary, and the observer moves at relativistic speeds. The observer must measure light rays from directly ahead and perpendicular to the observer to travel at the same speed. Under Lorentz transformation, this adds extra components of velocity to light rays that are not dead ahead. As a result, an observer looking ahead on our relativistic craft will see a star field that encompasses more than the field of view should permit. At highly relativistic speeds, the observer should be able to see stars that are 'behind them' (see Рисунок 19.7).

If we are in the observer's frame, and the emitter moves with speed v at an angle θ_t relative to the vector that connects the emitter and observer when the light is emitted, then we can compute the same angle as measured by the observer θ_o

$$\cos\theta_o = \frac{\cos\theta_t - \beta}{1 - \beta \cos\theta_t} \quad (19.30)$$

This is clearly advantageous if we wish to observe on a wider field of view. At highly relativistic speeds, light emitted a few degrees astern of the craft will appear only a few degrees off the bow! On the other hand, this also requires us to be able to correct for this relativistic aberration when reconstructing a 'true' image taken by our spacecraft's instrumentation.




Рисунок 19.7 Illustrating relativistic aberration. Light is emitted by sources at rest along radial lines of sight towards our spacecraft at rest (top figure). Emitters from slightly behind these positions will still be visible from an observer travelling on the spacecraft at $0.1c$ (middle). At highly relativistic velocities, the observer's field of view becomes close to 360° (bottom).

Менее обсуждаемая проблема при рассмотрении флотов зондов — это вопрос связи. Передача сигналов со скоростью света приводит к значительной задержке во времени на галактических расстояниях, и в результате память данного зонда о посещенных звездах будет неизбежно неполной, поскольку сигналам от других зондов требуется время для поступления. Большинство симуляций обходят эту проблему, предполагая мгновенную связь.

Одним из решений этой проблемы является создание «хранилищ данных» в каждой посещенной звездной системе. Когда зонд посещает звездную систему, он создает хранилище и заполняет его данными о посещенных им звездах. Если впоследствии звездную систему посещает другой зонд, он «синхронизируется» с хранилищем, загружая данные о посещенных звездах и загружая свои собственные данные о посещениях. Это относительно эффективная система передачи данных, поскольку она не требует межзвездных трансляций, а локальные хранилища могут использовать звездное излучение в качестве источника энергии.

20. Опасность исследования зондов

Исследование Млечного Пути с помощью зондов требует от них относительно высокого уровня автономности, способности к самовосстановлению и (скорее всего) саморепликации. Это ключевые характеристики биологических организмов, и популяция зондов предоставлена сама себе на (вероятно) миллионы лет. В зависимости от способности зонда уменьшать ошибки репликации в каждом поколении, вполне разумно предположить, что популяция зондов будет подвержена эквиваленту генетического дрейфа и естественного отбора. Целое семейство решений парадокса Ферми предполагает, что непредвиденные последствия этих эволюционных эффектов слишком опасны для внеземных цивилизаций, чтобы позволить создание самореплицирующихся зондов (см., например, Sagan and Newman, 1983). Теперь мы рассмотрим эти аргументы более подробно..

20.1 Зонды саморепликаторы

The most stringent version of Fermi's Paradox revolves around the self-replicating probe, a device that can produce copies of itself as it explores the Galaxy. This results in an exponentially increasing number of probes exploring the Galaxy on a relatively short timescale.

The concept of self-replicating machine has its logical foundations with Von Neumann (1966) (hence their being commonly referred to as *Von Neumann machines*). Initial attempts at studying self-replication were entirely digital and focused on *cellular automata* – grids of cells with on/off states defined by rules relating to their neighbour cells.

A classic example of the cellular automaton is Conway's Game of Life, which defines whether a cell is either active or inactive by the following rule-set, which is applied to the cells repeatedly:

1. An active cell with fewer than two active neighbours becomes inactive.
2. An active cell with three active neighbours persists to the next repetition.
3. An active cell with greater than three active neighbours becomes inactive.
4. An inactive cell with three active neighbours becomes active.

It was quickly shown that cellular automata could be designed such that selfreplication and self-repair behaviour will appear. Von Neumann designed such a cellular automaton with 29 possible states. Cells in this automaton, once excited,

then proceed through a subset of these 29 states depending on their neighbourhood cells. This 29-state automaton eventually produces self-replicating behaviour.

Self-replicating systems are therefore possible in theory. This is hardly surprising, because biological systems are self-replicating systems. What was less clear was whether self-replicating mechanical systems were possible.

Beginning with Von Neumann's suggestion of self-configuration/self-assembly from caches of available parts, there have been many proposals for self-assembling or self-replicating machines or swarms of machines (see Jones and Straub, 2017, and references within). Many have attempted to ape the self-replication of biological systems, with some even relying on evolutionary methods to generate successful iterations (cf. Pan, 2007).

The advent of 3D printing as a viable technology has revolutionised our thinking on how machines can self-replicate. The self-replication problem can eventually be boiled down to: *can a 3D printer print a copy of itself?* The answer to this question, thanks to technologies such as RepRap, appears to be yes (Jones et al., 2011). Of course, the real question should be *can a 3D printer create a fully assembled, functioning copy of itself?* The current answer to this question seems to be no, as RepRap's printer copies currently require human assembly. However, robotic assembly of parts is a relatively straightforward task compared to replication, and so we must conclude that self-replicating machines are very possible (Ellery, 2016), and in fact likely to appear in human industry in the near future. We should therefore consider self-replicating machines as a viable technology for interstellar travel, provided that the raw materials for making copies exist *en route*.

The most detailed first description of the mechanics of a self-replicating interstellar probe comes from Freitas (1980). Taking the Daedalus interstellar probe blueprints as a starting point, Freitas speculated on designs for humanity's own self-replicating craft.

Freitas's design pre-dates modern construction technology, in particular 3D printing. In his scheme, the probe (dubbed REPRO) is a scaled-up Daedalus, with a mass approximately two times larger. Upon arrival at a star system, REPRO orbits a gas giant with moons (Freitas is assuming a Jovian system). REPRO then deploys SEED to the moon to establish a (much larger) FACTORY, which in turn constructs a copy of REPRO. Freitas argues that building REPRO directly from SEED is suboptimal, and the intermediate FACTORY stage allows the system to vastly reduce the construction timescale for REPRO. Also, once FACTORY has been constructed, SEED is free to build another FACTORY, doubling the production rate of REPRO probes.

The replication process is carried out by an ecosystem of robotic entities, with varying levels of artificial sentience and autonomy. These entities are the first elements that SEED builds, which allows the system to mine the lunar surface, process the ore, assemble the components and verify the build is carried out according to design (while also extracting fuel from the upper atmosphere of the giant planet).

20.2 Can Probes Self-Replicate without Evolving?

Consider the two elements necessary for a probe to make a copy of itself. It requires raw materials (hardware), and it requires instructions as to how to assemble them (software). If both elements are present, it can either construct the copy, or build tools that carry out the task of construction.

How would the software be stored? In human systems, DNA and mRNA contain the necessary data to code for proteins and produce the necessary structures. The propagation of human genetic information requires reproduction. Humans possess two *alleles* (copies/variants) of a gene, at the same genetic locus on a chromosome.

During reproduction, the allele pairs from each parent are mixed amongst their children. The resulting genotype is either homozygous (matching alleles) or heterozygous (differing alleles). Which allele ends up being expressed in the organism depends on which is dominant (or recessive).

In the New Horizons probe which recently visited Pluto, the data is stored on two solid-state drives. The data is stored as a stream of zeros and ones. These bits of data can be corrupted or changed by radiation impacting the system. Most spacecraft are shielded to some degree against this event, but high-energy particles such as cosmic rays are extremely difficult to mitigate against. If zeros are switched to ones (and vice versa), then the instructions are rewritten, in a manner analogous to mutation in organisms (transition/transversion, see page 115). In most cases, a switch of a digit would result in a program that cannot be executed. In some cases, it may result in code being executed with a different set of variables, with a different output as a result.

If a self-replicating probe executes copying with flawed instructions, we can expect the result to be fatally flawed in most cases, in the same manner that many mutations are fatal to biological organisms. However, given a large enough population, some mutated probes will be viable systems, and their own software is likely to inherit the same flaws as the parent. If the local selection pressure is weak, this results in genetic drift of the probe population.

But what if a mutated probe is ‘better’ than the original design? A ‘successful’ mistake that increases the relative fitness of the probe can then be propagated

through a probe population, as high-fitness mutations propagate through biological populations. The combination of genetic drift, gene flow and natural selection (acting on timescales longer than the interval between copying events) would then result in a variety of forms, each adapted to varying environments and challenges, just as happens in biological systems (see section 5.3.6).

This logic relies on the premise that replication errors cannot be rectified by the parent during the copying process. Error checking is a fundamental part of modern computing and signal processing. A well-designed replicator will possess a variety of fail-safes and checking algorithms during a copy.

In signal processing, the average *bit error rate* can be calculated by dividing the number of bits transmitted in error by the total number of bits. Given that information is copied and transmitted by Earth's Deep Space Network to probes in the Solar System with bit error rates of 10^{-6} , i.e., one erroneous bit per million bits (Taylor, 2014), and that most transmission systems are designed to be redundant against erroneous bits, it might seem quite possible that the level of error could be extremely small indeed, removing the possibility that probes could evolve 'naturally'.

However, we should note that replication of the human genome constitutes an extremely low bit error rate of 10^{-10} per site (with similar low rates for other species, such as *E. coli*). If biological systems can possess such a low error rate and still evolve, what hope is there for mechanical and electronic systems?

Also, we have already noted that probes are likely to be highly autonomous, and possess software approaching (or exceeding) our definition of artificial intelligence. A flexible goal-seeking system may alter its own programming as it receives new data regarding itself and its environment. Therefore, rather than evolving via natural selection, it may well be the case that probes evolve via intelligent (auto)design!

If probes do evolve and change in ways unforeseen by their creators, then there are some dangerous scenarios that we can consider.

20.3 Хищники и жертвы

During the Ediacaran Period (around 575 million years ago), the growing abundance of animals allowed a fundamental shift in how biological organisms obtained energy from the environment – the consumption of other animals. While predation is not unique to large organisms, the sudden boost in energy available from the practice triggered a significant increase in organism size, and fundamentally shifted the tempo of life.

We can imagine a similar shift might occur in a population of self-replicating machines. Instead of being forced to replicate from whole cloth, a machine can scavenge ready-made parts from another, and significantly decrease the time and energy cost of replication. This ‘predatory’ strain of self-replicating probe will begin to outgrow other strains that require more costly construction requirements.

If mutated programming encourages machines to seek out other machines to consume, it is quite possible that these machines will be conferred the same evolutionary advantage as the first animal predators on Earth.

Once this behaviour is established, we can think of the probes in the same way that we think of animal predator–prey populations. In population dynamics, a typical starting point is the Lotka-Volterra system of equations describing the number of predators P and the number of prey R :

$$\frac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RP \quad (20.1)$$

$$\frac{dP}{dt} = \delta PR - \gamma P \quad (20.2)$$

α is the growth rate of prey, β is the death rate of prey due to predators, δ is the growth rate of predators due to consuming prey, and γ is the death rate of predators due to natural causes. This system assumes that the predators only eat prey (with infinite appetite), prey have an ample food supply, (i.e., will grow unchecked in the absence of predators), and both populations grow exponentially.

This non-linear system (coupled through the RP cross-terms) either results in predators destroying the prey population ($R \rightarrow 0$), or produces a periodic solution for P and R , with the values of both constrained to a fixed trajectory in $R - P$ phase space (see Рисунок 20.1).

We can define the conditions of this steady state by rearranging the coupled equations into a single form:

$$d(\delta R + \beta P - \gamma \log R - \alpha \log P) = 0 \quad dt \quad (20.3)$$

We can then take a Hamiltonian approach, where the Hamiltonian

$$H(R, P) = \delta R + \beta P - \gamma \log R - \alpha \log P \quad (20.4)$$

As the second derivatives of H are all positive, H is a convex matrix. It therefore has a well-defined unique minimum, which we determine from $\nabla H = 0$:

$$\frac{\partial H}{\partial R} = \beta - \frac{\gamma}{R} = 0 \quad (20.5)$$

$$\frac{\partial H}{\partial P} = \delta - \frac{\gamma}{P} = 0 \quad (20.6)$$




Рисунок 20.1 Динамика взаимодействия хищник-жертва в системе Лотки-Вольтерры. На верхнем графике показана общая численность популяции во времени для системы Лотки-Вольтерры, где $\alpha = 1/3$, $\beta = 0,666$ и $\delta = \gamma = 1$. Эволюция обеих популяций носит периодический характер и описывает замкнутую локус в фазовом пространстве R – P (нижний график).

We can then solve for

$$(R, P) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right) \quad (20.7)$$

This identifies the beginning point of the system's trajectory in R-P space, with each curve being a contour of constant H .

In our case, we should consider modifying the 'vanilla' Lotka-Volterra system to include mutation of prey into predators, and ideally some consideration of competition for asteroid resources. Pure exponential growth is an unphysical model if the resources are finite (see Chapter 12). If we instead require that the prey practise logistic growth with some carrying capacity K :

$$\frac{dR}{dt} = R \left(\alpha - 1 - \beta R P \right) \quad (20.8)$$

$$\frac{dP}{dt} = -K - \gamma P \quad (20.9)$$

This fundamentally alters the system's stability. Depending on the system parameters ($\alpha, \beta, \delta, \gamma, K$), one can either destroy the prey population, or produce a solution with initial periodicity, quickly settling toward an equilibrium solution with constant (R, P) (Рисунок 20.2). If the predators also practise logistic growth (which may occur if they, for example, find a secondary food supply), then this approach to an equilibrium can be especially rapid.

Indeed, scavenging probes may not restrict their appetites to other probes. Rather than being forced to refine asteroid ore, if a probe happens upon any object containing pre-processed material, its programming may consider it an advantage to simply dismantle the object and use its components.

Predators may even predate on each other. We can think of this type of interaction using the Lanchester equations, originally developed to describe the losses of armies in battle. If we imagine two strains of predators, A and B , then the Lanchester system is given by

$$dA$$

$$20.3 \text{ Predators and Prey} \quad (20.10)$$


$$\frac{dT}{dt} = - \quad (20.11)$$

where α and β now describe the

predatory ability of A and B

respectively. In its original use, α describes the rate at which individuals in army A fire bullets at army B , and vice versa for β . This combat model assumes that either numerical superiority or greater firepower are the only factors in the success of an attacking population. From it, we note Lanchester's Law, that a force's power is proportional to the square of its population.¹⁸

In an extreme case, a predatory strain of self-replicating probes could become a marauding band, harvesting any technology it encounters to convert into further probes. We can think of this as a macroscopic 'grey goo' scenario (see section 14.2).



¹⁸ In practice, military strategists tend to work with the salvo combat model, which more accurately reflects the discrete nature of munitions and warfare generally.




Рисунок 20.2. Аналогично рисунку 20.1, но для популяции жертв, демонстрирующей логистический рост. Горизонтальная пунктирная линия показывает предельную численность популяции K . Динамика взаимодействия хищник-жертва в системе Лотки-Вольтерры. На верхнем графике показана общая численность популяции во времени для системы Лотки-Вольтерры, где $\alpha = 10$, $\beta = 0,1$ и $\delta = 1$, $\gamma = 2$. Эволюция обеих популяций носит периодический характер, но быстро стабилизируется на постоянных значениях, образуя спираль в фазовом пространстве $R - P$ (нижний график)

Уайли (Wiley, 2011) указывает на некоторые важные различия между животными и хищниками-зондами, а именно на то, что добыча не обязательно остается в точке своего происхождения, а, скорее всего, рассеивается радиально с максимальной скоростью, не останавливаясь на отдых. Хищники, преследующие такую добычу, оставляют за собой «хищническую тень» неисследованной территории, когда сталкиваются с приближающейся добычей.

В целом, влияние динамики хищник/жертва на парадокс Ферми остается неясным. Решением может быть то, что хищники в конечном итоге уменьшат количество зондов в Млечном Пути, но количество хищников может сократиться (или, по крайней мере, стабилизироваться) по мере исчезновения добычи. Наблюдаем ли мы Млечный Путь в момент доминирования хищников? На данный момент у нас недостаточно данных, чтобы подойти к этому вопросу.

21. Алиены тихие

21.1 Они ведут коммуникации на других частотах

В предыдущих главах мы обсуждали мотивы, побуждающие ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), выбирать определенные частоты для своих поисков. Большая часть радиопоисков SETI была сосредоточена на частотах, близких к частоте излучения атомарного водорода, в частности, к эмиссионной линии H I. Оптические поиски SETI охватывали диапазон частот от видимого до ближнего инфракрасного, частично ограниченный доступными технологиями подсчета фотонов и относительной непрозрачностью Млечного Пути в видимом диапазоне длин волн.

Мы рассматривали вероятные частоты передачи при двух ограничениях: межзвездной среде и атмосфере Земли. Все внеземные цивилизации ограничены первым ограничением, но не очевидно, что они ограничены вторым. В зависимости от структуры и состава их планеты, их атмосферные условия могут отличаться от наших. Основными поглотителями радиоволн в атмосфере Земли являются молекулы водяного пара и кислорода — изменение относительного содержания этих веществ будет увеличивать или уменьшать поглощение в диапазонах выше примерно 10 ГГц.

Messerschmitt (2015) notes that interstellar communication is likely to be optimised in a different way to terrestrial communication. Terrestrial communication is *spectrally optimised* whereas interstellar communication is *energetically optimised*.

More rigorously, optimal interstellar communication maximises the information rate for a given input signal power (or minimises the signal power for a given information rate). There is a further desideratum that the receiver's energy requirements to process any signal be minimal.

We can see this by considering the information-carrying limitations of a signal. Spectrally efficient transmission maximises the spectral efficiency S :

$$(21.1) \quad S = \frac{R}{B}$$

291

where R is the information rate in bits per second, and B is the bandwidth in Hz. Energy-efficient transmission maximises the power efficiency (bits per joule):

$$= \frac{1}{p} P^-$$

where P^- is the average radiated power (usually obtained by simply dividing the total energy consumed in the transmission, and dividing by the signal duration). It is also quite common to see power efficiency described by the energy-per-bit $E_b = 1/p$.

In a perfect universe, a transmission would maximise both the spectral and power efficiencies. This is not possible – a signal with high power efficiency will have low spectral efficiency, and vice versa. This is due to the so-called *Shannon limit* on channel capacity, C . If our information rate $R \leq C$, then, mathematically speaking, perfect communication is possible. Information rates above the channel capacity cannot be communicated reliably.

The simplest example of a channel model is the Additive White Gaussian Noise model (AWGN). We take a ‘pure’ transmitted signal X , and add noise N (which is a Gaussian random process with zero mean), which results in a received signal Y :

$$Y = X + N \quad (21.3)$$

The channel capacity in this case is

$$C = B \log_2(1 + SNR) = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \quad (21.4)$$

In this equation N_0 is the noise amplitude per unit frequency, and hence $N_0 B$ is the total noise in the signal bandwidth. In this case, it can be shown that the Shannon limit $R < C$ can be re-expressed as an upper bound on power efficiency (relative to spectral efficiency):

$$\frac{p}{p_{\max}} < \frac{s \log 2}{2s - 1}, \quad (21.5)$$

where $p_{\max}$ is the maximum possible power efficiency:

$$p_{\max} = \frac{1}{N_0 \log 2}. \quad (21.6)$$

Increasing the power efficiency results in a sharp decrease in the permitted spectral efficiency. Terrestrial communications have typically prized spectral efficiency due to:

a) the limited transparent frequencies in the Earth’s atmosphere,

- b) the commercial and legal limitations on what frequencies can be used for broadcast, and
- c) the potential for interference in broadband signals as a result.

Interstellar communications may not be limited by atmospheric concerns at all, as is the case for space-based telescopes orbiting the Earth. Given that interstellar transmissions require large amounts of energy regardless of their signal properties, it seems reasonable that ETIs would attempt to maximise their power efficiency and obtain the greatest bit-per-joule rate possible.

Further limitations on both power and spectral efficiency come from the so-called *interstellar coherence hole*. This is a combination of time/bandwidth constraints imposed on signals attempting to traverse the interstellar medium. The frequency constraints come from wavelength dispersion by free electron plasmas, and scattering, which disfavour high bandwidth signals. Time constraints depend on the motion of the transmitter/receiver pair relative to the interstellar medium, which changes both the total path length of the signal (acceleration), as well as the line of sight of the signal, ensuring it encounters different regions of space and variations of scattering and dispersion as a result (scintillation). As a result, shorter-duration signals are less susceptible.

We can therefore define the interstellar coherence hole as a region in parameter space where signals will pass from transmitter to receiver coherently with $t < t_c$ and $B < B_c$, where t_c and B_c are the naturally imposed upper limits on time interval and bandwidth.

We can see now why interstellar communication will generally adopt energy efficient modes. While narrow bandwidths suggest a spectrally efficient signal, the time constraints ensure that the bits per joule must remain high for a signal to be completed in short time. The received signal strength will be significantly lower than the signal strength at transmission due to the inverse square law, but the range of frequencies at our disposal is large.

There are several strategies available to reduce energy consumption when transmitting:

Reduce the information rate This is the motivation behind so-called ‘beacons’. These are ‘on/off’ signals, transmitted in a single channel. To maximise the energy efficiency, these beacons typically emit pulses of radiation, where the pulse duration and pulse intervals can be adjusted to optimise against one of several constraining factors (distance, systems contacted, energy costs, etc.). This is the extreme limit in information rate.

Increase the carrier wave frequency This is perhaps the strongest argument for optical SETI over radio SETI. Increasing the frequency of the transmission allows more-intensive modulation of the signal, which can increase the information rate (with everything else being fixed). Typically, the required transmit power drops with increasing carrier frequency $P \propto \nu^{-2}$.

Select a less-distant target If a civilisation is severely restricted in its energy input, this is likely to be an adopted strategy. Closer targets demand less energy to broadcast a signal that can still be successfully detected ($P \propto D^2$).

Accept transmission errors Signals that are weak may be indistinguishable from noise at certain instants depending on the intervening medium and the tools available to the receiver. A signal that is repeatedly broadcast will allow receivers to reconstruct the entire transmission from multiple error-prone versions, so this can be an acceptable strategy if one is willing to repeat oneself. We will return to the issue of successfully decoding transmissions in later chapters.

A crucial concept in interstellar communication is the energy bundle. In effect, this is the quantum of any transmission – a pulse of radiation with a bundle energy and a specific waveform. We can concoct a highly flexible transmission by chaining together an ensemble of energy bundles. Naively, one might assume that an energy bundle is equivalent to one bit of information transmitted (and in some encoding strategies, it is), but as we will see, this is not true in general. As we have already stated, there are two fundamental parameters that govern the information rate of any transmission – the power, and the spectral bandwidth.

We give some examples of spectrally efficient and energy-efficient encoding schemes (see Рисунок 21.1). The most conceptually simple spectrally efficient scheme is referred to as On-Off Keying (OOK). This is quite simply transmitting on a narrow bandwidth in a binary fashion, where pulses equal 1, and gaps equal zero. This can be considered to be the next step up from a beacon transmission, where the pulses are timed such that a series of bits are transmitted.

Multilevel Keying (MLK) can increase the information rate by allowing the signal strength to vary. If the signal can be one of M levels of energy (including zero), then each energy bundle can transmit a total of $\log_2 M$ bits of information. OOK is of course multilevel keying with $M = 2$.

Spectrally efficient coding schemes can be impressively information-dense. For example, frequency-shift keying (FSK) utilises multiple frequency bands, as opposed to multiple energy levels. This is extremely energy-efficient compared to multilevel keying due to the need for receivers to discriminate energy levels against a noise background. For safety, the average energy per bundle needs to increase with M as M^2 in MLK, which can become prohibitive for large M .

By contrast, FSK demands a single energy level for each bundle, but that the frequency of the bundle shifts to one of M bands. Again, this delivers $\log_2 M$ bits per bundle, without increasing energy demands.¹⁹

21.1 They Communicate at a Different Frequency

¹⁹ Using a wide total bandwidth may seem to put transmissions at risk of scintillation and other attenuation effects from the surrounding ISM, but the quantisation of the signal into energy bundles of narrow bandwidth prevents this from becoming a serious issue.




Рисунок 21.1 Spectrally and energy-efficient encoding schemes. Each graph represents energy bundles (boxes) transmitted at a specific frequency ν at a time t . On-Off Keying (OOK, first) and Frequency Shift Keying (FSK, second), which use a single fixed bundle energy. Bottom: Multilevel Keying (MLK, third), which maintains spectral efficiency by broadcasting a range of M bundle energies. In this case $M = 3$, giving $\log_2 3 = 1.58$ bits of information per bundle; and Multilevel Shift Keying (MSK, fourth), which combines the advantages (and disadvantages) of both MLK and FSK.

21.2 У них другой метод коммуникаций

It is entirely possible that interstellar transmissions do not use the electromagnetic spectrum at all. Our current understanding of the physical Universe suggests several possible communication methods that are theoretically possible, but extremely challenging for humans to receive or decode given current technological capability.

21.2.1 Нейтрино

We have conducted our discussion of practical, observational SETI entirely in the electromagnetic spectrum. Detecting photons of various energies has been the standard approach of astronomers for centuries. Our recent advances in particle physics have shown us that photons are not the only messenger particles available to sufficiently advanced civilisations.

An enticing candidate is the neutrino. Neutrinos are extremely low-mass, weakly interacting particles, produced not only naturally in stars, supernovae and AGN, but also by humanity as the byproducts of particle accelerators. Neutrinos are leptons, and come in three flavours, corresponding to the other three leptons of the Standard Model of particle physics (electron e , muon μ , tau τ). Neutrinos can *oscillate* between each of the three flavours, as their flavour/mass is actually a superposition of three possible eigenstates. The probability of changing from one state to the next varies, as the phase of each eigenstate depends on each state's mass.

The local (solar) flux of neutrinos at any instant is very high (of order 10^9 – 10^{10} particles $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$), but most pass through the Earth without interaction. This is because neutrinos only couple to other particles through either the weak force or the gravitational force. The weak force acts only at extremely short range, and the gravitational force is some 10^{38} times weaker than the other fundamental forces (and the neutrino is itself extremely low mass).

As such, despite being a fermion, the scattering cross section of neutrinos with other fermions is extremely small, making their detection extremely challenging. The majority of the Sun's neutrino emission passes through the Earth without being absorbed.

Neutrino detectors cannot directly detect the particle. Instead, they detect the byproducts of interactions between neutrinos and other fermions, such as protons and electrons. Modern detectors typically employ large tanks of very highly purified water (buried at high depths to remove unwanted signals from cosmic rays). Neutrinos travelling through the water occasionally interact with an electron,

causing it to be accelerated beyond the speed of light in the medium (which is approximately 75% of light speed in a vacuum). This results in Cherenkov radiation, which is then sensed by an array of detectors placed around the tank's edge.

Neutrino astronomy is in its infancy – the only astrophysical sources currently detected are the Sun and recent supernova SN 1987A, using the Super-Kamiokande and Irvine-Michigan-Brookhaven observatories in Japan and the USA (Hirata et al., 1987). The most recent attempts to find significant signals beyond the solar neutrino fluxes have yet to yield a convincing detection from a specific object (IceCube, 2017).

Neutrinos are also produced by human activities. Antineutrinos are commonly produced in nuclear reactors. As neutrons decay into a proton and electron, an electron-antineutrino ($\bar{\nu}_e$) is released. A typical fission reactor will emit around 5% of its output energy as antineutrinos which are not harnessed and escape to (presumably) interstellar distances.

Particle accelerators can also produce neutrinos. Protons, when accelerated at a target, produce charged pions and kaons (π/K), which can then decay into muon/muon-neutrino (ν_μ) pairs. Thanks to the relativistic velocities reached by the protons before particle production, the neutrino emission is highly beamed.

If ETIs were able to generate and direct neutrino beams, these would offer several advantages compared to photon beams:

1. The universe emits far fewer neutrinos than photons. Even a relatively weak neutrino beam, given an appropriate particle energy, propagates in a region of low noise and hence has a favourable S/N ratio.
2. The low interaction cross section of neutrinos means their signals arrive without attenuation, even if they traverse particularly dense regions of the interstellar medium.
3. Neutrino beams arrive at the detector with virtually no scatter, resulting in no positional 'jitter', which improves a receiver's ability to locate the signal. The lack of temporal jitter also allows for higher-fidelity encoding.

Neutrinos are generated by natural sources over a relatively wide range of energies, just like photons. Analogously, the cross section of neutrinos changes with energy, although the relationship between cross section and energy is relatively simple, compared to the opacity laws that govern photons.

Like ETIs transmitting photons, ETIs transmitting neutrinos also have important decisions about which energy to transmit at. Most natural sources produce neutrinos at the 10 MeV scale (for example, supernovae tend to produce 40 MeV neutrinos).

Increasing the neutrino energy moves the signal out of the range of natural sources and also boosts the cross section. In particular, electron anti-neutrinos with energies of 6.3 PeV interact with electrons producing a *Glashow Resonance*. This creates a W boson which can then decay back into lepton and neutrino pairs. The fact this resonance occurs at a unique energy is quite analogous to the photon-based Water Hole in the microwave band.

If ETIs were able to produce such a neutrino beam, for example, by producing high-energy pions (π^-) which decay into ν^-_μ , some fraction of the neutrino beam would eventually oscillate into ν^-_e . Information could be injected into the beam by (for example) switching the beam between π^- and π^+ , resulting in an intermittent stream of ν^-_e , with the potential for two-level signal keying (ν^-_μ, ν^-_e).

The energies required to make PeV neutrinos is clearly immense. The Large Hadron collider at CERN produces neutrinos with energies less than 100 GeV, around ten thousand times too weak (Bailey et al., 1999). It has been argued that muon colliders are a more effective neutrino source – indeed, the neutrino radiation field could become so intense in the vicinity of the source as to be a biohazard (Silagadze, 2008; Learned et al., 2009).

While humans are yet to achieve such extraordinary feats of particle acceleration, instrumentation such as the IceCube observatory should easily discriminate neutrino beams with energies in excess of 10 TeV from the background (where the expected flux from background sources is less than $1\text{yr}^{-1}\text{km}^{-2}$). A 100 TeV beam is calculated to be easily detectable even at 20 light-years distance (higher-energy beams are increasingly collimated, making their detection less and less probable).

The most extreme proposal for neutrino SETI concerns advanced civilisations' efforts to study the Planck scale, at which quantum theory and general relativity can no longer be considered separately, and must be unified into a quantum gravity theory. This requires a particle accelerator of YeV energies (10^{24} eV, or 1 billion PeV), or the entire rest mass energy contained within $100M_\odot$ of matter! Such particle accelerators would necessarily be much larger than a planet. As well as producing enormous amounts of synchrotron radiation as particles are accelerated in the presence of a magnetic field, YeV neutrinos are almost certainly produced.

Such neutrinos are in principle easier to detect due to their boosted cross section, but we expect to see a far lower number count, and it is likely that modern neutrino detectors are simply not big enough to detect YeV particles – even detectors covering the Earth's entire surface area are likely to be insufficient (Lacki, 2015).

On a more encouraging note, neutrino SETI can also be conducted in serendipitous or ‘piggyback’ mode. Neutrino observatories are not ‘pointed’ at a particular astrophysical source – instead they receive flux from the entire 4π solid angle of the sky (including the Earth beneath them). SETI studies can occur exactly in concert with other experiments focused on neutrino detection, such as the problem of further constraining neutrino masses, or the study of supernovae.

21.2.2 Гравитационные волны

As of 2015, the Advanced LIGO system has directly detected the presence of gravitational waves. Gravitational waves are oscillations in the fabric of space-time, a wave solution of Einstein’s equations of general relativity. In GR, the propagation of the gravitational force has a finite velocity – the speed of light. In the same way that perturbations in the electromagnetic field (photons) are constrained to travel at c , perturbations in the space-time metric (gravitational waves) must also travel at light speed.

We can see how wave solutions emerge from the field equations by considering their linearised form. We do this by assuming that the space-time metric $g_{\mu\nu}$ is close to a flat (Minkowski) metric $\eta_{\mu\nu}$, with a small perturbation $h_{\mu\nu}$:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (21.7)$$

We then substitute this metric tensor into Einstein’s field equation:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (21.8)$$

where T is the energy-momentum tensor, and $R_{\mu\nu}$ is the Ricci tensor, and R the Ricci scalar. As with electromagnetism, an appropriate gauge choice is required. A full derivation is lengthy, and does not really belong in this textbook (the interested reader is directed towards Tiec and Novak, 2016). Suffice it to say that by defining our perturbation²⁰

$$h^{\mu\nu} \equiv h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}, \quad (21.9)$$

and choosing the Lorentz (or harmonic) gauge:

²⁰ We also assume the Einstein Summation Convention, where repeated indices in any multiplication require a sum over those indices.

$$\delta^\nu h^-_{\mu\nu} = 0, \quad (21.10)$$

Einstein's field equations reduce to the following wave equation:

$$h^-_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}, \quad (21.11)$$

where the D'Alembertian operator

$$= \eta_{\mu\nu} \delta^\mu \delta^\nu = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 \quad (21.12)$$

We can now see that $h^-_{\mu\nu}$ represents a quantity that propagates as a wave on a flat space-time background, with source given by $T_{\mu\nu}$. Equation (21.11) represents in fact 4×4 equations, one for each component of the tensor $h^-_{\mu\nu}$. With an appropriate set of gauge choices (and setting the source $T_{\mu\nu} = 0$), we can derive the resulting metric perturbation, which only has two components:




Рисунок 21.2 The two polarisation states of gravitational waves. A circular ring of masses is deformed by the passing of a gravitational wave with (top) a h_+

perturbation, and (bottom) a h_- perturbation.

$$h_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (21.13)$$

The components h_+ and $h_\times$ correspond to polarisation states of the gravitational wave, much as electromagnetic waves can be polarised (see Рисунок 21.2). We can show that these metric perturbations, when acting on two particles where we

can measure the Euclidean (i.e., non-curved) distance between them, L_0 , will demonstrate a characteristic deviation from this value:

$$L(t) = L_0 \left(1 + \frac{1}{2L_0^2} \Delta x^\mu \Delta x^\nu h_{\mu\nu} \right) \quad (21.14)$$

with x being defined as the initial distance between the particles. We can therefore show that the measured change in particle positions from a gravitational wave are

$$\Delta L \sim \frac{1}{2} |h| L_0 \quad (21.15)$$

The typical magnitude of h , estimated by assuming an oscillating spherical mass (see Tiec and Novak, 2016), is:

$$|h| \sim \frac{2GMv}{c^2 r} \quad (21.16)$$

where r is the distance from the source to the observer, M is the source mass and v is the typical internal velocity of the oscillating material. As we shall see in a moment, this quantity is very small, but we should be encouraged by the mere $1/r$




Рисунок 21.3 A simplified schematic of the LIGO apparatus, which successfully detected gravitational waves from merging stellar mass black holes in 2015.

decay of the magnitude. After all, this is significantly slower than the $1/r^2$ decay we see in electromagnetic radiation. While gravitational radiation is intrinsically weak, it can travel a good deal further with less decay of the signal.

Gravitational wave detectors (like the successful LIGO instruments) are interferometers. One LIGO station consists of two arms, each 4 kilometres in size.

A single laser is beamsplit, and sent along each arm to a mirror at each end (see Рисунок 21.3). Reflected light from both arms is then sent to a detector. If the path length travelled by both beams is identical, the beams destructively interfere and no signal is observed.

If the length of either beam changes, the beams can constructively interfere and produce a classic interference pattern at the detector. The strain placed on the arms by a gravitational wave h is

$$\frac{\Delta L}{L} = h \quad (21.17)$$

where L is the beam length, and ΔL is the change in beam length induced by the wave. A typical gravitational wave induces a strain of $h = 10^{-17}$, which means that for $L = 4 \times 10^3$ m, the beam length changes by $\Delta L = 4 \times 10^{-15}$ m, which is of order the diameter of a proton! This extremely low h is why humans have only just detected gravitational waves. Our apparatus must detect changes in a measured length that is very small compared to the total length.

The first gravitational waves detected by LIGO were emitted by a merging of two black holes of mass 36^{+5}_{-4} and $29 \pm 4M$ respectively (Abbott et al., 2016b).

The team used two identical stations to measure the incoming gravitational wave signal. By doing this, they were able to place better constraints on the wave's origin. Another detection of gravitational waves from a separate black hole merger (of masses $1.42^{+0.03}_{-0.02}$ and $7.5 \pm 2.3M$) was announced shortly afterwards (Abbott et al., 2016a). Most excitingly, gravitational waves and electromagnetic radiation have now been detected emanating from the same object (Smartt et al., 2017).

The gravitational wave spectrum exists completely separate from the electromagnetic spectrum. Both types of wave can be emitted from the same object, and both types of wave carry away energy from the emitter, but their characteristics are fundamentally different. Electromagnetic waves typically possess a wavelength less than or equal to the size of the emitter: gravitational wave wavelengths are typically greater than the source size. Electromagnetic waves are dipolar, while gravitational waves are quadrupolar. Even the nature of detection is different – electromagnetic detectors are sensitive to the wave power, while gravitational wave detectors are sensitive to the wave amplitude. This is quite analogous to the sensorial nature of the eyes and ears respectively. We have watched the Universe for centuries – for the first time, we can now hear it.

The detection of gravitational waves is a feat as epoch-making as Galileo’s observations of the Jovian moons and Saturn’s rings. Until LIGO’s detection, gravitational waves were a prediction of general relativity, indirectly confirmed by observations of the decaying orbits of binary pulsars (Hulse 1994; Taylor, 1994). Our ability to measure gravitational waves directly opens up exciting future prospects for SETI.

It has been proposed by some that gravitational waves would be an excellent communication medium for advanced civilisations, as it requires an exceptional degree of material science knowledge and understanding of the Universe to search for them. It also possesses the aforementioned advantage of greatly reduced attenuation through its $1/r$ decay behaviour, and its extremely small absorption in intervening material.

Communicating in this form would be an excellent way to ensure one’s message is only received by very advanced civilisations. However, the power required to produce a detectable signal is enormous. Perhaps we will discover more precise means of measuring the length of a laser beam, and be able to sense smaller and smaller perturbations in space-time, but will this mean that we will begin to hear gravitational wave transmissions?

Perhaps, just as with electromagnetic radiation, ETI will be forced to make specific choices about what wavelength of radiation to broadcast with. Astrophysical sources of gravitational waves span some 20 orders of magnitude in frequency (Рисунок 21.4) – in general, higher-frequency gravitational waves present less strain.




Рисунок 21.4 Schematic of astrophysical gravitational wave sources, as a function of wave frequency and wave strain.

At extremely low frequencies (10^{-16} Hz), primordial gravitational waves are present from the Universe’s early history, in particular the epoch of inflation. These

are unlikely to be detected directly, as their wave period is of order a Gyr. Instead, their signature must be discerned from the polarisation of the cosmic microwave background, as claimed somewhat prematurely by the BICEP2 collaboration, whose analysis appears to have been fatally affected by intervening dust (Ade et al., 2015).

At frequencies of tens of nanohertz (i.e., periods of years), supermassive black hole binaries are expected to radiate continuously, with strains of up to $h \sim 10^{-10}$. These waves are in principle detectable via pulsar timing studies. Merging compact objects (as was detected by LIGO) occupy the higher-frequency regimes, with the frequency increasing as the mass of the mergers decreases.

Rotating neutron stars will emit continuous gravitational waves if they are not axisymmetric, with the frequency of the wave ν being twice the star's rotational frequency. The strain received from this source would be (Riles, 2013):

$$h_0 \propto \frac{\nu^2}{c^4} D^4 \quad (21.18)$$

This assumes that the star rotates about the z-axis, and that the star has a finite quadrupole moment due to an asymmetry, giving rise to an ellipticity ϵ . This suggests at least one way that ETIs could send a GW signal, by adding matter to a neutron star to alter its quadrupole moment (although the additional mass required to do so would likely be significant).

There are precious few papers on the subject of artificial generation of GW signals. It may seem fantastical, but with proper thought, the next generation of gravitational wave surveys could present even stronger constraints on the number of advanced civilisations present in the Milky Way.

21.3 Мы их не понимаем

It is highly likely that any message we do receive will be a single, one-way transmission. Given the vastness of interstellar distances and the finite speed of light, we are unlikely to be able to ask for clarification as to the message's meaning. Conversely, it is unlikely that any transmitter will have had the opportunity to decipher human language to formulate such a transmission.

We are faced with a highly frustrating prospect – we could possess a *bona fide* transmission from another intelligent species, but be almost entirely ignorant as to its content. What can we do?

In the first instance, we can consider the apparent structure of the message. Any message can be decomposed into a string of bits, where each individual bit is either zero or one. Groupings of bits can then be formed producing what we shall call signal types. For example, we can consider English as obtaining a minimal 27

signal types (the 26 letters of the alphabet, plus the space bar to indicate word length).

We can immediately apply the principles of cryptography and information theory to this bitstream. A commonly used tool is *entropic level analysis*. This measures the conditional information in the stream, or more simply how a message element depends on its context – the preceding and following elements of the message (Doyle et al., 2011).

By simply counting the available signal types N in the message, we can compute the zero-order entropy:

$$S_0 = \log_2 N \quad (21.19)$$

This gives the maximum degrees of freedom available to the communication system. The first-order entropy depends on the frequency of individual signal types in the message. If the probability of a given signal type i occurring is $P(i)$, then the first-order entropy is

$$S^1 = - \sum_{i=1}^N P(i) \log_2 P(i) \quad (21.20)$$

If every signal type is equally likely ($P(i) = 1/N$), then the first- and zerothorder entropies are equal. Second-order entropy relies on the probability that signal types i and j are grouped together. If $P(i, j)$ is the joint probability of types i and j , and $P(j|i)$ is the probability of j given i , then the second-order entropy is:




Рисунок 21.5 The information entropy, as a function of the entropic order (Рисунок 4a from Doyle et al., 2011). Note that English, Russian and Arabic all tend to follow Zipf's law, with a powerlaw index of -1 . The Arecibo message shows no strong conditional relationships between bits, and so the entropy is relatively constant at all orders. Bottlenose dolphins also show syntactic structure to their communication thanks to their decaying entropy with order.

$$S_2 = - \sum_{i,j=1}^N P(i, j) \log_2 P(j|i) \quad (21.21)$$

This can then be generalised to n th order:

$$S_n = - \sum_{i,j,k \dots n=1}^N P(i, j, k \dots n) \log_2 P(j, k \dots n|i) \quad (21.22)$$

What does this analysis give us? It is instructive to consider the entropic structure of signals from human communication, non-human animal communication, and signals from inanimate objects. Doyle et al. (2011) relate measurements of the entropic structure of several communication sources (see Рисунок 21.5).

Plotting the entropy against order in this fashion helps to interpret the nature of the signal. We can classify signals according to the slope of these graphs. Shallow

slopes (where the entropy varies slowly with order) suggest significant levels of repetition and redundancy in the signal.

If the entropy decays with order, this is most likely thanks to the presence of syntax and grammatical structure preventing or discouraging combinations of signal types and favouring others. Signals where the entropy decreases sharply at some n indicate a limit to the signal's rule structure, or in a loose sense, 'complexity'.

If the entropies are computed in base 10 rather than 2, it is found that most human language achieves a slope of approximately -1 . This phenomenon is referred to as *Zipf's law*. Finding such a slope is not a guarantee of human-like language, as other phenomena have been shown to exhibit similar behaviour.

That being said, Doyle et al. show that human communication is markedly different in entropic structure from inanimate signals such as the signalling received from pulsars, which show shallow entropy slopes. Bottlenose dolphins and humpback whales show slopes close to the Zipf slope, but this remains insufficient evidence for complex symbolic communication (although see section 6.4.4). It is also important to note the low Zipf slope of the Arecibo message (section 21.4.1), which indicates the lack of conditional relationships between any two bits of the message.

21.4 Они не ведут передач

It is possible that we exist in a Galaxy populated by many civilisations listening for signs of their neighbours, but choosing not to transmit signals. If no one transmits a signal, then it is quite possible that no civilisation can detect each other.

This solution to Fermi's Paradox lies at the heart of a polarising debate in the SETI community, regarding whether humanity should be sending exploratory transmissions into the Universe, in an attempt to instigate contact. This practice has been given many names over the years: CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence), METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), and most recently active SETI. I will adopt METI throughout, as it is most clearly different (both phonetically and in text) from SETI.

21.4.1 Аргументы в защиту METI

SETI's Decades of Failure Merits a New Approach

We are now almost sixty years from Frank Drake's first SETI observations as part of Project Ozma. METI activists argue that our failure to detect another civilisation by merely listening indicates that eavesdropping on interstellar

communications is likely to fail, and that direct messaging is the only viable possibility for Earth to receive extraterrestrial transmissions.

It is true that eavesdropping on unintentional or leaked broadcasts from radio/TV transmitters is extremely challenging even at relatively short interstellar distances. As we have discussed in the Introduction, our leaked transmissions are at best only likely to be received at distances less than a few hundred parsecs from Earth with receivers akin to our own (Loeb and Zaldarriaga, 2007). Our radar systems, especially for asteroid detection and for space probe ranging, may do better and penetrate deeper into the interstellar medium, but these are highly directed beams of energy. If we wished to do so, we could prevent the accidental transmission of these signals towards nearby stars by simply halting operations when the beam's target occults a known star (or transits the Galactic plane).

Consider twostar systems possessing intelligent civilisations aware of each other's existence, and in formal contact. If these two systems decide to communicate, it is likely that their communications would entail a modest collimation of the signal beam, as this would assist in producing reliable transmissions with a judicious use of energy. Now consider Earth as the third party in this scenario, who wish to intercept this communication beam. It is simple to demonstrate that if the communication beam is only modestly collimated, the probability of interception by any third party is exceptionally small (Forgan, 2014). If this is true, then we can identify three possibilities:

1. Earth will only be able to detect ETI via direct contact from a civilisation that has determined our existence.
2. Earth will only be able to detect ETI via secondary forensic evidence (a growing field of interest, which we will address in the concluding part of this book).
3. Earth will never be able to detect ETI.

METI activists argue that to forestall possibility 3, we must encourage possibility 1 to occur. The best way to get a direct signal in this scenario would be to encourage a response to our own transmitted signal.

Кто-то должен начать разговор

We can imagine a Galaxy with a relatively small number of intelligent civilisations, who have all decided not to send out communications. From the previous argument, if ETI leave no detectable secondary forensic evidence, then ETI will never be able to ascertain each other exists.

If humans do not exercise METI, then we are demanding that other ETIs practise it instead. It is arguable that civilisations that practise METI initiate

contact earlier than civilisations which do not. In this scenario, Earth's attempt at METI would be a lighting of the touchpaper, a trigger to all listening civilisations that we exist, and wish to communicate.

Они могут нам помочь

A long-used argument for initiating contact is that a response from ETI may contain valuable information. We have outlined in part 2 a series of existential risks to humanity (both natural and self-inflicted). If we initiate a conversation with an advanced civilisation, they may have passed the so-called 'Great Filter', and may have crucial information on how to do so.

This information could take the form of blueprints for hardware to combat climate change, appropriate software to control artificial intelligence, or even political doctrine that produces harmonious governance. METI activists assert that such assistance is unlikely to arrive unasked for. It may well be that few civilisations can pass the Great Filter unaided, and that we must ask for help before it's too late.

Мы делаем это тем не менее

With the correct electronics, any single-dish radio telescope can be refitted to become a radio transmitter. The Earth has a long history of sending radio transmissions at a variety of frequencies and bandwidths, with a great diversity of information contained within. Five major deliberate radio transmissions are recorded in Table 21.1 (Shuch, 2011). More transmissions continue to occur (albeit at significantly reduced radio power).

Famous large-scale efforts include the Arecibo message, sent in 1974. The message's contents were drafted principally by Frank Drake, with assistance from graduate students at Cornell University (Richard Isaacman and Linda May) as well as Carl Sagan.

The Arecibo message consisted of 1,679 bits of information. The transmission (sent at 2,380 MHz) used frequency shifting to indicate zeros and ones, with a shifting rate of 10 bits per second. The message transmission took less than three minutes, and was not repeated. We can see the message in Рисунок 21.6. The selection of 1,679 bits is crucial, as it is *semiprime*, i.e., it is a product of only two primes: 23 and 73. If the bits are arranged in 73 rows and 23 columns, the stream of zeros and ones become pixels of a pictorial message.

The message contents are as follows. The first row establishes the numbers one to ten in binary, where each number is represented by two columns (the second column is only necessary to describe numbers above 8). With this established, the principal elements in terrestrial biology are given in the second row by their atomic numbers (H, C, N, O, P).

In the subsequent four rows of numbers, the structures of deoxyribose and phosphate sugars occupy the margins, and the two sets of base pairs (AT, CG) are also indicated. This indicates the composition of DNA, whose double helix shape is sketched below (with the interior number giving the typical number of base pairs in the human genome).

Table 21.1 The five major radio transmissions made by humancivilisation

Name	Date	Authors	Radar Sets	Time (min)	Energy (MJ)
Arecibo Message	16/11/1974	Drake, Sagan, Isaacman et al.		- /07/99	Chafer, Dutil, Dumas, Arecibo 1383
Cosmic Call	124/05			- /07/99	Chafer, Dutil, Dumas, Evpatoria 49608, 640
Teen Age Message	29/08			- /09/2001	Pshenichner, Braastad, Zaitsevetal. Evpatoria 63662, 200
					Filippova, Gindilis, Zaitsevetal. Evpatoria 59008, 100
Cosmic Call	206/07/2003	Chafer, Dutil, Dumas, Braastad, Zaitsevetal.			Evpatoria 12401, 440
A Message From Earth	10/09/2001	Madgett, Coombs, Levine, Zaitsevetal.			




Рисунок 21.6 The Arecibo message. The 1,679 bits of information are arranged in 73 rows and 23 columns – black pixels correspond to ones, and white pixels correspond to zeros.

Below the DNA strand is a depiction of a human. To the right is the population count of the Earth as it was in 1974 – around 4 billion. The depiction to the left of the human is the number 14. If we convert using the wavelength of the transmission (around 12.6 cm) then this gives a value of 176 cm, approximately the height of a human.

Below the human is a depiction of the Solar System – the Earth is raised to indicate that this is our homeworld. The sizes of each point roughly indicate (in logarithmic scale) the size of each body compared to the Earth. The final graphic outlines the Arecibo antenna, with an indication of the antenna size of 306 metres (again in transmission wavelength units).

The message's target was the globular cluster M13, approximately 25,000 lightyears away. As such, the message will not arrive for millenia, and will be almost certainly undetectable when it does arrive. This choice of target might satisfy the anti-METI camp – the risk of the message being intercepted is extremely small – but the pro-METI camp is unlikely to consider such efforts as being worthy. The message is perhaps the most famous example of a deliberate message to ETI, but its content, construction and target guarantee that its value as a means of establishing contact is exceptionally poor.

Later message attempts (championed by Alexander Zaitsev) contained a great deal more information encoded in the error-resistant Lexicon language, constituting messages totalling of order half a million bits (see, for example, the Cosmic Call messages of 1999²¹). Lexicon's construction mitigates against accidental bitflipping in the message during transit. It also retains its uniqueness under rotation and mirror symmetries, ensuring that even if the message is received out of sequence, the underlying meaning is preserved (Рисунок 21.7).

Это незаконно

The SETI community has a 'Draft Declaration of Principles Concerning Sending Communications with Extraterrestrial Intelligence',²² colloquially known as 'the reply protocol', which covers the circumstances of responding to a message or signal from ETI. These protocols require any reply to be approved by all nationstates entering into the agreement, with no single state given the authority to speak for the Earth without express permission. Anti-METI activists argue that while we have not received a transmission from ETI, the reply protocols still cover any transmission sent by humans into interstellar space.

Unfortunately, the reply protocols are drafts only, and have no legal force. Even if they did, policing the transmission of radio signals into space is effectively

²¹ <http://www.cplire.ru/html/ra&sr/irm/report-1999.html>

²² <https://iaaseti.org/en/protocols/>



Рисунок 21.7 An excerpt from the Cosmic Call messages, written in Lexicon. This initial page defines the number system (from 0 to 20), both in base 10 format (dots) and binary representation (crosses and rhombus shapes), and finally both are equated to a unique symbol, which retains its uniqueness under mirror and rotational symmetry. This symbolic measure established, the prime numbers are then written underneath, along with the then largest known prime in 1999: $2^{3,021,377} - 1$ (Yvan Dutil, private communication).

impossible, due to the ease of setting up and executing a transmission. METI activists argue that, because signals have already been sent into space (and that we unintentionally leak radio signals also), the horse has bolted, and locking the stable door is pointless.

Они на большом расстоянии и не представляют угрозы

The lack of intercepted transmissions from ETI as part of the SETI program already place (weak) constraints on the number of transmitting civilisations in existence. It certainly is the case that there cannot be millions or billions of planets possessing ETI that transmit in the radio, as such a scenario would almost certainly have resulted in a detection, even given our relatively brief and sporadic search.

If this assumption is correct, the nearest civilisation is at least a few hundred parsecs away, if not thousands of parsecs. The signal travel time is therefore hundreds to thousands of years. The quickest response would be another signal transmitted at the speed of light, which would take hundreds to thousands of years to return. Therefore, METI poses essentially no immediate threat to the Earth. Current METI signals with the closest targets will still require at least another 30–50 years of travel time.

Even if our efforts contacted a hostile civilisation, it is argued that the enormous effort of crewed space travel (section 22.1) is unlikely to appeal to any civilisation wishing to conquer Earth. The prospect of an alien invasion fleet in the Solar System is so highly improbable that pro-METI activists tend to discard it as a possibility.

21.4.2 Аргументы против METI

Непредвиденные последствия контакта – аргумент конкистадоров

В истории Земли существует множество примеров, которые служат предостережением против контактов между развитыми и примитивными цивилизациями. Наиболее часто приводимый пример — прибытие испанских конкистадоров в Новый Свет. Хотя большинство ученых, занимающихся поиском внеземных цивилизаций (SETI), согласны с тем, что физический контакт между людьми и инопланетными цивилизациями крайне маловероятен, пример с конкистадорами обычно не используется для аргументации против близких контактов. Как правило, он применяется для предупреждения о непредвиденных последствиях контакта, физического или иного.

Гибель цивилизаций Нового Света, возможно, ускорила благодаря передовым технологиям европейских колонистов, но самым мощным агрессором в этих событиях был биологический фактор. Быстрое распространение ранее невиданных бактерий среди коренного населения истребило их ряды и фатально ослабило любую оборону, которую они могли создать.

Вероятно, своего рода интеллектуальная инфекция также распространилась среди коренных американских народов во время испанского завоевания. Странный новый тип людей появляется в самом сердце вашей цивилизации, обладая дальнобойным оружием, намного превосходящим ваши нынешние технологии. В течение нескольких дней небольшая группа этих существ проникает в вашу самую защищенную цитадель и захватывает вашего лидера, фактически вашего божества. Перед лицом такой ужасающей силы и неуважения что оставалось людям, кроме как впасть в отчаяние?

Даже если мы никогда не получим дозу инопланетных микробов или залп инопланетных боеприпасов, контакт приведет к проникновению инопланетной культуры. Реакции человечества могут быть похожи на реакции их ацтекских предков – глубокое чувство культурной неполноценности, возможно, даже отчаяние (особенно если окажется, что у инопланетян есть решения экзистенциальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и которыми они не хотят/не могут поделиться).

Даже если инопланетяне доброжелательны и готовы поделиться с нами своими технологиями, разумно ли нам получать эти знания «опережая наше время»? Опять же, мы видели бесчисленные примеры того, как человеческие культуры внезапно получали доступ к новым и мощным технологиям, что приводило к разрушительным последствиям.

Злонамеренные цивилизации могут прилететь на Землю

Science fiction provides us with further warnings against contact with alien civilisations. These warnings can be blunt and somewhat obtuse stories, pulpy popcorn affairs of alien invasions laying waste to our planet (such as *Independence Day*). The ‘Berserker’ solution to Fermi’s Paradox comes to us from the science fiction novels of Fred Saberhagen. This solution suggests that intelligent civilisations are silent because they fear retribution from rogue wandering autonomous craft, the so-called ‘Berserkers’. Loud civilisations tend to be silenced against their will by these ‘Berserkers’.

Точная природа Берсеркера варьируется в зависимости от того, кто предлагает такое объяснение. В романах Саберхагена Берсеркеры были машинными интеллектами, оставшимися после межзвездной войны, но они могут представлять собой инопланетный боевой флот, стремящийся уничтожить любых разумных конкурентов, или какой-либо автономный зонд с поврежденной программой (или даже автономный зонд с намеренно злонамеренной программой). Аргумент сторонников METI о том, что инопланетное вторжение крайне маловероятно, опровергается концепцией, согласно которой такой флот вторжения может вообще не обладать никакой биологической составляющей. Путешествие в несколько тысяч лет может быть лишь незначительным неудобством для беспилотного автономного боевого флота.

Злонамеренные цивилизации могут дать опасный ответ

Даже нефизический контакт таит в себе свои опасности. Классический радиосериал «А для Андромеды» (автор — известный астроном сэр Фред Хойл) описывает возможный сценарий радиосвязи между людьми и другой цивилизацией. Сообщение, полученное Землей, содержит инструкции по

созданию компьютера и соответствующей программы. Компьютерная программа выдает инструкции по созданию живых клеток и, в конечном итоге, по созданию человеческого клона, которого она использует в секретном плане по попытке завоевания человечества. Этот сценарий демонстрирует мощь передаваемых данных — несмотря на то, что сообщение пришло из «туманности Андромеды» (то есть галактики Андромеды, расположенной на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет), и нет никакой возможности физического контакта между передатчиками сигнала и людьми, оно все равно может причинить нам вред и боль.

Для обнаружения инопланетян общение не требуется

Returning to the three possibilities outlined in section 21.4.1:

1. Earth will only be able to detect ETI via direct contact from a civilisation that has determined our existence.
2. Earth will only be able to detect ETI via secondary forensic evidence (a growing field of interest which we will address in the concluding part of this book).
3. Earth will never be able to detect ETI.

A pro-METI argument by definition ignores possibility 2 as being credible. If we can detect ETI by the imprints left by its activities around stars and on planetary bodies, then we can use this to exclude possibility 3 without having to send a transmission.

Куда вы осуществляете передачу?

It is well established that a collimated transmission from Earth that is not sent in an appropriate direction is unlikely to be received by an ETI. METI sends the transmission in the hopes of establishing contact, which by definition extends to learning of the existence of another technological civilisation. But the logic is circular: to detect ETI, we must transmit a signal; for ETI to receive our signal, we must already have detected them to know where to centre our transmission. ProMETI academics argue that this can be solved by selecting a larger number of targets, broadcasting to each target in a repeating duty cycle. However one chooses to carry out METI, any message is a shot in the dark, without prior evidence that the target contains a technological civilisation.

У нас нет учреждения, способного принять какой-либо ответ

Even if we are successful in initiating contact with ETI, any conversational aspect may be extremely limited by the constraints of lightspeed. Unless our interlocutor

is a local probe or machine designed to mediate on ETI's behalf, a likely scenario will be that of transmit – delay – reply – delay – transmit, where each delay interval could be as long as hundreds (even thousands) of years, certainly beyond the lifespan of an individual human.

For any human–ETI conversation to have coherence, we must be able to accurately document the interchange over several iterations of this transmit–reply cycle. As Gertz (2016) notes, such coherence requires institutional memory. We can point to very few human institutions that remain recognisably intact over thousands of years. The best candidates for institutional longevity are arguably religious institutions such as the Catholic Church which have endured for several centuries, at times in the teeth of fierce antagonism. Of course, the means by which such institutions have endured rarely make them suitable for what is required here.

If we are to truly attempt METI, then there should be preparations for a reply. An institution responsible for METI must perform multiple roles:

1. It must attain full accreditation and legal authority to converse on behalf of all the Earth's peoples.
2. It must protect the means of communication, including but not limited to the instrumentation used to transmit and receive, but also the environment of the signal. For example, a radio conversation would require that certain frequency bands be protected from radio frequency interference due to human use.
3. It must record with high fidelity all instances of transmission and reply. This will mean being able to curate and protect digital information and retrieve it many thousands of years after recording.

At the time of writing, no institution in existence can demonstrate that it can perform any of these three roles. This is a symptom of a wider failing in present global human society – the ability to plan effectively on timescales larger than a few decades.

21.4.3 Можно ли разрешить дебаты по поводу METI ?

Haqq-Misra (2018) demonstrates that the METI debate, which we can phrase concisely as:

Will transmitting result in a positive or negative outcome?

can be reduced to an instance of the halting problem (see Chapter 15) and is therefore undecidable without further data (i.e., detecting ETI). Without this data, we must therefore rely on a guiding principle to decide whether to transmit or not. If we state the value of METI U_M as

$$U_M = p_d M - C \quad (21.23)$$

where M is the magnitude of an ETI's response (which can be either positive or negative), p_d is the probability that a message is detected by ETI, and C is the transmission cost. We must therefore ask, what is the sign of M ? We cannot know without further information.

Anti-METI activists argue for the *principle of precautionary malevolence*. We must assume in the absence of data that ETIs are malevolent, and that transmitting will produce a negative outcome ($M < 0$).

Pro-METI activists argue for the *principle of assumed benevolence*. The likely technological and historical asymmetry of any contact suggests that ETIs will be benevolent ($M > 0$), and we should therefore transmit.

Haqq-Misra (2018) advocates for a third principle, the *principle of preliminary neutrality*. Without knowledge of the sign of M , we must instead assume $M = 0$ until proven otherwise. This neither advocates for or against METI, but instead ascribes its value merely by the cost, C . METI should only be pursued if its costs are sufficiently low (compared against the many demands on human resources). In essence, the decision to transmit should be economically motivated, and not motivated by any other principle.

22. Они находятся слишком далеко

Как уже совершенно очевидно, наши наблюдения за Галактикой не позволят различить сценарий, в котором мы действительно одиноки, и сценарий, в котором существует небольшое количество технологически развитых цивилизаций, разделённых большими расстояниями. Если только другая цивилизация не потратит огромные ресурсы лишь на то, чтобы связаться с нами, то во втором сценарии мы получим так же мало свидетельств существования разумной жизни, как и в первом.

Most optimistic arguments for detecting ETI assume that any population of civilisations would inhabit the Galactic Habitable Zone (section 4.2.2). This rationale relies on the civilisations having somewhat specific biological needs. If the civilisation is fully post-biological (or elements of it are), then we can expand the potential domain of intelligent beings far beyond the GHZ.

Indeed, a post-biological intelligence would have its own rationale for moving as far away from the Galactic Centre as possible, for thermodynamic reasons. If fast and accurate computing is necessary or desired by such intelligences, then they are likely to seek our regions of low temperature and reduced levels of ionising radiation.

We can see this constraint in the following inequality, which defines the maximum amount of information content available to be processed in any system $I_{\max}$ (Landauer, 1961; Brillouin, 1962):

$$I \leq I_{\max} = \frac{E}{k_B T \ln 2}, \quad (22.1)$$

as a function of the energy used, E , and the system temperature T . In an ideal case, the system should be passively cooled, rather than using extra energy to reduce its temperature. The simplest solution is placing the system in a heat reservoir of as low temperature as possible.

The coolest heat reservoir possible is that of the cosmic microwave background, which in the absence of other energy sources has the temperature (Fixsen, 2009):

$$T_{\text{CMB}} = 2.72548 \pm 0.00057\text{K} \quad (22.2)$$

In practice, it is not feasible that computers will be able to reside in direct contact with these sorts of temperatures, but it is clearly a target that motivated post-biological civilisations can aim for.

Cirkovic and Bradbury (2006) used this reasoning to motivate a *Galactic Technological Zone* – regions of the galaxy conducive to high-performance

computing. This includes the outer reaches of the Milky Way, but may also include the interiors of giant molecular clouds, where temperatures can remain relatively low (although such regions can still be dogged by significant cosmic ray heating, which can not only increase the reservoir temperature but also cause bit corruption).

Таким образом, мы можем представить себе сценарий, в котором мы появились поздно в глобальном масштабе, и что внешние области Млечного Пути густо населены развитыми постбиологическими цивилизациями, потенциально контактирующими друг с другом, но не с нами. Мы также можем представить себе сценарий, в котором Земля появилась поздно, и развитые цивилизации решили прекратить свою деятельность и подождать, пока сама Вселенная не станет холоднее. Уравнение (22.1) показывает нам, что по мере того, как звездообразование затухает, а космическое микроволновое фоновое излучение продолжает охлаждаться, цивилизации начинают достигать гораздо большей энергетической эффективности на бит информации. Так называемое «эстивационное» решение парадокса Ферми (решение U.10, Sandberg et al., 2017) предполагает, что развитые цивилизации выбирают эстивацию (пребывание в состоянии покоя в периоды высоких температур) и фактически невидимы для менее развитых цивилизаций, таких как наша.

Рассматривая возможность установления контакта с очень отдаленными цивилизациями, следует учитывать сложности, связанные с передачей информации или звездоплавания на большие расстояния, как мы обсудим в следующих разделах.

22.1 Осуществимость пилотируемых межзвездных путешествий

In earlier chapters, we have already explored the mechanics of uncrewed interstellar craft and their exploration of the Universe. The payload of these uncrewed missions ranges from grams to a few hundred tons. If we add the further requirement that these craft are crewed, by which we mean they host biological life forms, the payload required is significantly greater.

As the payload is significantly larger, the maximum velocity of the craft is likely to be significantly slower, even for the most advanced and exotic means of travel. Considering that the Daedalus design (of mass $\sim 54,000$ tonnes) could achieve a maximum velocity of order $0.1c$, what would a human-crewed vehicle achieve?

Assuming the goal of crewed interstellar travel is to found a settlement at the destination, we can estimate the expected settlement mass M_s as (Cassenti, 1982):

$$M_s = M_e + M_i N_i \quad (22.3)$$

where M_e is the total mass of landers, probes and equipment to support the mission, M_i is the mass required to support a specific individual, and N_i is the number of individuals. A human crew of 1,000, with individual needs of 100 tonnes per person, already has a settlement mass of $M_s = 0.1Mt$ (ignoring the support equipment mass). Without enormous energy cost, it is likely that a crewed human voyage would take many thousands of years to travel from Earth to the nearest star system.

A journey of this duration places even stronger demands on the spacecraft's payload. No spacecraft can carry a thousand years' supply of food for a human crew, even one with only a hundred individuals. For such an interstellar vehicle to successfully carry its crew to destination, it must be able to *generate* food, energy and gravity during the flight, using only what resources it is launched with, and the meagre provender available in the interstellar medium.

These so-called *generation ships* (sometimes called interstellar arks) are effectively miniature planets, able to sustain a mobile settlement of humans from beginning to end. Tsiolkovsky, like much of astronautics, was amongst the first to describe the concept in his essay *The Future of Earth and Mankind* (1928).

A classic generation ship design derives from the *O'Neill cylinder*. O'Neill's cylinder is a free-space habitat design, where the cylinder rotates along its longest axis to maintain a centrifugal force on the interior of the cylindrical surface. This provides a source of artificial gravity (a counter-rotating cylinder would provide gyroscopic balance to the craft). For an acceleration equal to Earth's gravity g in a cylinder of radius R , the angular velocity of the cylinder

$$= \frac{g}{R} \quad (22.4)$$

For $R = 895$ m, the cylinder can achieve an acceleration of $1g$ at a rotation rate of 1 revolution per minute (rpm). A km-sized cylinder would contain a total volume of $V = \pi R^2 z \approx 3 \times 10^9 \left(\frac{z}{1 \text{ km}}\right) \text{ m}^3$, and a total surface area (ignoring the lids) of $A = 2\pi R z \approx 3 \times 10^6 \left(\frac{z}{1 \text{ km}}\right) \text{ m}^2 \approx \text{ — } .$

If $z = 1$ km, this is sufficient to house hundreds of thousands of people (assuming a population density of 70 m^2 per person). By keeping the total population much lower than this, a generation ship has more carrying capacity for other biomass and environmental equipment needed to generate a functional biosphere.

Much of the standard O'Neill design assumes the cylinder would remain in close proximity to the Sun or the planets, and receive a steady supply of materials and sunlight. A generation ship will not have such a luxury, and must rely instead on its own resources. Instead of relying on a nearby star, energy must be used to

power a set of lamps to provide appropriate radiation to drive the onboard ecosystem.

Any faults on the ship must be repaired by its own engineers. Hein et al. (2012) calculate the reliability R of a craft, defined as the fraction of parts n still working at time t :

$$R(t) = \frac{n(t)}{n(0)} \quad (22.5)$$

by considering the mean time between failure (MTBF) data from the Magellan mission, and fitting parameters to a modified Weibull distribution:

$$R(t) = \exp \left[\left(\frac{-t}{\tau_{\text{mission}}} \right)^\beta \right] \quad (22.6)$$

For Magellan, $\tau_{\text{mission}} = 102,775$ hours and $\beta \approx 0.43$. After 50 hours, the reliability of the craft drops to 99.99%, corresponding to around half a million faulty parts on a generation ship, or a failure rate of around 3 per second! They therefore argue that a small human crew is incapable of repairing this prodigious amount of failed parts, and that automatic repair systems are essential (as is bringing a significant fraction of the total ship mass in redundant spares).

If the cylinder becomes depleted in supplies of essential elements and minerals, the entire biosphere may be placed in jeopardy. For example, the transition metal molybdenum is one of the least abundant micronutrients found in plant tissue, but is crucial in nitrogen fixation reactions (Kaiser et al., 2005). An interstellar ark with a very small deficiency in molybdenum could soon see significant problems not just with crop yields, but with atmospheric regulation also.

The ecosystem of any interstellar ark will be subject to the effects of *island biogeography*. On Earth, the ecology of islands depends sensitively on the distance of the island from the mainland (from which it can source new immigrant species and gene flow), and on the surface area of the island. Larger islands will see larger levels of immigrant species (the *target effect*), and immigration becomes more likely as distance to the mainland decreases. The diversity of islands (measured by the total count of species S) is typically proportional to the island area A :

$$S = K A^x \quad (22.7)$$

where $0 < x < 1$ and commonly $x \approx 0.3$. In the classic MacArthur-Wilson model of island biogeography, this relationship is established as an equilibrium state between the extinction rate of local species and the immigration rate of invasive

species. Islands are much more subject to *endemism* – a preponderance of unique organisms, highly adapted to local habitats but extremely vulnerable to extinction if the habitat changes.

On an interstellar ark, there are no immigrant species. Gene flow is utterly suppressed. Genetic drift is weakened by the low population count aboard. Mutation and selection dominate the evolution of the system. Generation ships are therefore extremely fragile ecosystems. Small mutations in, say, the microbial community aboard can have devastating consequences. With such a small population aboard, highly prone to endemism, there are only a limited number of genetic combinations available to the ecosystem to search for an equilibrium solution. This can be mitigated against by carrying extra genetic material in a more condensed form (either by hosting a seed bank, or storing DNA in a digital form for later genetic engineering efforts).

Perhaps a greater challenge to any interstellar voyage is the psychological pressure exerted on the voyagers. Interstellar travel in this mode guarantees that the crew launching the voyage will never see its end. Indeed, there are likely to be many generations of crew who live on the vehicle for their entire lives, and never see the starting point or destination.

There are multiple psychosocial stressors acting on a generation ship crew, which include (Kanas, 2015):

- Isolation and loneliness – knowing that both home and destination will never be within reach
- Monotony and tedium
- Unforeseen physiological/psychological effects of travel at near-relativistic speeds
- Governance of a totally isolated group of a few hundred individuals, including dealing with criminal elements and mentally ill individuals who place their fellow crew at risk
- Maintaining a sustainable environment
- Maintaining a healthy society and culture
- Maintaining a truthful ship history and legacy

Much of human society is predicated on deeply ingrained assumptions regarding our environment. For example, on Earth it goes without saying that the air cannot be policed, but it can inside a generation ship. How can liberty be maintained when literally every aspect of human life can be controlled by another human or machine (Cockell, 2015; Stevens, 2015)?

These are placed on top of all the problems that human societies face, with the added stress that other humans beyond the ship will take many decades to contact, if they can be contacted at all. Cross-generational social contracts lie at the heart of modern societies on Earth, but can we expect the descendants of the first crew

to accept a contract that means their life is largely pre-determined by their parents, without hope of revision?

Эти факторы позволяют предположить, что, хотя пилотируемые межзвездные путешествия не запрещены законами физики, существуют веские аргументы в пользу утверждения, что «биологические формы жизни не перемещаются между звездами». Это, возможно, частичное решение парадокса Ферми. Маловероятно, что инопланетяне приземлятся на лужайке Белого дома, если они не смогут преодолеть световой барьер, но это не исключает возможности беспилотных аппаратов, аппаратов, управляемых небιологическими или постбиологическими существами, или отправки сообщений.

22.2 Возможность надёжной межзвёздной сетевой связи

Без какого-либо невероятно мощного источника энергии (и помимо исключительной точности наведения) маловероятно, что цивилизация сможет напрямую общаться с другой цивилизацией через весь галактический диск (по крайней мере, используя электромагнитное излучение). Даже если такой источник энергии будет найден, между ними существует множество источников излучения и поглощающих сред, которые могут создавать помехи.

По этой и многим другим причинам следует рассмотреть возможность того, что сообщество цивилизаций, охватывающее всю Галактику, может не выбрать прямую связь, а вместо этого полагаться на само сообщество, создав сеть или систему ретрансляции. Отправка сигналов соседу (с ожиданием, что этот сигнал будет передан дальше) значительно снижает общие энергетические затраты для отдельной цивилизации.

Это отчасти объясняется законом обратных квадратов, но экономия энергии также достигается за счет коллимации сигнала. Сигнал, проходящий меньшее расстояние, будет занимать меньший физический радиус (при фиксированном телесном угле пучка), и, следовательно, больше фотонов (или других частиц-носителей) придет в приемник при той же входной энергии. При использовании соответствующих методов коррекции ошибок (см. раздел 21.1) сигнал также защищен от ухудшения качества, которое он получил бы при прохождении через большой межзвездный объем. Сигнал достигнет места назначения, будучи перефокусированным и повторно переданным несколько раз.

Общая длина пути сигнала, вероятно, будет больше, чем длина пути прямой передачи, но насколько больше? И насколько осуществимо создание такой коммуникационной сети?

Недавние исследования показывают, что такая сеть будет создана относительно быстро. Давайте начнем с определения некоторых полезных терминов для сетей из теории графов. Сеть или граф G определяется

множеством вершин V и множеством ребер E , соединяющих пары вершин. В дальнейшем обсуждении мы будем рассматривать цивилизации как потенциальные вершины, а соединяющие их ребра — как связи, обеспечивающие коммуникацию. Поэтому мы присвоим каждому ребру вес d , который в нашем случае равен расстоянию между двумя цивилизациями. Наш граф неориентирован, поскольку ребра являются двунаправленными (другими словами, сигнал может передаваться от вершины A к вершине B или наоборот).

Отдельная вершина может иметь несколько соединенных ребер. Разумно предположить, что как только две цивилизации установили связь, эта связь будет поддерживаться до тех пор, пока обе цивилизации продолжают существовать.

Здесь полезны два простых, но важных свойства графов. Мы можем определить подграф, известный как связная компонента, как подмножество вершин, соединенных друг с другом (т. е. любая вершина в компоненте может быть достигнута из любой другой вершины в компоненте). Граф может иметь только одну связную компоненту (т. е. каждая вершина может быть достигнута из любой другой вершины, как в примере графа на левой панели рисунка 22.1), или же может быть много связных компонент — много сетей, фактически изолированных друг от друга (см. рисунок 22.2).




Рисунок 22.1 Вверху: Пример полностью связного графа, состоящего из вершин (круги) и ребер (линии). Внизу: Минимальное остовное дерево того же графа.




Рисунок 22.2 Пример графа с тремя связными компонентами.

Второе свойство известно как минимальное остовное дерево (МОС). Определим граф G с вершинами V и ребрами E , имеющий единственную связную компоненту. МОС — это граф с вершинами V и ребрами E , где E подмножество E , и определяется для уменьшения общего веса ребер.

$$D = \sum_E d \quad (22.8)$$

при сохранении связности графа (т. е., поддерживая единственную связную компоненту, содержащую все V). Минимальные остовные деревья описывают минимальное количество ребер, необходимых для построения графа (см. правую панель рисунка 22.1). Если граф имеет более одной связной компоненты, то эквивалентной сущностью является минимальный остовный лес (MSF), где каждая связная компонента становится минимальным остовным деревом своего подграфа.

Представляется желательным, чтобы межзвездная коммуникационная сеть состояла из одной связной компоненты и имела относительно низкий суммарный вес ребер (так что любой сигнал, проходящий через сеть, имел бы минимальную длину пути).

В недавнем примере развития межзвездных сетей рассматривалось наблюдение за транзитами планет друг друга как критерий связи. Это предположение основано на недавних идеях о том, что транзиты экзопланет могут быть полезными носителями для передачи электромагнитных сигналов (см. раздел 27.1.4). Требование, чтобы взаимные транзиты планет являлись критерием связи, является относительно строгим, поэтому оно служит консервативным примером для более прямых форм связи.

Моделирование цивилизаций в кольцевой Галактической Обитаемой Зоне показывает, что в любой момент времени сеть, вероятно, будет иметь множество связанных компонентов. Это при условии, что вершины не обладают «памятью» о прошлых связях. Если вершины сохраняют память о прошлых связях, то эта сеть может быстро сформировать один связанный компонент. Если вершины «общаются адресными книгами», то есть любые

две связанные вершины имеют общие ребра, то эта сеть может быть полностью сформирована менее чем за миллион лет!

Минимальное остовное дерево сети фактически отражает размеры Галактической Обитаемой Зоны. Если цивилизация на радиусе R захочет связаться с членом сети на другой стороне кольца, также находящимся на радиусе R , то вместо попытки прямой передачи по пути длиной $2R$, пересекающему Галактический центр, можно отправить ретрансляционный сигнал, проходящий путь длиной около πR . Это увеличит общую длину пути в $\pi/2$ раза, но позволит значительно сэкономить энергию на начальной передаче, поскольку исходный сигнал должен будет пройти расстояние порядка среднего расстояния между цивилизациями:

$$d^- = \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} < \pi R \quad (22.9)$$

Как уже говорилось, это относительно консервативный сценарий. Если цивилизации транслируют информацию о своем присутствии в какой-либо другой форме, то создание полностью связанной сети может занять еще меньше времени. Это указывает на то, что межзвездные коммуникационные сети должны быть относительно надежными, простыми в создании и поддержании.

Главное условие заключается в том, что плотность цивилизаций остается выше критического значения по всему галактическому объему. Следовательно, допустимым решением парадокса Ферми является то, что связь с Землей прерывается, когда число цивилизаций оказывается ниже критического значения для создания надежной сети. Какова эта критическая плотность? If the maximum broadcast distance is $d_{\max}$, then we require the mean separation $d^- \approx d_{\max}$. As d^- is a function of N , we can therefore only infer: if communication fails, and we are confident of $d_{\max}$, then

$$N < \left(\frac{d_{\max}}{V}\right)^3, \quad (22.10)$$

given the volume V we expect civilisations to arise in.

23. Гипотеза зоопарка

Как цивилизация, мы все больше осознаем наше воздействие на окружающую среду и населяющие ее организмы. Осуществление масштабных политических изменений для прекращения этого ухудшения — сложная задача, но решения меньшего масштаба внедряются уже на протяжении веков.

Зоопарк или национальный парк — это простой юридический инструмент для сохранения и поощрения развития других видов. Человечество, ограничивая доступ человека к окружающей среде или преднамеренно вмешиваясь в неё для предотвращения дальнейшей деградации и поддержания местных экосистем, демонстрировало переменчивые результаты в предотвращении вымирания и изменении судьбы несчастных животных и растений.

Наше растущее мастерство в защите других видов заставило Балла (Ball, 1973) задуматься, может ли подобная процедура существовать среди звёзд. Опасности проникновения человека в нетронутые ранее районы вполне очевидны — разрушение среды обитания, охота на местные виды, загрязнение, но существует дополнительный уровень опасности, если местная флора/фауна разумна. Культурное загрязнение мира внеземными цивилизациями может иметь значительные последствия для его обитателей.

Ball hypothesised that the current observational data (Fact A) was consistent with the notion that Earth is itself an interstellar nature reserve, sealed off from the galactic community for what could be a number of reasons: scientific study of the Earth environment; scientific study of Earth as a ‘primitive’ civilisation; or a general awareness that contact would be extremely harmful to either party (or possibly both parties). Fermi’s Paradox is then resolved rather simply (if somewhat frustratingly).

Fogg (1987) would go on to develop this concept into what he refers to as the Interdict Hypothesis, a generalised version where the Earth is visited or probed in the very distant past by ETIs, and is sealed off from settlement efforts, most likely as a means of *planetary protection*.

Our past, present and future uncrewed missions to our Solar System neighbours are deeply concerned with contamination of landing and exploration sites by organisms from the Earth. Taken without due care, we may accidentally seed nearby planets and moons with life that never originated there, casting doubt on any future discovery of life as proof it can arise and evolve off-Earth. Conversely, any physical interaction we have with life from another world may be fundamentally incompatible with our biochemistry (or more glibly, planetary protection goes both ways). In Fogg’s view, the presence of extraterrestrial

organisms or ideas on Earth represents a hazard to the planet, and must therefore be mitigated against.

The concept of a ‘Galactic Club’ of civilisations is central to the Zoo Hypothesis. If Earth is to be truly sealed off, this requires agreement across multiple civilisations. Nature reserves on Earth are protected by a variety of legal frameworks and treaties. If the Earth is to be a reserve itself, a similar set of agreements must be established – what Newman and Sagan (1981) refer to as the ‘Codex Galactica’. Equally, any infractions of these agreements must be policed.

As with many of the Paradox solutions in this part, it is to a large degree ‘unprovable’. Its validity requires an absence of evidence, and a twist on the well-worn aphorism applies: ‘absence of evidence is not evidence of presence’. The only real evidence for the Zoo Hypothesis can come from its resolution, when the interdict is lifted and Earth is contacted.

A common assumption is that our admission to the Galactic Club is predicated on our demonstration of some particular advancements or achievements. The precise criteria for acceptance depend on the motivations for the Club’s existence. The only true analogue for the Club on Earth is the United Nations. Chapter I, Article I of the United Nations Charter²³ states four purposes of the UN: to maintain international peace and security, develop international relations to assist and maintain said peace, foster international co-operation to tackle global problems and to protect individual human freedoms, and to be a facilitating agent for nations of the world to achieve the previous three goals. It is somewhat obvious to note that the 193 parties to this Charter do not always share the same views on how to achieve these aims.

We of course have no idea what an equivalent charter for the Galactic Club might contain, as we do not know its guiding aims or principles. Is the maintenance of biodiversity the main goal? Preservation of pristine environments? Preservation of pristine cultural and intellectual outputs? Or are our ETI cousins motivated by the maximisation of free energy, information, or perhaps even profit?

Due to its reliance on our inability to collect evidence, the Zoo Hypothesis is extremely difficult to approach from a scientific viewpoint. What we can do is address the assumptions we have discussed above, and ask: *how can a Galactic Club be established across the vast reaches of interstellar space?*

Establishing agreements requires communication. The laws of physics do not permit information to travel faster than the speed of light, and hence we can begin to impose some rigorous boundaries on the ability of groups of civilisations to come to early consensus. Initial calculations were motivated by the belief that if

²³ <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>

The Zoo/Interdict Hypothesis

ETIs exist, then it is likely that some are significantly older than humanity (Hair, 2011).

If we assume for the sake of argument that the distribution of arrival time t_a in the Milky Way is Gaussian, and that the arrival times are not in any way correlated, we can model this arrival as a Poisson point process, where the number of civilisations that have arisen by time t is Poisson-distributed:

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \quad (23.1)$$

By construction, the time interval $t = t_{a,i} - t_{a,i-1}$ is exponentially distributed:

$$P(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (23.2)$$

with mean $1/\lambda$. As this distribution can have a long tail, the implication is that the first civilisation to arrive in the Milky Way may have to wait a long time for the next to arrive (which may have consequences for humanity if we are the first; see section 18.2). This time interval has been proposed by many as an opportunity for the first civilisation to broadcast or send its belief systems across the entire Milky Way, establishing the Galactic Club at the earliest instance.

These efforts did not take much account of the fact that the time interval is not the relevant variable for group establishment, but in fact it is the *space-time interval* that matters. If two civilisations exist in the Milky Way at position vectors

$$\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1) \quad (23.3) \quad \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2) \quad (23.4)$$

and arrive at times t_1 and t_2 ($t_1 < t_2$), then we can define the space-time separation 4-vector as:

$$dx_v = (ct, x, y, z) \quad (23.5)$$

where c is the speed of light, $t = t_1 - t_2$ is the difference in arrival time between the two civilisations, and $x = x_1 - x_2$, $y = y_1 - y_2$ and $z = z_1 - z_2$. If we adopt the following convention for the magnitude of the 4-vector:

$$|dx_v|^2 = c^2 t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \quad (23.6)$$

then we can immediately determine three cases based on the sign of $|dx_v|^2$:

1. $|dx_v|^2 > 0$: a signal travelling at c from civilisation 1 reaches the location of civilisation 2 before civilisation 2 can begin broadcasting its own signal. In this case, civilisation 2 can be strongly influenced by civilisation 1, making agreement easier.
2. $|dx_v|^2 < 0$: civilisation 1's signal cannot reach civilisation 2 before it starts its own broadcasting. The influence of civilisation 1 on civilisation 2 is subsequently much weaker, and agreement is harder to establish.
3. $|dx_v|^2 = 0$: the edge case, where civilisation 1's signal arrives at the instant civilisation 2 begins to broadcast.

Recent simulations have shown that if the arrival time of civilisations is Gaussian, and the civilisations exist at a range of distances from the Galactic Centre, then instead of a single Club forming, a large number of much smaller 'Galactic Cliques' can form instead (Forgan, 2017b). Depending on the number of civilisations, and the conditions of their arrival, these cliques can be very small indeed, perhaps even just individual pairs of civilisations. To form a single Club, civilisations must:

- be quite numerous (i.e., there must be many hundreds of civilisations)
- be (without exception) extremely long-lasting, with lifetimes of order a million years or greater, and
- counter-intuitively must arrive reasonably close together.

These results illustrate the softness of the Zoo Hypothesis – since its inception, its adherents have always been aware that an interdict placed on Earth can easily be broken by one dissenting actor, and the size of the Milky Way is sufficient that dissenters will always have a place to reside.

24. Гипотеза компьютерной симуляции

Perhaps the most esoteric solution to Fermi's Paradox is the conclusion that the entire Universe is itself artificial. In this solution, we are not physical entities at all, but instead software elements in a larger computer program.

Humans have managed a roughly exponential increase in computer processing power over several decades (so-called Moore's Law). If we assume that this processing power continues to grow, at some point in the future there will be sufficient storage and processing power to emulate individual humans, and eventually entire civilisations of humans.

Note that this implicitly borrows from the philosophy of mind the concept of *substrate independence*, i.e., that mental states can occur or be consequent on a broad spectrum of possible physical substrates. Substrate independence may not be precisely true, but may be 'true enough' that emulations of a human brain (e.g., at the synapse level) would be sufficient to generate a conscious mind indistinguishable from a human mind running on traditional biological substrates.

To the humans inside such a simulation, it is arguable that their experience of the simulated world will be indistinguishable from a 'physical' human's experience of the 'real' world. After all, experience is grounded in sensory inputs and outputs (with the ferociously complex intermediate software-substrate mix that is the human brain). This concept is often referred to colloquially as the 'brain-in-a-vat' scenario, but this is a slight misnomer, as we can distinguish two possibilities:

1. Our minds exist in the real world on biological substrates, but are being fed sensory input ('brain in a vat')
2. Our brains are also simulated (i.e., the substrate is silicon)

The first option has deep philosophical roots, tracing itself back to Descartes. In his *Meditations*, he attacked the epistemological question of knowledge. How can any of us be certain that our perception of the world is correct? Descartes imagined that an evil demon could feed us false information not just about our senses, but about mathematical knowledge that, since the ancient Greeks, has been our gold standard of demonstrable truth. In short, everything attached to our experience, including the products of our own intellect, is corruptible and susceptible to deception.

In his attempt to resolve this crisis, he began by discarding certainty of any aspect of the Universe. Only his self is saved in this initial state because, famously, *cogito ergo sum* (I think, therefore I am). In this case, 'I' can only be the 'thinking thing', i.e., the mind, and not the body, which the mind learns of through sensory impulses which can be deceived. In other words, Descartes is arguing for a clear

distinction between the mind and the body (so-called *dualism*) precisely because the mind is all that is ‘knowable’. This form of thinking, while not an ironclad argument for dualism, is sufficient for our understanding of how minds can be fooled into thinking their bodies exist in a form contrary to reality.

If an observer cannot determine from their own experience if they are real or simulated, then we are forced to assign non-zero probabilities to each outcome. Our probability of being a simulated observer can be estimated (in a frequentist fashion) by considering the expected ratio of simulated to ‘real’ observers. Construction of observer minds running on biological substrates is limited by the constraints imposed in generating the substrate. Reproducing and growing new human brains is energy intensive. Constructing minds entirely in software is likely to be much cheaper energetically speaking (especially if such processes run to scale, and large numbers of electronic minds are made).

We have already begun to make significant advances in sensory input/output. If (and this is a large if) the human brain can be fully simulated, then it stands to reason that a future advanced civilisation could be capable of running an *ancestorsimulation* – a detailed re-enactment of its own past.

Let us therefore define f_p as the fraction of all civilisations that achieve the ability to generate ancestor-simulations, N as the average number of ancestorsimulations run, and n as the average number of citizens produced by a civilisation before it can produce ancestor-simulations. The fraction of all observers that are in fact simulated is

$$f_{\text{sim}} = \frac{f_p N n}{f_p N + 1} = \frac{f_p N}{1 + f_p N} \quad (24.1) \quad f_p N n \quad n$$

where we have assumed that each ancestor-simulation reproduces the entire presimulation population n . As simulated civilisations are significantly more energy efficient than ‘real’ civilisations, it stands to reason that if ancestor-simulations ever become possible, then N will tend to a large number, and $f_{\text{sim}} \rightarrow 1$.

We can then outline three possibilities:

1. Humans (and ETI generally) are physical entities which will soon reach extinction before being capable of simulating intelligent observers, or that simulating intelligent observers is in some way functionally impossible ($f_p = 0$).
2. Any advanced simulation, while capable, is unlikely to run ancestorsimulations.
3. We are living in a simulation, as the number of simulated observers is likely to significantly exceed the number of physical observers ($f_{\text{sim}} \rightarrow 1$).

Cirković *c'* (2015) rightly notes that the simulation hypothesis and the AI solutions to Fermi's Paradox are deeply interlinked. If we are agents in a computer simulation, then we are arguably an instantiation of strong AI. Any physical universe where sentient beings create a simulated universe with simulated sentient beings must also be a universe where sentient beings create strong AI.

The risks associated with strong AI (what Cirkovic refers to as 'AI⁺⁺') are indelibly attached to the simulation hypothesis. Any advanced civilisation wishing to run simulations must first assimilate and resolve/ameliorate the risks associated with producing strong AI. In other words, the probability that we are living in a simulation is conditional on the probability that civilisations can safely produce AI.

If AI can be produced with appropriate safeguards (as we discussed in section 15.5), then a single civilisation can run an extremely large number of ancestor-simulations, and we are most likely among this cohort of simulated beings. If AI cannot be produced safely, then this limits the number of ancestor-simulations that can be run before malevolent AI ceases their execution (either by seizing the hardware or by destroying the civilisation).²⁴

24.1 Сколько потребуется вычислительной мощности?

If ancestor-simulations of Earth were run, what sort of computer would be able to run them? We can begin to estimate this by considering the processing power and memory storage in (a) the human body, and (b) the environment at large. It is difficult to estimate the precise processing power of the human brain – extrapolations from smaller quantities of nervous tissue suggest 10^{14} operations per second (OPS). If synapse firing data, in particular the firing frequency, is used, these estimates grow to 10^{16} – 10^{17} OPS. Given that biological systems are replete with noise, and rely on significant levels of redundancy, it is conceivable that conscious entities could be run on lower OPS, but the matter remains unclear. Given that human sensory input constitutes a data stream of no more than approximately 10^8 bits per second, the limiting step to simulated minds is not the input data, but the computations performed on it.

Estimates of the total memory storage of the mind are difficult to obtain. Given that a typical human brain contains between 80–100 billion neurons, and each neuron is typically connected to around 1,000 others, this would present $10^{11} \times 10^3 \sim 10^{14}$ synapses (Hawkins and Ahmad, 2016). Assuming each synapse is equal to one bit of information, the total storage would be 10^{14} bits, or around 100 terabytes. Synapses are not digital sensors, and can therefore store more than a single bit

²⁴ One could argue that malevolent AI might choose to execute their own simulations. A rather dismal prospect is that our universe appears cruel and indifferent as its creator, a malevolent AI, is itself cruel and indifferent towards its simulated subjects.

(0/1) of information. Also, neurons tend to collaborate when storing or recalling memory, which can exponentially increase the total storage capacity, perhaps to values even as large as several petabytes (several thousand terabytes).

As we multiply these memory and bandwidth elements (i.e., we simulate more people) and we place them into a simulated environment, the required computing grows. If we merely attempt to catalogue the genomic content of the Earth's biosphere (i.e., by listing the genome of all known species and taking a sum), we arrive at a total of approximately 10^{31} bits (Landenmark et al., 2015), which is itself only a fraction of the total DNA storage available in Earth's biomass. This ignores the information stored in the non-biological environment, such as the fluid properties of the Earth's mantle, or its patterns of cloud cover and precipitation. Adding a human population of $10^{15} \times 10^9 \sim 10^{24}$ bits, we can therefore see that an ancestor-simulation of the Earth alone will already require storage well beyond 10^{30} bits, and most likely of order 10^{40} bits (perhaps even larger), with the ability to conduct at least $10^9 \times 10^{14} \sim 10^{23}$ OPS to simulate the processing power of all the human brains present today (we can be generous to the simulators and assume that animal brains need not be simulated to the same level, as 'conscious' brains are the only ones that need to be fooled). These calculations assume the Earth is the only subject of an ancestor-simulation, and indeed we might expect that an ambitious simulator would attempt to reproduce multiple planetary systems with intelligent life, to understand the interactions of different civilisations, or even to simulate the entire Universe.

One might consider a faithful simulation of every particle in the Universe an implausible task. This is not a necessary goal of an ancestor-simulation – the agents within need merely be *convinced* of its verisimilitude. Of the entire sum of human experience, the vast majority occurs in spatial and temporal scales proximate to that of human existence. The microscopic world is present when we observe it using the correct machinery, as are distant galaxies when we study telescope data, but these could be simulated only when needed. This is in exact analogy to modern video games, which only render environments within visible range of the player.

One could argue (rather cheekily) that the Copenhagen Interpretation of quantum physics (that material existence can only be defined during interactions between the environment and the observer) is a highly convenient tool for a universe simulator keen to trim CPU operations.

24.2 Как мы можем это получить?

An ancestor-simulation requires a computer that can store some 10^{40} bits or greater, and perform at least $10^{25.3}$ OPS. The key physical factors that limit information processing are:

Size/density of processor/memory units We must first consider the physical limit of how many computational units can be compressed into a relatively small space (i.e., the information density, measured in bits/cm³). The number of bits in a system of average energy E at temperature T is

$$S = \frac{E}{k_B T \ln 2} + \sum_i \frac{e^{-\frac{E_i}{k_B T}}}{k_B \ln 2} \log_2 = \quad (24.2)$$

where i represents the various states of the system, and their corresponding energies are E_i . Cooled systems can therefore store more bits for the same energy, by reducing the system entropy S (recall that $T = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)^{-1}$). The quantum limit of information storage in a finite region is defined by the *Bekenstein bound* (Bekenstein, 1972). A finite space (with finite energy) can only occupy a limited volume of phase space. Quantum uncertainty prevents us from subdividing this volume into arbitrarily small portions, which results in the inequality

$$I \leq \frac{2\pi ER}{\hbar c \ln 2} \quad (24.3)$$

where R is the physical scale of the region. The above equation can be recast via mass-energy equivalence as $I \leq kMR$, where $k = \frac{c}{\hbar \ln 2} 2\pi$ is a constant and M is the mass in the region. For a 1 kg mass of radius 1 m, the maximum information is approximately 2.6×10^{40} bits.

Information density cannot be increased without limit. The physical scale of the system cannot be reduced below $R < \frac{2GM}{c^2}$ or the system will collapse and form a black hole.²

Processing Speed At the very upper limits of computation, we can state that any logical operation requiring time t will require the following minimum energy input (thanks to Heisenberg's Uncertainty Principle):

24.2 Where Could We Get It From?

²⁵ Bekenstein originally derived the bound heuristically by requiring that general relativity not violate the second law of thermodynamics – the entropy of black holes being an important component in this theory.

$$E_{\min} \geq \frac{\hbar}{2t} \quad (24.4)$$

Hence a system of average energy E can perform at a maximum speed of $\frac{2E}{\hbar}$ — OPS (sometimes referred to as Bremermann's limit). Surprisingly, the upper limit for a 1 kg device would correspond to around 10^{50} OPS!

Communication Delay Our computer can transmit data between its components at a maximum speed of c . Depending on the physical scale of the machine and its architecture, significant time lags can be set up by the finite speed of light.

Energy Supply A system with high energy E and low entropy S maximises both the information storage and the processing speed of the machine, and therefore any calculator will attempt to optimise both quantities. It is important to note that some forms of computation are *reversible* (i.e., there is no net energy expenditure from the calculation). Examples of reversible computation include copying bits, and adding bits (provided a record of one bit is kept). Erasing bits is an irreversible operation that has a minimum net cost given by Brillouin's inequality:

$$E \geq k_B \ln 2 T \quad (24.5)$$

Any system that dissipates energy through irreversible computations will radiate heat. It can be shown that if a system can perform reversible computations, and dissipate energy merely for correcting bit errors, it can sustain a bit density $\rho_I =$

I/V such that (Sandberg, 1999)

$$R < \frac{3\sigma_{SB}}{k_B \ln 2} T e^{3/k_B T} \quad (24.6)$$

where we have assumed the system radiates as a blackbody according to the Stefan Boltzmann law.

24.2.1 Мозг матрёшки

Proposed by Bradbury (see Bradbury, 2002), the Matrioshka brain is simply a series of concentric Dyson spheres, hence their name (inspired by the wooden Russian nesting dolls). The innermost shell of the Matrioshka brain draws off the majority of the stellar flux, emitting large amounts of waste heat while performing high-temperature computing. The nextmost shell absorbs the waste heat, performs computation on this energy and then re-emits to the next shell. The interior shell would operate at extremely high temperature, and the outermost shell would operate at temperatures close to the cosmic microwave background temperature of 2.7 K.

If we apply the Bekenstein bound, then we require that a 10^{40} bit system acquire energy equal to

$$E \geq \frac{I \hbar c \ln 2}{2\pi R} = 3.5 \times 10^{13} J \left(\frac{R}{1\text{m}} \right)^{-1} \quad (24.7)$$

If we are dealing with a traditional Dyson sphere with maximum radial extent $R = 1\text{AU}$, then the minimum energy is approximately 233 J, which seems like an extremely small number for a large amount of information. In practice the Bekenstein bound is never the lower limit for information storage at a given energy, and other concomitant factors (such as noise and other instrumentation problems) drive this energy higher.

A Matrioshka brain is an enormous undertaking, requiring many times more matter and energy than a single Dyson sphere to construct. It also will suffer from communication delay issues due to its vast scale. This can be reduced by appropriate ‘chunking’ of the system hardware into modules (as well as judicious software design). In principle, however, it seems that a Matrioshka brain is capable of storing the data for ancestor-simulations. Whether the device can process the data at sufficient speed (and control the dissipation of energy and the generation of entropy) is a question for the would-be architects of such megastructures.

24.3 Аргументы против гипотезы Симуляции

Главные аргументы против гипотезы симуляции носят моральный и этический характер. Если бы мы могли запустить симуляцию с полностью разумными существами внутри, то прекращение такой симуляции, приводящее к смерти содержащихся в ней разумных существ, должно рассматриваться как акт массового убийства или геноцида. Можно представить себе запрет на запуск достаточно сложных симуляций именно по этой причине. Создание сложной симуляции, пожалуй, является самым определением игры в Бога, и создатели несут моральный долг перед своим творением. Даже если их творение никогда не породит разумных существ, мы, люди, понимаем, что жестокое обращение с животными также является морально неправильным.

Иными словами, как только запускается продвинутая симуляция, её ни в коем случае нельзя прекращать, и необходимо предусмотреть возможность её неограниченного запуска. Будущие цивилизации, придерживающиеся этого принципа в своём моральном кодексе, должны быть готовы тратить фактически бесконечное количество ресурсов, что явно невыгодно с термодинамической точки зрения. Следовательно, можно утверждать, что симуляции предков никогда не будут запускаться, ссылаясь на это сочетание экономических и моральных возражений.

Суть аргумента о моделировании заключается в неразличимости моделируемых наблюдателей от реальных наблюдателей. По сути, у нас нет объективных средств для идентификации себя как реальных или моделируемых.

Были предприняты некоторые попытки определить, моделируется ли Вселенная. Например, рассмотрим возможность моделирования Вселенной на фиксированной пространственной сетке. Поскольку мы не «видим» эту сетку в обычной жизни, она должна быть чрезвычайно мелкой. Бин и др. (Beane et al., 2014) показали, что такая сетка ввела бы ограничение в спектре космических лучей, и, следовательно, шаг сетки 10^{-12} фм = 10^{-27} м. Учитывая, что наши попытки моделирования Вселенной (с использованием решеточной квантовой хромодинамики) обычно не продвигаются ниже 1 фм, ясно, что мы очень далеки от создания моделирования с той же достоверностью, что и наша собственная Вселенная.

Таким образом, гипотеза моделирования остается стимулирующим философским аргументом, но пока с ограниченной применимостью к исследователям SETI..

25. Они уже здесь

25.1 Зонды Брейсвелла или ‘затаившиеся’ аппараты

Почти сразу после того, как Дрейк начал проект радиовещания SETI, Брейсвелл (Bracewell, 1960) поставил под сомнение логику инопланетных цивилизаций, вкладывающих средства в масштабную и дорогостоящую кампанию радиовещания.

Повторяя результаты будущих расчетов, показавших, что использование записанной материи в качестве метода передачи информации значительно более экономично, чем радиосигналы (Rose and Wright, 2004), Брейсуэлл предложил так называемые «зонды Брейсуэлла» в качестве усовершенствованной стратегии мониторинга близлежащих звездных систем с целью получения разведывательной информации. Он предложил запускать нереплицирующиеся зонды к ближайшим примерно тысяче звезд, где они займут орбиты вблизи «обитаемой зоны температуры», которую мы сейчас называем околозвездной обитаемой зоной.

Созданные для того, чтобы выдерживать разрушительное воздействие метеоритов и радиации, зонды Брейсвелла, или «скрывающиеся» зонды, предназначены для нахождения в интересующей системе в течение значительного промежутка времени. Хотя Брейсвелл никогда прямо не упоминал об этом в своей первоначальной статье 1960 года, современные представления предполагают, что могут пройти тысячи или миллионы лет, прежде чем зонд сможет достичь своей цели. Точная природа цели варьируется в зависимости от того, кто обсуждает эту идею — первоначальная концепция Брейсвелла требовала, чтобы зонд прослушивал интересные радиопередачи и просто повторял их отправителю. Если отправитель определяет источник эха (и его искусственный характер), эхо повторяется, и это, предположительно, является основой для диалога (хотя вопрос о налаживании понятного диалога остается; см. раздел 21.3).

Успех такого диалога зависит от свойств зонда. Брейсуэлл представлял себе «сложный компьютер», обладающий «разветвленным хранилищем информации». Хотя это и не было сказано прямо, это предполагает, что зонд на самом деле является автономным искусственным интеллектом (ИИ), способным выступать в роли посла своих создателей.

Если рассуждения Брейсуэлла верны, то поиски внеземного разума следует сосредоточить на нашей Солнечной системе, а не на других звездах. Эта мысль на протяжении следующих трех десятилетий повторялась несколькими астрономами.




Рисунок 25.1 Пробелы Кирквуда в поясе астероидов. Нестабильные резонансы среднего движения с Юпитером обеспечивают смещение астероидов от определенных больших полуосей орбит. Утверждается, что любой космический аппарат, посещающий пояс астероидов, будет использовать орбиты внутри этих пробелов, чтобы минимизировать риск столкновений. График первоначально предоставлен Аланом Чемберленом, JPL/Caltech. (Gradie et al., 1989)

Paragiannis (1978) утверждал, что главный пояс астероидов был естественным выбором для любого поселения инопланетян из-за относительно обильных источников минералов и другого сырья. Любой посещающий космический корабль мог бы затем перейти на орбиту внутри промежутков между поясами астероидов (Рисунок 25.1), чтобы уменьшить вероятность опасных столкновений. В то время также утверждалось, что поселения на расстоянии 1–10 км будут чрезвычайно трудно обнаружить с Земли с помощью оптических наблюдений (хотя Paragiannis предполагает, что утечка радиосигналов и необычные инфракрасные сигнатуры могут выдать их присутствие).

Роберт Фрейтас (Freitas, 1983) был еще более резок в своих аргументах, предполагая, что парадокс Ферми не может быть сформулирован до тех пор, пока мы не завершим исследование Солнечной системы, поскольку его легко разрешить, заявив, что инопланетные артефакты уже здесь, а мы их еще не наблюдали (Решение С. 16). По сути, факт А не является достаточно полезным фактом, пока он полностью не охватывает все объекты Солнечной системы размером более нескольких метров.

Мы можем оценить наше относительное невежество относительно наличия или отсутствия скрытых объектов в Солнечной системе, используя байесовские методы (Naqq-Misra and Koppurapu, 2012). Определим гипотезу H , её отрицательное значение $\bar{H}$ и событие VR :

- H – Внеземные артефакты присутствуют в объеме V

- Н – Внеземные артефакты отсутствуют в объеме V
- VR – Проведено исследование с пространственным разрешением R в объеме, являющемся подмножеством V, и не обнаружено внеземных артефактов

Затем мы можем вычислить вероятность с помощью правила Байеса того, что в объеме нет артефактов, при условии VR:

$$\frac{P(H) P(V_R|H)}{P(V_R)} = \frac{P(H|V_R)}{1} \quad P(H|V_R) = 1 - P(V_R|H)$$

Где очевидно (25.1)

$$P(V_R) = P(V_R|H)P(H) + P(V_R|\neg H)P(\neg H). \quad (25.2)$$

Если мы определим априорное отношение шансов $(H) = P(\neg H)/P(H)$, тогда

мы можем переписать вышеприведенное следующим образом:

$$\frac{P(\neg H|V_R)}{P(H|V_R)} = \frac{1 - P(V_R|H)}{(H)P(V_R|\neg H) + P(V_R|H)} \quad (25.3)$$

Вероятность того, что отрицательный результат поиска в подтоме обусловлен отсутствием артефактов, зависит от априорного отношения шансов (т. е. благоприятствует ли Вселенная большему или меньшему количеству разумной жизни?), а также от вероятности того, что отрицательный результат поиска все еще может допустить существование артефактов, $P(V_R|H)$. Если предположить неинформативное априорное распределение, то $(H) = 1$, и осознать, что $P(V_R|\neg H) = 1$ по определению (если нет артефактов, поиск всегда не сможет их обнаружить), то это сводится к простому

$$P(\neg H|V_R) = \frac{1}{1 + P(V_R|H)} \quad (25.4)$$

По определению, $P(V_R|H) = 0$, если $VR = V$ (где V — общий объем Солнечной системы), и $P(V_R|H) = 1$, если $VR = 0$. Предполагая, что вероятность обнаружения линейно связана с объемом поиска, тогда

$$P(V_R|H) = 1 - \frac{V_R}{V} \quad (25.5)$$

при условии, что пространственное разрешение R достаточно высокое для обнаружения артефакта. Поиски со слишком низким разрешением всегда будут давать $P(V_R|H) = 1$. Следовательно, для исследования с высоким разрешением:

$$P(\neg H | V_R) = \frac{1}{1 + \frac{v_R}{v}} \quad (25.6)$$

А если разрешение исследования слишком низкое, то $P(\neg H | V_R) = 0,5$. Следовательно, если мы предположим $(H) = 1$, мы не можем с высокой степенью уверенности заключить, что Солнечная система лишена скрытых зондов, без проведения высокоточного исследования её объёма. Если отношение шансов не равно единице, т.е., то

$$P(\neg H | V_R) = \frac{1}{1 + \frac{v_R}{v}} \quad (25.7)$$

И видно, что если априорное предположение сильно смещено в сторону наличия артефакта в Солнечной системе ($v \rightarrow 0$), то указанная выше вероятность также стремится к нулю (любой поиск не убеждает в нулевой гипотезе). Аналогично, при $v \rightarrow \infty$ вероятность нулевой гипотезы при условии проведения исследования стремится к 1. Как это часто бывает в условиях низкой информированности, априорные предположения играют решающую роль.

Наблюдения за объектами Солнечной системы значительно продвинулись со времен работ Папагианниса и Фрейтаса. В частности, пояс астероидов подвергся обширным исследованиям за последние два десятилетия, и число зарегистрированных тел за этот период значительно увеличилось (Рисунок 25.2). По мере роста этого числа вероятность обнаружения крупных артефактов во внутренней части Солнечной системы резко уменьшается – любое крупное тело будет возмущать орбитальные элементы известных тел и обнаружит себя. Именно по этому механизму было предсказано открытие Нептуна, и это может открыть еще одну планету в Солнечной системе, так называемую Планету Девять. (Batygin and Brown, 2016).




Рисунок 25.2 Общее количество зарегистрированных малых планет (астероидов, комет и карликовых планет) в зависимости от времени. За последние несколько десятилетий было обнаружено чрезвычайно большое количество таких объектов. Данные предоставлены Центром малых планет Международного астрономического союза.

Для того чтобы проявилась искусственная природа более мелких объектов, не нужно возмущать гравитационное поле. Для объектов, естественно освещаемых Солнцем, хорошо изучена взаимосвязь между отраженным от Солнца потоком F и расстоянием от Солнца D (Loeb and Turner, 2012):

$$\frac{d \log F}{d \log D} = -4 \quad (25.8)$$

Искусственно освещенные объекты будут отклоняться от этого соотношения и, таким образом, станут обнаруживаемыми. Это вполне достижимо, поскольку орбитальные элементы объектов в поясе Койпера измеряются с точностью до 10^{-3} или лучше, а будущие обзоры с помощью таких инструментов, как Большой синоптический телескоп (LSST), увеличат как точность, так и общее количество обзоров. Если в Солнечной системе действительно существует внеземной искусственный объект, ему остается все меньше и меньше места, чтобы скрываться.

25.2 Неопознанные летающие объекты и похищения инопланетянами

Многие утверждают, что парадокс Ферми не является парадоксом, поскольку оспаривают истинность факта А. Как правило, они приводят эти доводы, основываясь на личном опыте, который, по их мнению, выходит за рамки объяснения, если только не прибегнуть к экстраординарному утверждению – о существовании внеземных цивилизаций на Земле или вблизи неё в настоящее время.

Для того чтобы сделать это экстраординарное заявление, необходимы экстраординарные доказательства. Читателя не должно удивлять, что таких экстраординарных доказательств не существует. Свидетельства очевидцев о встречах с внеземными цивилизациями и их технологиями должны занять свое место среди других рассказов о потусторонних существах — ангелах, демонах, духах и божествах. Эта группировка кажется еще более уместной, если учесть причудливые сверхъестественные измерения, которые принимают многие из этих встреч. Многие рассказы описывают паранормальные способности, такие как экстрасенсорное восприятие, телепатия и другие психические связи, явления, которые неоднократно не соответствовали стандартам, требуемым научными доказательствами.

Сообщения о загадочных летательных аппаратах имеют богатую историю, насчитывающую сотни лет, хотя их количество было значительно меньше, чем в двадцатом веке. Миллман (Millman, 1975) приводит рассказ из Йоркшира XIII века, который, если рассматривать его с современной точки зрения, несомненно, был бы расценен как наблюдение НЛО. Кратковременные, но более интенсивные всплески сообщений об НЛО занимали первые полосы газет в конце XIX века (загадочные «воздушные корабли», пилотами которых были как довольно умные изобретатели, так и гротескные марсиане).

Истинное начало эры встреч с инопланетянами обычно относят к 1947 году – 26 июня того же года частный пилот Кеннет Арнольд сообщил о наблюдении девяти дисков, пролетевших между его самолетом и Каскадными горами в штате Вашингтон, США. Первоначальное описание неопознанных летающих объектов (НЛО) как «тарелок» породило знаменитую фразу «летающая тарелка», а серия интервью американским газетам позволила ему изложить внеземное происхождение этих кажущихся летательных аппаратов (отвергая возможность того, что эти аппараты могли быть секретными военными самолетами или оптической иллюзией, созданной облаками или другими погодными явлениями).

Стоит отметить, что количество сообщений об НЛО резко возросло с популяризацией рассказов о летающих тарелках и появлением множества популярных книг в 1950-х годах и последующие десятилетия. По этой причине найти достоверное обсуждение этого явления крайне сложно. Как

отмечает Кларк (Clark, 2000), многие последующие встречи и сопровождающие их публикации были преднамеренными мистификациями и подделками, призванными использовать растущую одержимость общественности космическими путешествиями и возможностью посещения космоса инопланетянами.

ВВС США отнеслись к рассказу Арнольда (и других) достаточно серьезно, чтобы начать собственную работу по документированию, известную в конечном итоге как «Проект Синяя Книга» (Project Blue Book). Проект продолжался с 1947 по 1969 год и привлекал астрономов для попытки исключить распространение неверных интерпретаций. Неслучайно даже в наши дни сообщения об НЛО часто связывают с метеорами, планетами и даже земными явлениями. Национальный центр сообщений об НЛО ведет онлайн-базу данных, которая, как можно проверить, показывает, что при рассмотрении дат сообщений пик наблюдений НЛО приходится на Четвертое июля (Рисунок 25.3), когда празднование Дня независимости покрывает небо США фейерверками.

Дж. Аллен Хайнек, астрономический консультант компании Blue Book, предложил шестиступенчатую систему классификации задокументированных случаев встреч с «инопланетянами», которая стала общепринятым стандартом.




Рисунок 25.3 Корреляция между наблюдениями НЛО и датой (в частности, Днем независимости США). Данные Национального центра сообщений об НЛО. Рисунок предоставлен Сэмюэлем Монфортом (Samuel Montfort, George Mason University).

Первые три (ночное сияние, дневные диски и радиолокационно-визуальное наблюдение) позволяют наблюдать относительно удаленные точки сближения, причем последнее, по-видимому, подтверждается приборами. Последние три — это наиболее известные близкие сближения.

Близкие контакты первого типа — это визуальное обнаружение на близком расстоянии (несколько сотен футов или меньше). Во втором типе наблюдается физический эффект (например, неисправность оборудования, паралич наблюдателя или круги на полях). В третьем типе наблюдатель

физически взаимодействует с внеземным цивилизацией. Близкие контакты третьего типа можно отнести и к похищению инопланетянами (хотя некоторые расширяют шкалу Хайнека и рассматривают это как контакт четвертого типа).

Рассказов о похищениях инопланетянами бесчисленное множество, и перечислять их здесь было бы нецелесообразно. Однако большинство рассказов, как правило, используют несколько общих мотивов или тем. Например, для похищенных характерно переживание «пропавшегося времени», когда наблюдатели испытывают кратковременную амнезию, длящуюся от нескольких минут до нескольких часов. Падение времени может охватывать вход и выход из космического корабля или всё событие похищения. Это пропавшее время часто возвращается к похищенным с помощью гипнотической регрессии. Это ставит под сомнение их правдивость, поскольку конфабуляция воспоминаний особенно возможна, даже вероятна, во время регрессии (cf. Spiegel, 1995; Cox and Barnier, 2015).

Описания инопланетных похитителей в большинстве своем соответствуют стереотипному образу Серого, глубоко укоренившемуся в массовой культуре. Невысокий рост, большая голова и большие непрозрачные черные глаза Серого были уже известны в массовой культуре до первого широко освещенного случая похищения существами, соответствующими этому описанию. Рассказ Бетти и Барни Хилл 1965 года заложил многие стереотипы об инопланетных похищениях, которые сохраняются до сих пор.

Заинтересованному читателю следует обратиться к работе Кларка (Clark, 2000), посвященной эволюции рассказов о похищениях НЛО на протяжении десятилетий. Детализация этих рассказов чутко реагирует не только на публикацию других рассказов об НЛО и похищениях, которые в 1970-х и 1980-х годах добавили к этому списку генетические эксперименты и программы принудительного размножения, но и на растущие научные знания о планетарных соседях Земли.

Классическим примером искажения фактов является история печально известного Джорджа Адамски, который утверждал, что в 1952 году в калифорнийской пустыне встретил венерианца. Адамски описал венерианца как довольно высокого человека нордической внешности, глубоко обеспокоенного деятельностью человека с ядерным оружием. Позже Адамски рассказывал о космических полетах к Сатурну для участия в межпланетных конференциях. Рассказы Адамски были быстро опровергнуты, когда истинная природа Венеры, далеко не являющейся приятным обитаемым миром, стала очевидной во время первого пролета зонда «Маринер-2» и советских посадочных модулей «Венера».

Наконец, важно развеять распространенное представление об НЛО, что наблюдатели инопланетных космических кораблей и похищенные ими люди каким-то образом психически неустойчивы. Психологические исследования тех, кто сообщает об НЛО/похищениях, в сравнении с контрольными группами показывают (Cardeña et al., 2000) «отсутствие корреляции между этими переживаниями и психопатологией». Это должно послужить важным напоминанием о том, что субъективные переживания доступны всем нам. Даже самые ярые скептики могут испытывать визуальные и сенсорные стимулы, которые сбивают с толку и дезориентируют. Когда эти стимулы обдумываются (и, что еще хуже, извлекаются из субъекта с помощью гипнотической регрессии), могут быть построены совершенно фантастические рассказы, которые закрепятся в глубоко укоренившихся убеждениях. Эти убеждения вполне совместимы с отличным психическим здоровьем, находясь при этом в полном противоречии с объективной реальностью. Единственным лекарством от этого состояния является глубокий скептицизм и разумное применение научного метода.

26. Они были здесь давным-давно

Удобным решением парадокса Ферми является утверждение, что в прошлом Землю посещали внеземные цивилизации на достаточно больших расстояниях. Если же нет желания приводить доказательства в поддержку этого вывода, можно просто предположить, что визит внеземной цивилизации произошёл миллионы лет назад, и что выветривание, тектоника или другие геологические процессы стёрли и без того очень слабые следы этого события.

В качестве мысленного эксперимента мы могли бы представить себе, как современные люди отправляются в прошлое, чтобы посетить Землю, скажем, в докембрийский период. Прочитав их научную фантастику, ученые, посетившие древнюю Землю, приложили бы все усилия, чтобы не повлиять на ход эволюции планеты, поскольку это могло бы поставить под угрозу их собственное существование. Даже если невнимательный человек раздавит бабочку (как это происходит в классическом рассказе Рэя Брэдли «Звук грома»), доказательства того, что этот человек совершил этот поступок, вряд ли сохранятся до наших дней (даже если последствия будут значительными).

В том же духе, нам не следует ожидать, что убедительные судебно-медицинские доказательства посещения древней Земли внеземными цивилизациями сохранятся до наших дней. Если только внеземные цивилизации не оставят преднамеренных следов своего присутствия,

рассчитанных на длительные геологические эпохи на планете, изобилующей процессами выветривания, обновления поверхности и перестройки, вопрос о действительно древнем посещении в настоящее время не имеет научного ответа и, следовательно, не представляет интереса для SETI.

Если посещение произошло во времена существования человека, то можно предположить, что либо геологические процессы не успели достаточно замаскировать это, либо наша собственная зафиксированная история каким-то образом задокументировала их визит. Именно этот сценарий привлекает много внимания и породил множество псевдонаучных теорий и суеверий. Естественно, такие нелепые и плохо продуманные гипотезы редко привлекают внимание строгих ученых — я обсуждаю их только для того, чтобы проиллюстрировать их серьезные недостатки и дать толчок тем немногим, кто берет на себя неблагодарную задачу их опровержения..

26.1 Гипотеза ‘Древнего астронавта’

Истоки этой идеи — о том, что внеземные цивилизации напрямую вмешивались в развитие древних человеческих культур — можно проследить до нескольких книг, опубликованных в 1960-х годах. Большая часть этих работ первоначально была посвящена интерпретациям Библии, особенно Ветхого Завета, в которых утверждалось, что события Книги Бытия были неверно истолкованы очевидцами и авторами текста. Например, часто утверждалось, что разрушение Содома и Гоморры было вызвано не огненным гневом Бога, а ядерным взрывом, и что жена Лота превратилась в соль в результате того, что стала свидетельницей взрыва (физический процесс, не наблюдавшийся ни в Хиросиме, ни в Нагасаки, ни во время бесчисленных атомных испытаний XX века).

Гипотеза о древних астронавтах получила широкую известность благодаря публикации книги «Колесницы богов» Эриха фон Дэникена, который в то время работал управляющим отелем в своей родной Швейцарии. В книге были объединены несколько направлений исследований гипотезы о древних астронавтах, включая библейскую интерпретацию и предполагаемые «доказательства» использования внеземных строительных технологий в пирамидах, на равнинах Наска, внушительных статуях голов (моаи) острова Пасхи и многих других местах.

Чтобы полностью опровергнуть работу фон Дэникена, потребовалась бы целая книга. Мало кто готов потратить ресурсы на опровержение большого количества (признаюсь, весьма слабых) аргументов. Лучшее опровержение, с которым я сталкивался, содержится в книге Рональда Стори

«Раскрытые космические боги», и я рекомендую её в качестве дополнительного чтения.

Давайте рассмотрим один пример из работ фон Дэнникена и разберём его аргумент. Равнина Наска на юге Перу представляет собой пустынную местность протяженностью около сорока миль (и обычно около девяти миль в ширину). На равнине высечены линии, которые с воздуха приобретают вид фигур и геометрических форм, форма которых различима только с неба (Рисунок 26.1). Линии создаются простым удалением окисленных поверхностных камней, обнажая более лёгкую почву под ними.

В своей книге «Колесницы» фон Дэнникен предполагает, что археологи считали эти линии частью дорожной инфраструктуры, что он высмеивает. Его предпочтительная интерпретация линий заключается в том, что это обозначения, указывающие на аэродром для внеземных цивилизаций – в конце концов, какой смысл был бы древнему народу, не имевшему летательных аппаратов, в символах, которые он сам не может увидеть с земли?

Во-первых, предположение о том, что современные археологи считали эти линии инкскими дорогами, серьезно устарело – еще в 1947 году было установлено, что эти линии никоим образом не пригодны для транспортировки.




Рисунок 26.1 Линии Наска. Изображение сделано по указанным координатам 14.7° S, 75.1° W. Image Credit: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and US/Japan ASTER Science Team.

Одновременно с этим было замечено, что некоторые линии на поверхности совпадают с важными астрономическими событиями. Например, некоторые линии, по-видимому, указывали на точку захода Солнца во время зимнего солнцестояния (в Южном полушарии). Неясно, являются ли эти совпадения преднамеренными или случайными. Что еще более показательное, некоторые пиктограммы, образованные линиями, по-видимому, совпадают с южными созвездиями (см. выше), что позволяет

предположить, что линии являются воспроизведением ночного неба. Создание этих изображений без использования аэрофотосъемки вполне осуществимо при наличии подходящего плана для получения изображения, измеренного по следам..

Почему идея инопланетного вмешательства в человеческую жизнь вызывает такой энтузиазм и поддержку? Мы можем указать на несколько аспектов древнего образа астронавта, которые делают его особенно подходящим для внедрения в сознание людей двадцатого века. Публикация «Колесниц» совпала с подъемом идей «Новой эры» и спиритуализма, наступлением космической эры и растущим страхом перед ядерным уничтожением. Продолжающееся пилотируемое освоение космоса в сочетании с феноменом НЛО и растущим корпусом научной фантастики подготовило человечество к размышлениям об разумной жизни на других планетах. Это сопровождалось осознанием собственной смертности и пониманием того, что причиной смерти для человечества вполне может быть самоубийство (или, по крайней мере, моральная и этическая неполноценность).

Попытавшись осмыслить то, что выдаётся за «литературу» о гипотезе древних астронавтов, трудно не прийти к выводу, что сторонники этой теории преследуют духовную или религиозную цель, а не проводят критический анализ этой концепции с помощью научного метода. Древний астронавт — это новая форма мифа, в котором сверхразумные инопланетяне вытесняют божества как источники благоговения и поклонения. Постоянный поток «документальных фильмов», создаваемых на эту тему, очень напоминает религиозный евангелизм, принимая, казалось бы, научный вид, но на самом деле являясь полной фальшивкой, либо из-за использования ложных сведений, печальных неверных интерпретаций, логических ошибок, либо всего сразу.

Пожалуй, самое тревожное заключается в том, что гипотеза о древних астронавтах дает нам право принижать и игнорировать достижения древних народов. Так называемые лидеры мнений в теории древних астронавтов преимущественно белые, и почти все их мысли сосредоточены на достижениях небелых культур в Африке, Южной Америке и на Индийском субконтиненте.

Рассмотрим две версии происхождения пирамид. В первой версии пирамиды являются продуктом цивилизации древних египтян, чьи труды создали одни из самых впечатляющих сооружений на Земле (хотя и в результате рабского труда в условиях жесткой иерархии). Во второй версии пирамиды являются продуктом инопланетного сверхразума, поскольку, по сути, египтяне были неспособны построить такое сооружение. Сторонники

теории древних астронавтов намеренно игнорируют множество свидетельств, подтверждающих, что египтяне действительно построили пирамиды, начиная с ранних мастаб (сооружений, похожих на скамьи), переходя к многоярусным мастабам (некоторые из которых имеют признаки ранних ошибок в строительстве, как, например, изогнутая пирамида Снеферу в Дахшуре), и заканчивая Великой пирамидой Гизы (например).

Найти примеры теорий древних астронавтов, касающихся ранних европейских обществ, гораздо сложнее. Тот факт, что гипотеза о древних астронавтах часто соседствует с расистскими и расистскими доктринами, подчеркивает опасность нечеткого понимания того, что мы можем считать безобидной фантазией.

Можно ли вообще воспринимать что-либо в этой области всерьез? Запятнанная репутация теорий о древних астронавтах подавляет более взвешенные исследования этой концепции. Несмотря на огромное количество псевдонауки, окружающей ее, мы можем ограничить возможность существования предшествующих технологических цивилизаций на Земле, рассматривая, какие технопризнаки могли сохраниться от нашей цивилизации (Райт, 2017; Шмидт и Франк, 2018).

В настоящее время деятельность человека настолько сильно изменяет геологическую летопись, что её вполне возможно восстановить. Ожидается, что наша цивилизация оставит после себя несколько различных следов, включая окаменелости, изотопные аномалии, появление промышленно синтезированных химических веществ и материалов, пластмасс и необычных радиоактивных элементов.

Однако в палеонтологической летописи всегда сохраняется лишь несколько процентов объектов или материалов определённого времени. Об этом свидетельствует общая редкость останков *Homo sapiens* за несколько сотен тысяч лет. Истинные ископаемые останки людей или технологические артефакты вряд ли удастся обнаружить после нескольких миллионов лет, а также они становятся исключительно редкими к этому возрасту.

Изотопные аномалии могут быть более перспективными, в частности, аномалии изотопов азота, связанные с сельским хозяйством, и снижение содержания углерода-13 по отношению к углероду-12, обусловленное промышленной деятельностью в целом. Эти явления, по-видимому, являются относительно устойчивыми и поддающимися восстановлению.

Возможно, наиболее многообещающими индикаторами индустриальной цивилизации являются наличие хлорированных соединений, таких как ХФУ, которые могут стабильно сохраняться в геологической летописи в течение миллионов лет. В зависимости от пути их попадания в

геологические слои, пластмассы также могут быть очень стойкими элементами.

В любом случае, геологическая летопись будет полностью обновлена в масштабах времени от 0.1 до 1 млрд лет благодаря тектонике плит, в результате которой земная кора погружается в мантию.

Подобные технопризнаки отсутствуют как в археологической, так и в палеонтологической летописи, что убедительно свидетельствует об отсутствии технологических цивилизаций, по крайней мере, в последние сто миллионов лет истории Земли. Учитывая, что кембрийский взрыв произошел 540 миллионов лет назад, это оставляет мало времени для возникновения технологической цивилизации на Земле. Вот почему мы отвергаем идею о том, что на Земле существовала цивилизация до человечества, или что такая цивилизация могла посещать Землю в прошлом. Вероятно, поверхность Венеры полностью уничтожила любую цивилизацию, которая могла существовать на планете в более благоприятные для жизни условия (Райт, 2017). На телах с безвоздушной или разреженной атмосферой любые сооружения быстро разрушались бы в результате выветривания микрометеоритами.

Однако эта работа показывает, что мы пока не можем исключить возможность того, что цивилизации могли посещать Землю или другие объекты Солнечной системы, так же как мы не можем исключить присутствие зондов типа «Брасуэлл» или «скрывающихся» зондов в поясе Койпера. Наше изучение этого решения парадокса Ферми требует высочайшей добросовестности и тщательности.

27. Решения парадокса Ферми

Как вы уже догадались, пока нет верного решения парадокса Ферми, а просто есть список возможных объяснений, некоторые из которых могут быть экспериментально проверены, а другие нет.

Так что же это даёт нам, если мы поставили вопрос с сотнями потенциально правильных ответов? Это похоже на большинство научных или исследовательских вопросов. Мы начинаем в области почти полного невежества и отбрасываем ответы один за другим, используя научный метод, пока не останутся наиболее вероятные ответы. В заключение этой книги я остановлюсь на некоторых захватывающих новых событиях, которые помогают уточнить наше понимание Факта А и парадокса Ферми в целом.

27.1 Будущее Факта А

27.1.1 Текущие и будущие радио/оптические миссии SETI

Прослушивание космоса

В 2015 году была анонсирована программа Breakthrough Listen, крупнейшая в истории программа SETI, которая начала свою работу 1 января 2016 года. В настоящее время Breakthrough Listen использует телескоп Грин-Бэнк и радиотелескоп Паркс в Австралии, и планируется расширение использования других инструментов (таких как установка MeerKAT). Параллельно реализуется оптическая программа SETI, включающая автоматизированный поиск планет в Lick Observatory, обеспечивающий охват обзора от 0.350 ГГц до 100 ГГц в радиодиапазоне и от 374 нм до 950 нм в оптическом диапазоне (где разрешение оптического спектрометра составляет $R = 95\,000$).

Цель проекта Breakthrough Listen — исследовать миллион звёзд в ходе его работы. Первый список целей (Isaacson et al., 2017) включает 1709 звёзд, охватывающих широкий диапазон возрастов и масс на диаграмме Герцшпрунга-Рассела в пределах 50 пк от Солнца. В него входит подвыборка из 60 известных звёзд в пределах 5 пк. Наряду со звёздной выборкой, в качестве целей будут выбраны 123 галактики различных типов и морфологий для поиска цивилизаций типа Кардашева III на расстоянии до 30 Мпк, а также объекты, представляющие собой достаточно аномальные объекты, чтобы оправдать их наблюдение.

Предварительные результаты для 692 близлежащих звёзд (Энрикес и др., 2017) уже показывают, что ни один передатчик в диапазоне 1.1–1.9 ГГц не излучает с эффективной изотропной мощностью излучения 10^{13} Вт

(сопоставимой с мощностью излучения планетарного радара Аресибо), и в результате они подсчитали, что менее 0.1% звезд в пределах 50 пк от Солнца обладают постоянно излучающими радиомаяками.

Трудно переоценить масштабы этого исследования. На сегодняшний день крупнейшим исследованием такого рода является проект «Феникс», в рамках которого за время его работы было обследовано около 800 звезд на станциях Паркс, Грин-Бэнк и Аресибо. Бюджет проекта Breakthrough Listen составляет 100 миллионов долларов за весь период его работы, что значительно превышает любой бюджет SETI на сегодняшний день. Даже без обнаружений он установит очень жесткие верхние пределы для передатчиков/лазеров в окрестностях нашей Солнечной системы..

NIROSETI

Аббревиатура NIROSETI расшифровывается как Near-Infrared Optical SETI (оптический SETI в ближнем инфракрасном диапазоне), и это оборудование также используется в обсерватории Лик. Благодаря достижениям в области фотоумножителей ближнего инфракрасного диапазона и лавинных фотодиодов, NIROSETI способен обнаруживать наносекундные импульсы на длинах волн от 950 до 1650 нм. NIROSETI использует стандартный метод множественных детекторов для уменьшения количества ложных срабатываний, хотя в последнее время эти методы были распространены на импульсы различной длительности, вплоть до микросекундного диапазона. (Tallis et al., 2016).

Оптическое SETI в обсерваториях Черенковского излучения

Наземная гамма-астрономия — это косвенная наука. Наземные гамма-телескопы не могут обнаружить гамма-фотоны, поскольку они немедленно взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли, создавая обширный атмосферный ливень из высококорелятивистских частиц. Энергия, передаваемая отдельным частицам, гарантирует, что они могут фактически превышать скорость света в воздухе, испуская короткий импульс черенковского излучения.

Именно это оптическое излучение регистрируют телескопы с черенковским излучением в атмосфере (IACT), такие как VERITAS. VERITAS состоит из четырех 10-метровых телескопов, каждый из которых имеет 499 отдельных фотоумножителей для регистрации событий с одиночными фотонами. Эта система детекторов на каждом телескопе позволяет определить местоположение атмосферного ливня (и гамма-излучения, вызвавшего его).

Короткий наносекундный импульс оптического излучения, локализованный на небе, — это именно тот сигнал, который ищут оптические

миссии SETI. Абейсекара и др. (2016) описали недавний обзор KIC 8462852 (Звезда Таббита) на предмет оптических вспышек с использованием VERITAS. Хотя сигнал не был обнаружен, существует невероятное количество архивных данных IACT — 30 000 часов, полученных с помощью VERITAS и других обсерваторий, таких как HESS и MAGIC.

Возможность поиска сигналов SETI в этом архиве заслуживает дальнейшего изучения. Планируемый массив черенковских телескопов, вероятно, будет включать более 100 телескопов в обоих полушариях, что позволит создать еще больший набор данных для поиска сигналов SETI.

Лазерное SETI – оптическое SETI всего неба

Предложение по лазерному SETI заключается в размещении большого количества относительно недорогих пар детекторов в разных точках планеты. Поскольку каждый детектор имеет относительно большое поле зрения, это представляет собой обзор всего неба для монохроматических вспышек. Одновременное наблюдение нескольких камер за одним и тем же участком неба также упрощает проверку и локализацию сигнала. На момент написания статьи команда лазерного SETI развертывает восемь камер (для одновременного охвата двух полей зрения), и их количество будет увеличено по мере поступления финансирования..

27.1.2 Гравитационные волны и SETI

Будущее науки о гравитационных волнах выглядит чрезвычайно многообещающим. По мере строительства всё большего количества станций типа LIGO (см. раздел 21.2.2) улучшается наша способность локализовать сигналы гравитационных волн на небе (подобно интерферометрии электромагнитных сигналов). Поскольку технология Advanced LIGO уже доказала свою эффективность, существует сильный стимул к созданию большего количества станций, аналогичных ей, а также к изучению других методов обнаружения гравитационных волн (таких как пульсарная синхронизация). Космические обсерватории гравитационных волн, такие как LISA (запуск которой запланирован на 2034 год), будут чувствительны к низкочастотным волнам (см. рис. 21.4), открывая новые области поиска искусственно генерируемых гравитационных волн.

Наше понимание того, как генерировать искусственные гравитационные волны, остается крайне скудным, но по мере того, как наземные и космические наблюдения продолжают развиваться в плане чувствительности и дальности, вполне вероятно, что на горизонте появятся новые типы/классы небесных объектов (и, возможно, новая физика). У специалистов по SETI появится множество захватывающих возможностей присоединиться к этой гонке за новыми открытиями – все, что нужно, это

разумные аналитические модели для искусственных волновых форм и доступ к растущему потоку данных.

27.1.3 Нейтринное SETI

В разделе 21.2.1 мы обсуждали преимущества нейтринного SETI, но большинство нейтринных обсерваторий еще не рассматривали их всерьез, несмотря на высокую степень случайности нейтринной астрономии. Заметным исключением является предложение NU-SETI Фишбаха и Грюнвальда (2017). Их исследование радиоактивного распада образцов 54Мп показывает корреляцию между скоростями распада и солнечной активностью. Они предполагают, что эта корреляция обусловлена интерференцией потока солнечных нейтрино с их образцами, и, следовательно, образец действует как нейтринный сенсор. Размещение образцов по всему миру создало бы интерферометрическую сеть, позволяющую локализовать поток нейтрино на небе. Эти сенсоры были бы значительно меньше по размеру по сравнению с существующими нейтринными телескопами и могли бы представлять собой гораздо более дешевый способ поиска нейтринных сигналов.

В любом случае, дальнейшие достижения в области обнаружения нейтрино начнут открывать этот альтернативный способ поиска искусственных сигналов. Текущие поиски с использованием IceCube (IceCube, 2017) не дали убедительных результатов обнаружения источников с энергиями выше 1 ТэВ (то есть энергией, поглощенной детектором), и из 263 обнаруженных каскадных событий не удалось выявить значительной анизотропии. Однако команда IceCube отмечает, что улучшенные модели излучения и распространения нейтрино в Млечном пути могут еще улучшить эти результаты, особенно для Южного неба.

27.1.4 Транзитное SETI

Мы неоднократно наблюдали растущие преимущества использования данных о транзитах экзопланет для исследования относительно мелкомасштабных явлений в других звездных системах. Действительно, следует ожидать, что эта область продолжит развиваться благодаря предстоящим космическим миссиям как от ЕКА (CHEOPS, PLATO), так и от НАСА (TESS).

В предыдущих главах мы обсуждали использование транзитной спектроскопии для обнаружения признаков биологических организмов и технологического развития. В будущем остается исследовать вопрос о том, можно ли использовать транзитное явление в качестве средства коммуникации.

Из-за ориентации планетных систем относительно нашей линии зрения, лишь небольшая часть экзопланет проходит перед своей родительской звездой с нашей точки зрения. Обратный результат заключается в том, что лишь немногие звёздные системы смогут наблюдать прохождение Земли перед Солнцем со своей точки зрения. Эти звёзды существуют в тонкой полосе вокруг плоскости эклиптики Солнечной системы, которую мы можем назвать «зоной солнечного транзита Земли» (или сокращённо ЗСТ). Любая внеземная цивилизация, находящаяся в пределах ЗСТ и обладающая достаточными технологическими возможностями, сможет измерить свойства Земли на основе её прохождения перед Солнцем.²⁶

По аналогии, они могли бы определить, что Земля — обитаемая планета, если бы удалось выделить спектр Земли. Особенно удачливый наблюдатель, способный проводить измерения с чрезвычайно высокой точностью, мог бы даже обнаружить слабое присутствие ХФУ в нашей атмосфере, пик концентрации которых пришелся на 1990-е годы. Свет, излучаемый в эту эпоху, будет находиться на расстоянии приблизительно 8 парсеков (охватывая 50 ближайших к Земле звезд). Это могло бы привлечь их внимание и побудить к проведению радиоисследования, которое, вероятно, даст обнаруживаемый сигнал (если их возможности наблюдения в радиодиапазоне соответствуют нашим). Исходя из этого, если когда-либо на Землю достигнет преднамеренный сигнал от другой цивилизации, можно утверждать, что существует высокая вероятность того, что этот сигнал будет исходить из источника в ЭСТЗ (зоне сверхпроводимости).

Начиная с конца 1980-х годов, неоднократно высказывались предположения о том, что поиски внеземных цивилизаций (SETI) должны быть сосредоточены на зоне транзита (ESTZ) на основе следующих соображений (Филиппова и Стрелницкий, 1988; Конн Генри и др., 2008; Хеллер и Пудриц, 2016), хотя некоторые предлагают расширить область поиска, включив в нее транзитные зоны других планет Солнечной системы, особенно Юпитера..

Энергетическая зона перехода (ЭСТЗ) может быть вычислена довольно просто, если предположить круговую орбиту Земли с большой полуосью a . Если мы ограничимся случаем, когда наблюдатели видят Землю полностью в момент перехода, то угловой размер ЭСТЗ $\phi_{ESTZ} = 2(\alpha - \beta)$, где $\tan \alpha = R/a$ и $\sin \beta = R \oplus /$ (см. рис. 27.1). Тогда теорема Пифагора дает

²⁶ It is a chastening thought that our own transit observations still fail to detect an Earth-size planet in the habitable zone around a G star, at least at the time of writing.

$$\phi_{ESTZ} = 2 \left(\arctan \frac{R_{\odot}}{a} - \arcsin \frac{R}{a} \right) \oplus \sim R \quad (27.1)$$

где мы использовали тот факт, что и $\arctan(x) \rightarrow x$ для малых x . Для касательных переходов, $\phi_{ESTZ, \text{graze}} = 2(\alpha + \beta)$ (Heller and Pudritz, 2016).

Таким образом, сокращение пространства поиска до зоны ESTZ соответствует более чем тысячекратному сокращению времени обзора, что, безусловно, выгодно для проведения повторных наблюдений. Это оставляет несколько сотен обнаруженных звезд в пределах зоны ESTZ, с моделью галактического диска предсказывающей, что по мере улучшения наблюдений могут быть обнаружены еще тысячи объектов.




Рисунок 27.1 Транзитная зона Земли, определяемая как угловая область $\phi_{ESTZ} = 2(\alpha - \beta) \sim R/a$ в пределах $R \gg R_{\oplus}$.

Но что, если мы не хотим, чтобы нас наблюдали? Многие утверждают, что нам не следует афишировать свое присутствие, передавая сигналы в Млечный Путь, опасаясь эксплуатации или завоевания со стороны более развитых цивилизаций (см. раздел 21.4.2). Прохождение Земли по диску Солнца кажется досадным непреднамеренным сигналом, который мы не можем скрыть. Однако мы могли бы изобрести «устройство маскировки», просто направив лазер на наблюдателя (Kipping and Teachey, 2016). Соответственно коллимированный и мощный лазерный луч эффективно «заполняет» провал на кривой прохождения, скрывая присутствие Земли на частоте лазера. Широкополосные лазеры могут скрыть всю сигнатуру планеты (например, в оптическом диапазоне), или можно использовать узкополосные лазеры для маскировки определенных спектральных особенностей (таких как линии O2 или особенности, связанные с ХФУ). Эти методы маскировки требуют минимального знания местоположения наблюдателя для правильного наведения лазера, что, скорее всего, потребует от нас обнаружения транзита для определения родной планеты наблюдателя.

Также эти методы маскировки можно модифицировать для передачи сигнала. Это имеет огромные преимущества перед стандартными методами сигнализации (как мы рассмотрели в разделе 22.2), поскольку время и местоположение сигнала становятся гораздо более предсказуемыми на стороне приемника, и возможности повторения сигнала через каждый орбитальный период очевидны.

27.2 Будущие попытки межзвёздных миссий

Проект Breakthrough Starshot

В рамках инициативы *Breakthrough Listen* в апреле 2016 года был анонсирован проект *Breakthrough Starshot*. Его цель — разработка концептуальных проектов и прототипов наноразмерных аппаратов с парусом для отправки к Проксиме Центавра. Известно, что Проксима обладает планетой размером с Землю в обитаемой зоне, Проксима b (AngladaEscudé et al., 2016). Более высокая цель Starshot — возможность передавать на Землю телеметрию ближнего радиуса действия об этом мире, поскольку в настоящее время это ближайшая к Земле известная экзопланета, имеющая статус «потенциально обитаемой» (со всеми оговорками, которые подразумевает эта фраза).

Starshot планирует запустить космический аппарат с лазерным парусом, тонким как пластина («StarChip»). Конструкция StarChip — это кульминация нескольких десятилетий миниатюризации технологий. Максимальная скорость паруса ограничена его массой (Lubin, 2016.):

$$v_{\max} \sim m^{-1/4} \quad (27.2)$$

Для достижения достаточно больших (релятивистских) скоростей полета требуется чрезвычайно малая масса. Предполагается, что масса StarChip составит порядка 1 г, и, как следствие, ожидается, что он сможет развивать максимальную скорость до 0.2c (аналогично концепции «StarWisp» Forward, 1985).

Once the designs are perfected, the majority of the mission cost is the construction of the ground-based laser to accelerate the sail. The proposed design is a phased array of transmitters. An example is the DE-STAR system (Directed Energy System for Targeting Asteroids and exploRation) – a modular phased array design, with a total power rating depending on the array size. DE-STAR’s primary intended use is for planetary defence (Lubin and Hughes, 2015; Brashers et al., 2015). A 10 km DE-STAR array will be able to target 500 m asteroids with directed energy to raise the spot temperature to around 3,000 K, sufficient to vapourise the body within 1 year at distances of 1 AU.

While such a transmitter is expensive to build and operate, the spacecraft construction will be relatively cheap by comparison, and hence a large number of

StarChips can be built and flown. This fleet can be launched into a high-altitude orbit by conventional rocketry. Once in place, the laser design is predicted to deliver 50–70 GW of power (for a 10 km array), accelerating the sail to $0.2c$ within around 10 minutes of acceleration.

Deceleration at the target is challenging. Current mission plans include a flyby at nearby α Centauri. A combined ‘photogravitational assist’ would allow the sail to decelerate before making the final journey to Proxima, with a total travel time of around 112 years (Heller and Hippke, 2017; Heller et al., 2017).

Once the StarChip arrives at its target, the laser array can be switched from transmit to receive mode, effectively becoming an interferometer. This would allow for very faint signals to still be acquired at Earth.

The modular nature of the phased arrays allows for incremental construction, and testing of smaller configurations. The low cost of the StarChip means that Starshot will be able to make test flights within the Solar System (without significant risk if StarChips are lost). Starshot’s aim is to bring travel at relativistic speeds into humanity’s hands in the next few decades, which would have significant consequences. For example, Voyager 2 currently resides at ≈ 117 AU from the Sun²⁷ and has taken 40 years to get there. A sail travelling at $0.2c$ would reach this distance in less than 3 days. Being able to travel even at $0.01c$ in the Solar System would have significant benefits – a flight to Mars would take less than 12 hours.

Если проект *Starshot* окажется жизнеспособным, то человечество наконец сможет вырваться из «ловушки стимулов». По мере увеличения нашей максимальной крейсерской скорости, запущенный сейчас звездолёт в конечном итоге будет превзойдён кораблями, запущенными после него, так зачем же запускать? Учитывая нашу экспоненциальную тенденцию роста скорости, можно показать, что как только наша скорость превысит $0,196c$, стимул ждать исчезнет (Heller, 2017).

Икар, Фонд Тау Зеро и Институт межзвездных исследований

Наследие проекта «Дедал» продолжает жить в рядах членов Института межзвездных исследований (I4IS), Фонда «Тау Зеро» и Британского межпланетного общества (BIS). Эти слабо связанные между собой группы разделяют общую цель – достижение межзвездных полетов в течение следующего столетия, выдвигая множество идей и проектов.

Наиболее заметной из этих идей является проект «Икар». Официально запущенный в 2009 году в штаб-квартире BIS, «Икар» наследует

²⁷ <https://voyager.jpl.nasa.gov/where>, accessed 6/2/2018

разработки «Дедала» и призван адаптировать их к современным технологиям. Первоначальной целью «Дедала» была звезда Барнарда, а жесткие технологические требования предполагали запуск проекта в будущем, когда колония в масштабах всей Солнечной системы уже будет создана (тогда это оценивалось примерно в 300 лет).

В настоящее время «Икар» нацелен на Альфа Центавра, и его проектирование ограничено требованием возможности запуска в течение 100 лет. Вместо попытки создания «революционной» конструкции, «Икар» представляет собой усовершенствование, основанное на нескольких десятилетиях электронных и механических достижений, чтобы создать конструкцию в стиле «Дедала» для XXI (или даже XXII) века. Философия «Икара» обязывает конструктора не экстраполировать технологические достижения на следующие несколько десятилетий, но при этом достичь максимальной крейсерской скорости около 0.2c (с возможностью замедления на цели либо за счет дополнительного включения двигателя, либо за счет дополнительных фотонных парусов).

Подобно Starshot, проект Icarus использует уменьшенную версию конструкции Pathfinder (по сути, двигатель второй ступени Daedalus) для запуска полезной нагрузки на расстояние 1000 астрономических единиц в течение десяти лет (крейсерская скорость приблизительно 0.0015c). Утверждается, что это достижимо в течение 20 лет (Swinney et al., 2012).

Организация «Икар Межзвездный» управляет проектом «Икар», а также несколькими другими связанными проектами, опирающимися на наследие «Дедала», и рассматривает будущее развитие межзвездной человеческой цивилизации. Значительная часть ее членов связана с организациями «Тау Зеро» и «I4IS». Все эти организации приверженцы концепции «100 летнего звездолета». Недавнее выделение финансирования на разработку планов миссий ясно показывает, что нынешний ренессанс в исследованиях межзвездных полетов будет продолжаться.

27.3 Теоретические и численные модели

Поскольку наблюдательные проекты продолжают появляться в сети, наблюдается соответствующий рост теоретических расчетов и численного моделирования, имеющих отношение к SETI. Ниже приводится краткая выборка некоторых из последних работ в этой области.

27.3.1 Численное моделирование роста цивилизаций, эволюции и взаимодействия

За последние пятнадцать лет произошел взрыв в литературе, что можно назвать «цифровым SETI», где исследователи разрабатывают и используют компьютерные модели формирования и взаимодействия

цивилизаций в Млечном Пути. Хотя численная интеграция аналитических моделей проводится, по крайней мере, с начала 1970-х годов (например, Newman and Sagan, 1981), последующие достижения в вычислительной мощности обеспечили достаточное разрешение для запуска более гибких полуаналитических моделей и моделей Монте-Карло. Астрофизическая составляющая этих моделей в значительной степени не была откалибрована — частота планетных систем была неизвестна, и большинство моделей предполагали прямое звездное распределение. С притоком данных об экзопланетах современные модели теперь лучше отражают ландшафт, в котором могут существовать внеземные цивилизации..

Мы по-прежнему ничего не знаем о самих ETI, поэтому любая попытка их моделирования сопряжена с большим количеством предположений. При этом численный SETI позволяет нам исследовать последствия наших предположений. Некоторые авторы исследовали различные аспекты возникновения и роста цивилизации. Сам автор исследовал формирование цивилизаций в синтетическом Млечном Пути, используя подход реализации Монте-Карло (Forgan, 2009; Forgan and Rice, 2010). Путем выборки свойств звёзд на основе исходной функции масс, истории звездообразования и соотношения возраста и металличности, а также с учётом предполагаемой структуры галактики можно создать популяцию звезд. Затем планетные системы можно засеять в соответствии с корреляциями металличности гигантских планет, распределением по большой полуоси и т. д. Это представляет собой фон, на котором можно проверить различные гипотезы (см., в частности, проверку гипотезы редкой Земли, Forgan and Rice, 2010). Хотя эта модель даёт типичное количество цивилизаций с течением времени (и несколько прогонов могут оценить стандартное отклонение выборки в этой величине), делать прямые выводы на основе этих цифр опасно. Более разумный подход — сравнить с контрольным прогоном, чтобы выяснить, как конкретные предположения влияют на рост цивилизаций и как цивилизации затем устанавливают контакт (или нет).

Моделирование Монте-Карло — лишь один из инструментов современного численного SETI. Вукотич и Циркович (Vukotic and Cirkovi, 2012) рассмотрели модель вероятностных клеточных автоматов (PCS). Это решетчатые модели, в которых клетка в решетке (i, j) находится в одном из четырех состояний:

$$\begin{array}{llll} \sigma(i, j) = 0 & & \text{nolife} & (27.3) \\ & 1 & \text{simplelife} & 2 \quad \text{complexlife} \\ & 3 & & \text{technologicalcivilisation} \end{array}$$

Вероятность перехода от состояния m к состоянию $m + 1$ зависит от того, как от внутренних так и внешних факторов. Для каждой ячейки решетки можно построить матрицу ранга 3 P_{ijk} , которая вычисляет вероятность перехода. Ее можно рассматривать как набор из k матриц ранга 2 P_{ij} . Для $k = 0$ это учитывает внутренние эволюционные вероятности, а для $k = 1, 4$ — вероятность перехода, обусловленную соседом состояния $k - 1$ на ячейке. Вукотич и Чиркович (Vukotic and' Cirkovic', 2012) также допускают вероятности перехода из более широкой среды $k = 5$. Например, вероятность того, что безжизненное место получит сложную жизнь от цивилизации, определяется как $P03^4$. Переходы, такие как $P10^5$ или $P20^5$, указывают на нисходящие переходы из-за факторов окружающей среды (т. е. глобальных механизмов регулирования, которые мы обсуждали в разделе 18.2)

Запуск этой модели PCA с входным значением P_{ijk} генерирует кластеры участков с различным σ , что позволяет оценить, как плотность обитаемых планет и технологических цивилизаций меняется со временем. По сути, входное значение P_{ijk} кодирует клеточный автомат предлагаемым решением парадокса Ферми. Этот подход PCA особенно перспективен, поскольку он дает возможность проверить множество различных решений парадокса на основе имеющихся наблюдательных данных..

В значительной степени моделирование обходит стороной процесс формирования звёзд и планет, вместо этого стремясь исследовать природу установления контакта на межзвездных расстояниях. Например, Смит (Smith, 2009) разрабатывает простую модель изотропно передающих сигналы цивилизаций, используя частицы-передатчики, движущиеся со скоростью света c . Если цивилизации имеют конечное время жизни сигнала L и дальность передачи D , то можно вычислить объем, который сигнал охватывает в пространстве, и, следовательно, количество цивилизаций, способных обнаружить сигнал N_{detect} , равно. n t_f

$$N_{detect} = \int_0^{t_f} V(t) dt \quad (27.4)$$

$$L \quad t_0$$

where t_f represents the time of the signal's eventual decay at D , i.e., $t_f = L + D/c$. The $1/L$ factor is absorbed into the integral, which has an analytic solution (see Рисунок 27.2):

$$N_{detect} = \frac{4}{3} \pi n D^3 \quad Lc > D \quad (27.5)$$

$$\frac{2}{3} \pi n (4D^3 - 3D^2 Lc + 2(Lc)^2 D - (Lc)^3) \quad Lc < D \quad (27.6)$$

В данном анализе предполагается, что L и D фиксированы для всех цивилизаций, а n также является постоянной величиной..

Гримальди (2017) проводит аналогичный анализ для пульсирующих изотропных и анизотропных сигналов, предполагая, что D и длительность импульса d являются случайными величинами, где n — фиксированная функция распределения плотности, и что $L \gg \text{Gyr}$. Вероятность того, что Земля сможет обнаружить один сигнал в этом сценарии, определяется формулой, где N — общее число цивилизаций, R_{observe} — максимальное наблюдаемое расстояние от Земли, а R_M — максимальное расстояние сигнала от Земли (из соображений эволюционной временной шкалы)




Рисунок 27.2 Количество обнаруживаемых цивилизаций как функция времени жизни трансляции цивилизации L и дальности трансляции D (см. уравнение (27.6)). Заметим, что для долгоживущих сигналов обнаруживаемость зависит только от дальности. Как только $Lc \leq D$ (пунктирная линия), обнаруживаемость зависит от ширины сферической оболочки, создаваемой изотропным сигналом.

$$d \quad N$$

$$P_{\text{detect}} = 1 - \frac{d}{R_M} + \pi(R_{\text{observe}}) \quad (27.7)$$

Модели Монте-Карло позволяют ослабить все эти допущения, допуская изменение плотности числа объектов пропорционально плотности звёзд, а также использование случайных величин L , D и d . Эти модели позволяют исследовать способность разнородной популяции цивилизаций устанавливать контакты в течение определенного периода времени, даже с динамически развивающейся популяцией звезд. Они также позволяют определить, какие параметры гарантируют формирование Галактического Клуба и способствуют реализации гипотезы Зоопарка, а какие параметры ее запрещают. (Forgan, 2011, 2017b).

В последнее время значительное количество численных моделей посвящено проблеме исследования Галактики с помощью межзвездных

зондов. Некоторые из этих работ по моделированию уже обсуждались в разделе 19.2 (Björk, 2007; Cotta and Morales, 2009; Forgan et al., 2013; Nicholson and Forgan, 2013). В недавних работах по моделированию также рассматривалось исследование окрестностей Солнца (Cartin, 2013). Перколяционные модели, аналогичные оригинальной модели Ландиса (раздел 19.1), продолжают исследовать ее допущения и ограничения (Wiley, 2011; Hair and Hedman, 2013). В сочетании с попытками моделирования будущих межзвездных зондов человечества, которые придут в ближайшую к нам звездную систему (Heller and Hippke, 2017; Heller et al., 2017; Forgan et al., 2018b), эти модели исследования и заселения позволили выдвинуть гипотезы и решения парадокса Ферми, а также дать количественные прогнозы о численности/плотности цивилизаций в Млечном пути и о том, как их взаимодействие регулируется законами физики..

27.3.2 Наблюдение признаков интеллекта в астрофизических данных

Фотоны Вселенной в настоящее время наблюдаются практически во всех доступных астрономам длинах волн в «режиме обзора». Наряду с целенаправленными наблюдениями, астрономические обзоры генерируют огромные объемы данных, которые теперь архивируются и находятся в открытом доступе. Поддержание специализированных исследований SETI затруднено из-за отсутствия интереса со стороны правительств и других традиционных финансирующих организаций. Поэтому альтернативой является изучение текущих или завершенных исследований и попытка выявить признаки искусственных сигналов или технологических цивилизаций в полученных данных.

Это стало своего рода стандартной практикой в радиодиапазоне, одном из первых, где был введен режим обзорной съемки, и, действительно, в оптическом/инфракрасном диапазоне, где именно эта стратегия использовалась для поиска сфер Дайсона (Carrigan, 2009; см. раздел 2.2.1). Случайное обнаружение внеземного излучения может произойти буквально в любом астрономическом обзоре, от рентгеновского телескопа ХММ (Hippke and Forgan, 2017) до исследований гравитационного микролинзирования (Rahvar, 2016). Учитывая это, исследователи продолжают делать прогнозы относительно особенностей астрономических данных, которые могли бы указывать на наличие разумной жизни.

Например, недавно обнаруженные быстрые радиовспышки (FRB) (Lorimer et al., 2007) поставили перед теоретиками новую задачу, пытаясь объяснить их происхождение. Излучая около 10^{40} эрг за несколько миллисекунд, эти FRB, вероятно, имеют схожее происхождение с гамма-вспышками, но с ещё более экстремальными прародителями. Среди

выдвинутых гипотез — замедленный коллапс сверхмассивных нейтронных звёзд (Falcke and Rezzolla, 2014), слияние нейтронных звёзд (Zhang, 2013) или особенно мощные звёздные вспышки.

Лингам и Лозб (2017) предположили, что цивилизация, использующая лазерные паруса для ускорения (подобно проекту Breakthrough Starshot), будет производить радиовспышку, по своим свойствам схожую с быстрой радиовспышкой (FRB). Учитывая, что было обнаружено лишь небольшое количество FRB (см. список в работе Petroff et al., 2016), это накладывает ограничения на количество цивилизаций, достигших такого уровня технологического развития. Вероятно, FRB действительно вызваны природными явлениями, но если цивилизация использует лазерные паруса для ускорения, она вполне может маскироваться под FRB. Любой космический аппарат, движущийся с релятивистскими скоростями в нашем ближайшем окружении, также должен быть хорошо виден в широком диапазоне частот благодаря отражению окружающих фотонов. (Zubrin, 1995; Garcia-Escartin and Chamorro-Posada, 2013).

Наиболее известным примером объяснения необычных данных обзора с точки зрения SETI является звезда Бояджиана, KIC8462852 (Boyajian et al., 2016). Впервые обнаруженная в рамках проекта гражданской науки Planet Hunters в наборе данных транзитов экзопланет Kepler, звезда Бояджиана не поддавалась стандартной автоматической идентификации транзитов экзопланет из-за своей поразительно необычной кривой блеска. Звезда Бояджиана демонстрирует серию очень глубоких событий затемнения (до 22% от общего потока), причем эти провалы кажутся относительно аperiодическими. Есть признаки периодичности в 24,2 дня, которые Райт и Сигурдссон (2016) считают незначительными. Второй период в 928,25 дня также очевиден в данных телескопа Kepler. (Kiefer et al., 2017).

Звезда Бояджиана — это достаточно типичная F-звезда, в которой отсутствует избыток инфракрасного излучения, характерный для диска из пылевого вещества, что могло бы объяснить провалы блеска. Бояджиан и др. (2016) предложили предварительное объяснение, предполагающее, что рой гигантских комет, проходящих перед звездой, может объяснить кривую блеска, хотя почему такая кометная система не должна содержать пыли, объяснить сложно. После проведения повторного анализа полнокадровых изображений с телескопа «Кеплер» Монте и Симон (Montet and Simon, 2016) показали, что звезда также претерпевает вековое затемнение примерно на 0.7 звездной величины в столетие, что противоречит выборке из примерно 200 «типичных» F-звезд. Редкость звезды Бояджиана склоняет чашу весов в пользу объяснений, связанных с поглощающим веществом в Солнечной системе. Поглощение из-за повышенной плотности межзвездного вещества

также было предложено для объяснения этого явления. (Wright and Sigurdsson, 2016).

«Последнее объяснение» заключается в том, что через звезду Boyajian проходят искусственные структуры, возможно, строящаяся сфера Дайсона. Данные о транзите экзопланет позволяют нам однозначно характеризовать объекты планетарного масштаба на расстояниях кпк. Если бы мегаструктура строилась вокруг другой звезды, то мы бы ожидали серию необычных, глубоких и аperiodических провалов кривой блеска. На самом деле, существует целый зоопарк различных мегаструктур, которые не обязательно являются сферами Дайсона. Arnold (2005) описывает, как транзитные мегаструктуры могут использоваться в качестве сигнальных устройств. Форма и период обращения структуры кодируют информацию в кривой блеска звезды, в результате чего образуется мощный широкополосный сигнал, который может обнаружить любая цивилизация, способная обнаружить транзиты экзопланет. Korpela et al. (2015) описывают, как геоинженерные проекты по освещению ночной стороны планеты с помощью парка зеркал могут привести к заметным изменениям в планетарном транзите. Частичные сферы Дайсона можно использовать для создания дисбаланса между давлением фотонов и гравитацией, что приводит к суммарному давлению на систему и толканию звезды. Эти звездные двигатели класса А или двигатели Шкадова (Shkadov, 1987; Badescu and Cathcart, 2000) будут создавать чрезвычайно асимметричные транзитные сигнатуры (Форган, 2013). Конечно, могут существовать и многие другие конфигурации искусственных мегаструктур, но мы можем выделить до десяти общих особенностей кривых транзита под влиянием мегаструктур. (Wright et al., 2015):

- Изменения формы входа/выхода
- Аномальное поведение фазовой кривой
- Аномальная форма транзитной впадины
- Переменная глубина транзита
- Переменное время/длительность
- Аномальная предполагаемая плотность звезд
- Аperiodичность
- Исчезновение (полное затенение)
- Ахроматические (независимые от длины волны) транзиты
- Очень низкие массы, полученные из транзита

Каждая из этих особенностей обычно обнаруживается в транзитных системах из-за эксцентриситета орбит, наличия невидимых планетных компаньонов или обломков, а также звездной активности. Окончательное объяснение звезды Бояджиана до сих пор не найдено – традиционные поиски

SETI не дали никакого сигнала (Harp et al., 2016; Schuetz et al., 2016; Abeysekara et al., 2016), а недавние наблюдения дифференциального покраснения в провалах (Boyajian et al., 2018; Deeg et al., 2018) фактически исключили объяснение с помощью мегаструктуры.

Транзитные исследования также чувствительны к планетным кольцам. Человечество создает искусственное кольцо из спутников (и обломков) на геостационарной орбите, которые в принципе можно обнаружить с помощью транзитных методов. Однако текущая непрозрачность пояса спутников (если смотреть вдоль линии зрения в направлении Земли) составляет около 10^{-13} . Чтобы его можно было обнаружить на межзвездных расстояниях с помощью приборов, подобных человеческим, эта непрозрачность должна увеличиться на несколько порядков до 10^{-4} . Предполагается, что это произойдет к 2200 году, если удастся избежать катастрофического случая синдрома Кесслера (Socas-Navarro, 2018).

Даже обломки планетных систем могут содержать информацию о добыче полезных ископаемых на астероидах. Если внеземные цивилизации обитают на планетах земной группы с ограниченными запасами драгоценных металлов, то вполне вероятно, что индустриальная цивилизация истощит эти запасы и будет искать их в близлежащих полях обломков. Инфракрасная спектроскопия дисков обломков может выявить необычное химическое истощение, механический нагрев или перепроизводство пыли. Все это может быть признаком добычи полезных ископаемых на астероидах (Forgan and Elvis, 2011).

В более широком масштабе другие применили третий закон Артура Кларка:

Любая достаточно развитая технологическая цивилизация неотличима от магии.

Иными словами, существуют ли в данных обзоров скрытые, казалось бы, невозможные эффекты, такие как исчезающие звезды, галактики с сильно меняющимся красным смещением или, действительно, исчезающие галактики? Поскольку многочисленные обзоры отображают области неба в разные эпохи, эти данные можно сравнивать для проверки аномальных изменений. Например, Вильярроэль и др. (Villarroel et al., 2016) сопоставили данные USNO-B1.0 Военно-морской обсерватории США и Слоановского цифрового обзора неба (SDSS), получив в общей сложности 290 000 объектов, которые присутствуют в USNO-B1.0, но отсутствуют в SDSS. Из них только один является потенциальным кандидатом на роль внеземного цивилизованного существа (SETI), но с очень низкой степенью достоверности.

Даже вымершие цивилизации могут быть обнаружены с помощью данных об экзопланетах. Стивенс и др. (Stevens et al., 2016) рассматривают, как может выглядеть конец человеческой цивилизации на межзвездных расстояниях. В зависимости от канала гибели цивилизации (ядерная аннигиляция, серая слизь, загрязнение, синдром Кесслера, полное разрушение планеты), эти процессы оставляют следы в атмосферах экзопланет, которые распадаются за время от нескольких лет до 0.1 млн лет. Эти сигналы вряд ли будут обнаружены с помощью телескопов текущего поколения, и их будет трудно найти даже с помощью следующего поколения (например, космического телескопа Джеймса Уэбба). Возможно, нам придется ждать следующего поколения, такого как телескоп LUVOIR, прежде чем руины каких-либо близлежащих цивилизаций станут нам очевидны..

27.4 Можно ли найти решение Парадокса Ферми?

Будущее SETI выглядит на удивление светлым. Как дисциплина, она остается хронически недофинансированной, но как показывают предыдущие разделы, существует многообещающее количество специализированных программ SETI, получающих частное финансирование и выходящих в Интернет. Теоретики и разработчики моделей добавляют все больше и больше способов, с помощью которых астрономические исследования в широком диапазоне длин волн могут выявить наблюдаемые явления, характеризующие разумную деятельность. Поскольку астробиология превратилась в уважаемую отрасль научных исследований, SETI постепенно избавляется от негативных предрассудков прошлого и развивает прочную основу для строгих наблюдений и тщательной аргументации. Действительно, SETI теперь следует рассматривать как полностью развитую отрасль астробиологии. (Wright, 2018).

Если мы обнаружим внеземной разум, парадокс Ферми, конечно, можно будет разрешить путем обнаружения внеземного разума. Увеличение выборки известных цивилизаций с $N = 1$ до $N = 2$ значительно улучшило бы наше понимание того, что создаёт цивилизации и что поддерживает их, даже если мы не собираем значительный объем данных о наших собратьях внеземных разумных организмов из любых сигналов, которые мы получаем. Даже простое доказательство того, что разумная жизнь существует где-то во Вселенной, позволяет нам скорректировать наши предположения относительно местоположения Великого Фильтра. Если мы вернемся к нашей первоначальной формулировке Фильтра:

$$N f_i f_{sup} \leq 1 \quad (27.8)$$

В нашем нынешнем состоянии знаний все фракции f получают единое априорное значение в диапазоне $[0,1]$. Обнаружение разумной жизни переместило бы значения f_l и f_i от 0 (и, возможно, f_{sup} в зависимости от характера обнаружения).

Этот сценарий будет означать, что возникновение интеллекта не является каким-то шагом, заводящим эволюцию в тупик, а может на самом деле быть чем-то другим. Если мы уверены, что рассматриваемая цивилизация умерла до того, как стала широко заметной, то это может локализовать Великий Фильтр где-то особенно близко к нашим сегодняшним дням. Хотя $N = 2$ вряд ли является разумным показателем для расчета статистики, оно содержит значительно больше информации, чем $N = 1$. По крайней мере, мы можем начать заключать в скобки диапазон значений продолжительности жизни цивилизации, а также сравнивать и противопоставлять, насколько различаются системы создают разумную жизнь.

Если мы обнаружим сигнал ETI со значительным информативным содержанием, тем самым получив детальное понимание их происхождения и эволюции, то это поможет прояснить, находятся ли правильные решения парадокса Ферми в редкоземельной (R), катастрофической (C) или некоммуникативные (U) категории. Действительно, мы можем обнаружить, что парадокс Ферми требует составного решения (RC, CU и т. д.). Возможно, цивилизации деградируют в результате изменения климата, случайно вызванному нанотехнологиями (CC), или они попадают в виртуальную реальность, которая в конечном итоге терпит крах из-за технических проблем (UC). Возможно даже, что цивилизации крайне редки во Вселенной и предпочитают оставаться на месте (RU).

Если нам не удастся обнаружить внеземные цивилизации... Конечно, вполне возможно, даже вероятно, что наши продолжающиеся поиски внеземных цивилизаций не принесут результата. Что, если факт А станет более убедительным? Что, если в следующем столетии будет окончательно установлено, что в радиусе нескольких сотен световых лет от Земли нет передатчиков, подобных Аресибо, ни в оптическом, ни в радиодиапазоне, и что в радиусе 50 астрономических единиц от Солнца нет искусственных зондов размером более нескольких сантиметров? Что тогда?

Парадокс останется источником постоянных интриг и споров, но он будет основан на гораздо более прочном фундаменте. Мы установим, что «классические» методы SETI не показывают наличия близлежащих цивилизаций, и что мы должны соответствующим образом корректировать наши априорные предположения при решении данной задачи.

Например, если мы начинаем обнаруживать экзопланеты с убедительными биосигнатурами, но не можем обнаружить искусственные сигналы, то мы видим, что биологические организмы распространены, а технологические артефакты — нет. Это снижает нашу уверенность в некоторых из наших решений R (по крайней мере, R.1–R.11) и вместо этого указывает нам на решения R.12 и выше, а также на решения C. Возвращаясь к терминологии Великого Фильтра, мы можем поместить его в наше будущее, а не в наше прошлое.

Определение вероятности того, что решение C описывает Вселенную, является более сложной задачей. Мы можем количественно оценить частоту сверхновых, активных ядер галактик и гамма-всплесков, чтобы ограничить масштабы катастроф галактического масштаба (решения C.8 и C.9). Аналогично, наше улучшающееся понимание звездообразования может определить вероятность того, что столкновения звезд разрушат биосферы (C.7). Наше понимание звездной эволюции хорошо обосновано (C.5), но мы продолжаем узнавать больше о космической погоде и звездной активности (C.4).

Применение геофизики к экзопланетным системам поможет нам ограничить масштабы катастрофических событий земного масштаба (C.2, C.3), а наблюдения за дисками обломков вокруг звезд дают нам хорошие ограничения на частоту столкновений с планетами в настоящее время, но менее надежны в отношении поведения в прошлом (C.1). Без обнаружения внеземных цивилизаций (живых или мертвых) саморазрушительные решения остаются фактически неопределенными (C.10–C.20).

А что насчет решений U? По определению, их трудно ограничить в отсутствие доказательств. В равной степени, если мы сможем успешно запустить межзвездные миссии, то сможем начать говорить о решениях U.2 и U.11 (и о U.12, если сможем поддерживать связь с нашим флотом на большом расстоянии). Если эти зонды смогут самовоспроизводиться, это также изменит априорные представления о решениях U.3 и U.4. По мере того, как мы будем наблюдать Вселенную в более широком диапазоне электромагнитных частот, мы сможем отклонить U.6. Наши достижения в гравитационно-волновой и нейтринной астрономии вскоре позволят лучше ограничить U.7. Полный переписной учет содержимого Солнечной системы с точностью до нескольких сантиметров более или менее исключит U.16.

Более экзотические решения U, вероятно, ускользнут от наших усилий по их ограничению, почти независимо от того, обнаружим мы внеземные цивилизации или нет. Несмотря на все наши усилия, будет чрезвычайно трудно определить, является ли наша Вселенная смоделированной, пока мы не сможем исследовать достаточно малые

масштабы в экспериментах на ускорителях частиц (U.14). Также будет очень сложно определить, был ли когда-либо наложен запрет на Землю (U.13/U.15)

В лучшем случае мы сможем сказать, что такие решения либо требуют от внеземных цивилизаций действовать за пределами разумных рамок, либо имеют дальнейшие последствия для наших наблюдений, которые мы не видим. По принципу бритвы Оккама, мы должны считать, что экзотические U-решения требуют слишком много движущихся частей/параметров модели, и в отсутствие более качественных данных их априорные предположения следует свести к минимуму, если не полностью обнулить.

Остается очевидным, что с ростом количества и качества астрономических данных и постоянно улучшающимся пониманием того, как исследовать эти данные на предмет признаков искусственности, мы сможем делать строгие количественные утверждения о свойствах разумной жизни в локальной Вселенной. В свою очередь, мы прольем свет на самих себя и постепенно начнем воспринимать человеческое состояние с более объективной точки зрения..

Приложение А

База данных решений Парадокса Ферми

В этом Приложении перечислены возможные решения Парадокса Ферми, которые рассматриваются (явно или иначе) в этой книге. Трудно сказать, что это исчерпывающий список. В конце концов, многие решения в литературе (и в более широкой культуре) часто являются повторением более раннего решения или объединением нескольких решений. Действительно, мы можем ожидать, что «истинное» решение Парадокса будет объединением нескольких решений из любой из трех категорий, которые использованы в этой книге.

В следующей таблице перечислены сценарии по категориям, а также ссылки на соответствующие разделы в основном тексте. Для полноты также добавлены некоторые решения, данные Уэббом (2002), на сегодняшний день единственная другая попытка строгой компиляции решений. Как будет ясно, некоторые из этих решений, хотя и излагаются, либо трудно формализовать с научной точки зрения, либо уже частично рассмотрены в тексте.

Категории решений Парадокса Ферми.

Таблица А.1 Уникальность

ID	Решение	Описание	Ссылка
U1	Землеподобные планеты, терранеты, встречаются редко	Мало планет имеющих $R = R_{\oplus}$, $M = M_{\oplus}$	4.1.7
U2	Состав поверхности Земли уникален	Мало планет имеющих необходимый состав компонентов на поверхности	4.3
U3	Состав атмосферы Земли уникален	Мало планет имеющих необходимый состав компонентов атмосферы	4.3
U4	Терранеты не всегда обитаемы	Мало планет имеющих подходящий климат с циклами круговорота	4.2.1
U5	На биосферы терранет влияют соседи	Редко встречаются динамически спокойные планетные системы	4.4
U6	Терранеты подвергаются ударам	Мало планет с низкой частотой столкновений с астероидами и кометами	4.5
U7	У терранет нет крупных лун	Землеподобные планеты не имеют спутников, стабилизирующих наклон оси	4.5
U8	Спутники терранет малы по размерам	Немногие планеты имеют спутник подходящей массы для обеспечения стабильности наклона оси планеты.	4.5
U9	Планеты звёзд ОВА и М не имеют биосфер	Большинство звёзд — это маломассивные М-звёзды, слишком активны для биосфер	10.1.2
U10	Зона обитаемости SHZ слишком узкая	Непрерывные околозвездные обитаемые зоны эволюционируют слишком быстро, чтобы планеты могли развить разум	4.2.1
U11	Обитаемость Галактики низкая	Галактическая обитаемая зона слишком мала для появления разумных существ	4.2.2
U12	Зарождение жизни происходит редко	Возникновение жизни редкое явление	5.2
U13	Появление жизни недолговечно	Жизнь может зарождаться много раз, но так и не укорениться	5.2.4
U14	Многоклеточная жизнь уникальна	Переход к многоклеточной жизни сложный процесс	5.3.5
U15	Сложные биоорганизмы редкость	Организмы, достаточно крупные для функционирования сложного мозга, встречаются редко	5.3.5

Решения парадокса Ферми			380
U16	Мозг встречается редко	Мозг может не являться конечным продуктом эволюции	5.3.7
U17	Интеллект редкость	Самосознающие, обладающие сознанием существа встречаются редко	6
U18	Разум не в приоритете	Интеллектуальные способности как свойство подвергаются сильному отрицательному отбору	5.3.6
U19	Социальные структуры редкость	Организмы редко создают достаточно сложные социальные структуры	5.3.8
U20	Символьная коммуникация редкость	Язык, искусство и музыка редко встречаются у разумных организмов	6.4
U21	Цивилизация редкость	Социальные структуры редко достигают стадии цивилизации	5.3.9
U22	Устойчивые политические системы редкость	Цивилизации редко имеют стабильную политическую структуру для прогресса	6.7
U23	Наука и математика редкость	Цивилизации редко создают системы систематического приобретения знаний	6.6
U24	Технология редкость	Цивилизации редко создают технологии	6.6
U25	Цивилизации биоорганизмов редкость	Цивилизации редко остаются биологическими — в постбиологической стадии их трудно обнаружить	5.3.10 (C.16)

Таблица А.2 Катастрофизм

ID	Решение	Описание	Ссылка
D26	Столкновение с небесным телом	Цивилизации уничтожаются от удара астероидов или комет	8 (р. 159)
D27	Супервулканизм терранеты	Цивилизации уничтожаются сильной тектонической активностью	9.1 (р. 169)
D28	Исчезновение магнитного поля	Цивилизации уничтожаются при ослаблении магнитного поля планеты	9.2 (р. 173)
D29	Активность светила	Цивилизации уничтожаются от звёздной активности	10.1 (р. 179)
D30	Эволюция звезды	Цивилизации гибнут когда их светило покидает главную последовательность	10.3 (р. 190)
D31	Взрыв сверхновой	Цивилизации разрушаются вспышками сверхновых звёзд	10.5 (р. 194)
D32	Сближение звёзд	Цивилизации уничтожаются в результате сближения с блуждающими звёздами	10.6 (р. 198)

D33	Гибель от AGN	Цивилизации уничтожаются от высокой активности галактического ядра.	11.1 (р. 201)
D34	Гибель от GRB	Цивилизации гибнут от вспышек гамма-излучения	11.2
D35	Регресс неустойчивого развития	Цивилизации не смогли устойчиво развиваться	12
D36	Гибель от изменения климата	Цивилизации гибнут в результате искусственно вызванного изменения климата	13
D37	Гибель от разрушения биосферы	Цивилизации терпят крах, когда сокращают местное биоразнообразие ниже допустимых пределов.	13.4
D38	Гибель от синдрома Кesslera	Цивилизации терпят крах из-за столкновений космического мусора, разрушающих орбитальную среду	13.5
D39	Гибель от генной инженерии	Цивилизации уничтожают сами себя, когда открывают эффективные методы генной инженерии	14.1
D40	Гибель от серой слизи	Цивилизации уничтожаются вышедшими из-под контроля нанотехнологиями	14.2
D41	Крах от ИИ	Цивилизации уничтожаются злонамеренным искусственным интеллектом	15
D42	Коллапс от Сингулярности	Цивилизации оказываются во власти собственного искусственного интеллекта и терпят крах	15.4
D43	Гибель от войн	Цивилизации уничтожают сами себя в вооруженных конфликтах	16
D44	Социальный коллапс	Цивилизации не могут адаптироваться к внутренним и внешним стрессовым факторам и рушатся	17
D45	Интеллектуальный коллапс	Цивилизации теряют стремление интеллектуальному развитию и приходят в упадок	17.2

Таблица А.3. Коммуникабельность

ID	Решение	Описание	Ссылка
C46	Поздний филогенез	Цивилизации возникли лишь недавно по причине глобального механизма регулирования	18.2

C47	Слабая изученность космоса	Цивилизации не смогли исследовать окрестности Земли	19
C48	Саморепликаторы опасны для связи	Цивилизации не создают автономных самовоспроизводящихся зондов, так как они по своей природе опасны.	20
C49	Зонды «Хищник-жертва» мутируют	Межзвездные зонды мутируют и начинают поглощать друг друга ради ресурсов	20.3
C50	Молчание в «Тёмном лесу»	Инопланетяне не объявляют о своем присутствии по ряду причин (страх, затраты, самосохранение и т. д.).	
C51	Связь ведётся на других частотах	Внеземные цивилизации используют электромагнитные сигналы, но на частоте, которую мы еще не исследовали	
C52	Алиены общаются иными методами	Пришельцы не используют электромагнитные сигналы для общения	
C53	Мы не понимаем инопланетян	Пришельцы посылают нам сигналы, но мы не считаем их сообщения искусственными	
C54	Инопланетяне слишком далеко	Внеземные цивилизации находятся вне досягаемости наших наблюдательных возможностей (редко встречаются в пространстве и времени?)	
C55	Алиены практикуют эстивацию	Внеземные цивилизации находятся в состоянии спячки, ожидая дальнейшего охлаждения Вселенной, чтобы улучшить свои вычислительные возможности	
C56	Межзвёздные перелёты слишком трудны	Внеземные цивилизации не смогли преодолеть экономические и технологические барьеры на пути исследования Галактики	
C57	Межзвездная связь ненадежна	Внеземные цивилизации не способны поддерживать надежный диалог в межзвездном пространстве	
C58	Гипотеза зоопарка может быть верна	Инопланетные существа договорились не связываться с Землей по научным или политическим причинам	
C59	Гипотеза симуляции может быть верна	Мы — единственные разумные существа, живущие в компьютерной симуляции	
C60	Гипотеза планетария может быть верна	Внеземные цивилизации создали впечатление, что обитаема только Земля (путем манипулирования нашими наблюдениями на Земле и вблизи нее)	

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| C61 | Зонды Bracewell/Lurker уже здесь | Зонды Bracewell/Lurker присутствуют во внешней части Солнечной системы, но пока не обнаружены |
| C62 | НЛО корабли пришельцев | Пришельцы посещают Землю и люди их наблюдали |
| C63 | Гипотеза о древних пришельцах верна | Пришельцы посещали Землю в прошлом |
| C64 | Возможно мы потомки инопланетян | Инопланетные пришельцы посетили Землю и засеяли её жизнью и разумом |
| C65 | Происходит направленная панспермия | Внеземные цивилизации засеяли Землю жизнью из космоса Crick (1973) |

Литература

- Abbott, B.P., Abbott, R., Abbott, T. D., Abernathy, M. R., Acernese, F., Ackley, K., Adams, C., Adams, T., Addesso, P., Adhikari, R. X., and Others. 2016a. GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass Binary Black Hole Coalescence. *Physical Review Letters*, **116**(24), 241103.
- 2016b. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Physical Review Letters*, **116**(6), 061102.
- Abeysekara, A. U., Archambault, S., Archer, A., Benbow, W., Bird, R., Buchovecky, M., Buckley, J. H., Byrum, K., Cardenzana, J. V., Cerruti, M., Chen, X., Christiansen, J. L., Ciupik, L., Cui, W., Dickinson, H. J., Eisch, J. D., Errando, M., Falcone, A., Fegan, D. J., Feng, Q., Finley, J. P., Fleischhack, H., Fortin, P., Fortson, L., Furniss, A., Gillanders, G. H., Griffin, S., Grube, J., Gyuk, G., Hütten, M., Håkansson, N., Hanna, D., Holder, J., Humensky, T. B., Johnson, C. A., Kaaret, P., Kar, P., Kelley-Hoskins, N., Kertzman, M., Kieda, D., Krause, M., Krennrich, F., Kumar, S., Lang, M. J., Lin, T. T. Y., Maier, G., McArthur, S., McCann, A., Meagher, K., Moriarty, P., Mukherjee, R., Nieto, D., O'Brien, S., de Bhróithe, A. O'Faoláin, Ong, R. A., Otte, A. N., Park, N., Perkins, J. S., Petrashyk, A., Pohl, M., Popkow, A., Pueschel, E., Quinn, J., Ragan, K., Ratliff, G., Reynolds, P. T., Richards, G. T., Roache, E., Santander, M., Sembroski, G. H., Shahinyan, K., Staszak, D., Telezhinsky, I., Tucci, J. V., Tyler, J., Vincent, S., Wakely, S. P., Weiner, O. M., Weinstein, A., Williams, D. A., and Zitzer, B. 2016. A Search for Brief Optical Flashes Associated with the SETI Target KIC 8462852. *The Astrophysical Journal*, **818**(2), L33.
- Ade, P. A. R., Aghanim, N., Ahmed, Z., Aikin, R. W., Alexander, K. D., Arnaud, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., Banday, A. J., Barkats, D., Barreiro, R. B., Bartlett, J. G., Bartolo, N., Battaner, E., Benabed, K., Benoît, A., Benoit-Lévy, A., Benton, S. J., Bernard, J.-P., Bersanelli, M., Bielewicz, P., Bischoff, C. A., Bock, J. J., Bonaldi, A., Bonavera, L., Bond, J. R., Borrill, J., Bouchet, F. R., Boulanger, F., Brevik, J. A., Bucher, M., Buder, I., Bullock, E., Burigana, C., Butler, R. C., Buza, V., Calabrese, E., Cardoso, J.-F., Catalano, A., Challinor, A., Chary, R.-R., Chiang, H. C., Christensen, P. R., Colombo, L. P. L., Combet, C., Connors, J., Couchot, F., Coulais, A., Crill, B. P., Curto, A., Cuttaia, F., Danese, L., Davies, R. D., Davis, R. J., de Bernardis, P., de Rosa, A., de Zotti, G., Delabrouille, J., Delouis, J.-M., Désert, F.-X., Dickinson, C., Diego, J. M., Dole, H., Donzelli, S., Doré, O., Douspis, M., Dowell, C. D., Duband, L., Ducout, A., Dunkley, J., Dupac, X., Dvorkin, C., Efstathiou, G., Elsner, F., Enßlin, T. A., Eriksen, H. K., Falgarone, E., Filippini, J. P., Finelli, F., Fliescher, S., Forni, O., Frailis, M., Fraisse, A. A., Franceschi, E., Frejsel, A., Galeotta, S., Galli, S., Ganga, K., Ghosh, T., Giard, M., Gjerløw, E., Golwala, S. R., González-Nuevo, J., Górski, K. M., Gratton, S., Gregorio, A., Gruppuso, A., Gudmundsson, J. E., Halpern, M., Hansen, F. K., Hanson, D., Harrison, D. L., Hasselfield, M., Helou, G., Henrot-Versillé, S., Herranz, D., Hildebrandt, S. R., Hilton, G. C., Hivon, E., Hobson, M., Holmes, W. A., Hovest, W., Hristov, V. V., Huppenberger, K. M., Hui, H., Hurier, G., Irwin, K. D., Jaffe, A. H., Jaffe, T. R., Jewell, J., Jones, W. C., Juvela, M., Karakci, A., Karkare, K. S., Kaufman, J. P., Keating, B. G., Kefeli, S., Keihänen, E., Kernasovskiy, S. A., Keskitalo, R., Kisner, T. S., Kneissl, R., Knoche, J., Knox, L., Kovac, J. M., Krachmalnicoff, N., Kunz, M., Kuo, C. L., Kurki-Suonio, H., Lagache, G., Lähteenmäki, A., Lamarre, J.-M., Lasenby, A., Lattanzi, M., Lawrence, C. R.,

- Leitch, E. M., Leonardi, R., Levrier, F., Lewis, A., Liguori, M., Lilje, P. B., Linden-Vørnle, M., López-Caniego, M., Lubin, P. M., Lueker, M., Macías-Pérez, J. F., Maffei, B., Maino, D., Mandolesi, N., Mangilli, A., Maris, M., Martin, P. G., Martínez-González, E., Masi, S., Mason, P., Matarrese, S., Megerian, K. G., Meinhold, P. R., Melchiorri, A., Mendes, L., Mennella, A., Migliaccio, M., Mitra, S., Miville-Deschênes, M.-A., Moneti, A., Montier, L., Morgante, G., Mortlock, D., Moss, A., Munshi, D., Murphy, J. A., Naselsky, P., Nati, F., Natoli, P., Netterfield, C. B., Nguyen, H. T., NørgaardNielsen, H. U., Noviello, F., Novikov, D., Novikov, I., O'Brient, R., Ogburn, R. W., Orlando, A., Pagano, L., Pajot, F., Paladini, R., Paoletti, D., Partridge, B., Pasian, F., Patanchon, G., Pearson, T. J., Perdureau, O., Perotto, L., Pettorino, V., Piacentini, F., Piat, M., Pietrobon, D., Plaszczyński, S., Pointecouteau, E., Polenta, G., Ponthieu, N., Pratt, G. W., Prunet, S., Pryke, C., Puget, J.-L., Rachen, J. P., Reach, W. T., Rebolo, R., Reinecke, M., Remazeilles, M., Renault, C., Renzi, A., Richter, S., Ristorcelli, I., Rocha, G., Rossetti, M., Roudier, G., Rowan-Robinson, M., Rubiño-Martín, J. A., Rusholme, B., Sandri, M., Santos, D., Savelainen, M., Savini, G., Schwarz, R., Scott, D., Seiffert, M. D., Sheehy, C. D., Spencer, L. D., Staniszewski, Z. K., Stolyarov, V., Sudiwala, R., Sunyaev, R., Sutton, D., Suur-Uski, A.-S., Sygnet, J.-F., Tauber, J. A., Teply, G. P., Terenzi, L., Thompson, K. L., Toffolatti, L., Tolan, J. E., Tomasi, M., Tristram, M., Tucci, M., Turner, A. D., Valenziano, L., Valiviita, J., Van Tent, B., Vibert, L., Vielva, P., Vieregg, A. G., Villa, F., Wade, L. A., Wandelt, B. D., Watson, R., Weber, A. C., Wehus, I. K., White, M., White, S. D. M., Willmert, J., Wong, C. L., Yoon, K. W., Yvon, D., Zacchei, A., and Zonca, A. 2015. Joint Analysis of BICEP2/ Keck Array and Planck Data. *Physical Review Letters*, **114**(10), 101301.
- Adler, Paul S., and Kwon, Seok-Woo. 2002. Social Capital: Prospects for a New Concept. *The Academy of Management Review*, **27**(1), 17–40.
- Alexander, Richard, Pascucci, Ilaria, Andrews, Sean, Armitage, Philip, and Cieza, Lucas. 2013. The Dispersal of Protoplanetary Disks. Pages 475–496 of: Beuther, Henrik, Klessen, Ralf S., Dullemond, Cornelis P., and Henning, Thomas (eds.), *Protostars and Planets VI*. University of Arizona Press.
- Alfonseca, Manuel, Cebrian, Manuel, Anta, Antonio Fernandez, Coviello, Lorenzo, Abeliuk, Andres, and Rahwan, Iyad. 2016. Superintelligence Cannot be Contained: Lessons from Computability Theory. *CoRR*, jul, abs/1607.00913.
- Allen, Anthony, Li, Zhi-Yun, and Shu, Frank H. 2003. Collapse of Magnetized Singular Isothermal Toroids. II. Rotation and Magnetic Braking. *ApJ*, **599**(1), 363–379.
- Almár, Iván. 2011. SETI and Astrobiology: The Rio Scale and the London Scale. *Acta Astronautica*, **69**(9–10), 899–904.
- Alpert, Barbara Olins, and Foundation 2021. 2008. *Creative Ice Age Brain: Cave Art in the Light of Neuroscience*. Santa Fe: Foundation 20 21.
- Anglada-Escudé, Guillem, Amado, Pedro J., Barnes, John, Berdiñas, Zaira M., Butler, R. Paul, Coleman, Gavin A. L., de la Cueva, Ignacio, Dreizler, Stefan, Endl, Michael, Giesers, Benjamin, Jeffers, Sandra V., Jenkins, James S., Jones, Hugh R. A., Kiraga, Marcin, Kürster, Martin, López-González, María J., Marvin, Christopher J., Morales, Nicolás, Morin, Julien, Nelson, Richard P., Ortiz, José L., Ofir, Aviv, Paardekooper, Sijme-Jan, Reiners, Ansgar, Rodríguez, Eloy, Rodríguez-López, Cristina, Sarmiento, Luis F., Strachan, John P., Tsapras, Yiannis, Tuomi, Mikko, and Zechmeister, Mathias. 2016. A Terrestrial Planet Candidate in a Temperate Orbit around Proxima Centauri. *Nature*, **536**(7617), 437–440.

- Annis, J. 1999. An Astrophysical Explanation for the ‘Great Silence’. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **52**, 19–22.
- Aravind, P. K. 2007. The Physics of the Space Elevator. *American Journal of Physics*, **75**(2), 125.
- Ariely, Gal. 2014. Does Diversity Erode Social Cohesion? Conceptual and Methodological Issues. *Political Studies*, **62**(3), 573–595.
- Armitage, P. J. 2010. *Astrophysics of Planet Formation*. Cambridge University Press.
- Armstrong, D. J., Pugh, C. E., Broomhall, A.-M., Brown, D. J. A., Lund, M. N., Osborn, H. P., and Pollacco, D. L. 2016. Host Stars of Kepler’s Habitable Exoplanets: Superares, Rotation and Activity. *MNRAS*, **455**(3), 3110–3125.
- Arnold, Luc F. A. 2005. Transit Light-Curve Signatures of Artificial Objects. *ApJ*, **627**(1), 534–539.
- Atri, Dimitra, Melott, Adrian L., and Karam, Andrew. 2014. Biological Radiation Dose from Secondary Particles in a Milky Way Gamma-Ray Burst. *International Journal of Astrobiology*, **13**(03), 224–228.
- Axelrod, R. 1984. *The Evolution of Cooperation: Revised Edition*. New York: Basic Books.
- Backus, Peter R., and Team, Project Phoenix. 2002. Project Phoenix: SETI Observations from 1200 to 1750 MHz with the Upgraded Arecibo Telescope. Page 525 of: Stanimirovic, Snezana, Altschuler, Daniel, Goldsmith, Paul, and Salter, Chris (eds.), *NAIC-NRAO School on Single-dish Radio Astronomy: Techniques and Applications*. Astronomical Society of the Pacific.
- Badescu, V., and Cathcart, R. B. 2000. Stellar Engines for Kardashev’s Type II Civilisations. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **53**, 297–306.
- Bagnères, Anne-Geneviève, and Hanus, Robert. 2015. Communication and Social Regulation in Termites. Pages 193–248 of: *Social Recognition in Invertebrates*. Cham: Springer International Publishing.
- Bailer-Jones, C. A. L. 2015. Close Encounters of the Stellar Kind. *Astronomy & Astrophysics*, **575**(mar), A35.
- Bailey, R., Elsener, Konrad, Ereditato, A., Weisse, E., Stevenson, Graham Roger, Vincke, H. H., Ferrari, A., Maugain, J. M., Vassilopoulos, N., Ball, A. E., and Others. 1999. *The CERN Neutrino Beam to Gran Sasso (NGS)*. Tech. rept.
- Balbi, Amedeo, and Tombesi, Francesco. 2017. The Habitability of the Milky Way During the Active Phase of Its Central Supermassive Black Hole. *Scientific Reports*, **7**(1), 16626.
- Ball, J. 1973. The Zoo Hypothesis. *Icarus*, **19**(3), 347–349.
- Bambach, Richard K. 2006. Phanerozoic Biodiversity Mass Extinctions. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, **34**(1), 127–155.
- Barge, P., and Sommeria, J. 1995. Did Planet Formation Begin Inside Persistent Gaseous Vortices? *A&A*, **295**(1), L1–L4.
- Barnes, Rory, and Heller, René. 2013. Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils of a Cooling Primary. *Astrobiology*, **13**(3), 279–291.
- Barnes, Rory, Mullins, Kristina, Goldblatt, Colin, Meadows, Victoria S., Kasting, James F., and Heller, René. 2013. Tidal Venuses: Triggering a Climate Catastrophe via Tidal Heating. *Astrobiology*, **13**(3), 225–50.
- Barnosky, Anthony D., Matzke, Nicholas, Tomiya, Susumu, Wogan, Guinevere O. U., Swartz, Brian, Quental, Tiago B., Marshall, Charles, McGuire, Jenny L., Lindsey,

- Emily L., Maguire, Kaitlin C., Mersey, Ben, and Ferrer, Elizabeth A. 2011. Has the Earth's Sixth Mass Extinction Already Arrived? *Nature*, **471**(7336), 51–57.
- Barrow, J. D. 1998. *Impossibility: The Limits of Science and the Science of Limits*. 1st edn. Oxford University Press.
- Bartelmann, Matthias, and Schneider, Peter. 2001. Weak Gravitational Lensing. *Physics Reports*, **340**(4–5), 291–472.
- Batygin, Konstantin, and Brown, Michael E. 2016. Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. *The Astronomical Journal*, **151**(2), 22.
- Batygin, Konstantin, and Laughlin, Greg. 2015. Jupiter's Decisive Role in the Inner Solar System's Early Evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **112**(14), 4214–4217.
- Baxter, S. 2001. The Planetarium Hypothesis – A Resolution of the Fermi Paradox. *JBIS*, **54**, 210–216.
- Bean, Jacob L., Kempton, Eliza Miller-Ricci, and Homeier, Derek. 2010. A Ground-Based Transmission Spectrum of the Super-Earth Exoplanet GJ 1214b. *Nature*, **468**(7324), 669–72.
- Beane, Silas R., Davoudi, Zohreh, and Savage, Martin J. 2014. Constraints on the Universe as a Numerical Simulation. *The European Physical Journal A*, **50**(9), 148.
- Beatty, John. 2006. Replaying Life's Tape. *The Journal of Philosophy*, **103**(7), 336–362.
- Becker, Werner, Bernhardt, Mike G., and Jessner, Axel. 2013. Autonomous Spacecraft Navigation with Pulsars. *Acta Futura*, **7**, 11–28.
- Bekenstein, J. D. 1972. Black Holes and the Second Law. *Lettere Al Nuovo Cimento Series 2*, **4**(15), 737–740.
- Bekker, A., Holland, H. D., Wang, P.-L., Rumble, D., Stein, H. J., Hannah, J. L., Coetsee, L. L., and Beukes, N. J. 2004. Dating the Rise of Atmospheric Oxygen. *Nature*, **427**(6970), 117–120.
- Belbruno, Edward, and Gott III, J. Richard. 2005. Where Did the Moon Come From? *The Astronomical Journal*, **129**(3), 1724–1745.
- Bell, Elizabeth A., Boehnke, Patrick, Harrison, T. Mark, and Mao, Wendy L. 2015. Potentially Biogenic Carbon Preserved in a 4.1 Billion-Year-Old Zircon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **112**(47), 14518–14521.
- Benford, James, Benford, Gregory, and Benford, Dominic. 2010. Messaging with CostOptimized Interstellar Beacons. *Astrobiology*, **10**(5), 475–90.
- Bennett, D. P., Batista, V., Bond, I. A., Bennett, C. S., Suzuki, D., Beaulieu, J.-P., Udalski, A., Donatowicz, J., Bozza, V., Abe, F., Botzler, C. S., Freeman, M., Fukunaga, D., Fukui, A., Itow, Y., Koshimoto, N., Ling, C. H., Masuda, K., Matsubara, Y., Muraki, Y., Namba, S., Ohnishi, K., Rattenbury, N. J., Saito, To, Sullivan, D. J., Sumi, T., Sweatman, W. L., Tristram, P. J., Tsurumi, N., Wada, K., Yock, P. C. M., Albrow, M. D., Bachelet, E., Brillant, S., Caldwell, J. A. R., Cassan, A., Cole, A. A., Corrales, E., Coutures, C., Dieters, S., Dominis Prester, D., Fouqué, P., Greenhill, J., Horne, K., Koo, J.-R., Kubas, D., Marquette, J.-B., Martin, R., Menzies, J. W., Sahu, K. C., Wambsganss, J., Williams, A., Zub, M., Choi, J.-Y., DePoy, D. L., Dong, Subo, Gaudi, B. S., Gould, A., Han, C., Henderson, C. B., McGregor, D., Lee, C.-U., Pogge, R. W., Shin, I.-G., Yee, J. C., Szymanski, M. K., Skowron, J., Poleski, R., Kozłowski, S., Wyrzykowski, Ł., Kubiak, M., Pietrukowicz, P., Pietrzynski, G., Soszyński, I., Ulaczyk, K., Tsapras, Y., Street, R. A., Dominik, M., Bramich, D. M., Browne, P., Hundertmark, M., Kains, N., Snodgrass, C., Steele, I. A., Dekany, I., Gonzalez, O. A., Heyrovský, D., Kadori, R., Kerins, E., Lucas, P. W., Minniti, D.,

- Nagayama, T., Rejkuba, M., Robin, A. C., and Saito, R. 2014. MOA-2011-BLG-262Lb: A SubEarth-Mass Moon Orbiting a Gas Giant Primary Or a High Velocity Planetary System in the Galactic Bulge. *ApJ*, **785**, 155–167.
- Berdahl, Mira, Robock, Alan, Ji, Duoying, Moore, John C., Jones, Andy, Kravitz, Ben, and Watanabe, Shingo. 2014. Arctic Cryosphere Response in the GeoEngineering Model Intercomparison Project G3 and G4 Scenarios. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, **119**(3), 1308–1321.
- Berdugina, Svetlana V., and Kuhn, Jeff R. 2017. Surface Imaging of Proxima b and Other Exoplanets: Topography, Biosignatures, and Artificial Mega-Structures. oct.
- Berna, F., Goldberg, P., Horwitz, L. K., Brink, J., Holt, S., Bamford, M., and Chazan, M. 2012. Microstratigraphic Evidence of in situ Fire in the Acheulean Strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape Province, South Africa. *PNAS*, **109**(20), E1215–E1220.
- Beskin, Gregory, Borisov, Nikolai, Komarova, Victoria, Mitronova, Sofia, Neizvestny, Sergei, Plokhhotnichenko, Vladimir, and Popova, Marina. 1997. The Search for Extraterrestrial Civilizations in Optical Range – Methods, Objects, Results. Page 595 of: *Astronomical and Biochemical Origins and the Search for Life in the Universe*, IAU Colloquium 161. Bologna.
- Bickerton, D. 1998. Catastrophic Evolution: The Case for a Single Step from Protolanguage to Full Human Language. Pages 341–358 of: Hurford, James R., Studdert-Kennedy, Michael, and Knight, Chris (eds.), *Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Biases*.
- Binder, Alan B. 1974. On the Origin of the Moon by Rotational Fission. *The Moon*, **11**(1–2), 53–76.
- Binzel, Richard P. 1997. A Near-Earth Object Hazard Index. *Annals of the New York Academy of Sciences*, **822**(1 Near-Earth Ob), 545–551.
- Bisbas, Thomas G., Wunsch, Richard, Whitworth, Anthony P., Hubber, David A., and Walch, Stefanie. 2011. Radiation-Driven Implosion and Triggered Star Formation. *ApJ*, **736**(2), 142.
- Björk, R. 2007. Exploring the Galaxy Using Space Probes. *International Journal of Astrobiology*, **6**(02), 89.
- Blair, D. G., and Zadnik, M. G. 1993. A List of Possible Interstellar Communication Channel Frequencies for SETI. *A&A*, **278**, 669–672.
2002. A Search for Optical Beacons: Implications of Null Results. *Astrobiology*, **2**(3), 305–312.
- Bolduc, Léonard. 2002. GIC Observations and Studies in the Hydro-Québec Power System. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, **64**(16), 1793–1802.
- Boley, Aaron C., Durisen, R.H., Nordlund, Ake, and Lord, Jesse. 2007. Three-Dimensional Radiative Hydrodynamics for Disk Stability Simulations: A Proposed Testing Standard and New Results. *ApJ*, **665**(2), 1254–1267.
- Boley, Aaron C., Hayfield, Tristen, Mayer, Lucio, and Durisen, Richard H. 2010. Clumps in the Outer Disk by Disk Instability: Why They Are Initially Gas Giants and the Legacy of Disruption. *Icarus*, **207**(2), 509–516.
- Bond, A. 1978. *Project Daedalus: The Final Report on the BIS Starship Study*. London: British Interplanetary Society.
- Bonnell, I. A., Dobbs, C. L., and Smith, R. J. 2013. Shocks, Cooling and the Origin of Star Formation Rates in Spiral Galaxies. *MNRAS*, **430**(3), 1790–1800.
- Bostrom, Nick. 2002. Existential Risks. *Journal of Evolution and Technology*, **9**(1), 1–31.

- Bostrom, Nick. 2014. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press.
- Bouchard, Denis. 2013. *The Nature and Origin of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Boyajian, T. S., LaCourse, D. M., Rappaport, S. A., Fabrycky, D., Fischer, D. A., Gandolfi, D., Kennedy, G. M., Korhonen, H., Liu, M. C., Moor, A., Olah, K., and Others. 2016. Planet Hunters IX. KIC 8462852 – Where’s the Flux? *MNRAS*, **457**(4), 3988–4004.
- Boyajian, Tabetha S., Alonso, Roi, Ammerman, Alex, Armstrong, David, Ramos, A. Asensio, Barkaoui, K., Beatty, Thomas G., Benkhaldoun, Z., Benni, Paul O., Bentley, Rory, Berdyugin, Andrei, Berdyugina, Svetlana, Bergeron, Serge, Bieryla, Allyson, Blain, Michaela G., Blanco, Alicia Capetillo, Bodman, Eva H. L., Boucher, Anne, Bradley, Mark, Brincat, Stephen M., Brink, Thomas G., Briol, John, Brown, David J. A., Budaj, J., Burdanov, A., Cale, B., Carbo, Miguel Aznar, García, R. Castillo, Clark, Wendy J., Clayton, Geoffrey C., Clem, James L., Coker, Phillip H., Cook, Evan M., Copperwheat, Chris M., Curtis, J. L., Cutri, R. M., Cseh, B., Cynamon, C. H., Daniels, Alex J., Davenport, James R. A., Deeg, Hans J., Lorenzo, Roberto De, de Jaeger, Thomas, Desrosiers, Jean-Bruno, Dolan, John, Dowhos, D. J., Dubois, Franky, Durkee, R., Dvorak, Shawn, Easley, Lynn, Edwards, N., Ellis, Tyler G., Erdelyi, Emery, Ertel, Steve, Farfán, Rafael G., Farihi, J., Filippenko, Alexei V., Foxell, Emma, Gandolfi, Davide, García, Faustino, Giddens, F., Gillon, M., González-Carballo, JuanLuis, González-Fernández, C., Hernández, J. I. González, Graham, Keith A., Greene, Kenton A., Gregorio, J., Hallakoun, Na’ama, Hanyecz, Ottó, Harp, G. R., Henry, Gregory W., Herrero, E., Hildbold, Caleb F., Hinz, D., Holgado, G., Ignácz, Bernadett, Ilyin, Ilya, Ivanov, Valentin D., Jehin, E., Jermak, Helen E., Johnston, Steve, Kafka, S., Kalup, Csilla, Kardasis, Emmanuel, Kaspi, Shai, Kennedy, Grant M., Kiefer, F., Kieley, C. L., Kessler, Dennis, Kiiskinen, H., Killestein, T. L., King, Ronald A., Kollar, V., Korhonen, H., Kotnik, C., Könyves-Tóth, Réka, Kriskovics, Levente, Krumm, Nathan, Krushinsky, Vadim, Kundra, E., Lachapelle, Francois-Rene, LaCourse, D., Lake, P., Lam, Kristine, Lamb, Gavin P., Lane, Dave, Lau, Marie Wingyee, Lewin, Pablo, Lintott, Chris, Lisse, Carey, Logie, Ludwig, Longeard, Nicolas, Villanueva, M. Lopez, Ludington, E. Whit, Mainzer, A., Malo, Lison, Maloney, Chris, Mann, A., Mantero, A., Marengo, Massimo, Marchant, Jon, Martínez González, M. J., Masiero, Joseph R., Mauerhan, Jon C., McCormac, James, McNeely, Aaron, Meng, Huan Y. A., Miller, Mike, Molnar, Lawrence A., Morales, J. C., Morris, Brett M., Muterspaugh, Matthew W., Nespral, David, Nugent, C. R., Nugent, Katherine M., Odasso, A., O’Keeffe, Derek, Oksanen, A., O’Meara, John M., Ordasi, András, Osborn, Hugh, Ott, John J., Parks, J. R., Perez, Diego Rodriguez, Petriew, Vance, Pickard, R., Pál, András, Plavchan, P., Pollacco, Don, Nuñez, F., Pozo, J., Pozuelos, F., Rau, Steve, Redfield, Seth, Relles, Howard, Ribas, Ignasi, Richards, Jon, Saario, Joonas L. O., Safron, Emily J., Sallai, J. Martin, Sárneczky, Krisztián, Schaefer, Bradley E., Schumer, Clea F., Schwartzendruber, Madison, Siegel, Michael H., Siemion, Andrew P. V., Simmons, Brooke D., Simon, Joshua D., Simón-Díaz, S., Sitko, Michael L., Socas-Navarro, Hector, Sódor, Á., Starkey, Donn, Steele, Iain A., Stone, Geoff, Strassmeier, Klaus G., Street, R. A., Sullivan, Tricia, Suomela, J., Swift, J. J., Szabó, Gyula M., Szabó, Róbert, Szakáts, Róbert, Szalai, Tamás, Tanner, Angelle M., Toledo-Padrón, B., Tordai, Tamás, Triaud, Amaury H. M. J., Turner, Jake D., Ulowetz, Joseph H., Urbanik, Marian, Vanaverbeke, Siegfried, Vanderburg, Andrew, Vida, Krisztián, Vietje, Brad P.,

- Vinkó, József, von Braun, K., Waagen, Elizabeth O., Walsh, Dan, Watson, Christopher A., Weir, R. C., Wenzel, Klaus, Plaza, C. Westendorp, Williamson, Michael W., Wright, Jason T., Wyatt, M. C., Zheng, Weikang, and Zsidi, Gabriella. 2018. The First Post-Kepler Brightness Dips of KIC 8462852. *ApJ*, **853**(1), L8.
- Boyd, Brian. 2010. *On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction*. 1st edn. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Boyd, Robert, and Richerson, Peter J. 1988. *Culture and the Evolutionary Process*. University of Chicago Press.
- Bracewell, R. N. 1960. Communications from Superior Galactic Communities. *Nature*, **186**(4726), 670–671.
- Bradbury, Robert J. 2002. ‘Dyson Shell Supercomputers As the Dominant Life Form’ in Galaxies. Page 213 of: Lemarchand, G., and Meech, K. (eds.), *Bioastronomy 2002: A New Era in Bioastronomy*.
- Brashears, Travis, Lubin, Philip, Hughes, Gary B., McDonough, Kyle, Arias, Sebastian, Lang, Alex, Motta, Caio, Meinhold, Peter, Batliner, Payton, Griswold, Janelle, Zhang, Qicheng, Alnawakhtha, Yusuf, Prater, Kenyon, Madajian, Jonathan, Sturman, Olivia, Gergieva, Jana, Gilkes, Aidan, and Silverstein, Bret. 2015 (Sep). Directed Energy Interstellar Propulsion of Wafersats. Page 961609 of: Taylor, Edward W., and Cardimona, David A. (eds.), *Nanophotonics and Macrophotonics for Space Environments IX*.
- Brasier, M., McLoughlin, N., Green, O., and Wacey, D. 2006. A Fresh Look at the Fossil Evidence for Early Archaean Cellular Life. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **361**(1470), 887–902.
- Brillouin, L. 1953. The Negentropy Principle of Information. *Journal of Applied Physics*, **24**(9), 1152–1163.
1962. *Science and Information Theory*. 2nd edn. New York: Academic Press.
- Brin, G. D. 1983. The Great Silence – The Controversy Concerning Extraterrestrial Intelligent Life. *QJRAS*, **24**, 283–309.
- Bringsjord, Selmer. 2012. Belief in the Singularity Is Logically Brittle. *Journal of Consciousness Studies*, **19**(7), 14.
- Brown, Steven. 2000. The ‘Musilanguage’ Model of Music Evolution. Pages 271–300 of: Wallin, Nils L., Merker, Bjorn, and Brown, Steven (eds.), *The Origins of Music*. Cambridge, MA: MIT Press Ltd.
- Burmeister, Alita R. 2015. Horizontal Gene Transfer. *Evolution, Medicine, and Public Health*, **2015**(1), 193–194.
- Buss, D. M. 2005. *The Murderer Next Door: Why the Mind Is Designed to Kill*. New York: Penguin.
- Bussard, R. W. 1960. Galactic Matter and Interstellar Spaceflight. *Acta Astronautica*, **6**, 170–194.
- Cairo, Osvaldo. 2011. External Measures of Cognition.’ *Frontiers in Human Neuroscience*, **5**.
- Caldeira, Ken, and Wickett, Michael E. 2003. Oceanography: Anthropogenic Carbon and Ocean pH. *Nature*, **425**(6956), 365–365.
- Cameron, A. G. W., and Ward, W. R. 1976. The Origin of the Moon. Page 120 of: *Lunar and Planetary Science Conference*, vol. 7.
- Campbell, Neil A., Reece, Jane B., Urry, Lisa A., Cain, Michael C., Wassermann, Steven A., Minorsky, Peter V., and Jackson, Robert B. 2014. *Biology: A Global Approach*. 10th edn. Pearson Education.

- Canup, R. M. 2012. Forming a Moon with an Earth-like Composition via a Giant Impact. *Science*, **338**(6110), 1052–1055.
- Canup, Robin M., and Ward, William R. 2006. A Common Mass Scaling for Satellite Systems of Gaseous Planets. *Nature*, **441**(7095), 834–9.
- Carbone, V., Sorriso-Valvo, L., Vecchio, A., Lepreti, F., Veltri, P., Harabaglia, P., and Guerra, I. 2006. Clustering of Polarity Reversals of the Geomagnetic Field. *Physical Review Letters*, **96**(12), 128501.
- Cardena, E., Lynn, S. J., and Krippner, S. 2000. Introduction: Anomalous Experiences in Perspective. Page 4 of: Cardena, E., and Lynn, S. (eds.), *Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence*. American Psychological Association.
- Carracedo, Juan Carlos. 2014. Structural Collapses in the Canary Islands. In: Gutiérrez F., Gutiérrez M. (eds.) *Landscapes and Landforms of Spain*. World Geomorphological Landscapes. Springer, Dordrecht.
- Carrigan, Richard A. 2009. IRAS-Based Whole Sky Upper Limit on Dyson Spheres. *ApJ*, **698**(2), 2075–2086.
- Carrington, R. C. 1859. Description of a Singular Appearance Seen in the Sun on September 1, 1859. *MNRAS*, **20**(1), 13–15.
- Carter, B., and McCrea, W. H. 1983. The Anthropic Principle and Its Implications for Biological Evolution [and Discussion]. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, **310**(1512), 347–363.
- Cartin, Daniel. 2013. Exploration of the Local Solar Neighborhood I: Fixed Number of Probes. *International Journal of Astrobiology*, in press.
- Cassenti, B. N. 1982. A Comparison of Interstellar Propulsion Methods. *JBIS*, **35**, 116–124.
- Catling, David C., and Claire, Mark W. 2005. How Earth’s Atmosphere Evolved to an Oxic State: A Status Report. *Earth and Planetary Science Letters*, **237**(1–2), 1–20.
- Catling, David C., Krissansen-Totton, Joshua, Kiang, Nancy Y., Crisp, David, Robinson, Tyler D., DasSarma, Shiladitya, Rushby, Andrew, Del Genio, Anthony, Bains, William, and Domagal-Goldman, Shawn. 2017. Exoplanet Biosignatures: A Framework for Their Assessment. *Astrobiology*, vol. 18, issue 6, pp. 709–738.
- Chang, S.-W., Byun, Y.-I., and Hartman, J. D. 2015. Photometric Study on Stellar Magnetic Activity I. Flare Variability of Red Dwarf Stars in the Open Cluster M37. *ApJ*, **814**(1), 35.
- Chapman, Clark R., and Morrison, David. 1994. Impacts on the Earth by Asteroids and Comets: Assessing the Hazard. *Nature*, **367**(6458), 33–40.
2003. No Reduction in Risk of a Massive Asteroid Impact. *Nature*, **421**(6922), 473–473.
- Chen, Xian, and Amaro-Seoane, Pau. 2014. Sagittarius A* Rivalled the Sun in the Ancient X-ray Sky. *eprint arXiv:1412.5592*, dec.
- Chomsky, N. 2007. Of Minds and Language. *Biolinguistics*, **1**, 9–27.
2005. Three Factors in Language Design. *Linguistic Inquiry*, **36**(1), 1–22.
- Chulliat, A., and Olsen, N. 2010. Observation of Magnetic Diffusion in the Earth’s Outer Core from Magsat, Ørsted, and CHAMP Data. *Journal of Geophysical Research*, **115**(B5), B05105.
- Cirkovic, M., and Bradbury, R. 2006. Galactic Gradients, Postbiological Evolution and the Apparent Failure of SETI. *New Astronomy*, **11**(8), 628–639.

- Cirkovi' c, Milan M. 2006. Macroengineering in the Galactic Context: A New Agenda' for Astrobiology. Pages 281–298 of: Badescu, Viorel, Cathcart, Richard B., and Schilling, Roelof D. (eds), *Macro-engineering: A Challenge for the Future*. Springer.
2008. Against the Empire. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **61**, 246–254.
2015. Linking Simulation Argument to the AI Risk. *Futures*, **72**(sep), 27–31.
- Cirkovi' c, Milan M., and Vukoti' c, Branislav. 2016. Long-Term Prospects: Mitigation of' Supernova and Gamma-Ray Burst Threat to Intelligent Beings. *Acta Astronautica*, **129**(dec), 438–446.
- Clark, Jerome. 2000. *Extraordinary Encounters: An Encyclopedia of Extraterrestrials and Otherworldly Beings*. ABC-CLIO.
- Clarke, Bruce. 2014. John Lilly, the Mind of the Dolphin, and Communication Out of Bounds. *communication+1*, **3**, 8.
- Cocconi, G., and Morrison, P. 1959. Searching for Interstellar Communications. *Nature*, **184**, 844–846.
- Cockell, Charles S. 2015. Extraterrestrial Liberty: Can It Be Planned? Pages 23–42 of: *Human Governance Beyond Earth*.
- Collins, Gareth S., Melosh, H. Jay, and Marcus, Robert A. 2005. Earth Impact Effects Program: A Web-Based Computer Program for Calculating the Regional Environmental Consequences of a Meteoroid Impact on Earth. *Meteoritics and Planetary Science*, **40**(6), 817–840.
- Commerçon, B., Hennebelle, P., Audit, E., Chabrier, G., and Teyssier, R. 2010. Protostellar Collapse: Radiative and Magnetic Feedbacks on Small-Scale Fragmentation. *Astronomy and Astrophysics*, **510**(feb), L3.
- Conn Henry, Richard, Kilston, S., and Shostak, S. 2008. SETI in the Ecliptic Plane. *Bulletin of the American Astronomical Society*, **40**, 194.
- Conway Morris, Simon. 2003a. *Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe*. Cambridge University Press.
- 2003b. The Navigation of Biological Hyperspace. *International Journal of Astrobiology*, **2**(2), 149–152.
- Cooper, David L. 2006. Broca's Arrow: Evolution, Prediction, and Language in the Brain. *The Anatomical Record Part B: The New Anatomist*, **289B**(1), 9–24.
- Cotta, Carlos, and Morales, Álvaro. 2009. A Computational Analysis of Galactic Exploration with Space Probes: Implications for the Fermi Paradox. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **62**(Jul), 82–88.
- Courtillot, Vincent, and Olson, Peter. 2007. Mantle Plumes Link Magnetic Superchrons to Phanerozoic Mass Depletion Events. *Earth and Planetary Science Letters*, **260**(3–4), 495–504.
- Cox, Rochelle E., and Barnier, Amanda J. 2015. A Hypnotic Analogue of Clinical Confabulation. *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, **63**(3), 249–273.
- Crawford, I. A. 1990. Interstellar Travel: A Review for Astronomers. *QJRAS*, **31**, 377–400.
- Crick, F. 1973. Directed Panspermia. *Icarus*, **19**(3), 341–346.
- Cross, Ian, and Morley, Iain. 2009. The Evolution of Music: Theories, Definitions and the Nature of the Evidence. *Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship*, 61–81.
- Crucifix, Michael. 2011. Glacial/Interglacial Cycles. Pages pp. 359–356 of: Singh, Vijay P., Singh, Pratap, and Haritashya, Umesh K. (eds.), *Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers*. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Dordrecht: Springer Netherlands.

- Cucchiara, A., Levan, A. J., Fox, D. B., Tanvir, N. R., Ukwatta, T. N., Berger, E., Krühler, T., Yolda, A. Küpcü, Wu, X. F., Toma, K., Greiner, J. E., Olivares, F., Rowlinson, A., Amati, L., Sakamoto, T., Roth, K., Stephens, A., Fritz, Alexander, Fynbo, J. P. U., Hjorth, J., Malesani, D., Jakobsson, P., Wiersema, K., O'Brien, P. T., Soderberg, A. M., Foley, R. J., Fruchter, A. S., Rhoads, J., Rutledge, R. E., Schmidt, B. P., Dopita, M. A., Podsiadlowski, P., Willingale, R., Wolf, C., Kulkarni, S. R., and D'Avanzo, P. 2011. A Photometric Redshift of $z \sim 9.4$ for GRB 090429B. *The Astrophysical Journal*, **736**(1), 7.
- Cuk, M., and Stewart, S. T. 2012. Making the Moon from a Fast-Spinning Earth: A Giant Impact Followed by Resonant Despinning. *Science*, **338**(6110), 1047–1052.
- Dalrymple, G. B. 2001. The Age of the Earth in the Twentieth Century: A Problem (Mostly) Solved. *Geological Society, London, Special Publications*, **190**(1), 205–221.
- De Biasi, A., Secco, L., Masi, M., and Casotto, S. 2015. Galactic Planar Tides on the Comets of Oort Cloud and Analogs in Different Reference Systems. I. *Astronomy & Astrophysics*, **574**(jan), A98.
- Deeg, H. J., Alonso, R., Nespral, D., and Boyajian, Tabetha. 2018. Non-Grey Dimming Events of KIC 8462852 from GTC Spectrophotometry. jan.
- Delgado, José Manuel Rodríguez. 1969. *Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society*. New York: Harper & Row.
- Dence, M. R., Grieve, R. A. F., and Robertson, P. B. 1977. Terrestrial Impact Structures – Principal Characteristics and Energy Considerations. Pages 247–275 of: *In: Impact and Explosion Cratering: Planetary and Terrestrial Implications; Proceedings of the Symposium on Planetary Cratering Mechanics, Flagstaff, Ariz., September 13-17, 1976. (A78-44030 19-91)* New York, Pergamon Press, Inc., 1977, pp. 247–275.
- DeVito, Carl L. 1991. Languages, Science and the Search for Extraterrestrial Intelligence. *Interdisciplinary Science Reviews*, **16**(2), 156–160.
- Diamond, J. 2013. *Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive*. Penguin Books Limited.
- Dick, Steven. 2008. The Postbiological Universe. *Acta Astronautica*, **62**, 499 – 504.
2003. Cultural Evolution, the Postbiological Universe and SETI. *International Journal of Astrobiology*, **2**(1), 65–74.
2009. The Postbiological Universe and Our Future in Space. *Futures*, **41**(8), 578–580.
- Dieks, D. 1992. Doomsday – or the Dangers of Statistics. *Philosophical Quarterly*, **42**, 78–84.
- Dobzhansky, Theodosius. 1972. Darwinian Evolution and the Problem of Extraterrestrial Life. *Perspectives in Biology and Medicine*, **15**(2), 157–176.
- Doeleman, Sheperd S., Weintraub, Jonathan, Rogers, Alan E. E., Plambeck, Richard, Freund, Robert, Tilanus, Remo P. J., Friberg, Per, Ziurys, Lucy M., Moran, James M., Corey, Brian, Young, Ken H., Smythe, Daniel L., Titus, Michael, Marrone, Daniel P., Cappallo, Roger J., Bock, Douglas C.-J., Bower, Geoffrey C., Chamberlin, Richard, Davis, Gary R., Krichbaum, Thomas P., Lamb, James, Maness, Holly, Niell, Arthur E., Roy, Alan, Strittmatter, Peter, Werthimer, Daniel, Whitney, Alan R., and Woody, David. 2008. Event-Horizon-Scale Structure in the Supermassive Black Hole Candidate at the Galactic Centre. *Nature*, **455**(7209), 78–80.
- Dolan, Michelle M., Mathews, Grant J., Lam, Doan Duc, Lan, Nguyen Quynh, Herczeg, Gregory J., and Dearborn, David S. P. 2016. Evolutionary Tracks for Betelgeuse. *The Astrophysical Journal*, **819**(1), 7.

- Domagal-Goldman, Shawn D., Segura, Antígona, Claire, Mark W., Robinson, Tyler D., and Meadows, Victoria S. 2014. Abiotic Ozone and Oxygen in Atmospheres Similar to Prebiotic Earth. *The Astrophysical Journal*, **792**(2), 90.
- Downs, G. S. 1974. *Interplanetary Navigation Using Pulsating Radio Sources*. Tech. rept. JPL, Pasadena.
- Dowswell, C. 2009. Norman Ernest Borlaug (1914-2009). *Science*, **326**(5951), 381–381.
- Doyle, Laurance R., McCowan, Brenda, Johnston, Simon, and Hanser, Sean F. 2011. Information Theory, Animal Communication, and the Search for Extraterrestrial Intelligence. *Acta Astronautica*, **68**(3–4), 406–417.
- Draine, B.T. 2003. Interstellar Dust Grains. *ARA&A*, **41**(1), 241–289.
- Drake, F.D. 2003. The Drake Equation Revisited: Part 1. *Astrobiology Magazine*.
- Dunbar, R. 1998. *Grooming, Gossip, and the Evolution of Language*. Harvard University Press.
- Dunning Hotopp, Julie C. 2011. Horizontal Gene Transfer Between Bacteria and Animals. *Trends in Genetics*, **27**(4), 157–163.
- Duquennoy, A., and Mayor, M. 1991. Multiplicity Among Solar-Type Stars in the Solar Neighbourhood. II - Distribution of the Orbital Elements in an Unbiased Sample. *A&A*, **248**, 485–524.
- Duric, Neb. 2004. *Advanced Astrophysics*. Cambridge University Press.
- Durrant, Russil. 2009. Born to Kill? A Critical Evaluation of Homicide Adaptation Theory. *Aggression and Violent Behavior*, **14**(5), 374–381.
- Dyson, Freeman J. 1960. Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation. *Science*, **131**(3414), 1667–1668.
1963. Gravitational Machines. Chap. 12 of: Cameron, A. G. W. (ed.), *Interstellar Communication*. New York: Benjamin Press.
- Eckart, A., and Genzel, R. 1996. Observations of Stellar Proper Motions Near the Galactic Centre. *Nature*, **383**(6599), 415–417.
- Edmondson, William H., and Stevens, Ian R. 2003. The Utilization of Pulsars As SETI Beacons. *IJA*, **2**(4), 231–271.
- Eliseev, Alexey V., Chernokulsky, Alexandr V., Karpenko, Andrey A., and Mokhov, Igor I. 2010. Global Warming Mitigation by Sulphur Loading in the Stratosphere: Dependence of Required Emissions on Allowable Residual Warming Rate. *Theoretical and Applied Climatology*, **101**(1), 67–81.
- Ellery, Alex. 2016. Are Self-Replicating Machines Feasible? *Journal of Spacecraft and Rockets*, **53**(2), 317–327.
- Enriquez, J. Emilio, Siemion, Andrew, Foster, Griffin, Gajjar, Vishal, Hellbourg, Greg, Hickish, Jack, Isaacson, Howard, Price, Danny C., Croft, Steve, DeBoer, David, Lebofsky, Matt, MacMahon, David H. E., and Werthimer, Dan. 2017. The Breakthrough Listen Search for Intelligent Life: 1.1–1.9 GHz Observations of 692 Nearby Stars. *The Astrophysical Journal*, **849**(2), 104.
- Erlykin, A. D., and Wolfendale, A. W. 2010. Long Term Time Variability of Cosmic Rays and Possible Relevance to the Development of Life on Earth. *Surveys in Geophysics*, **31**(4), 383–398.
- Ezzedine, Souheil M., Lomov, Ilya, Miller, Paul L., Dennison, Deborah S., Dearborn, David S., and Antoun, Tarabay H. 2015. Simulation of Asteroid Impact on Ocean Surfaces, Subsequent Wave Generation and the Effect on US Shorelines. *Procedia Engineering*, **103**, 113–120.

- Fabian, A. C. 2012. Observational Evidence of Active Galactic Nuclei Feedback. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, **50**(1), 455–489.
- Falcke, Heino, and Rezzolla, Luciano. 2014. Fast Radio Bursts: The Last Sign of Supramassive Neutron Stars. *Astronomy & Astrophysics*, **562**(feb), A137.
- Falk, D. 2004. Prelinguistic Evolution in Early Hominins: Whence Motherese? *Behavioral and Brain Sciences*, **27**, 491–541.
- Farquhar, J., Zerkle, A. L., and Bekker, A. 2014. Geologic and Geochemical Constraints on Earth's Early Atmosphere. Pages 91–138 of: *Treatise on Geochemistry*. Elsevier.
- Farrer, Joan. 2010. Smart Dust: Sci-Fi Applications Enabled by Synthetic Fiber and Textiles Technology. *TEXTILE*, **8**(3), 342–346.
- Fernald, R. D. 2006. Casting a Genetic Light on the Evolution of Eyes. *Science*, **313**(5795), 1914–1918.
- Filippova, L. N., and Strel'nitskij, V. S. 1988. Ecliptic as an Attractor for SETI. *Astronomicheskii Tsirkulyar*, **1531**, 31.
- Fiori, R. A. D., Boteler, D. H., and Gillies, D. M. 2014. Assessment of GIC Risk Due to Geomagnetic Sudden Commencements and Identification of the Current Systems Responsible. *Space Weather*, **12**(1), 76–91.
- Fischbach, Ephraim, and Gruenwald, John T. 2017. NU-SETI: A Proposal to Detect ExtraTerrestrial Signals Carried by Neutrinos. feb.
- Fischer-Kowalski, M. 1997. *Gesellschaftlicher Stoffwechsel und Kolonisierung von Natur: ein Versuch in sozialer {Ö}kologie*. G+B Verlag Fakultas.
- Fixsen, D. J. 2009. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal*, **707**(2), 916–920.
- Flasinski, Mariusz. 2016. *Introduction to Artificial Intelligence*. Cham: Springer International Publishing.
- Flores Martinez, Claudio L. 2014. SETI in the Light of Cosmic Convergent Evolution. *Acta Astronautica*, **104**(1), 341–349.
- Fogg, M. 1987. Temporal Aspects of the Interaction Among the First Galactic Civilizations: The 'Interdict Hypothesis'. *Icarus*, **69**(2), 370–384.
- Foley, Bradford J., Bercovici, David, and Landuyt, William. 2012. The Conditions for Plate Tectonics on Super-Earths: Inferences from Convection Models with Damage. *Earth and Planetary Science Letters*, **331–332**(may), 281–290.
- Foley, Jonathan A., DeFries, Ruth, Asner, Gregory P., Barford, Carol, Bonan, Gordon, Carpenter, Stephen R., Chapin, F. Stuart, Coe, Michael T., Daily, Gretchen C., Gibbs, Holly K., Helkowski, Joseph H., Holloway, Tracey, Howard, Erica A., Kucharik, Christopher J., Monfreda, Chad, Patz, Jonathan A., Prentice, I. Colin, Ramankutty, Navin, and Snyder, Peter K. 2005. Global Consequences of Land Use. *Science*, **309**(5734), 570–574.
- Forgan, D., and Kipping, D. 2013. Dynamical Effects on the Habitable Zone for Earth-like Exomoons. *MNRAS*, **432**(4), 2994–3004.
- Forgan, D., and Rice, K. 2013. Towards a Population Synthesis Model of Objects Formed by Self-Gravitating Disc Fragmentation and Tidal Downsizing. *MNRAS*, **432**(4), 3168–3185.
- Forgan, D. H., Hall, C., Meru, F., and Rice, W. K. M. 2018a. Towards a Population Synthesis Model of Self-Gravitating Disc Fragmentation and Tidal Downsizing II: the Effect of Fragment–Fragment Interactions. *MNRAS*, **474**(4), 5036–5048.

- Forgan, Duncan, and Rice, Ken. 2011. The Jeans Mass as a Fundamental Measure of Self-Gravitating Disc Fragmentation and Initial Fragment Mass. *MNRAS*, **417**(3), 1928–1937.
- Forgan, Duncan, and Yotov, Vergil. 2014. The Effect of Planetary Illumination on Climate Modelling of Earth-like Exomoons. *MNRAS*, **441**(4), 3513–3523.
- Forgan, Duncan, Dayal, Pratika, Cockell, Charles, and Libeskind, Noam. 2017. Evaluating Galactic Habitability Using High-Resolution Cosmological Simulations of Galaxy Formation. *International Journal of Astrobiology*, **16**(01), 60–73.
- Forgan, Duncan H. 2009. A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence. *International Journal of Astrobiology*, **8**(02), 121.
2011. Spatio-Temporal Constraints on the Zoo Hypothesis, and the Breakdown of Total Hegemony. *International Journal of Astrobiology*, **10**(04), 341–347.
2013. On the Possibility of Detecting Class A Stellar Engines Using Exoplanet Transit Curves. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **66**(jun), 144–154.
2014. Can Collimated Extraterrestrial Signals be Intercepted? *J. Br. Interplanet. Soc.*, **67**(oct), 232–236.
- 2017a. Exoplanet Transits as the Foundation of an Interstellar Communications Network. *IJA*, jul, in press.
- 2017b. The Galactic Club or Galactic Cliques? Exploring the Limits of Interstellar Hegemony and the Zoo Hypothesis. *International Journal of Astrobiology*, **16**(04), 349–354.
- Forgan, Duncan H., and Elvis, Martin. 2011. Extrasolar Asteroid Mining as Forensic Evidence for Extraterrestrial Intelligence. *International Journal of Astrobiology*, **10**(04), 307–313.
- Forgan, Duncan H., and Rice, Ken. 2010. Numerical Testing of the Rare Earth Hypothesis Using Monte Carlo Realization Techniques. *International Journal of Astrobiology*, **9**(02), 73.
- Forgan, Duncan H., Papadogiannakis, Semeli, and Kitching, Thomas. 2013. The Effect of Probe Dynamics on Galactic Exploration Timescales. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **66**, 171–177.
- Forgan, Duncan H., Heller, René, and Hippke, Michael. 2018b. Photogravimagnetic Assists of Light Sails: A Mixed Blessing for Breakthrough Starshot? *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **474**(3), 3212–3220.
- Forgan, Duncan H., Wright, Jason T., Tarter, Jill C., Korpela, Eric J., Siemion, Andrew P. V., Almár, Iván, and Pirola, Elisabeth. 2018c. Rio 2.0 – Revising the Rio Scale for SETI Detections. *IJA*, in press.
- Forshaw, Jason, Aglietti, Guglielmo, Navarathinam, Nimal, Kadhém, Haval, Salmon, Thierry, Joffre, Eric, Chabot, Thomas, Retat, Ingo, Axthelm, Robert, Barraclough, Simon, and Others. 2015. An In-Orbit Active Debris Removal Mission-REMOVEDEBRIS: Pre-Launch Update. In: *Int. Astronautical Congress, IAC'2015*.
- Forward, R. 1989. Grey Solar Sails. In: *25th Joint Propulsion Conference*. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics.
1984. Roundtrip Interstellar Travel Using Laser-Pushed Lightsails. *Journal of Spacecraft and Rockets*, **21**(2), 187–195.
1985. Starwisp – An Ultra-Light Interstellar Probe. *Journal of Spacecraft and Rockets*, **22**(3), 345–350.
- Foster, K., and Ratnieks, F. 2005. A New Eusocial Vertebrate? *Trends in Ecology & Evolution*, **20**(7), 363–364.

- Fouchard, M., Froeschlé, Ch., Rickman, H., and Valsecchi, G. B. 2011. The Key Role of Massive Stars in Oort Cloud Comet Dynamics. *Icarus*, **214**(1), 334–347.
- Fouts, R. S. 1973. Acquisition and Testing of Gestural Signs in Four Young Chimpanzees. *Science*, **180**(4089), 978–980.
- Freeman, Chris, Ostle, Nick, and Kang, Hojeong. 2001. An Enzymic ‘Latch’ on a Global Carbon Store. *Nature*, **409**(6817), 149–149.
- Freitas, Robert A. 1980. A Self-Reproducing Interstellar Probe. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **33**, 251–264.
1983. The Search for Extraterrestrial Artifacts (SETA). *British Interplanetary Society*, **36**, 501–506.
2000. *Some Limits to Global Ecophagy by Biovorous Nanoreplicators, with Public Policy Recommendations*. Tech. rept. Foresight Institute.
- Freudenthal, H. 1960. *Lincos: Design of a Language for Cosmic Intercourse*. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, no. v. 1. North-Holland.
- Fripp, Deborah, Owen, Caryn, Quintana-Rizzo, Ester, Shapiro, Ari, Buckstaff, Kara, Jankowski, Kristine, Wells, Randall, and Tyack, Peter. 2005. Bottlenose Dolphin (*Tursiops Truncatus*) Calves Appear to Model Their Signature Whistles on the Signature Whistles of Community Members. *Animal Cognition*, **8**(1), 17–26.
- Frisch, Priscilla C., and Mueller, Hans-Reinhard. 2013. Time-Variability in the Interstellar Boundary Conditions of the Heliosphere: Effect of the Solar Journey on the Galactic Cosmic Ray Flux at Earth. *Space Science Reviews*, **176**(1-4), 21–34.
- Galama, T. J., Vreeswijk, P. M., van Paradijs, J., Kouveliotou, C., Augusteijn, T., Bönhardt, H., Brewer, J. P., Doublier, V., Gonzalez, J.-F., Leibundgut, B., Lidman, C., Hainaut, O. R., Patat, F., Heise, J., in’t Zand, J., Hurley, K., Groot, P. J., Strom, R. G., Mazzali, P. A., Iwamoto, K., Nomoto, K., Umeda, H., Nakamura, T., Young, T. R., Suzuki, T., Shigeyama, T., Koshut, T., Kippen, M., Robinson, C., de Wildt, P., Wijers, R. A. M. J., Tanvir, N., Greiner, J., Pian, E., Palazzi, E., Frontera, F., Masetti, N., Nicastro, L., Feroci, M., Costa, E., Piro, L., Peterson, B. A., Tinney, C., Boyle, B., Cannon, R., Stathakis, R., Sadler, E., Begam, M. C., and Ianna, P. 1998. Discovery of the Peculiar Supernova 1998bw in the Error Box of GRB980425. *Nature*, **395**(6703), 670–672.
- Gale, Joseph. 2009. *The Astrobiology of Earth*. 1st edn. Oxford: Oxford University Press.
- Gammie, C. 2001. Nonlinear Outcome of Gravitational Instability in Cooling, Gaseous Disks. *ApJ*, **553**(1), 174–183.
- Garcia-Escartin, Juan Carlos, and Chamorro-Posada, Pedro. 2013. Scouting the Spectrum for Interstellar Travellers. *Acta Astronautica*, **85**(apr), 12–18.
- Gardner, Chester S., Liu, Alan Z., Marsh, D. R., Feng, Wuhu, and Plane, J. M. C. 2014. Inferring the Global Cosmic Dust Influx to the Earth’s Atmosphere from Lidar Observations of the Vertical Flux of Mesospheric Na. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, **119**(9), 7870–7879.
- Gardner, R. Allen, and Gardner, Beatrice T. 1969. Teaching Sign Language to a Chimpanzee. *Science*, **165**(3894), 664–672.
- Garrett, M. A. 2015. Application of the Mid-IR Radio Correlation to the G Sample and the Search for Advanced Extraterrestrial Civilisations. *Astronomy & Astrophysics*, **581**(sep), L5.

- Gerig, Austin, Olum, Ken D., and Vilenkin, Alexander. 2013. Universal Doomsday: Analyzing Our Prospects for Survival. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, **2013**(05), 013–013.
- Gertz, J. 2016. Reviewing METI: A Critical Analysis of the Arguments. *JBIS*, **69**, 31–36.
- Gillon, Michaël, Triaud, Amaury H. M. J., Demory, Brice-Olivier, Jehin, Emmanuël, Agol, Eric, Deck, Katherine M., Lederer, Susan M., de Wit, Julien, Burdanov, Artem, Ingalls, James G., Bolmont, Emeline, Leconte, Jeremy, Raymond, Sean N., Selsis, Franck, Turbet, Martin, Barkaoui, Khalid, Burgasser, Adam, Burleigh, Matthew R., Carey, Sean J., Chaushev, Aleksander, Copperwheat, Chris M., Delrez, Laetitia, Fernandes, Catarina S., Holdsworth, Daniel L., Kotze, Enrico J., Van Grootel, Valérie, Almléaky, Yaseen, Benkhaldoun, Zouhair, Magain, Pierre, and Queloz, Didier. 2017. Seven Temperate Terrestrial Planets Around the Nearby Ultracool Dwarf Star TRAPPIST-1. *Nature*, **542**(7642), 456–460.
- Gisler, Galen, Weaver, Robert, and Gittings, Michael L. 2006. *Sage Calculations of the Tsunami Threat from La Palma*.
- Glade, Nicolas, Ballet, Pascal, and Bastien, Olivier. 2012. A Stochastic Process Approach of the Drake Equation Parameters. *International Journal of Astrobiology*, **11**(02), 103–108.
- Glansdorff, Nicolas, Xu, Ying, and Labedan, Bernard. 2008. The Last Universal Common Ancestor: Emergence, Constitution and Genetic Legacy of an Elusive Forerunner. *Biology Direct*, **3**(1), 29.
- Glassmeier, Karl-Heinz, and Vogt, Joachim. 2010. Magnetic Polarity Transitions and Biospheric Effects. *Space Science Reviews*, **155**(1–4), 387–410.
- Gleghorn, George, Asay, James, Atkinson, Dale, Flury, Walter, Johnson, Nicholas, Kessler, Donald, Knowles, Stephen, Rex, Dietrich, Toda, Susumu, Veniaminov, Stanislav, and Warren, Robert. 1995. *Orbital Debris: A Technical Assessment*. Tech. rept. National Academy Press, Washington, D.C.
- Gonzalez, G., Brownlee, D., and Ward, P. 2001. The Galactic Habitable Zone: Galactic Chemical Evolution. *Icarus*, **152**(1), 185–200.
- Good, Irving John. 1966. Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine. Pages 31–88 of: *Advances in Computers*. Elsevier.
- Goodfellow, Ian J., Pouget-Abadie, Jean, Mirza, Mehdi, Xu, Bing, Warde-Farley, David, Ozair, Sherjil, Courville, Aaron, and Bengio, Yoshua. 2014. Generative Adversarial Networks. *ArXiv e-prints*, jun, ID 1406.2661.
- Goodman, A. A., Benson, P. J., Fuller, G. A., and Myers, P. C. 1993. Dense Cores in Dark Clouds. VIII - Velocity Gradients. *ApJ*, **406**(apr), 528.
- Gordon, J. P., Zeiger, H. J., and Townes, C. H. 1954. Molecular Microwave Oscillator and New Hyperfine Structure in the Microwave Spectrum of NH₃. *Physical Review*, **95**(1), 282–284.
- Gott, J. Richard. 1993. Implications of the Copernican Principle for Our Future Prospects. *Nature*, **363**(6427), 315–319.
- Goudie, Andrew. 1992. *Environmental Change*. Oxford University Press.
- Gould, S. J. 2000. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. Vintage.
- Gowanlock, Michael G., Patton, David R., and McConnell, Sabine M. 2011. A Model of Habitability Within the Milky Way Galaxy. *Astrobiology*, **11**(9), 855–73.

- Grace, Katja, Salvatier, John, Dafoe, Allan, Zhang, Baobao, and Evans, Owain. 2017. When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. *Journal of Artificial Intelligence Research*, may, in press.
- Gradie, Jonathan C., Chapman, Clark R., and Tedesco, Edward F. 1989. Distribution of Taxonomic Classes and the Compositional Structure of the Asteroid Belt. Pages 316–335 of: *Asteroids II*. Tucson: University of Arizona Press.
- Gray, Robert H. 2015. The Fermi Paradox is Neither Fermi's Nor a Paradox. *Astrobiology*, **15**(3), 195–9.
- Grimaldi, Claudio. 2017. Signal Coverage Approach to the Detection Probability of Hypothetical Extraterrestrial Emitters in the Milky Way. *Scientific Reports*, **7**(apr), 46273.
- Gubbins, David, and Herrero-Bervera, Emilio. 2007. *Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism*. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Gurzadyan, G. A. 1996. *Theory of Interplanetary Flights*. Amsterdam: Gordon and Breach.
- Hacar, A., Tafalla, M., Kauffmann, J., and Kovács, A. 2013. Cores, Laments, and Bundles: Hierarchical Core Formation in the L1495/B213 Taurus Region. *Astronomy & Astrophysics*, **554**(jun), A55.
- Hadjidemetriou, John D. 1963. Two-Body Problem with Variable Mass: A New Approach. *Icarus*, **2**(Jan), 440–451.
- Hair, Thomas W. 2011. Temporal Dispersion of the Emergence of Intelligence: an InterArrival Time Analysis. *International Journal of Astrobiology*, **10**(02), 131–135.
- Hair, Thomas W., and Hedman, Andrew D. 2013. Spatial Dispersion of Interstellar Civilizations: A Probabilistic Site Percolation Model in Three Dimensions. *International Journal of Astrobiology*, **12**(01), 45–52.
- Hall, Jeffrey C. 2008. Stellar Chromospheric Activity. *Living Reviews in Solar Physics*, **5**(2).
- Hamkins, Joel David, and Lewis, Andy. 2000. Infinite Time Turing Machines. *The Journal of Symbolic Logic*, **65**(02), 567–604.
- Hammond, Andrew, Galizi, Roberto, Kyrou, Kyros, Simoni, Alekos, Siniscalchi, Carla, Katsanos, Dimitris, Gribble, Matthew, Baker, Dean, Marois, Eric, Russell, Steven, Burt, Austin, Windbichler, Nikolai, Crisanti, Andrea, and Nolan, Tony. 2015. A CRISPR-Cas9 Gene Drive System Targeting Female Reproduction in the Malaria Mosquito Vector *Anopheles Gambiae*. *Nature Biotechnology*, **34**(1), 78–83.
- Han, Zhidong, and Fina, Alberto. 2011. Thermal Conductivity of Carbon Nanotubes and Their Polymer Nanocomposites: A Review. *Progress in Polymer Science*, **36**(7), 914–944.
- Hanson, Robin. 1998. *The Great Filter – Are We Almost Past It?*
- Haqq-Misra, Jacob. 2018. Policy Options for the Radio Detectability of Earth. *Futures*, apr.
- Haqq-Misra, Jacob, and Kopparapu, Ravi Kumar. 2012. On the Likelihood of Nonterrestrial Artifacts in the Solar System. *Acta Astronautica*, **72**(mar), 15–20.
- Haqq-Misra, Jacob D., and Baum, Seth D. 2009. The Sustainability Solution to the Fermi Paradox. *J. Br. Interplanet. Soc.*, **62**, 47–51.
- Harp, G. R., Richards, Jon, Shostak, Seth, Tarter, J. C., Vakoch, Douglas A., and Munson, Chris. 2016. Radio SETI Observations of the Anomalous Star KIC 8462852. *The Astrophysical Journal*, **825**(2), 155.

- Hart, Michael H. 1975. Explanation for the Absence of Extraterrestrials on Earth. *QJRAS*, **16**, 128–135.
- Hathaway, David H. 2010. The Solar Cycle. *Living Rev. Solar Phys.*, **7**, [Online Article]: cited 30/06/2016.
- Hawkins, Jeff, and Ahmad, Subutai. 2016. Why Neurons Have Thousands of Synapses, a Theory of Sequence Memory in Neocortex. *Frontiers in Neural Circuits*, **10**(mar).
- Hays, J. D., Imbrie, J., and Shackleton, N. J. 1976. Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages. *Science (New York, N.Y.)*, **194**(4270), 1121–32.
- Haywood, M., Lehnert, M. D., Di Matteo, P., Snaith, O., Schultheis, M., Katz, D., and Gómez, A. 2016. When the Milky Way Turned off the Lights: APOGEE Provides Evidence of Star Formation Quenching in our Galaxy. *Astronomy & Astrophysics*, **589**(apr), A66.
- Haywood, Raphaëlle D. 2016. Stellar Activity as a Source of Radial-Velocity Variability. Pages 13–44 of: *Radial-velocity Searches for Planets Around Active Stars*. Springer.
- Hein, Andreas M., Pak, M., Putz, D., and Reiss, P. 2012. World Ships – Architectures and Feasibility Revisited. *JBIS*, **65**, 119–133.
- Heisler, J. 1986. The Influence of the Galactic Tidal Field on the Oort Comet Cloud. *Icarus*, **65**(1), 13–26.
- Hejnal, A., and Martindale, M. Q. 2008. Acoel Development Supports a Simple Planulalike Urbilaterian. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **363**(1496), 1493–1501.
- Heller, René. 2017. Relativistic Generalization of the Incentive Trap of Interstellar Travel with Application to Breakthrough Starshot. *MNRAS*, **470**(3), 3664–3671.
- Heller, René, and Barnes, Rory. 2013. Exomoon Habitability Constrained by Illumination and Tidal Heating. *Astrobiology*, **13**(1), 18–46.
- Heller, Rene, and Hippke, Michael. 2017. Deceleration of High-Velocity Interstellar Photon Sails into Bound Orbits at Alpha Centauri. *ApJ*, **835**(2), L32.
- Heller, René, and Pudritz, Ralph E. 2016. The Search for Extraterrestrial Intelligence in Earth's Solar Transit Zone. *Astrobiology*, **16**(4), 259–270.
- Heller, René, Williams, Darren, Kipping, David, Limbach, Mary Anne, Turner, Edwin, Greenberg, Richard, Sasaki, Takanori, Bolmont, Emeline, Grasset, Olivier, Lewis, Karen, Barnes, Rory, and Zuluaga, Jorge I. 2014. Formation, Habitability, and Detection of Extrasolar Moons. *Astrobiology*, **14**(9), 798–835.
- Heller, René, Hippke, Michael, and Kervella, Pierre. 2017. Optimized Trajectories to the Nearest Stars Using Lightweight High-velocity Photon Sails. *The Astronomical Journal*, **154**(3), 115.
- Helliwell, J. F., and Putnam, R. D. 2004. The Social Context of Well-Being. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **359**(1449), 1435–1446.
- Hennebelle, P., and Ciardi, A. 2009. Disk Formation During Collapse of Magnetized Protostellar Cores. *A&A*, **506**(2), L29–L32.
- Herman, Louis M., Richards, Douglas G., and Wolz, James P. 1984. Comprehension of Sentences by Bottlenosed Dolphins. *Cognition*, **16**(2), 129–219.
- Herzing, D L, and Johnson, C M. 2015. *Dolphin Communication and Cognition: Past, Present, and Future*. MIT Press.
- Hilbert, Martin, and López, Priscila. 2011. The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. *Science (New York, N.Y.)*, **332**(6025), 60–5.
- Hippke, Michael. 2018. Spaceflight from Super-Earths Is Difficult. *IJA*, Apr, in press.

- Hippke, Michael, and Forgan, Duncan H. 2017. Interstellar Communication. VI. Searching X-ray Spectra for Narrowband Communication. *eprint arXiv:1712.06639*, dec.
- Hirata, K., Kajita, T., Koshiba, M., Nakahata, M., Oyama, Y., Sato, N., Suzuki, A., Takita, M., Totsuka, Y., Kifune, T., Suda, T., Takahashi, K., Tanimori, T., Miyano, K., Yamada, M., Beier, E. W., Feldscher, L. R., Kim, S. B., Mann, A. K., Newcomer, F. M., Van, R., Zhang, W., and Cortez, B. G. 1987. Observation of a Neutrino Burst from the Supernova SN1987A. *Physical Review Letters*, **58**(14), 1490–1493.
- Hobaiter, Catherine, and Byrne, Richard W. 2011. The Gestural Repertoire of the Wild Chimpanzee. *Animal Cognition*, **14**(5), 745–767.
- Horner, J., and Jones, B. W. 2008a. Jupiter – Friend or Foe? I: The Asteroids. *International Journal of Astrobiology*, **7**(3–4), 251.
- Horner, J., and Jones, B. W. 2008b. Jupiter – Friend or Foe? II: The Centaurs. *International Journal of Astrobiology*, **8**(02), 75.
- Horner, J., Jones, B. W., and Chambers, J. 2010. Jupiter – Friend or Foe? III: The Oort Cloud Comets. *International Journal of Astrobiology*, **9**(01), 1.
- Horvath, P., and Barrangou, R. 2010. CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archaea. *Science*, **327**(5962), 167–170.
- Howard, Andrew, Horowitz, Paul, Mead, Curtis, Sreetharan, Pratheev, Gallicchio, Jason, Howard, Steve, Coldwell, Charles, Zajac, Joe, and Sliski, Alan. 2007. Initial Results from Harvard All-Sky Optical SETI. *Acta Astronautica*, **61**(1–6), 78–87.
- Howard, Andrew W., Horowitz, Paul, Wilkinson, David T., Coldwell, Charles M., Groth, Edward J., Jarosik, Norm, Latham, David W., Stefanik, Robert P., Willman, Jr., Alexander J., Wolff, Jonathan, and Zajac, Joseph M. 2004. Search for Nanosecond Optical Pulses from Nearby Solar-Type Stars. *ApJ*, **613**(2), 1270–1284.
- Hring, Nadine, and Rix, Hans-Walter. 2004. On the Black Hole Mass-Bulge Mass Relation. *The Astrophysical Journal*, **604**(2), L89–L92.
- Huang, Su-Shu. 1959. The Problem of Life in the Universe and the Mode of Star Formation. *PASP*, **71**(oct), 421.
- Hulse, R. A., 1994. The Discovery of the Binary Pulsar. *Bulletin of the Astronomical Society*, **26**, 971–972.
- Hunt, B. G. 1979. The Effects of Past Variations of the Earth’s Rotation Rate on Climate. *Nature*, **281**(5728), 188–191.
- Huybers, Peter. 2007. Glacial Variability over the Last Two Million Years: an Extended Depth-Derived Agemodel, Continuous Obliquity Pacing, and the Pleistocene Progression. *Quaternary Science Reviews*, **26**(1–2), 37–55.
- Huybers, Peter, and Wunsch, Carl. 2004. A Depth-Derived Pleistocene Age Model: Uncertainty Estimates, Sedimentation Variability, and Nonlinear Climate Change. *Paleoceanography*, **19**(1), n/a–n/a.
- IceCube. 2017. Search for Astrophysical Sources of Neutrinos Using Cascade Events in IceCube. *The Astrophysical Journal*, **846**(2), 136.
- Ida, S., Guillot, T., and Morbidelli, A. 2016. The Radial Dependence of Pebble Accretion Rates: A Source of Diversity in Planetary Systems. *Astronomy & Astrophysics*, **591**(jul), A72.
- IEA. 2014. *2014 Key World Energy Statistics*. Tech. rept. International Energy Agency.
- IPCC. 2013. *Climate Change 2013: The Physical Science Basis*. Tech. rept. IPCC.
- Isaacson, Howard, Siemion, Andrew P. V., Marcy, Geoffrey W., Lebofsky, Matt, Price, Danny C., MacMahon, David, Croft, Steve, DeBoer, David, Hickish, Jack, Werthimer, Dan, Sheikh, Sofia, Hellbourg, Greg, and Enriquez, J. Emilio. 2017. The

- Breakthrough Listen Search for Intelligent Life: Target Selection of Nearby Stars and Galaxies. *eprint arXiv:1701.06227*, jan.
- Ishino, Y., Shinagawa, H., Makino, K., Amemura, M., and Nakata, A. 1987. Nucleotide Sequence of the iap Gene, Responsible for Alkaline Phosphatase Isozyme Conversion in *Escherichia Coli*, and Identification of the Gene Product. *Journal of Bacteriology*, **169**(12), 5429–5433.
- Jacobson, S. A., and Morbidelli, A. 2014. Lunar and Terrestrial Planet Formation in the Grand Tack Scenario. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, **372**(2024), 20130174–20130174.
- James, S.R. 1989. Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the Evidence. *Current Anthropology*, **30**, 1–26.
- Janik, Vincent M. 2009. Chapter 4 Acoustic Communication in Delphinids. *Advances in the Study of Behavior*, **40**, 123–157.
- Javaux, Emmanuelle J. 2007. Eukaryotic Membranes and Cytoskeleton: Origins and Evolution. Chap. The Early, pages 1–19 of: *The Early Eukaryotic Fossil Record*. New York, NY: Springer New York.
- Jerison, Harry J. 1973. *Evolution of the Brain and Intelligence*. 1st edn. New York: Academic Press Inc.
- Jewitt, David. 2000. Astronomy: Eyes Wide Shut. *Nature*, **403**(6766), 145–148.
- Jiménez-Torres, Juan J., Pichardo, Bárbara, Lake, George, and Segura, Antígona. 2013. Habitability in Different Milky Way Stellar Environments: A Stellar Interaction Dynamical Approach. *Astrobiology*, **13**(5), 491–509.
- Johansen, Anders, Oishi, Jeffrey S., Low, Mordecai-Mark Mac, Klahr, Hubert, Henning, Thomas, and Youdin, Andrew. 2007. Rapid Planetesimal Formation in Turbulent Circumstellar Disks. *Nature*, **448**(7157), 1022–1025.
- Johnson, N. L., Office, O. D. P., and Cemter, N. J. S. 2008. *History of On-Orbit Satellite Fragmentations (14th Edition)*. Books Express Publishing.
- Jones, Andrew, and Straub, Jeremy. 2017. Concepts for 3D Printing-Based SelfReplicating Robot Command and Coordination Techniques. *Machines*, **5**(2), 12.
- Jones, Eric M. 1985. ‘Where Is Everybody?’ *An Account of Fermi’s Question*. Tech. rept. Los Alamos National Laboratory.
- Jones, Rhys, Haufe, Patrick, Sells, Edward, Iravani, Pejman, Olliver, Vik, Palmer, Chris, and Bowyer, Adrian. 2011. RepRap – the Replicating Rapid Prototyper. *Robotica*, **29**(01), 177–191.
- Joordens, Josephine C. A., D’Errico, Francesco, Wesselingh, Frank P., Munro, Stephen, de Vos, John, Wallinga, Jakob, Ankjærgaard, Christina, Reimann, Tony, Wijbrans, Jan R., Kuiper, Klaudia F., Múcher, Herman J., Coqueugniot, Hélène, Prié, Vincent, Joosten, Ineke, van Os, Bertil, Schulp, Anne S., Panuel, Michel, van der Haas, Victoria, Lustenhouwer, Wim, Reijmer, John J. G., and Roebroeks, Wil. 2014. Homo Erectus at Trinil on Java Used Shells for Tool Production and Engraving. *Nature*, **518**(7538), 228–231.
- Jorda, L., Gaskell, R., Capanna, C., Hviid, S., Lamy, P., Durech, J., Faury, G., Groussin, O., Gutiérrez, P., Jackman, C., Keilm, S.J., Keller, H. U., Knollenberg, J., Kührt, E., Marchi, S., Mottola, S., Palmer, E., Schloerb, F. P., Sierks, H., Vincent, J.-B., A’Hearn, M. F., Barbieri, C., Rodrigo, R., Koschny, D., Rickman, H., Barucci, M. A., Bertaux, J. L., Bertini, I., Cremonese, G., Da Deppo, V., Davidsson, B., Debei, S., De Cecco, M., Fornasier, S., Fulle, M., Güttler, C., Ip, W.-H., Kramm, J. R.,

- Küppers, M., Lara, L. M., Lazzarin, M., Lopez Moreno, J. J., Marzari, F., Naletto, G., Oklay, N., Thomas, N., Tubiana, C., and Wenzel, K.-P. 2016. The Global Shape, Density and Rotation of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko from preperihelion Rosetta/OSIRIS Observations. *Icarus*, **277**(oct), 257–278.
- Jortner, Joshua. 2006. Conditions for the Emergence of Life on the Early Earth: Summary and Reflections. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, **361**(1474), 1877–91.
- Kaiser, Brent N., Gridley, Kate L., Ngaire Brady, Joanne, Phillips, Thomas, and Tyerman, Stephen D. 2005. The Role of Molybdenum in Agricultural Plant Production. *Annals of Botany*, **96**(5), 745–754.
- Kanas, Nick. 2015. *Humans in Space*. Cham: Springer International Publishing.
- Kardashev, N. S. 1964. Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations. *Soviet Astronomy*, **8**, 217–221.
- Kasting, James F. 1988. Runaway and Moist Greenhouse Atmospheres and the Evolution of Earth and Venus. *Icarus*, **74**(3), 472–494.
- Kasting, J. F., Whitmire, D. P., and Reynolds, R. T. 1993. Habitable Zones around Main Sequence Stars. *Icarus*, **101**(1), 108–128.
- Keeling, Patrick J., and Palmer, Jeffrey D. 2008. Horizontal Gene Transfer in Eukaryotic Evolution. *Nature Reviews Genetics*, **9**(8), 605–618.
- Kennett, D. J., and Winterhalder, B. 2006. *Behavioral Ecology and the Transition to Agriculture*. Origins of Human Behavior and Culture. University of California Press.
- Kerfeld, C. A. 2005. Protein Structures Forming the Shell of Primitive Bacterial Organelles. *Science*, **309**(5736), 936–938.
- Kessler, Donald J., and Cour-Palais, Burton G. 1978. Collision Frequency of Artificial Satellites: The Creation of a Debris Belt. *Journal of Geophysical Research*, **83**(A6), 2637.
- Khodachenko, Maxim L., Ribas, Ignasi, Lammer, Helmut, Grießmeier, Jean-Mathias, Leitner, Martin, Selsis, Franck, Eiroa, Carlos, Hanslmeier, Arnold, Biernat, Helfried K., Farrugia, Charles J., and Rucker, Helmut O. 2007. Coronal Mass Ejection (CME) Activity of Low Mass M Stars as An Important Factor for The Habitability of Terrestrial Exoplanets. I. CME Impact on Expected Magnetospheres of Earth-Like Exoplanets in Close-In Habitable Zones. *Astrobiology*, **7**(1), 167–184.
- Kiefer, Flavien, des Etangs, Alain Lecavelier, Vidal-Madjar, Alfred, Hébrard, Guillaume, Bourrier, Vincent, and Wilson, Paul-Anthony. 2017. Detection of a Repeated Transit Signature in the Light Curve of the Enigma Star KIC 8462852: a 928-day period? *arXiv e-print 1709.01732*, sep.
- King, S. L., Sayigh, L. S., Wells, R. S., Fellner, W., and Janik, V. M. 2013. Vocal Copying of Individually Distinctive Signature Whistles in Bottlenose Dolphins. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **280**(1757), 20130053–20130053.
- Kipping, D. M., Bakos, G. Á., Buchhave, L., Nesvorný, D., and Schmitt, A. 2012. The Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) I. Description of a New Observational Project. *ApJ*, **750**(2), 115.
- Kipping, David M. 2009a. Transit Timing Effects Due to an Exomoon. *MNRAS*, **392**(1), 181–189.
- 2009b. Transit Timing Effects Due to an Exomoon - II. *MNRAS*, **396**(3), 1797–1804.
- Kipping, David M., and Teachey, Alex. 2016. A Cloaking Device for Transiting Planets. *MNRAS*, **459**(2), 1233–1241.

- Kipping, David M., Forgan, Duncan, Hartman, Joel, Nesvorný, D., Bakos, Gáspár Á., Schmitt, A., and Buchhave, L. 2013. The Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) III. The First Search for an Exomoon around a Habitable-Zone Planet. *ApJ*, **777**(2), 134.
- Kislev, Mordechai E, Hartmann, Anat, and Bar-Yosef, Ofer. 2006. Early Domesticated Fig in the Jordan Valley. *Science*, **312**(5778), 1372–1374.
- Kleiber, Max. 1932. Body Size and Metabolism. *Hilgardia*, **6**(11), 315–353.
- Klein, R G. 2009. *The Human Career: Human Biological and Cultural Origins, Third Edition*. University of Chicago Press.
- Kluyver, Thomas A., Jones, Glynis, Pujol, Benoît, Bennett, Christopher, Mockford, Emily J., Charles, Michael, Rees, Mark, and Osborne, Colin P. 2017. Unconscious Selection Drove Seed Enlargement in Vegetable Crops. *Evolution Letters*, **1**(2), 64–72.
- Kohonen, Teuvo. 1982. Self-Organized Formation of Topologically Correct Feature Maps. *Biological Cybernetics*, **43**(1), 59–69.
- Kokubo, Eiichiro, and Ida, Shigeru. 1998. Oligarchic Growth of Protoplanets. *Icarus*, **131**(1), 171–178.
- Kolbert, Elizabeth. 2014. *The Sixth Extinction: an Unnatural History*. 1st edn. New York: Henry Holt and Company, 2014.
- Kono, Masaru, and Roberts, Paul H. 2002. Recent Geodynamo Simulations and Observations of the Geomagnetic Field. *Reviews of Geophysics*, **40**(4), 1013.
- Kopparapu, Ravi K., Ramirez, Ramses M., SchottelKotte, James, Kasting, James F., Domagal-Goldman, Shawn, and Eymet, Vincent. 2014. Habitable Zones around Main-Sequence Stars: Dependence on Planetary Mass. *ApJ*, **787**, L29.
- Kopparapu, Ravi Kumar, Ramirez, Ramses, Kasting, James F., Eymet, Vincent, Robinson, Tyler D., Mahadevan, Suvrath, Terrien, Ryan C., Domagal-Goldman, Shawn, Meadows, Victoria, and Deshpande, Rohit. 2013. Habitable Zones around Main Sequence Stars: New Estimates. *ApJ*, **765**(2), 131.
- Korenaga, Jun. 2010. On the Likelihood of Plate Tectonics on Super-Earths: Does Size Matter? *The Astrophysical Journal*, **725**(1), L43–L46.
- Korpela, Eric J., Sallmen, Shauna M., and Greene, Diana Leystra. 2015. Modeling Indications of Technology in Planetary Transit Light Curves – Dark Side Illumination. *ApJ*, **809**(2), 139.
- Korycansky, D. G., and Asphaug, Erik. 2006. Low-Speed Impacts Between Rubble Piles Modeled as Collections of Polyhedra. *Icarus*, **181**(2), 605–617.
- Koshland Jr., D. E. 2002. Special Essay: The Seven Pillars of Life. *Science*, **295**(5563), 2215–2216.
- Kozmik, Zbynek, Ruzickova, Jana, Jonasova, Kristyna, Matsumoto, Yoshifumi, Vopalensky, Pavel, Kozmikova, Iryna, Strnad, Hynek, Kawamura, Shoji, Piatigorsky, Joram, Paces, Vaclav, and Vlcek, Cestmir. 2008. Assembly of the Cnidarian Camera-Type Eye from Vertebrate-like Components. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **105**(26), 8989–8993.
- Krissansen-Totton, Joshua, Olson, Stephanie, and Catling, David C. 2018. Disequilibrium Biosignatures over Earth History and Implications for Detecting Exoplanet Life. *Science Advances*, **4**(1), eaao5747.
- Krolik, J. H. 1999. *Active Galactic Nuclei*. 3rd edn. Princeton: Princeton University Press.
- Kump, Lee, Bralower, Timothy, and Ridgwell, Andy. 2009. Ocean Acidification in Deep Time. *Oceanography*, **22**(4), 94–107.
- Laakso, T., Rantala, J., and Kaasalainen, M. 2006. Gravitational Scattering by Giant Planets. *Astronomy and Astrophysics*, **456**(1), 373–378.

- Lacki, Brian C. 2015. SETI at Planck Energy: When Particle Physicists Become Cosmic Engineers. *ArXiv e-prints*, mar.
- Lacy, J. H., Townes, C. H., Geballe, T. R., and Hollenbach, D. J. 1980. Observations of the Motion and Distribution of the Ionized Gas in the Central Parsec of the Galaxy. II. *The Astrophysical Journal*, **241**(oct), 132.
- Lacy, J. H., Evans, Neal J., II, Achtermann, J. M., Bruce, D. E., Arens, J. F., and Carr, J. S. 1989. Discovery of Interstellar Acetylene. *The Astrophysical Journal*, **342**(Jul), L43.
- Lambrechts, M., and Johansen, A. 2012. Rapid Growth of Gas-Giant Cores by Pebble Accretion. *A&A*, **544**(Jul), A32.
- Landauer, R. 1961. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development*, **5**(3), 183–191.
- Landenmark, Hanna K. E., Forgan, Duncan H., and Cockell, Charles S. 2015. An Estimate of the Total DNA in the Biosphere. *PLOS Biology*, **13**(6), e1002168.
- Landis, G. A. 1998. The Fermi Paradox: An Approach Based on Percolation Theory. *Journal of the British Interplanetary Society*, **51**.
- Larmor, J. 1919. Possible Rotational Origin of Magnetic Fields of Sun and Earth. *Electrical Review*, **85**, 412.
- Laskar, J., and Robutel, P. 1993. The Chaotic Obliquity of the Planets. *Nature*, **361**(6413), 608–612.
- Latham, Katherine J. 2013. Human Health and the Neolithic Revolution: An Overview of Impacts of the Agricultural Transition on Oral Health, Epidemiology, and the Human Body. *Nebraska Anthropologist*, **28**, 95–102.
- Learned, J. G., Pakvasa, S., and Zee, A. 2009. Galactic Neutrino Communication. *Physics Letters B*, **671**(jan), 15–19.
- Lederberg, J. 1965. Signs of Life. Criterion-System of Exobiology. *Nature*, **207**(992), 9–13.
- Leinhardt, Z., and Richardson, D. 2002. N-Body Simulations of Planetesimal Evolution: Effect of Varying Impactor Mass Ratio. *Icarus*, **159**(2), 306–313.
- Letunic, Ivica, and Bork, Peer. 2016. Interactive Tree of Life (iTOL) v3: An Online Tool for the Display and Annotation of Phylogenetic and Other Trees. *Nucleic Acids Research*, **44**(W1), W242–W245.
- Li, Di, and Pan, Zhichen. 2016. The Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope Project. *Radio Science*, **51**(7), 1060–1064.
- Lilly, John C. 1962. Vocal Behavior of the Dolphin. *Proceedings of the American Philosophical Society*, **106**(6), 520–529.
- Lin, Douglas N. C., and Pringle, John E. 1990. The Formation and Initial Evolution of Protostellar Disks. *ApJ*, **358**(aug), 515.
- Lin, Henry W., Abad, Gonzalo Gonzalez, and Loeb, Abraham. 2014. Detecting Industrial Pollution in the Atmospheres of Earth-like Exoplanets. *ApJ*, **792**(1), L7.
- Lineweaver, C. 2001. An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect. *Icarus*, **151**(2), 307–313.
- Lineweaver, Charles H., Fenner, Yeshe, and Gibson, Brad K. 2004. The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way. *Science*, **303**(5654), 59–62.
- Lingam, Manasvi, and Loeb, Abraham. 2017. Fast Radio Bursts from Extragalactic Light Sails. *The Astrophysical Journal*, **837**(2), L23.

- Lissauer, Jack J., Barnes, Jason W., and Chambers, John E. 2012. Obliquity Variations of a Moonless Earth. *Icarus*, **217**(1), 77–87.
- Lloyd, Seth. 2000. Ultimate Physical Limits to Computation. *Nature*, **406**(6799), 1047–1054.
- Loeb, Abraham, and Turner, Edwin L. 2012. Detection Technique for Artificially Illuminated Objects in the Outer Solar System and Beyond. *Astrobiology*, **12**(4), 290–4.
- Loeb, Abraham, and Zaldarriaga, Matias. 2007. Eavesdropping on Radio Broadcasts from Galactic Civilizations with Upcoming Observatories for Redshifted 21 cm Radiation. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, **1**, 020–020.
- Lomb, N. R. 1976. Least-Squares Frequency Analysis of Unequally Spaced Data. *Astrophysics and Space Science*, **39**(2), 447–462.
- López-Morales, Mercedes, Gómez-Pérez, Natalia, and Ruedas, Thomas. 2011. Magnetic Fields in Earth-like Exoplanets and Implications for Habitability around M-dwarfs. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, **41**(6), 533–537.
- Lorimer, D. R., Bailes, M., McLaughlin, M. A., Narkevic, D. J., and Crawford, F. 2007. A Bright Millisecond Radio Burst of Extragalactic Origin. *Science*, **318**(5851), 777–780.
- Lovelock, J. E. 1965. A Physical Basis for Life Detection Experiments. *Nature*, **207**(4997), 568–570.
- Lovelock, J. E., and Kaplan, I. R. 1975. Thermodynamics and the Recognition of Alien Biospheres [and Discussion]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **189**(1095), 167–181.
- Lubin, Philip. 2016. A Roadmap to Interstellar Flight. *JBIS*, **69**(Apr), 40–72.
- Lubin, Philip, and Hughes, Gary B. 2015. Directed Energy for Planetary Defense. Pages 941–991 of: Pelton, Joseph N, and Allahdadi, Firooz (eds), *Handbook of Cosmic Hazards and Planetary Defense*. Cham: Springer International Publishing.
- Lutz, Christian, and Giljum, Stefan. 2009. Global Resource Use in a Business-as-Usual World up to 2030: Updated Results from the GINFORS Model. Pages 30–41 of: *Sustainable Growth and Resource Productivity: Economic and Global Policy Issues*. Greenleaf Publishing Limited.
- Lyra, W., Johansen, A., Zsom, A., Klahr, H., and Piskunov, N. 2009. Planet Formation Bursts at the Borders of the Dead Zone in 2D Numerical Simulations of Circumstellar Disks. *A&A*, **497**(3), 869–888.
- MacArthur, Robert H., and Wilson, Edward O. 2016. *The Theory of Island Biogeography*. Princeton University Press.
- Maccone, Claudio. 2010. The Statistical Drake Equation. *Acta Astronautica*, **67**(11-12), 1366–1383.
2012. *Mathematical SETI*. 2012 edn. Springer.
- Maiman, T. 1960. Stimulated Emission in Ruby. *Nature*, **187**, 493–494.
- Males, Jared R., Close, Laird M., Guyon, Olivier, Morzinski, Katie, Puglisi, Alfio, Hinz, Philip, Follette, Katherine B., Monnier, John D., Tolls, Volker, Rodigas, Timothy J., Weinberger, Alycia, Boss, Alan, Kopon, Derek, Wu, Ya-lin, Esposito, Simone, Riccardi, Armando, Xompero, Marco, Briguglio, Runa, and Pinna, Enrico. 2014 (Jul). Direct Imaging of Exoplanets in the Habitable Zone with Adaptive Optics. Page 914820 of: Marchetti, Enrico, Close, Laird M., and Véran, Jean-Pierre (eds.), *Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series*, vol. 9148.

- Malmberg, Daniel, Davies, Melvyn B., and Heggie, Douglas C. 2011. The Effects of FlyBys on Planetary Systems. *MNRAS*, **411**(2), 859–877.
- Mamajek, Eric E., Barenfeld, Scott A., Ivanov, Valentin D., Kniazev, Alexei Y., Väisänen, Petri, Beletsky, Yuri, and Boffin, Henri M. J. 2015. The Closest Known Flyby of a Star to the Solar System. *ApJ*, **800**(1), L17.
- Manchester, Zachary, and Loeb, Abraham. 2017. Stability of a Light Sail Riding on a Laser Beam. *The Astrophysical Journal Letters*, **837**(2), L20.
- Maoz, Dan, and Mannucci, Filippo. 2012. Type-Ia Supernova Rates and the Progenitor Problem: A Review. *PASA*, **29**(04), 447–465.
- Marmur, Abraham. 2004. The Lotus Effect: Superhydrophobicity and Metastability. *Langmuir*, **20**(9), 3517–3519.
- Marois, Christian, Macintosh, Bruce, Barman, Travis, Zuckerman, B., Song, Inseok, Patience, Jennifer, Lafrenière, David, and Doyon, René. 2008. Direct Imaging of Multiple Planets Orbiting the Star HR 8799. *Science*, **322**(5906), 1348–52.
- Martinelli, D. 2010. *A Critical Companion to Zoosemiotics: People, Paths, Ideas*. Biosemiotics. Springer Netherlands.
- Martínez-Barbosa, C. A., Jílková, L., Portegies Zwart, S., and Brown, A. G. A. 2017. The Rate of Stellar Encounters Along a Migrating Orbit of the Sun. *MNRAS*, **464**(2), 2290–2300.
- Marx, G. 1966. Interstellar Vehicle Propelled by Terrestrial Laser Beam. *Nature*, **211**(5044), 22–23.
- Matloff, G. L. 2006. *Deep Space Probes: To the Outer Solar System and Beyond*. 2nd edn. Springer Science & Business Media.
- Maury, A. J., André, Ph., Hennebelle, P., Motte, F., Stamatellos, D., Bate, M., Belloche, A., Duchêne, G., and Whitworth, A. 2010. Toward Understanding the Formation of Multiple Systems. *A&A*, **512**(Mar), A40.
- Mayr, E. 1995. The SETI Debate: A Critique of the Search for Extraterrestrial Intelligence. *Bioastronomy News*, **7**, 3.
- Mayr, Ernst. 1993. The Search for Intelligence. *Science*, **259**(5101), 1522–1523.
- McCarthy, John. 1960. *Programs with Common Sense*. RLE and MIT Computation Center.
- McInnes, Colin R., and Brown, John C. 1990. The Dynamics of Solar Sails with a NonPoint Source of Radiation Pressure. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, **49**(3), 249–264.
- McKay, Chris P. 2004. What Is Life – and How Do We Search for It in Other Worlds? *PLoS Biology*, **2**(9), e302.
- McKee, Christopher F., and Ostriker, Eve C. 2007. Theory of Star Formation. *ARA&A*, **45**(1), 565–687.
- McNamara, K. J. 2010. *The Star-Crossed Stone: The Secret Life, Myths, and History of a Fascinating Fossil*. Chicago: University of Chicago Press.
- Meadows, Victoria S., Reinhard, Christopher T., Arney, Giada N., Parenteau, Mary N., Schwieterman, Edward W., Domagal-Goldman, Shawn D., Lincowski, Andrew P., Stapelfeldt, Karl R., Rauer, Heike, DasSarma, Shiladitya, Hegde, Siddharth, Narita, Norio, Deitrick, Russell, Lyons, Timothy W., Siegler, Nicholas, and Lustig-Yaeger, Jacob. 2017. Exoplanet Biosignatures: Understanding Oxygen as a Biosignature in the Context of Its Environment. may.
- Mehrabian, A. 2017. *Nonverbal Communication*. Taylor & Francis.

- Mejia, Annie C., Durisen, R.H., Pickett, Megan K., and Cai, Kai. 2005. The Thermal Regulation of Gravitational Instabilities in Protoplanetary Disks. II. Extended Simulations with Varied Cooling Rates. *ApJ*, **619**(2), 1098–1113.
- Melott, A. L., Thomas, B. C., Kachelrieß, M., Semikoz, D. V., and Overholt, A. C. 2017. A Supernova at 50 pc: Effects on the Earth's Atmosphere and Biota. *ApJ*, **840**(2), 105.
- Melott, Adrian L., and Thomas, Brian C. 2009. Late Ordovician Geographic Patterns of Extinction Compared with Simulations of Astrophysical Ionizing Radiation Damage. *Paleobiology*, **35**(03), 311–320.
2011. Astrophysical Ionizing Radiation and Earth: A Brief Review and Census of Intermittent Intense Sources. *Astrobiology*, **11**(4), 343–361.
- Merrill, R. T., McElhinny, M. W., and McFadden, P. L. 1996. *The Magnetic Field of the Earth: Paleomagnetism, the Core, and the Deep Mantle*. International geophysics series. Academic Press.
- Messerschmitt, David G. 2013. End-to-End Interstellar Communication System Design for Power Efficiency. *Arxiv e-prints 1305.4684*, May.
2015. Design for Minimum Energy in Interstellar Communication. *Acta Astronautica*, **107**(Feb), 20–39.
- Mikhail, Sami, and Heap, Michael J. 2017. Hot Climate Inhibits Volcanism on Venus: Constraints from Rock Deformation Experiments and Argon Isotope Geochemistry. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, **268**(Jul), 18–34.
- Milankovitch, Milutin. 1941. *Canon of Insolation and the Ice Age Problem*. Belgrade: Royal Serbian Academy.
- Miller, S. L. 1953. A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. *Science*, **117**(3046), 528–529.
- Millman, Peter M. 1975. Seven Maxims of UFOs – A Scientific Approach. *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada*, **69**, 175–188.
- Mironova, Irina A., Aplin, Karen L., Arnold, Frank, Bazilevskaya, Galina A., Harrison, R. Giles, Krivolutsky, Alexei A., Nicoll, Keri A., Rozanov, Eugene V., Turunen, Esa, and Usoskin, Ilya G. 2015. Energetic Particle Influence on the Earth's Atmosphere. *Space Science Reviews*, **194**(1), 1–96.
- Mithen, S. 2011. *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body*. Orion.
- Mojzsis, S. J., Arrhenius, G., McKeegan, K. D., Harrison, T. M., Nutman, A. P., and Friend, C. R. L. 1996. Evidence for Life on Earth before 3,800 Million Years Ago. *Nature*, **384**(6604), 55–59.
- Montet, Benjamin T., and Simon, Joshua D. 2016. KIC 8462852 Faded Throughout the Kepler Mission. *The Astrophysical Journal*, **830**(2), L39.
- Morbidelli, Alessandro. 2005. Origin and Dynamical Evolution of Comets and their Reservoirs. *35th Saas-Fee Advanced Course, available as arXiv e-print 0512256*, Dec.
- Morgan, D. L. 1982. Concepts for the Design of an Antimatter Annihilation Rocket. *JBIS*, **35**, 405–413.
- Morrison, Philip, Billingham, John, and Wolfe, John. 1977. The Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. *The Search for Extraterrestrial Intelligence*.
- Mortier, A., Faria, J. P., Correia, C. M., Santerne, A., and Santos, N. C. 2015. BGLS: A Bayesian Formalism for the Generalised Lomb-Scargle Periodogram. *A&A*, **573**(Jan), A101.

- Mosqueira, Ignacio, and Estrada, Paul R. 2003a. Formation of the Regular Satellites of Giant Planets in an Extended Gaseous Nebula I: Subnebula Model and Accretion of Satellites. *Icarus*, **163**(1), 198–231.
- 2003b. Formation of the Regular Satellites of Giant Planets in an Extended Gaseous Nebula II: Satellite Migration and Survival. *Icarus*, **163**(1), 232–255.
- Mozdzen, T. J., Bowman, J. D., Monsalve, R. A., and Rogers, A. E. E. 2017. Improved Measurement of the Spectral Index of the Diffuse Radio Background Between 90 and 190 MHz. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **464**(4), 4995–5002.
- Murray, James D. 2004. *Mathematical Biology*. Interdisciplinary Applied Mathematics, vol. 17. New York, NY: Springer New York.
- Nadell, Carey D., Xavier, Joao B., and Foster, Kevin R. 2009. The Sociobiology of Biofilms. *FEMS Microbiology Reviews*, **33**(1), 206–224.
- NASA. 2007. *Near Earth Object Survey and Deflection: Analysis of Alternatives – Report to Congress*. Tech. rept. NASA, Washington, D.C.
- Nascimbeni, V., Mallonn, M., Scandariato, G., Pagano, I., Pioletto, G., Micela, G., Messina, S., Leto, G., Strassmeier, K. G., Bisogni, S., and Speziali, R. 2015. An LBT View of the Atmosphere of GJ1214b. *eprint arXiv:1505.01488*.
- Nayakshin, Sergei. 2010a. Formation of Planets by Tidal Downsizing of Giant Planet Embryos. *MNRAS*, **408**(1), L36–L40.
- 2010b. Grain Sedimentation Inside Giant Planet Embryos. *MNRAS*, **408**(4), 2381–2396.
2011. Formation of Terrestrial Planet Cores Inside Giant Planet Embryos. *MNRAS*, **413**(2), 1462–1478.
- Neuenschwander, Ben, and Melott, Adrian. 2015. Nitrate Deposition Following an Astrophysical Ionizing Radiation Event. *Advances in Space Research*, **55**(12), 2946–2949.
- Newman, William I., and Sagan, Carl. 1981. Galactic Civilizations: Population Dynamics and Interstellar Diffusion. *Icarus*, **46**(3), 293–327.
- Nicholson, Arwen, and Forgan, Duncan. 2013. Slingshot Dynamics for Self-Replicating Probes and the Effect on Exploration Timescales. *International Journal of Astrobiology*, **12**(04), 337–344.
- NOAA, NASA, UNEP, WMO, and EC. 2010. *Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010*. Tech. rept. World Meteorological Organisation.
- Noack, Lena, and Breuer, Doris. 2014. Plate Tectonics on Rocky Exoplanets: Influence of Initial Conditions and Mantle Rheology. *Planetary and Space Science*, **98**(aug), 41–49.
- Norris, R.S., and Arkin, W.M. 1996. Known Nuclear Tests Worldwide, 1945–1995. *The Bulletin of the Atomic Scientists*, Volume 52, Issue 3, May, 61–63.
- Nowak, Martin A., Tarnita, Corina E., and Wilson, Edward O. 2010. The Evolution of Eusociality. *Nature*, **466**(7310), 1057–1062.
- O’Brien, David P., Walsh, Kevin J., Morbidelli, Alessandro, Raymond, Sean N., and Mandell, Avi M. 2014. Water Delivery and Giant Impacts in the ‘Grand Tack’ Scenario. *Icarus*, **239**(Sep), 74–84.
- Ochman, Howard, Lawrence, Jeffrey G., and Groisman, Eduardo A. 2000. Lateral Gene Transfer and the Nature of Bacterial Innovation. *Nature*, **405**(6784), 299–304.
- Odenwald, Sten F., and Green, James L. 2007. Forecasting the Impact of an 1859-Caliber Superstorm on Geosynchronous Earth-Orbiting Satellites: Transponder Resources. *Space Weather*, **5**(6), S06002.

- Olum, Ken D. 2000. The Doomsday Argument and the Number of Possible Observers. *arXiv e-print 0009081*, Sep, 18.
- O'Malley-James, Jack T., Greaves, Jane S., Raven, John A., and Cockell, Charles S. 2013. Swansong Biospheres: Refuges for Life and Novel Microbial Biospheres on Terrestrial Planets Near the End of Their Habitable Lifetimes. *International Journal of Astrobiology*, **12**(02), 99–112.
- O'Malley-James, Jack T., Cockell, Charles S., Greaves, Jane S., and Raven, John A. 2014. Swansong Biospheres II: The Final Signs of Life on Terrestrial Planets Near the End of Their Habitable Lifetimes. *International Journal of Astrobiology*, **13**(03), 229–243.
- Omarov, T. B. 1962. On Differential Equations for Oscillating Elements in the Theory of Variable Mass Movement [in Russian]. *Izv. Astrofiz. Inst. Acad. Nauk. KazSSR*, **14**, 66–71.
- O'Neill, C., and Lenardic, A. 2007. Geological Consequences of Super-Sized Earths. *Geophysical Research Letters*, **34**(19), L19204.
- O'Neill, Craig, Lenardic, Adrian, Weller, Matthew, Moresi, Louis, Quenette, Steve, and Zhang, Siqi. 2016. A Window for Plate Tectonics in Terrestrial Planet Evolution? *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, **255**(Jun), 80–92.
- O'Neill, Gerard K. 1974. The Colonization of Space. *Physics Today*, **27**(9), 32–40.
1977. *The High Frontier: Human Colonies in Space*. William Morrow.
- Oort, J. H. 1950. The Structure of the Cloud of Comets Surrounding the Solar System and a Hypothesis Concerning its Origin. *Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands*, **11**, 91–110.
- O'Regan, Gerard. 2016. *Introduction to the History of Computing*. Undergraduate Topics in Computer Science. Cham: Springer International Publishing.
- Orgel, Leslie E. 1973. *The Origins of Life: Molecules and Natural Selection*. Wiley.
- Osmanov, Z. 2018. Are the Dyson Rings Around Pulsars Detectable? *International Journal of Astrobiology*, **17**(02), 112–115.
- Paczynski, B. 1978. A Model of Self-Gravitating Accretion Disk. *Acta Astronomica*, **28**, 91–109.
- Paluszek, Michael, and Thomas, Stephanie. 2017. *MATLAB Machine Learning*. Berkeley, CA: Apress.
- Pan, Zhijian. 2007. *Artificial Evolution of Arbitrary Self-Replicating Cellular Automata*. Ph.D. thesis.
- Papagiannis, Michael D. 1978. Are We All Alone, or Could They Be in the Asteroid Belt? *QJRAS*, **19**.
- Parfrey, Laura Wegener, and Lahr, Daniel J. G. 2013. Multicellularity Arose Several Times in the Evolution of Eukaryotes (Response to DOI 10.1002/bies.201100187). *BioEssays*, **35**(4), 339–347.
- Parker, Eugene N. 1955. Hydromagnetic Dynamo Models. *ApJ*, **122**(Sep), 293.
- Patel, Bhavesh H., Percivalle, Claudia, Ritson, Dougal J., Duffy, Colm D., and Sutherland, John D. 2015. Common Origins of RNA, Protein and Lipid Precursors in a Cyanosulfidic Protometabolism. *Nature Chemistry*, **7**(4), 301–307.
- Patruno, A., and Kama, M. 2017. Neutron Star Planets: Atmospheric Processes and Irradiation. *Astronomy & Astrophysics*, **608**(Dec), A147.
- Patterson, F. G. 1981. Ape Language. *Science*, **211**(4477), 86–87.
1978. The Gestures of a Gorilla: Language Acquisition in Another Pongid. *Brain and Language*, **5**(1), 72–97.

- Pavlov, Alexander A. 2005a. Catastrophic Ozone Loss During Passage of the Solar System Through an Interstellar Cloud. *Geophysical Research Letters*, **32**(1), L01815.
- 2005b. Passing Through a Giant Molecular Cloud: ‘Snowball’ Glaciations Produced by Interstellar Dust. *Geophysical Research Letters*, **32**(3), L03705.
- Penny, Alan John. 2013. The SETI Episode in the 1967 Discovery of Pulsars. *The European Physical Journal H*, Feb.
- Petroff, E., Barr, E. D., Jameson, A., Keane, E. F., Bailes, M., Kramer, M., Morello, V., Tabbara, D., and van Straten, W. 2016. FRBCAT: The Fast Radio Burst Catalogue. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, **33**(Sep), e045.
- Phoenix, C., and Drexler, E. 2004. Safe Exponential Manufacturing. *Nanotechnology*, **15**, 869–872.
- Pinker, Steven. 1999. How the Mind Works. *Annals of the New York Academy of Sciences*, **882**(1), 119–127.
- Pinker, Steven, and Jackendoff, Ray. 2005. The Faculty of Language: What’s Special About It? *Cognition*, **95**(2), 201–236.
- Piran, Tsvi, and Jimenez, Raul. 2014. Possible Role of Gamma Ray Bursts on Life Extinction in the Universe. *Physical Review Letters*, **113**(23), 231102.
- Power, C. 1998. Old Wives’ Tales: the Gossip Hypothesis and the Reliability of Cheap Signals. In: *Approaches to the Evolution of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Powner, Matthew W., Gerland, Béatrice, and Sutherland, John D. 2009. Synthesis of Activated Pyrimidine Ribonucleotides in Prebiotically Plausible Conditions. *Nature*, **459**(7244), 239–242.
- Prantzos, Nikos. 2007. On the ‘Galactic Habitable Zone’. *Space Science Reviews*, **135**(1–4), 313–322.
2013. A Joint Analysis of the Drake Equation and the Fermi Paradox. *International Journal of Astrobiology*, **12**(03), 246–253.
- Price, Daniel J., and Bate, Matthew R. 2007. The Impact of Magnetic Fields on Single and Binary Star Formation. *MNRAS*, **377**(1), 77–90.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
2007. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies*, **30**(2), 137–174.
- Rabinowitz, David, Helin, Eleanor, Lawrence, Kenneth, and Pravdo, Steven. 2000. A Reduced Estimate of the Number of Kilometre-Sized Near-Earth Asteroids. *Nature*, **403**(6766), 165–166.
- Rafikov, Roman R. 2005. Can Giant Planets Form by Direct Gravitational Instability? *ApJ*, **621**(1), L69–L72.
- Raghavan, D., McMaster, H. A., Henry, T. J., Latham, D. W., Marcy, G. W., Mason, B. D., Gies, D. R., White, R. J., and ten Brummelaar, T. A. 2010. A Survey of Stellar Families: Multiplicity of Solar-Type Stars. *ApJSS*, **190**, 1–42.
- Rahvar, Sohrab. 2016. Gravitational Microlensing Events as a Target for the SETI Project. *The Astrophysical Journal*, **828**(1), 19.
- Ramankutty, Navin, and Foley, Jonathan A. 1999. Estimating Historical Changes in Global Land Cover: Croplands from 1700 to 1992. *Global Biogeochemical Cycles*, **13**(4), 997–1027.
- Rampadarath, H., Morgan, J. S., Tingay, S. J., and Trott, C. M. 2012. The First Very Long Baseline Interferometric SETI Experiment. *The Astronomical Journal*, **144**(2), 38.

- Rampino, M. 2002. Supereruptions as a Threat to Civilizations on Earth-like Planets. *Icarus*, **156**(2), 562–569.
- Raup, D. M., and Valentine, J. W. 1983. Multiple Origins of Life. *PNAS*, **80**(10), 2981–2984.
- Raup, David M., and Sepkoski, J. John. 1982. Mass Extinctions in the Marine Fossil Record. *Science*, **215**(4539), 1501–1503.
- Raymo, M. E. 1997. The Timing of Major Climate Terminations. *Paleoceanography*, **12**(4), 577–585.
- Raymond, Sean N., Kokubo, Eiichiro, Morbidelli, Alessandro, Morishima, Ryuji, and Walsh, Kevin J. 2013. Terrestrial Planet Formation at Home and Abroad. *dec*, 24.
- Rice, W. K. M., Lodato, Giuseppe, Pringle, J. E., Armitage, P. J., and Bonnell, Ian A. 2004. Accelerated Planetesimal Growth in Self-Gravitating Protoplanetary Discs. *MNRAS*, **355**(2), 543–552.
- Rice, W. K. M., Lodato, Giuseppe, and Armitage, P. J. 2005. Investigating Fragmentation Conditions in Self-Gravitating Accretion Discs. *MNRAS*, **364**(Oct), L56.
- Rice, W. K. M., Armitage, P. J., Mamatsashvili, G. R., Lodato, G., and Clarke, C. J. 2011. Stability of Self-Gravitating Discs Under Irradiation. *MNRAS*, **418**(2), 1356–1362.
- Rich, E. 1983. *Artificial Intelligence*. 2 edn. McGraw-Hill Series in Artificial Intelligence, no. Volume 1. McGraw-Hill.
- Rickman, Hans, Fouchard, Marc, Froeschlé, Christiane, and Valsecchi, Giovanni B. 2008. Injection of Oort Cloud Comets: The Fundamental Role of Stellar Perturbations. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, **102**(1–3), 111–132.
- Riles, K. 2013. Gravitational Waves: Sources, Detectors and Searches. *Progress in Particle and Nuclear Physics*, **68**(jan), 1–54.
- Robin, Eugene D. 1973. The Evolutionary Advantages of Being Stupid. *Perspectives in Biology and Medicine*, **16**(3), 369–380.
- Robock, Alan, Ammann, Caspar M., Oman, Luke, Shindell, Drew, Levis, Samuel, and Stenchikov, Georgiy. 2009. Did the Toba Volcanic Eruption of ~74 ka B.P. Produce Widespread Glaciation? *Journal of Geophysical Research*, **114**(D10), D10107.
- Roebroeks, Wil, and Villa, Paola. 2011. On the Earliest Evidence for Habitual Use of Fire in Europe. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **108**(13), 5209–14.
- Rogers, Patrick D., and Wadsley, James. 2012. The Fragmentation of Protostellar Discs: the Hill Criterion for Spiral Arms. *MNRAS*, **423**(2), 1896–1908.
- Rose, Christopher, and Wright, Gregory. 2004. Inscribed Matter as an Energy-Efficient Means of Communication with an Extraterrestrial Civilization. *Nature*, **431**(7004), 47–49.
- Rose, William I., and Chesner, Craig A. 1990. Worldwide Dispersal of Ash and Gases from Earth's Largest Known Eruption: Toba, Sumatra, 75 ka. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **89**(3), 269–275.
- Roush, Bradley Monton, and Sherri. 2001. Gott's Doomsday Argument. *Phil. Sci. Archive*, 23.
- Rushby, Andrew J, Claire, Mark W, Osborn, Hugh, and Watson, Andrew J. 2013. Habitable Zone Lifetimes of Exoplanets Around Main Sequence Stars. *Astrobiology*, **13**(9), 833–49.

- Ryabov, Vyacheslav A. 2016. The Study of Acoustic Signals and the Supposed Spoken Language of the Dolphins. *St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics*, **2**(3), 231–239.
- Sacks, Oliver. 1993 (May). *To See and Not To See*.
- Sagan, C., and Newman, W. I. 1983. The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence. *QJRAS*, **24**, 113–121.
- Sagan, Carl. 1973. *Carl Sagan's Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective*. Cambridge University Press.
- Sampson, Robert. 2012. *Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sánchez, Joan-Pau, and McInnes, Colin R. 2015. Optimal Sunshade Configurations for Space-Based Geoengineering near the Sun-Earth L1 Point. *PLOS ONE*, **10**(8), e0136648.
- Sandberg, A. 1999. The Physics of Information Processing Superobjects: Daily Life Among the Jupiter Brains. *Journal of Evolution and Technology*, **5**, 1.
- Sandberg, Anders, Armstrong, Stuart, and Cirković, Milan M. 2017. That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox. *JBIS*, Apr, submitted.
- Sapir, E. 1921. Language Defined. Chap. 1, page 3 of: *Language: An Introduction to the Study of Speech*.
- Schawlow, A. L., and Townes, C. H. 1958. Infrared and Optical Masers. *Physical Review*, **112**(6), 1940–1949.
- Schmidt, Gavin A., and Frank, Adam. 2018. The Silurian Hypothesis: Would It Be Possible to Detect an Industrial Civilization in the Geological Record? *International Journal of Astrobiology*, Apr, in press.
- Schneider, Peter. 2005. *Weak Gravitational Lensing*. Berlin: Springer.
- Schödel, R., Ott, T., Genzel, R., Hofmann, R., Lehnert, M., Eckart, A., Mouawad, N., Alexander, T., Reid, M. J., Lenzen, R., Hartung, M., Lacombe, F., Rouan, D., Gendron, E., Rousset, G., Lagrange, A.-M., Brandner, W., Ageorges, N., Lidman, C., Moorwood, A. F. M., Spyromilio, J., Hubin, N., and Menten, K. M. 2002. A Star in a 15.2-Year Orbit Around the Supermassive Black Hole at the Centre of the Milky Way. *Nature*, **419**(6908), 694–696.
- Schröder, K.-P., and Connon Smith, Robert. 2008. Distant Future of the Sun and Earth Revisited. *MNRAS*, **386**(1), 155–163.
- Schubert, G., and Soderlund, K. M. 2011. Planetary Magnetic Fields: Observations and Models. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, **187**(3–4), 92–108.
- Schuetz, Marlin, Vakoch, Douglas A., Shostak, Seth, and Richards, Jon. 2016. Optical SETI Observations of the Anomalous Star KIC 8462852. *The Astrophysical Journal*, **825**(1), L5.
- Schulkin, Jay, and Raglan, Greta B. 2014. The Evolution of Music and Human Social Capability. *Frontiers in Neuroscience*, **8**, 292.
- Schwieterman, Edward W., Kiang, Nancy Y., Parenteau, Mary N., Harman, Chester E., DasSarma, Shiladitya, Fisher, Theresa M., Arney, Giada N., Hartnett, Hilairy E., Reinhard, Christopher T., Olson, Stephanie L., Meadows, Victoria S., Cockell, Charles S., Walker, Sara I., Grenfell, John Lee, Hegde, Siddharth, Rugheimer, Sarah, Hu, Renyu, and Lyons, Timothy W. 2017. Exoplanet Biosignatures: A Review of Remotely Detectable Signs of Life. may.

- Seager, S., Bains, W., and Hu, R. 2013. A Biomass-Based Model To Estimate the Plausibility of Exoplanet Biosignature Gases. *ApJ*, **775**(2), 104.
- Seager, S., Bains, W., and Petkowski, J.J. 2016. Toward a List of Molecules as Potential Biosignature Gases for the Search for Life on Exoplanets and Applications to Terrestrial Biochemistry. *Astrobiology*, **16**(6), 465–485.
- Segura, Antígona, Walkowicz, Lucianne M., Meadows, Victoria, Kasting, James, and Hawley, Suzanne. 2010. The Effect of a Strong Stellar Flare on the Atmospheric Chemistry of an Earth-like Planet Orbiting an M Dwarf. *Astrobiology*, **10**(7), 751–771.
- Seifried, D., Banerjee, R., Pudritz, R. E., and Klessen, R. S. 2013. Turbulence-Induced Disc Formation in Strongly Magnetized Cloud Cores. *MNRAS*, **432**(4), 3320–3331.
- Shepherd, L. 1952. Interstellar Flight. *JBIS*, **11**, 149–167.
- Shettleworth, S. J. 2010. *Cognition, Evolution, and Behavior*. Oxford University Press.
- Shkadov, L. M. 1987. Possibility of Controlling Solar System Motion in the Galaxy. *IAF, International Astronautical Congress, 38th*, 10–17.
- Shostak, Seth. 2010. What ET Will Look Like and Why Should We Care. *Acta Astronautica*, **67**(9–10), 1025–1029.
- Shostak, Seth, and Almar, Ivan. 2002. The Rio Scale Applied to Fictional. Pages IAA–9–1–06 of: *34th COSPAR Scientific Assembly, Second World Space Congress*.
- Shu, Frank H., Adams, Fred C., and Lizano, Susana. 1987. Star Formation in Molecular Clouds: Observation and Theory. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, **25**(1), 23–81.
- Shuch, H. Paul. 2011. *Searching for Extraterrestrial Intelligence*. The Frontiers Collection. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Siemion, Andrew P. V., Demorest, Paul, Korpela, Eric, Maddalena, Ron J., Werthimer, Dan, Cobb, Jeff, Howard, Andrew W., Langston, Glen, Lebofsky, Matt, Marcy, Geoffrey W., and Tarter, Jill. 2013. A 1.1-1.9 GHz SETI Survey of the Kepler Field. I. A Search for Narrow-Band Emission from Select Targets. *ApJ*, **767**(1), 94.
- Silagadze, Z. K. 2008. SETI and Muon Collider. *Acta Physica Polonica B*, **39**(11), 2943.
- Simpson, G. G. 1964. The Nonprevalence of Humanoids. *Science*, **143**(3608), 769–775.
- Smartt, S. J., Chen, T.-W., Jerkstrand, A., Coughlin, M., Kankare, E., Sim, S. A., Fraser, M., Inserra, C., Maguire, K., Chambers, K. C., Huber, M. E., Krühler, T., Leloudas, G., Magee, M., Shingles, L. J., Smith, K. W., Young, D. R., Tonry, J., Kotak, R., GalYam, A., Lyman, J. D., Homan, D. S., Agliozzo, C., Anderson, J. P., Angus, C. R., Ashall, C., Barbarino, C., Bauer, F. E., Berton, M., Botticella, M. T., Bulla, M., Bulger, J., Cannizzaro, G., Cano, Z., Cartier, R., Cikota, A., Clark, P., De Cia, A., Della Valle, M., Denneau, L., Dennefeld, M., Dessart, L., Dimitriadis, G., Elias-Rosa, N., Firth, R. E., Flewelling, H., Flörs, A., Franckowiak, A., Frohmaier, C., Galbany, L., González-Gaitán, S., Greiner, J., Gromadzki, M., Guelbenzu, A., Nicuesa, Gutiérrez, C. P., Hamałowicz, A., Hanlon, L., Harmanen, J., Heintz, K. E., Heinze, A., Hernandez, M.-S., Hodgkin, S. T., Hook, I. M., Izzo, L., James, P. A., Jonker, P. G., Kerzendorf, W. E., Klose, S., Kostrzewa-Rutkowska, Z., Kowalski, M., Kromer, M., Kuncarayakti, H., Lawrence, A., Lowe, T. B., Magnier, E. A., Manulis, I., MartínCarrillo, A., Mattila, S., McBrien, O., Müller, A., Nordin, J., O’Neill, D., Onori, F., Palmerio, J. T., Pastorello, A., Patat, F., Pignata, G., Podsiadlowski, Ph., Pumo, M. L., Prentice, S. J., Rau, A., Razza, A., Rest, A., Reynolds, T., Roy, R., Ruiter, A. J., Rybicki, K. A., Salmon, L., Schady, P., Schultz, A. S. B., Schweyer, T., Seitzzahl,

- I. R., Smith, M., Sollerman, J., Stalder, B., Stubbs, C. W., Sullivan, M., Szegedi, H., Taddia, F., Taubenberger, S., Terreran, G., van Soelen, B., Vos, J., Wainscoat, R. J., Walton, N. A., Waters, C., Weiland, H., Willman, M., Wiseman, P., Wright, D. E., Wyrzykowski, Ł., and Yaron, O. 2017. A Kilonova as the Electromagnetic Counterpart to a Gravitational-Wave Source. *Nature*, Oct.
- Smartt, Stephen J. 2009. Progenitors of Core-Collapse Supernovae. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, **47**(1), 63–106.
- Smith, David S., and Scalo, John M. 2009. Habitable Zones Exposed: Astrosphere Collapse Frequency as a Function of Stellar Mass. *Astrobiology*, **9**(7), 673–681.
- Smith, J. M. 1982. *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press.
- Smith, John Maynard, and Szathmari, Eors. 1997. *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford.
2000. *The Origins of Life: From the Birth of Life to the Origin of Language*. Oxford University Press, Oxford.
- Smith, Peter. 2003. *An Introduction to Formal Logic*. 6th edn. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Reginald D. 2009. Broadcasting But Not Receiving: Density Dependence Considerations for SETI Signals. *International Journal of Astrobiology*, **8**(02), 101.
- Snyder, Donald Lee, and Miller, Michael I. 1991. *Random Point Processes in Time and Space*. New York, NY, USA: Springer-Verlag.
- Socas-Navarro, Hector. 2018. Possible Photometric Signatures of Moderately Advanced Civilizations: The Clarke Exobelt. *ApJ*, **855**(2), 110.
- Society, Royal. 2004. *Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties*. Tech. rept. The Royal Society.
- Sokol, M. D., Raichlen, D. A., and Pontzer, H. 2007. Chimpanzee Locomotor Energetics and the Origin of Human Bipedalism. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **104**(30), 12265–12269.
- Sojo, Victor, Herschy, Barry, Whicher, Alexandra, Camprubí, Eloi, and Lane, Nick. 2016. The Origin of Life in Alkaline Hydrothermal Vents. *Astrobiology*, **16**(2), 181–197.
- Sotos, John G. 2017. Biotechnology and the Lifetime of Technical Civilizations. *arXiv e-print 1709.01149*, Sep.
- Spiegel, D. 1995. Hypnosis and Suggestion. Chap. 4, pages 129–173 of: Schacter, Daniel L., Coyle, J. S., Fishbach, G. D., Mesulam, M. M., and Sullivan, L. E. (eds.), *Memory Distortion: How Minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past*. Harvard University Press.
- Spoor, F., Leakey, M. G., Gathogo, P. N., Brown, F. H., Antón, S. C., McDougall, I., Kiarie, C., Manthi, F. K., and Leakey, L. N. 2007. Implications of New Early Homo Fossils from Ileret, East of Lake Turkana, Kenya. *Nature*, **448**(7154), 688–91.
- Stamenkovic, Vlada, Noack, Lena, Breuer, Doris, and Spohn, Tilman. 2012. The Influence of Pressure-Dependent Viscosity on the Thermal Evolution of Super-Earths. *The Astrophysical Journal*, **748**(1), 41.
- Stanek, K. Z., Matheson, T., Garnavich, P. M., Martini, P., Berlind, P., Caldwell, N., Challis, P., Brown, W. R., Schild, R., Krisciunas, K., Calkins, M. L., Lee, J. C., Hathi, N., Jansen, R. A., Windhorst, R., Echevarria, L., Eisenstein, D. J., Pindor, B., Olszewski, E. W., Harding, P., Holland, S. T., and Bersier, D. 2003. Spectroscopic Discovery of the Supernova 2003dh Associated with GRB 030329. *The Astrophysical Journal*, **591**(1), L17–L20.

- Steadman, D. 2003. The Late Quaternary Extinction and Future Resurrection of Birds on Pacific Islands. *Earth-Science Reviews*, **61**(1–2), 133–147.
- Stefano, R. Di, and Ray, A. 2016. Globular Clusters as Cradles of Life and Advanced Civilizations. *ApJ*, **827**(1), 54.
- Stephenson, D. G. 1977. Factors Limiting the Interaction Between Twentieth Century Man and Interstellar Cultures. *Journal of the British Interplanetary Society*, **30**.
- Stern, Robert J. 2016. Is Plate Tectonics Needed to Evolve Technological Species on Exoplanets? *Geoscience Frontiers*, **7**(4), 573–580.
- Stevens, Adam, Forgan, Duncan, and James, Jack O'Malley. 2016. Observational Signatures of Self-Destructive Civilizations. *International Journal of Astrobiology*, **15**(04), 333–344.
- Stevens, Adam H. 2015. The Price of Air. Pages 51–61 of: *Human Governance Beyond Earth*.
- Stewart, Sarah T., and Leinhardt, Zoë M. 2009. Velocity-Dependent Catastrophic Disruption Criteria for Planetesimals. *ApJ*, **691**(2), L133–L137.
- Stone, R.P.S., Wright, S.A., Drake, F., Muñoz, M., Treffers, R., and Werthimer, D. 2005. Lick Observatory Optical SETI: Targeted Search and New Directions. *Astrobiology*, **5**(5), 604–611.
- Stringer, Chris. 2012. Evolution: What Makes a Modern Human. *Nature*, **485**(7396), 33–5.
- Strughold, Hubertus. 1953. *The Green and Red Planet: A Physiological Study of the Possibility of Life on Mars*. University of New Mexico Press.
- Stuart, Joseph Scott, and Binzel, Richard P. 2004. Bias-Corrected Population, Size Distribution, and Impact Hazard for the Near-Earth Objects. *Icarus*, **170**(2), 295–311.
- Sugihara, Kokichi. 2016. Anomalous Mirror Symmetry Generated by Optical Illusion. *Symmetry*, **8**(4), 21.
- Surdin, V. G. 1986. Launch of a Galactic Probe using a Multiple Perturbation Maneuver. *Astronomicheskii Vestnik*, **19**, 354–358.
- Swinney, R. W., Long, K. F., Hein, A., Galea, P., Mann, A., Crawl, A., and Obousy, R. 2012. Project Icarus: Exploring the Interstellar Roadmap Using the Icarus Pathfinder and Starfinder Probe Concepts. *Journal of the British Interplanetary Society*, **65**, 244–254.
- Tainter, J. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. New Studies in Archaeology. Cambridge University Press.
- Tainter, Joseph A. 2000. Problem Solving: Complexity, History, Sustainability. *Population and Environment*, **22**(1), 3–41.
- Talbot Jr, R. J., and Newman, M. J. 1977. Encounters Between Stars and Dense Interstellar Clouds. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, **34**(Jul), 295.
- Tallis, Melisa, Maire, Jerome, Wright, Shelley, Drake, Frank D., Duenas, Andres, Marcy, Geoffrey W., Stone, Remington P. S., Treffers, Richard R., Werthimer, Dan, and NIROSETI. 2016. A Near-Infrared SETI Experiment: A Multi-time Resolution Data Analysis. *American Astronomical Society, AAS Meeting #228, id.120.03*, **228**.
- Tarter, Jill. 2007. Searching for Extraterrestrial Intelligence. Chap. 26, pages 513–536 of: Sullivan III, Woodruff T., and Baross, Thomas (eds.), *Planets and Life – The Emerging Science of Astrobiology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, Jim. 2014. *Deep Space Communications*. 1st edn. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory.

- Taylor, Joseph H. 1994. Binary Pulsars and Relativistic Gravity. *Reviews of Modern Physics*, **66**(3), 711–719.
- Terrace, H., Petitto, L., Sanders, R., and Bever, T. 1979. Can an Ape Create a Sentence? *Science*, **206**(4421), 891–902.
- Thomas, Brian C., Melott, Adrian L., Jackman, Charles H., Laird, Claude M., Medvedev, Mikhail V., Stolarski, Richard S., Gehrels, Neil, Cannizzo, John K., Hogan, Daniel P., and Ejzak, Larissa M. 2005a. Gamma-Ray Bursts and the Earth: Exploration of Atmospheric, Biological, Climatic, and Biogeochemical Effects. *ApJ*, **634**(1), 509–533.
- Thomas, Brian C., Jackman, Charles H., Melott, Adrian L., Laird, Claude M., Stolarski, Richard S., Gehrels, Neil, Cannizzo, John K., and Hogan, Daniel P. 2005b. Terrestrial Ozone Depletion Due to a Milky Way Gamma-Ray Burst. *ApJ*, **622**(2), L153–L156.
- Thomas, Brian C., Engler, E. E., Kachelrieß, M., Melott, A. L., Overholt, A. C., and Semikoz, D. V. 2016. Terrestrial Effects of Nearby Supernovae in the Early Pleistocene. *ApJ*, **826**(May).
- Thommes, E. W., Duncan, M. J., and Levison, H. F. 2003. Oligarchic Growth of Giant Planets. *Icarus*, **161**(2), 431–455.
- Thompson, R F. 2000. *The Brain: A Neuroscience Primer*. Worth Publishers.
- Tian, Feng, France, Kevin, Linsky, Jeffrey L., Mauas, Pablo J. D., and Vieytes, Mariela C. 2014. High Stellar FUV/NUV Ratio and Oxygen Contents in the Atmospheres of Potentially Habitable Planets. *Earth and Planetary Science Letters*, **385**(jan), 22–27.
- Tiec, Alexandre Le, and Novak, Jérôme. 2016. Theory of Gravitational Waves. In: Auger, G., and Plagnol, E. (eds.), *An Overview of Gravitational Waves: Theory and Detection*, 1st edn. World Scientific.
- Timofeev, M. Y., Kardashev, N. S., and Promyslov, V. G. 2000. A Search of the IRAS Database for Evidence of Dyson Spheres. *Acta Astronautica*, 655–659.
- Tipler, Frank J. 1993 (Aug). SETI – A Waste of Time! Pages 28–35 of: Kingsley, Stuart A. (ed), *SPIE 1867, The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) in the Optical Spectrum*.
- Tobin, John J., Looney, Leslie W., Wilner, David J., Kwon, Woojin, Chandler, Claire J., Bourke, Tyler L., Loinard, Laurent, Chiang, Hsin-Fang, Schnee, Scott, and Chen, Xuepeng. 2015. A Sub-Arcsecond Survey Toward Class 0 Protostars in Perseus: Searching for Signatures of Protostellar Disks. *ApJ*, **805**(2), 125.
- Tomida, Kengo, Okuzumi, Satoshi, and Machida, Masahiro N. 2015. Radiation Magnetohydrodynamic Simulations of Protostellar Collapse: Nonideal Magnetohydrodynamic Effects and Early Formation of Circumstellar Disks. *ApJ*, **801**(2), 117.
- Toynbee, A. J., and Somervell, D. C. 1987. *A Study of History*. A Study of History. Oxford University Press.
- Tsander, F. 1961. *Problems of Flight by Jet Propulsion: Interplanetary Flights*. Moscow: Nawzhio – Technical Publishing House.
- Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., and Levison, H. F. 2005. Origin of the Orbital Architecture of the Giant Planets of the Solar System. *Nature*, **435**(7041), 459–461.
- UN. 2004. *World Population to 2300*. Tech. rept. New York.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2015. *World Population Prospects: The 2015 Revision*. Tech. rept. United Nations, New York.
- Valencia, Diana, O’Connell, Richard J., and Sasselov, Dimitar. 2006. Internal Structure of Massive Terrestrial Planets. *Icarus*, **181**(2), 545–554.

2007. Inevitability of Plate Tectonics on Super-Earths. *The Astrophysical Journal*, **670**(1), L45–L48.
- Valencia, Diana, Tan, Vivian Yun Yan, and Zajac, Zachary. 2018. Habitability from Tidally Induced Tectonics. *The Astrophysical Journal*, **857**(2), 106.
- Vaughan, Naomi E., and Lenton, Timothy M. 2011. A Review of Climate Geoengineering Proposals. *Climatic Change*, **109**(3), 745–790.
- Veras, Dimitri. 2016. Post-Main-Sequence Planetary System Evolution. *Royal Society Open Science*, **3**(2), id 150571.
- Verendel, Vilhelm, and Häggström, Olle. 2015. Fermi’s Paradox, Extraterrestrial Life and the Future of Humanity: a Bayesian Analysis. *arXiv e-print 1510.08684*, Oct, 16.
- Verhulst, Pierre-Francois. 1845. Mathematical Researches into the Law of Population Growth Increase. *Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles*, **18**, 1–42.
- Verpooten, J. 2015. *Art and Signaling in a Cultural Species: Proefschrift*. Proefschriften UA-WET.
- Vida, K., Kovári, Zs., Pál, A., Oláh, K., and Kriskovics, L. 2017. Frequent Flaring in the TRAPPIST-1 System—Unsuited for Life? *The Astrophysical Journal*, **841**(2), 124.
- Vidotto, A. A., Jardine, M., Morin, J., Donati, J.-F., Lang, P., and Russell, A. J. B. 2013. Planetary Protection in the Extreme Environments of Low-Mass Stars. *Proceedings of the International Astronomical Union*, **9**(S302), 237–238.
- Villarroel, Beatriz, Imaz, Inigo, and Bergstedt, Josefine. 2016. Our Sky Now and Then: Searches for Lost Stars and Impossible Effects as Probes of Advanced Civilizations. *The Astronomical Journal*, **152**(3), 76.
- von Kiedrowski, Günter. 1986. A Self-Replicating Hexadeoxynucleotide. *Angewandte Chemie International Edition in English*, **25**(10), 932–935.
- Von Neumann, John. 1966. *Theory of Self-Reproducing Automata*. Urbana: University of Illinois Press.
- Vukotic, B., and Cirković, Milan M. 2007. On the Timescale Forcing in Astrobiology. *Serbian Astronomical Journal*, **175**(175), 45–50.
2008. Neocatastrophism and the Milky Way Astrobiological Landscape. *Serbian Astronomical Journal*, **176**(176), 71–79.
2012. Astrobiological Complexity with Probabilistic Cellular Automata. *Origins of Life and Evolution of the Biosphere: The Journal of the International Society for the Study of the Origin of Life*, **42**(4), 347–71.
- Wächtershauser, G. 1990. Evolution of the First Metabolic Cycles. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **87**(1), 200–204.
- Wainscoat, Richard J., Chambers, Kenneth, Lilly, Eva, Weryk, Robert, Chastel, Serge, Denneau, Larry, and Micheli, Marco. 2015. The Pan-STARRS Search for Near Earth Objects. *American Astronomical Society, DPS Meeting #47*, id.301.07.
- Wang, Bo, and Han, Zhanwen. 2012. Progenitors of Type Ia Supernovae. *New Astronomy Reviews*, **56**(4), 122–141.
- Wang, Junfeng, Zhou, Zongzheng, Zhang, Wei, Garoni, Timothy M., and Deng, Youjin. 2013. Bond and Site Percolation in Three Dimensions. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, **87**(5), 052107.
- Ward, S. 2000. Asteroid Impact Tsunami: A Probabilistic Hazard Assessment. *Icarus*, **145**(1), 64–78.
- Ward, Steven N., and Asphaug, Erik. 2003. Asteroid Impact Tsunami of 2880 March 16. *Geophysical Journal International*, **153**(3), F6–F10.

- Ward, Steven N., and Day, Simon. 2001. Cumbre Vieja Volcano-Potential Collapse and Tsunami at La Palma, Canary Islands. *Geophysical Research Letters*, **28**(17), 3397–3400.
- Ward, William R., and Canup, Robin M. 2010. Circumplanetary Disk Formation. *The Astronomical Journal*, **140**(5), 1168–1193.
- Webb, Stephen. 2002. *If the Universe Is Teeming with Aliens – Where Is Everybody?: Fifty Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life*. Vol. 1. Springer.
- Weiss, Madeline C., Sousa, Filipa L., Mrnjavac, Natalia, Neukirchen, Sinje, Roettger, Mayo, Nelson-Sathi, Shijulal, and Martin, William F. 2016. The Physiology and Habitat of the Last Universal Common Ancestor. *Nature Microbiology*, **1**(9), 16116.
- Wells, R., Poppenhaeger, K., Watson, C. A., and Heller, R. 2018. Transit Visibility Zones of the Solar System Planets. *MNRAS*, **473**(1), 345–354.
- Wetherill, George W. 1994. Possible Consequences of Absence of Jupiters in Planetary Systems. *Astrophysics and Space Science*, **212**(1–2), 23–32.
- White, C. R., and Seymour, R. S. 2003. Mammalian Basal Metabolic Rate Is Proportional to Body Mass $2/3$. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **100**(7), 4046–4049.
- Whitehead, A. N., and Russell, B. 1927. *Principia Mathematica*. Cambridge Mathematical Library, no. v. 1. Cambridge University Press.
- Wiley, Keith B. 2011. The Fermi Paradox, Self-Replicating Probes, and the Interstellar Transportation Bandwidth. *arXiv e-prints 1111.6131*, Nov.
- Willcox, George, Fornite, Sandra, and Herveux, Linda. 2008. Early Holocene Cultivation Before Domestication in Northern Syria. *Vegetation History and Archaeobotany*, **17**(3), 313–325.
- Wilson, E. O., and Holldobler, B. 2005. Eusociality: Origin and Consequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **102**(38), 13367–13371.
- Windmark, F., Birnstiel, T., Güttler, C., Blum, J., Dullemond, C. P., and Henning, Th. 2012. Planetesimal Formation by Sweep-up: How the Bouncing Barrier Can Be Beneficial to Growth. *A&A*, **540**(Mar), A73.
- Winn, J. N. 2011. Exoplanet Transits and Occultations. Pages 55–78 of: Seager, S. (ed.), *Exoplanets*. Tucson: University of Arizona Press.
- Wolszczan, A., and Frail, D. A. 1992. A Planetary System Around the Millisecond Pulsar PSR1257 + 12. *Nature*, **355**(6356), 145–147.
- Wrangham, Richard W., Wilson, Michael L., and Muller, Martin N. 2006. Comparative Rates of Violence in Chimpanzees and Humans. *Primates*, **47**(1), 14–26.
- Wright, J. T., Mullan, B., Sigurdsson, S., and Povich, M. S. 2014. The G Infrared Search[^] for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies. I. Background and Justification. *The Astrophysical Journal*, **792**(1), 26.
- Wright, Jason T. 2017. Prior Indigenous Technological Species. *eprint arXiv: 1704.07263*, apr.
2018. SETI is Part of Astrobiology. jan.
- Wright, Jason T., and Oman-Reagan, Michael P. 2017. Visions of Human Futures in Space and SETI. *International Journal of Astrobiology*, Aug, 1–12.
- Wright, Jason T., and Sigurdsson, Steinn. 2016. Families of Plausible Solutions to the Puzzle of Boyajian’s Star. *ApJ*, **829**(1), L3.
- Wright, Jason T., Cartier, Kimberly M. S., Zhao, Ming, Jontof-Hutter, Daniel, and Ford,

- Eric B. 2015. The G Search for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies. IV. The Signatures and Information Content of Transiting Megastructures. *ApJ*, **816**(1), 17.
- Wünnemann, K., Collins, G. S., and Weiss, R. 2010. Impact of a Cosmic Body into Earth's Ocean and the Generation of Large Tsunami Waves: Insight From Numerical Modeling. *Reviews of Geophysics*, **48**(4), RG4006.
- Wurster, James, Price, Daniel J., and Bate, Matthew R. 2016. Can Non-ideal Magnetohydrodynamics Solve the Magnetic Braking Catastrophe? *MNRAS*, **457**(1), 1037–1061.
- WWF. 2016. *Living Planet Report 2016*. Tech. rept. World Wildlife Fund.
- Xu, Yan, Newberg, Heidi Jo, Carlin, Jeffrey L., Liu, Chao, Deng, Licai, Li, Jing, Schönrich, Ralph, and Yanny, Brian. 2015. Rings and Radial Waves in the Disk of the Milky Way. *ApJ*, **801**(2), 105.
- Youdin, Andrew N., and Goodman, Jeremy. 2005. Streaming Instabilities in Protoplanetary Disks. *The Astrophysical Journal*, **620**(1), 459–469.
- Zackrisson, Erik, Calissendorff, Per, González, Juan, Benson, Andrew, Johansen, Anders, and Janson, Markus. 2016. Terrestrial Planets Across Space and Time. *The Astrophysical Journal*, **833**(2), 214.
- Zappes, Camilah Antunes, Andriolo, Artur, Simões-Lopes, Paulo César, and Di Benedetto, Ana Paula Madeira. 2011. 'Human-Dolphin (*Tursiops truncatus* Montagu, 1821) Cooperative Fishery' and Its Influence on Cast Net Fishing Activities in Barra de Imbé/Tramandaí, Southern Brazil. *Ocean & Coastal Management*, **54**(5), 427–432.
- Zeki, Semir. 1999. *Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain*. Oxford University Press.
- Zerkle, Aubrey L., Claire, Mark W., Domagal-Goldman, Shawn D., Farquhar, James, and Poulton, Simon W. 2012. A Bistable Organic-Rich Atmosphere on the Neoarchaeon Earth. *Nature Geoscience*, **5**(5), 359–363.
- Zhang, Bing. 2013. A Possible Connection Between Fast Radio Bursts and Gamma-Ray Bursts. *The Astrophysical Journal*, **780**(2), L21.
- Zhang, Zhihua, Moore, John C., Huisinigh, Donald, and Zhao, Yongxin. 2015. Review of Geoengineering Approaches to Mitigating Climate Change. *Journal of Cleaner Production*, **103**(Sep), 898–907.
- Zubrin, R. M. 1995. Detection of Extraterrestrial Civilizations via the Spectral Signature of Advanced Interstellar Spacecraft. Page 592 of: Shostak, Seth (ed.), *Progress in the Search for Extraterrestrial Life: 1993 Bioastronomy Symposium, Santa Cruz, California*. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific.

Индекс

- абиогенез, 100
- absolute magnitude, 185
- адаптация, 117
- afterglow, 210
- air showers, 208
- albedo, 71
- allele, 117, 284
- allele frequencies, 116
- аминокислоты, 99
- ancestor-simulation, 331
- anthropic principle, 139, 262
- anticipatory cognition, 141
- apparent magnitude, 185
- arc volcano, 170
- artefact SETI, 35 artificial intelligence (AI), 234
- astro-engineering, 35
- asymptotic giant branch, AGB, 188
- aurora, 181
- aurorae, 174
- automatic theorem provers, 237
- backward propagation, 241
- Bayes's Theorem, 340
- Bekenstein bound, 334
- biodiversity, 222
- biosignatures/biomarkers, 64
- Boussinesq approximation, 175
- Bracewell Probe, 338
- Bremermann's limit, 335
- brightness temperature, 22
- brown dwarf, 37, 189
- Cambrian explosion, 105 carbon fixation, 109
- chromosome, 108
- chromosphere, 180
- chron, 177
- circumstellar habitable zone (CHZ), 71
- Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), 228
- cognitive bias, 238
- colour, stellar, 185
- connected component, 323
- connectionism, 239
- continuous circumstellar habitable zone (CCHZ), 73 convergent evolution, 128 coral bleaching, 223
- corona, 180
- cosmic microwave background, 22
- CRISPR-Cas9, 228
- data science, 241
- decision tree, 237 Declination (Dec), 15 diploid, 108
- Уравнение Дрейка, 7
- Drake, Frank, 7
- дуализм, 331
- Сфера Дайсона, 35
- Earth, age of, 3
- Earth-like, 71
- effective temperature, 180
- electron neutrino, 197 endocast, 119 endosymbiont theory, 111 energetically optimised communication, 291 entropic level analysis, 304
- энтропия, 99
- epigenomics, 229
- eukaryotes, 111
- eusocial society, 124
- evidence, 13 evolution, 115
- evolutionarily stable strategy, ESS, 122
- exaptation, 148 exomoon, 97
- Fact A, 15 false negative, 66 false positive biosignature, 66
- Fast Radio Burst, FRB, 364
- Fermi, Enrico, 5
- Fermi's Paradox, 3
- Fisher's Fundamental Theorem, 117
- fitness, 117
- forward propagation, 241
- fringe, 29
- Galactic Cosmic Ray (GCR), 208
- Galactic Technological Zone, 318
- game theory, 121
- gene drive, 229
- gene flow, 116 gene transfer, horizontal, 115
- gene transfer, vertical, 115 generation ship, 319
- genetic drift, 116 genetics, 115 genomics, 229
- genotype, 128
- geomagnetic reversal, 177
- geosynchronous orbit (GEO), 177
- Glashow Resonance, 297
- Global Electric Circuit, 208
- Gödel's completeness theorem, 235
- gradient descent, 241
- Grand Tack, 96
- graph theory, 322
- Great Filter, The, 11
- halting problem, 236
- Hart, Michael, 6
- heliosphere, 181
- heliosphere, astrosphere, 208
- High Earth Orbit (HEO), 224
- Hill radius, 81
- horizontal gene transfer, 118
- hydrogen line (H_I), 22
- hydrothermal vents, 103
- ideal magnetohydrodynamics (MHD), 77, 175
- induction equation, 77
- interstellar ark, 319
- interstellar coherence hole, 293 interstellar medium, 75
- interstellar ramjet, 274

- island biogeography, 320
- ISM, 75
- knapping, 147
- Konopinski, Emil, 5
- Lagrange point, 95
- Large Synoptic Survey Telescope, 342
- lattice QCD, 337
- learning rate, 241
- lepton, 296
- Life, definition of, 98
- likelihood, 13
- lithosphere, 169, 171
- Low Earth Orbit (LEO), 224, 225
- LUCA, 100
- Lurker Probe, 338
- machine learning, 241
- macro-engineering, 35
- magnetic braking, 76
- magnetopause, 174
- magnetosphere, 174
- magnetotail, 174 magnitude, stellar, 185 main sequence, 185 Malthusian check, 212
- mantle, 171
- Mariner, 344
- Medium Earth Orbit (MEO), 224
- megafauna, 132
- meme, 138
- meteoroids, 225
- Milky Way, 3
- minimum spanning tree, MST, 324
- molecular cloud, 75, 208
- Monte Carlo Realisation, 361
- Moore's Law, 330
- multicellular organism, 112
- Multilevel Keying (MLK), 294
- muon, 296
- Mutually Assured Destruction (MAD), 253
- nearest neighbour heuristic (NNH), 269
- negentropy, 99 neural network, 239
- neuron, 119 neurotransmitter, 239
- neutrino, 296
- neutrinosphere, 197
- non-ideal magnetohydrodynamics, 77
- NRAO, Green Bank, 7 nucleic acid, 99
- O'Neill colony/cylinder, 319
- Occam's razor, 369
- On-Off Keying (OOK), 294
- opacity, 72
- optimisation, 242
- parasocial societies, 124
- pebble accretion, 80
- peptide, 99
- perceptron, 240
- percolation theory, 265
- phenotype, 128
- photosphere, 180
- planet formation, core accretion, 78
- planet formation, disc instability theory, 82
- planetary protection, 326
- plate tectonics, 169, 171
- ploidy, 116
- polarimetry, 18
- post-detection protocol, 40
- post-biological intelligence, 125
- posterior, 13
- predicate logic, first-order (PL1), 236
- predicate logic, second-order (PL2), 238
- prestellar core, 75
- principle of assumed benevolence, 316
- principle of precautionary malevolence, 316
- principle of preliminary neutrality, 316
- prior, 13
- probabilistic cellular automata, PCA, 361
- protein, 99
- protolanguage, 140
- push-down automaton, 244
- radio frequency interference (RFI), 24
- Radio SETI, 21
- radiogenic heating, 173
- Rayleigh Number, 172
- recombination, 116
- red giant branch, RGB, 188, 191
- relativistic aberration, 280
- reply protocol, 40
- Right Ascension (RA), 15
- Rio Scale, 38
- Rossby number, 176
- rubble pile, 80
- RuBiSCo, 110
- seed magnetic field, 176
- semiotics, 137
- SETA, 35
- Shannon limit, 292
- shield volcano, 170 shot noise, 22
- sidelobe, 27 Singularity, the, 234
- snowball glaciation, 209
- social capital, 256
- space debris, 225 spandrel, 148
- stagnant-lid regime, 172 standoff distance, 177 streaming instability, 80 strong AI, 234
- subduction, 171
- subduction zone, 169 subgiant branch, 188 substrate independence, 330
- superchron, 177
- superintelligence, 235
- supernova, Type I, 194
- supernova, Type II, 196

supervolcano, 170
synapse, 119, 239
tachocline, 180
tau lepton, 296
set, 242
Turing machine, 235
Turing-Church thesis, 236
Universal Grammar (UG), 139
Universal Turing Machine, 235
urban heat islands, 222
Van Allen radiation belts, 174
vegetative red edge, 68
Venera, 344
Volcanic Explosivity Index (VEI), 170
weak AI, 234 working fluid, 273
Wright's Adaptive Landscape, 117
York, Herbert, 5
Zipf's law, 306
zooxanthellae, 223

