

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Exponential- und Logarithmusfunktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($\frac{1}{8} = 0.125$), $y = \dots$ oder $f(x) = \dots$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$ oder $0.5^{t/6}$ oder $2^{-t/6}$, $\lg$ oder $\log_{10}$ — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Prozentsatz statt Faktor» oder «linear statt exponentiell gerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 $y = 3^x$ und $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ skizzieren

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Skizze	1	3^x steigend durch $(-2 \frac{1}{9})$, $(-1 \frac{1}{3})$, $(0 1)$, $(1 3)$, $(2 9)$; $(\frac{1}{3})^x$ als Spiegelbild an der y -Achse, fallend, durch $(-2 9)$, $(-1 3)$, $(1 \frac{1}{3})$. Beide über der x -Achse, keine erreicht sie. Toleranz: eine halbe Kästchenbreite.
Punkt und Asymptote	1 (A)	gemeinsamer Punkt $(0 1)$; Asymptote $y = 0$ (die x -Achse). Beides nötig.
Wertemenge	1 (A)	$W = \mathbb{R}^+$ (gleichwertig: alle positiven Zahlen, $y > 0$)

Typische Fehler: Eine Kurve schneidet oder berührt die x -Achse: Skizzen-Zeile 0 → 2 von 3 P. $W = \mathbb{R}$ oder $W = \mathbb{R}_0^+$ (die 0 gehört nicht dazu): letzte Zeile 0 → 2 von 3 P. Beide Kurven steigend gezeichnet oder $(\frac{1}{3})^x$ an der x -Achse gespiegelt (unter der Achse): Skizzen-Zeile 0 → 2 von 3 P.

G2 Basis aus einem Punkt

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Ansatz	1	$a^{-3} = 8 \Rightarrow \frac{1}{a^3} = 8 \Rightarrow a^3 = \frac{1}{8}$
(a) Basis	1 (E)	$a = \frac{1}{2}$
(b) Basis	1 (E)	$a^{3/2} = 27 \Rightarrow a = 27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$. Probe $9^{3/2} = 27$.

Typische Fehler: (a) $a = 2$ (Kehrwert übersehen): Basis-Zeile 0; ist der Ansatz richtig notiert, bleibt dessen Punkt → 2 von 3 P. (a) $a = -2$: Basis-Zeile 0 — die Basis ist positiv. (b) $a = 18$ ($27 : \frac{3}{2}$ gerechnet): Zeile (b) 0 → höchstens 2 von 3 P. (b) $a = 27^{3/2}$ (Exponent falsch herum): Zeile (b) 0.

G3 Population aus einer Tabelle

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Nachweis	1	Differenzen 100 und 120 sind verschieden (nicht linear); Quotienten $\frac{600}{500} = \frac{720}{600} = 1.2$ sind gleich (exponentiell). Beides nötig.
(a) Modell	1	$N(t) = 500 \cdot 1.2^t$
(b) $N(3)$	1 (E)	$720 \cdot 1.2 = 864$ Tiere
(c) Prozent	1 (E)	Faktor 1.2: Zunahme um 20 % pro Jahr

Typische Fehler: Linear gerechnet, $N(t) = 500 + 100t$, $N(3) = 800$: beide Zeilen (a) und (b) 0; «20 %» aus $\frac{100}{500}$ ist richtig → 1 von 4 P. $N(t) = 500 \cdot 0.2^t$ (Prozentsatz statt Faktor): Modell-Zeile 0; $N(3) = 4$ als Folgefehler zählt nicht als (E) → 2 von 4 P, wenn Nachweis und Prozent stimmen. Nur die Quotienten gezeigt, ohne die Differenzen (oder umgekehrt): Nachweis-Zeile 0.

G4 Medikament $m(t)$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Modell	1	$m(t) = 240 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$
(a) $m(18)$	1 (E)	$18 : 6 = 3$ Halbwertszeiten: $240 \cdot \frac{1}{8} = 30$ mg
(b) Zeit	1 (E)	$240 : 15 = 16 = 2^4$: vier Halbwertszeiten, $t = 24$ Stunden

Typische Fehler: $m(18) = 80$ ($240 : 3$, linear gedacht): Zeile (a) zweite 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. $m(18) = 40$ ($240 : 6$): Zeile (a) zweite 0. (b) $t = 96$ h ($16 \cdot 6$): Zeile (b) 0 — gezählt werden die Halbierungen ($2^4 = 16$), nicht der Faktor 16.

G5 Basiswechsel

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	$25 = 5^2$, also $25^x = 5^{2x}$
(b)	1 (E)	$\frac{1}{9} = 3^{-2}$, also $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^{-2x}$
(c)	1 (E)	$7 = e^{\ln 7}$, also $7^x = e^{(\ln 7)x}$ (gleichwertig: $b = \ln 7$; ein Näherungswert $b \approx 1.95$ zählt auch)

Typische Fehler: (a) 5^{5x} ($25 : 5$): Zeile (a) 0. (b) 3^{2x} (Minus vergessen) oder 3^{-3x} ($9 : 3$): Zeile (b) 0. (c) e^{7x} oder $\ln 7^x$: Zeile (c) 0. Ergebnisse ohne einen Schritt wie « $25 = 5^2$ »: Zählt voll, wenn die Potenzschreibweise der Basis erkennbar ist; reine Ergebnisse ohne jeden Zusammenhang 0.

G6 Wasserkocher $f(t) = 90 - 70e^{-kt}$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Start- und Sättigungswert	1 (A)	$f(0) = 90 - 70 = 20$ °C; Sättigungswert 90 °C. Beides nötig.
(b) Verlauf und Asymptote	1	steigt (Start $20 < 90$); Asymptote $y = 90$. Beides nötig.
(c) Temperatur	1 (E)	Abstand zum Sättigungswert $70 \rightarrow 35 \rightarrow 17.5$ nach zwei Halbierungen: $f(10) = 90 - 17.5 = 72.5$ °C

Typische Fehler: (a) Starttemperatur 70 oder -70 : Zeile (a) 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. (c) 17.5 °C (Abstand berechnet, aber nicht von 90 abgezogen): Zeile (c) 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. (c) 37.5 °C ($20 + 17.5$, Abstand zum Startwert addiert): Zeile (c) 0. (c) 22.5 °C (90 zweimal halbiert, Wert statt Abstand halbiert): Zeile (c) 0. (c) 55 °C ($90 - 35$, nur einmal halbiert — das ist $f(5)$): Zeile (c) 0.

G7 $f(x) = 2^x - 3$ umkehren

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) aufgelöst	1	$y = 2^x - 3 \Rightarrow 2^x = y + 3 \Rightarrow x = \log_2(y + 3)$
(a) getauscht	1 (E)	$f^{-1}(x) = \log_2(x + 3)$
(b) D und Asymptote	1	$x + 3 > 0$: $D =] - 3; \infty[$; Asymptote $x = -3$. Beides nötig.
(c) Nullstelle	1 (E)	$\log_2(x + 3) = 0 \Rightarrow x + 3 = 1 \Rightarrow x_0 = -2$

Typische Fehler: $f^{-1}(x) = \log_2(x) + 3$ oder $\log_2(x - 3)$: Zeile (a) zweite 0; (b) und (c) als Folgefehler bewerten, (c) nur, wenn der Weg zur eigenen Funktion passt, aber ohne (E)-Punkt $\rightarrow$ höchstens 2 von 4 P. (b) $D = \mathbb{R}^+$ (Verschiebung übersehen): Zeile (b) 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P. (c) $x_0 = 1$ (Nullstelle der unverschobenen Logarithmusfunktion): Zeile (c) 0.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Skizze	1	Spiegelbild von 2^x an $y = x$: steigend durch $(\frac{1}{4} -2)$, $(\frac{1}{2} -1)$, $(1 0)$, $(2 1)$, $(4 2)$; nur für $x > 0$, die y -Achse ist Asymptote (die Kurve berührt sie nicht). Toleranz: eine halbe Kästchenbreite.
Punkte	1 (A)	Nullstelle $(1 0)$ und $(4 2)$. Beide nötig.

Typische Fehler: An der x - oder y -Achse gespiegelt statt an $y = x$: Skizzen-Zeile 0; stimmen die Punkte trotzdem $\rightarrow 1$ von 2 P. Kurve schneidet die y -Achse oder reicht in $x \leq 0$: Skizzen-Zeile 0. $(0 | 1)$ als Nullstelle (Punkt von 2^x nicht gespiegelt) oder $(4 | 16)$: Punkte-Zeile 0.

4 • Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ **Kapitel:** G1, G2 $\rightarrow$ Kapitel 1 · G3, G4 $\rightarrow$ Kapitel 2 · G5 $\rightarrow$ Kapitel 3 · G6 $\rightarrow$ Kapitel 4 · G7, G8 $\rightarrow$ Kapitel 5