

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Vierecke» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Die Spalte P sagt, wie eine Zeile zählt: **(E)** — das Ergebnis muss stimmen und aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. **(F)** — Folgezeile: Sie zählt auch, wenn ich mit einem eigenen, falschen Vorwert richtig weitergerechnet habe, ausser dieser Vorwert ist *unmöglich* (Regel in Abschnitt 3). **(A)** — erkennen oder benennen, zählt auch ohne Rechenweg. Ohne Zeichen — die Zeile bewertet den Weg; auch sie zählt mit einem eigenen, möglichen Vorwert. So wird jeder Fehler nur einmal abgezogen. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeilen bei diesem Fehler 0 Punkte geben — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie $\sqrt{32.5}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten**: Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt diese Zeile 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamtttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «plus statt minus im Pythagoras» oder «ganzer Unterschied statt Überstand»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 24) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnis, das nur aus den gegebenen Zahlen folgt — richtig *und* Weg erkennbar · **(F)** = Folgezeile: zählt auch mit einem eigenen, falschen Vorwert, wenn damit richtig gerechnet ist · **(A)** = erkennen oder benennen, zählt auch ohne Rechenweg · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg (auch mit einem eigenen Vorwert). So wird jeder Fehler nur einmal abgezogen. **Unmöglich** ist ein eigener Vorwert, der der Figur widerspricht: eine Länge, die negativ oder null ist; eine Kathete (Höhe, Seite, halbe Diagonale), die länger ist als die Hypotenuse im selben Teildreieck; eine Mittellinie, die nicht zwischen a und c liegt; ein Viereckswinkel ab 180° . Auf einem unmöglichen Vorwert gibt es keine Folgepunkte. Taschenrechner erlaubt; Längen und Flächen auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01 (oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar); Folgewerte aus den ungerundeten eigenen Werten. **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. «Typische Fehler» nennt, welche Zeilen 0 Punkte geben, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte.

G1 Vierecke beschreiben

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Viereck	1 (A)	Ein Rhombus (Raute). «Rhombus, kein Quadrat» ist gleichwertig.
(a) Begründung	1	Die Diagonalen halbieren sich: Parallelogramm. Dazu stehen sie senkrecht: Rhombus. Sie sind verschieden lang ($7 \neq 10$): kein Rechteck, also kein Quadrat. Nötig sind alle drei Schritte.
(b) α, δ	1 (E)	α und δ liegen am Schenkel d : $\alpha + \delta = 180^\circ$ und $\delta - \alpha = 40^\circ$, also $\alpha = 70^\circ$, $\delta = 110^\circ$. Beide nötig.
(b) γ	1 (E)	β und γ liegen am Schenkel b : $\gamma = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$. (Probe: $70^\circ + 80^\circ + 100^\circ + 110^\circ = 360^\circ$.)

Typische Fehler: «Quadrat»: beide (a)-Zeilen 0 (die Diagonalen sind verschieden lang) → höchstens 2 von 4 P. «Parallelogramm» oder «Drachen»: (a)-Viereck 0; die Begründung zählt nur mit allen drei Schritten. Begründung ohne «halbieren» (nur «senkrecht $\Rightarrow$ Rhombus»): Begründungszeile 0. $\alpha + \delta = 360^\circ$ gerechnet ($\alpha = 160^\circ$, $\delta = 200^\circ$): α - δ -Zeile 0. α mit β statt mit δ gepaart ($\alpha = 100^\circ$, $\delta = 140^\circ$): α - δ -Zeile 0. $\gamma = \alpha$ oder $\gamma = 80^\circ$ (gegenüberliegende Winkel gleich gesetzt wie im Parallelogramm): γ -Zeile 0.

G2 Parallelogramm

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Teildreieck	1	Das Dreieck AFD ist rechtwinklig bei F , die Seite $\overline{AD}$ ist seine Hypotenuse: $h = \sqrt{AD^2 - AF^2}$.
(a) Höhe	1 (E)	$h = \sqrt{6.5^2 - 2.5^2} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$
(a) Fläche	1 (F)	$A = a \cdot h = 9.5 \cdot 6 = 57 \text{ cm}^2$
(b) h_b	1 (F)	Dieselbe Fläche mit $b = \overline{BC} = 6.5 \text{ cm}$ als Grundseite: $h_b = \frac{A}{b} = \frac{57}{6.5} \approx 8.77 \text{ cm}$

Typische Fehler: $h = \sqrt{6.5^2 + 2.5^2} \approx 6.96$ (plus statt minus): Teildreieck- und Höhenzeile 0; 6.96 ist länger als die Hypotenuse 6.5 — unmöglich, keine Folgepunkte → 0 von 4 P. Die schräge Seite als Höhe ($h = 6.5$, $A = 61.75$, $h_b = 9.5$): Teildreieck- und Höhenzeile 0; Fläche und h_b als Folgepunkte → 2 von 4 P. $h_b = \frac{2A}{b} \approx 17.54$ (Dreiecksformel): h_b -Zeile 0. $h_b = \frac{A}{a} = 6$ (durch die falsche Seite geteilt): h_b -Zeile 0.

G3 Fliese in Rhombusform

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Teildreieck	1	Die Diagonalen halbieren sich senkrecht; Teildreieck mit der Hypotenuse $a = 8.5$ und der Kathete $\frac{e}{2} = 7.5$: $\frac{f}{2} = \sqrt{8.5^2 - 7.5^2} = \sqrt{16} = 4$ cm
(a) Diagonale	1 (E)	$f = 2 \cdot 4 = 8$ cm
(b) Fläche	1 (F)	$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 8 = 60$ cm ²
(c) Abstand	1 (F)	Der Rhombus ist ein Parallelogramm: $A = a \cdot h$, also $h = \frac{60}{8.5} \approx 7.06$ cm

Typische Fehler: $f = 4$ (die halbe Diagonale nicht verdoppelt): Diagonalenzeile 0; $A = 30$ und $h \approx 3.53$ als Folgepunkte $\rightarrow 3$ von 4 P. $\frac{f}{2} = \sqrt{8.5^2 + 7.5^2} \approx 11.34$ (plus statt minus): Teildreieck- und Diagonalenzeile 0; 11.34 ist länger als die Hypotenuse 8.5 — unmöglich, keine Folgepunkte $\rightarrow 0$ von 4 P. $A = e \cdot f = 120$ ($\frac{1}{2}$ vergessen): Flächenzeile 0; $h = \frac{120}{8.5} \approx 14.12$ ist länger als die Seite 8.5 — unmöglich, Abstandszeile 0 $\rightarrow 2$ von 4 P. $h = \frac{2A}{a} \approx 14.12$ (Dreiecksformel): Abstandszeile 0 $\rightarrow 3$ von 4 P.

G4 Walmdach

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Mittellinie	1	$A = m \cdot h$, also $m = \frac{A}{h} = \frac{38.25}{4.5} = 8.5$ m (gleichwertig: $a + c = \frac{2A}{h} = 17$ m)
(a) First	1 (E)	$m = \frac{1}{2}(a + c)$, also $c = 2m - a = 17 - 12 = 5$ m
(b) Überstand	1	Teildreieck aus Höhe, Überstand und Grat; Überstand $\frac{a-c}{2} = \frac{12-5}{2} = 3.5$ m
(b) Grat	1 (F)	Der Grat ist die Hypotenuse: $s = \sqrt{3.5^2 + 4.5^2} = \sqrt{32.5} \approx 5.70$ m

Typische Fehler: $c = \frac{2A}{h} = 17$ ($-a$ vergessen): Mittellinienzeile zählt, Firstzeile 0; der Überstand $\frac{12-17}{2}$ wäre negativ — unmöglich, keine Folgepunkte $\rightarrow 1$ von 4 P. $c = \frac{A}{h} - a = -3.5$ (Mittellinie als $a + c$ genommen): Mittellinienzeile zählt, die anderen 0 (negative Länge) $\rightarrow 1$ von 4 P. Ganzer Unterschied $12 - 5 = 7$ als Überstand ($s = \sqrt{7^2 + 4.5^2} \approx 8.32$): Überstandzeile 0; Gratzeile als Folgepunkt $\rightarrow 3$ von 4 P. $s = 3.5 + 4.5 = 8$ (Längen addiert) oder $s = \sqrt{4.5^2 - 3.5^2} \approx 2.83$ (minus statt plus): Gratzeile 0 $\rightarrow 3$ von 4 P.

G5 Die Mittellinie teilt das Trapez

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Mittellinie	1 (E)	$m = \frac{1}{2}(a + c) = \frac{1}{2}(11 + 5) = 8$ cm
(b) Teilhöhen	1	Die Mittellinie liegt auf halber Höhe: Beide Teiltrapeze sind 2 cm hoch; ihre Parallelseiten sind a und m bzw. m und c .
(b) unten	1 (F)	$A_1 = \frac{1}{2}(11 + 8) \cdot 2 = 19$ cm ²
(b) oben	1 (F)	$A_2 = \frac{1}{2}(8 + 5) \cdot 2 = 13$ cm ² (Probe: $19 + 13 = 32 = m \cdot h$)

Typische Fehler: Beide Teile mit der ganzen Höhe 4 gerechnet ($A_1 = 38$, $A_2 = 26$): Teilhöhenzeile 0; beide Flächen als Folgepunkte $\rightarrow 3$ von 4 P. $m = a + c = 16$ oder $m = \frac{a-c}{2} = 3$: Mittellinienzeile 0; die Mittellinie liegt nicht zwischen 5 und 11 — unmöglich, keine Folgepunkte für die Flächen; die Teilhöhenzeile zählt $\rightarrow 1$ von 4 P. Nur die Gesamtfläche $8 \cdot 4 = 32$: beide Flächenzeilen 0.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Fehler	1	Die Diagonale ist die Hypotenuse, die Höhe eine Kathete — es muss $h^2 = d^2 - b^2$ heissen, nicht plus. Ohne Rechnen: Eine Seite des Rechtecks kann nicht länger sein als seine Diagonale ($85.80 > 65$). Nötig: eine der beiden Begründungen.
(b) Höhe	1 (E)	$h = \sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{1089} = 33 \text{ cm}$
(b) Umfang	1 (F)	$U = 2(56 + 33) = 178 \text{ cm}$
(c) Quadrat	1 (E)	Im Quadrat ist $d = a\sqrt{2}$, also $a = \frac{65}{\sqrt{2}} \approx 45.96 \text{ cm}$ (gleichwertig: $2a^2 = 65^2$)

Typische Fehler: Umfang mit Tims Höhe ($2(56 + 85.80) = 283.60$): Tims Höhe ist länger als die Diagonale — unmöglich, Umfangzeile 0. $U = 56 + 33 = 89$ (nur zwei Seiten): Umfangzeile 0. $a = \frac{65}{2} = 32.5$ (Diagonale halbiert) oder $a = 65\sqrt{2} \approx 91.92$: Quadratzeile 0.

4 • Selbsteinschätzung

- 21 – 24 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 16 – 20 P Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 15 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel:** G1 → Kapitel 1 (Die Vierecks-Familie); G2 → Kapitel 2 (Fläche und Umfang), die Höhe in Kapitel 4; G3 → Kapitel 4 (Fehlende Längen), Fläche und Abstand in Kapitel 2; G4 → Kapitel 3 (Trapez und Mittellinie), der Grat in Kapitel 4; G5 → Kapitel 3; G6 → Kapitel 4, der Umfang in Kapitel 2