

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket; Teil A ohne, Teil B mit Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Trigonometrische Funktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($\frac{1}{8} = 0.125$), $y = \dots$ oder $f(x) = \dots$, Bogenmass exakt oder auf drei Dezimalen ($\frac{5\pi}{6}$ oder 2.618), $k \in \mathbb{Z}$ oder « k ganz» — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Periode mal statt durch b» oder «nur die Lösung des Rechners»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Teil A ist ohne, Teil B mit Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Sinus und Cosinus skizzieren

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Sinuskurve	1	durch $(-\pi 0)$, $(-\frac{\pi}{2} -1)$, $(0 0)$, $(\frac{\pi}{2} 1)$, $(\pi 0)$, $(\frac{3\pi}{2} -1)$, $(2\pi 0)$; weiche Bögen, keine Spitzen. Toleranz: ein halbes Kästchen.
Cosinuskurve	1	durch $(-\pi -1)$, $(-\frac{\pi}{2} 0)$, $(0 1)$, $(\frac{\pi}{2} 0)$, $(\pi -1)$, $(\frac{3\pi}{2} 0)$, $(2\pi 1)$.
Nullstellen	1 (A)	$-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$ — alle drei nötig (gleichwertig: $\frac{\pi}{2} + k\pi$ für $k = -1, 0, 1$).

Typische Fehler: Sinus und Cosinus vertauscht: beide Skizzen-Zeilen 0; stimmen die Nullstellen des Cosinus → 1 von 3 P. Nur $0 \leq x \leq 2\pi$ gezeichnet: die betroffene Skizzen-Zeile 0. Nullstellen nur $\frac{\pi}{2}$ und $\frac{3\pi}{2}$ ($-\frac{\pi}{2}$ fehlt): letzte Zeile 0 → 2 von 3 P.

G2 Werte ohne Rechner

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Grad	1 (E)	$\frac{5\pi}{3} = \frac{5}{3} \cdot 180^\circ = 300^\circ$
(b) Sinus, Cosinus	1 (E)	$\sin \frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ (vierter Quadrant), $\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ (dritter Quadrant). Beide nötig.
(c) Tangens	1 (E)	$\tan \frac{3\pi}{2}$ ist nicht definiert ($\cos \frac{3\pi}{2} = 0$, Pol); $\tan(-\frac{3\pi}{4}) = 1$ (Sinus und Cosinus beide negativ, gleich gross). Beide nötig.

Typische Fehler: (b) $\frac{1}{2}$ statt $-\frac{1}{2}$ (Vorzeichen des Quadranten übersehen): Zeile (b) 0. (c) $\tan \frac{3\pi}{2} = 0$ (Pol mit Nullstelle verwechselt) oder $\tan(-\frac{3\pi}{4}) = -1$: Zeile (c) 0. Als (E)-Weg genügt der Quadrant oder ein Hinweis auf den Einheitskreis.

G3 Symmetrie und Periode

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a)	1 (E)	$\sin(-1.1) = -\sin 1.1 \approx -0.891$ — Sinuskurve punktsymmetrisch zum Ursprung.
(b)	1 (E)	$\cos(-1.1) = \cos 1.1 \approx 0.454$ — Cosinuskurve achsensymmetrisch zur y-Achse.
(c)	1 (E)	$\sin(\pi - 1.1) = \sin 1.1 \approx 0.891$ — Sinuskurve symmetrisch zur Geraden $x = \frac{\pi}{2}$.

Typische Fehler: Vorzeichen in (a) vergessen (0.891): Zeile (a) 0. (b) -0.454 : Zeile (b) 0. (c) $\cos 1.1 \approx 0.454$ oder -0.891 : Zeile (c) 0. Richtige Zahl ohne jede Begründung: die Zeile 0 — (E) verlangt einen erkennbaren Weg, hier die Symmetrie.

G4 Die Tangensfunktion

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) D und p	1 (A)	$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}; p = \pi$. Beides nötig.
(b) Pole	1 (A)	$x = \frac{\pi}{2}$ und $x = \frac{3\pi}{2}$
(b) Nullstellen	1 (A)	$0, \pi, 2\pi$ — alle drei nötig.

Typische Fehler: $p = 2\pi$: Zeile (a) $0 \rightarrow 2$ von 3 P. Pole und Nullstellen vertauscht: beide Zeilen (b) $0 \rightarrow 1$ von 3 P. Nullstellen ohne 0 oder ohne 2π (Ränder vergessen): Nullstellen-Zeile 0.

G5 Kenngrößen von $y = 2 \sin(3x) - 1$

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Amplitude	1 (A)	$a = 2$
Periode	1 (E)	$p = \frac{2\pi}{3}$ (gleichwertig: ≈ 2.094)
Wertemenge	1 (E)	$W = [-1 - 2; -1 + 2] = [-3; 1]$

Typische Fehler: $p = 6\pi$ ($2\pi \cdot 3$ statt $2\pi : 3$): Periode-Zeile $0 \rightarrow 2$ von 3 P. $W = [-2; 2]$ (Mittellinie vergessen) oder $W = [-1; 1]$: Wertemenge-Zeile 0. Amplitude 3 oder -1 : Amplitude-Zeile 0.

G6 Gleichung aus dem Graphen

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
v	1 (A)	höchster Wert 3.5, tiefster -1.5 : Mittellinie $v = \frac{3.5 + (-1.5)}{2} = 1$
a	1 (A)	$a = 3.5 - 1 = 2.5$
b	1 (E)	Periode $p = 4\pi$ (zum Beispiel von $(0 1)$ bis $(4\pi 1)$ mit gleicher Steigung): $b = \frac{2\pi}{4\pi} = 0.5$. Also $y = 2.5 \sin(0.5x) + 1$.

Typische Fehler: $b = 2$ (Periode 4π abgelesen, aber b und $\frac{1}{b}$ verwechselt): Zeile b $0 \rightarrow 2$ von 3 P. $a = 5$ (ganze Spannweite statt halbe): Zeile a 0. $v = 0$: Zeile v 0; $a = 3.5$ als Folgefehler zählt (A nur bei richtigem Wert) nicht $\rightarrow$ höchstens 1 von 3 P.

G7 Alle Lösungen

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) x_1	1 (E)	$x_1 = \sin^{-1}(0.35) \approx 0.358$
(a) x_2	1 (E)	$x_2 = \pi - x_1 \approx 2.784$
(b) x_1	1 (E)	$x_1 = \cos^{-1}(0.35) \approx 1.213$
(b) x_2	1 (E)	$x_2 = 2\pi - x_1 \approx 5.070$

Typische Fehler: Rechner im Gradmodus (20.487 bzw. 69.513): Zeilen x_1 0; die x_2 -Zeilen gibt es als Folgefehler nicht, weil der Wert nicht im Intervall liegt $\rightarrow 0$ von 4 P, ausser die Umrechnung ins Bogenmass ist erkennbar. (a) $x_2 = 2\pi - x_1 \approx 5.925$ (Regel des Cosinus): Zeile (a) x_2 0. (b) $x_2 = \pi - x_1 \approx 1.928$ (Regel des Sinus): Zeile (b) x_2 0. Nur die Rechnerwerte, keine zweiten Lösungen $\rightarrow 2$ von 4 P. Abweichung in der dritten Dezimale durch Runden zählt voll.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Extremwerte	1 (A)	höchstens $3 + 2 = 5$ m, mindestens $3 - 2 = 1$ m. Beides nötig.
(b) Periode	1 (E)	$p = \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ Stunden
(c) Zeiten	1 (E)	$2 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 3 = 4 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{6}$ oder $\frac{5\pi}{6}$, also $t = 1$ und $t = 5$ (um 1 Uhr und um 5 Uhr). Beide nötig.

Typische Fehler: (b) $p = \frac{\pi^2}{3}$ (2π mal statt durch b): Zeile (b) 0. (c) Nur $t = 1$ (zweite Lösung über die Symmetrie vergessen): Zeile (c) 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. (c) Mit dem Rechner $t = \frac{6}{\pi} \sin^{-1}(0.5) = 1$ und $t = 6 - 1 = 5$: gleichwertig, zählt voll.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ **Kapitel:** G1, G2 $\rightarrow$ Kapitel 1 · G3 $\rightarrow$ Kapitel 2 · G4 $\rightarrow$ Kapitel 3 · G5, G6 $\rightarrow$ Kapitel 4 · G7, G8 $\rightarrow$ Kapitel 5