

Corrigé colle S12
MPI/MPI* du lycée Faidherbe
Exercices

Léane Parent

29 novembre 2025

Exercice 20

Montrer que e est irrationnel.

On suppose e rationnel, on note $e = \frac{p}{q}$, avec $p, q \in \mathbb{N}$.
Considérons la quantité $pq!$. On a :

$$\begin{aligned} q!p &= q!q \frac{p}{q} = q!qe \\ &= q!q \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \\ &= q \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} + q \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!} \end{aligned}$$

Le membre de gauche est évidemment entier. Le second terme également, par somme d'entiers. Notons le second terme δ .

Montrons que $0 < \delta < 1$.

La première inégalité est évidente. De plus, on a $\delta = q \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!} = q \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{q!}{(q+k)!}$.

Or, pour $k > 0$, on a $\frac{q!}{(q+k)!} \leq \frac{1}{(q+1)^k}$, avec égalité ssi $k = 1$.

On en déduit $\delta = q \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{q!}{(q+k)!} < q \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(q+1)^k} = q \frac{1}{q+1} \frac{1}{1 - \frac{1}{q+1}} = \frac{q}{q+1} \frac{q+1}{q} = 1$.

On a bien montré $0 < \delta < 1$. Or, $\delta \in \mathbb{Z}$, par différence, ce qui est absurde.

Ainsi, $e \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 22

On suppose l'existence de $A \subset \mathbb{N}$ tq $\sum_{n \in A} \frac{x^n}{n!} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{x^2}$

1. Pour $I \subset A$ fini, calculer $\int_0^{+\infty} \sum_{n \in I} \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$.

La somme étant finie, on peut permuter somme et intégrale.

Calculons, par récurrence sur n (eww), $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x}$.

On a, pour $n > 0$ $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} = -[x^n e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} = 0 + I_{n-1}$ (le crochet vaut 0 parce qu'on a supposé $n \neq 0$, il faut faire attention!) Le crochet converge, et I_{n-1} converge par HR, d'où la convergence de I_n , et l'égalité.

On en déduit $I_n = I_0 = -1$.

Dès lors, l'intégrale de l'énoncé vaut $-\sum_{n \in I} \frac{1}{n!}$.

il y a une erreur, je connais pas beaucoup de fonctions positives d'intégrale négative