## Utilizando transformada Z para resolver um problema de recorrência

Péricles Lopes Machado

July 25, 2016

## Abstract

Neste artigo, a transformada Z é utilizada na resolução do problema:

$$F(0) = 0, \text{ para } n \le 0$$

$$F(n) = \frac{1}{n^2} \sum_{0 \le k < n} \left[ \sum_{0 \le i < k} [1 + F(k)] + 1 + \sum_{k \le i < n} [1 + F(n - 1 - k)] \right], \text{ para } n > 0$$

$$(1)$$

## 1 Resolução

Simplificando-se a eq. (1):

$$n^{2}F(n) = n + \sum_{0 \leq k < n} [k + kF(k)] + \sum_{0 \leq k < n} [n - k + (n - k)F(n - 1 - k)]$$

$$n^{2}F(n) = n + \sum_{0 \leq k < n} [k] + \sum_{0 \leq k < n} [kF(k)] + \sum_{0 \leq k < n} [n - k] + \sum_{0 \leq k < n} [(n - k)F(n - 1 - k)]$$

$$n^{2}F(n) = n + \sum_{0 \leq k < n} [n] + 2\sum_{0 \leq k < n} [kF(k)]$$

$$n^{2}F(n) = (n^{2} + n) + 2\sum_{k \geq 0} kF(k)u(n - 1 - k)$$

$$(2)$$

obtém-se:

$$n^{2}F(n) = (n^{2} + n) + 2[nF(n)] * [u(n-1)],$$
(3)

onde u(n) = 1, para  $n \ge 0$  e u(n) = 0, para n < 0. Aplicando a transformada  $\mathcal{Z}$  em (3) e fazendo  $Y = \mathcal{Z}\{F(n)\}$ :

$$z^{2}\frac{d^{2}}{dz^{2}}Y = \mathcal{Z}\left\{n^{2} + n\right\} - 2z\frac{d}{dz}Y\mathcal{Z}\left\{u(n-1)\right\}$$

$$\begin{split} z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \mathcal{Z} \left\{ n^2 + n \right\} - 2z \left( \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right) \frac{d}{dz} Y \\ z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \mathcal{Z} \left\{ n^2 \right\} + \mathcal{Z} \left\{ n \right\} - \left( \frac{2z}{z - 1} \right) \frac{d}{dz} Y \end{split}$$

$$\begin{split} z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} + \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \left(\frac{2z}{z-1}\right) \frac{d}{dz} Y \\ z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{z^2(1+z^{-1})}{(z-1)^3} + \frac{z}{(z-1)^2} - \left(\frac{2z}{z-1}\right) \frac{d}{dz} Y \\ z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + \frac{z}{(z-1)^2} - \left(\frac{2z}{z-1}\right) \frac{d}{dz} Y \\ z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + \frac{z(z-1)}{(z-1)^3} - \left(\frac{2z}{z-1}\right) \frac{d}{dz} Y \\ z^2 \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{2z^2}{(z-1)^3} - \left(\frac{2z}{z-1}\right) \frac{d}{dz} Y \\ \frac{d^2}{dz^2} Y &= \frac{2}{(z-1)^3} - \left(\frac{2}{z(z-1)}\right) \frac{d}{dz} Y \end{split}$$

Por fim,

$$\frac{d^2}{dz^2}Y = \frac{2}{(z-1)^3} - \left(\frac{2}{z(z-1)}\right)\frac{d}{dz}Y.$$
 (4)

Resolvendo a equação diferencial (4), usando o WolframAlpha:

$$Y(z) = (c_1 z^2 + 2\log(1-z)((c_1-2)z - c_1 + z^2 - 2(z-1)\log(z)) - c_1 z - c_1 + 2(-2(z-1)Li_2(z) + z^2(-\log(z)) + z + (z-1)\log^2(1-z) + 2z\log(z) - 3))/(z-1) + c_2$$
(5)

Expandindo a eq. (5):

$$Y(z) = \frac{c_1 z^2}{z - 1} - \frac{c_1 z}{z - 1} - \frac{c_1}{z - 1} + \frac{2c_1 \log(1 - z)}{z - 1} + \frac{2z^2 \log(1 - z)}{z - 1} - \frac{2z^2 \log(z)}{z - 1} + \frac{2z \log^2(1 - z)}{z - 1} - \frac{2\log^2(1 - z)}{z - 1} - \frac{4z \log(1 - z)}{z - 1} - \frac{2\log^2(1 - z)}{z - 1} - \frac{4z \log(1 - z) \log(z)}{z - 1} + \frac{4\log(1 - z) \log(z)}{z - 1} + \frac{4z \log(z)}{z - 1}$$

Simplificando a eq. (6):

$$Y(z) = c_1 z - \frac{c_1}{z - 1} + c_2 - \frac{c_1}{z - 1} + c_2 - \frac{2z^2}{z - 1} \left[ \log(1 - z) - \log(z) \right] + \frac{2z^2}{z - 1} - \frac{6}{z - 1} + \frac{4\log(1 - z)\log(z) \left[ \frac{z + 1}{z - 1} \right] + 2\log^2(1 - z) - \frac{2}{4\log(z) \left[ \frac{z}{z - 1} \right] - \frac{2}{4\log(z) \left[ \frac{z}{z - 1} \right] + 2c_1 \log(1 - z)}$$

Reorganizando:

$$Y(z) = c_1 z - \frac{c_1}{z - 1} + c_2 - 4Li_2(z) + \frac{2z^2 - 4z}{z - 1} \left[ \log(1 - z) - \log(z) \right] + \frac{2z - 6}{z - 1} + 4\log(1 - z)\log(z) \left[ \frac{z + 1}{z - 1} \right] + 2\log^2(1 - z) + 2c_1\log(1 - z)$$

$$(7)$$

Aplicando a transformada inversa  $\mathbb{Z}^{-1}$  na eq. (7):

$$F(n) = Z^{-1} \{c_1 z\} - Z^{-1} \left\{ \frac{c_1}{z - 1} \right\} + Z^{-1} \{c_2\} - Z^{-1} \{4Li_2(z)\} + Z^{-1} \left\{ \frac{2z^2 - 4z}{z - 1} \left[ \log(1 - z) - \log(z) \right] \right\} + Z^{-1} \left\{ \frac{2z - 6}{z - 1} \right\} + Z^{-1} \left\{ 4\log(1 - z) \log(z) \left[ \frac{z + 1}{z - 1} \right] \right\} + Z^{-1} \left\{ 2\log^2(1 - z) \right\} + Z^{-1} \left\{ 2c_1 \log(1 - z) \right\}$$

Simplificando:

$$\begin{split} \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{c_1 z - c_1 - c_1 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 - 6 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 - 6 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ c_2 \delta(n) - \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 4 \operatorname{Li}_2(z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 z^2 - 4 z}{z - 1} \left[ \log(1 - z) - \log(z) \right] \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 4 \log(1 - z) \log(z) \left[ \frac{z + 1}{z - 1} \right] \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 2 \log^2(1 - z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{c_1 z}{1 - z^{-1}} \right\} + \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{-c_1}{1 - z^{-1}} \right\} + \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{-c_1 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 - 6 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 - 6 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 z^2 - 4 z}{z - 1} \left[ \log(1 - z) - \log(z) \right] \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 4 \log(1 - z) \log(z) \left[ \frac{z + 1}{z - 1} \right] \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 2 \log^2(1 - z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 2 \log^2(1 - z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 4 \operatorname{Li}_2(z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 z^2 - 4 z}{z - 1} \right\} * \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \log(1 - z) - \log(z) \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ \frac{2 \log^2(1 - z)}{z - 1} \right\} + \\ \mathcal{Z}^{-1} & \left\{ 2 \log^2(1 - z) \right\} + \\$$