

PEDİYATRİK GASTROENTEROLOJİ · KLİNİK KARAR KİTAPÇIĞI

Çocuk Gastroenterolojisi Algoritma Kitapçığı

Sık karşılaşılan pediyatrik gastroenteroloji sorunlarında kanıta dayalı,
baskıya uygun tanı ve tedavi karar akışları.

4 algoritma 0-18 yaş Rome IV · ESPGHAN / NASPGHAN Sürüm 1 · 2026

İçindekiler

01 Fonksiyonel Kabızlık

Rome IV + ESPGHAN/NASPGHAN 2014 · tanı, disimpaksiyon, idame

02 Transaminaz Yüksekliği

İzole/kalıcı ALT-AST · basamaklı tetkik, akut yetmezlik

03 Kronik İshal

Ozmotik/sekretuar/inflamatuvar · yaşa göre yaklaşım

04 Yenidoğan Kolestazi

Uzamış sarılık · biliyer atrezi aciliyeti

Uyarı: Bu kitapçık eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Doz ve referans aralıklarını uygulamadan önce doğrulayın.

Çocuklarda Fonksiyonel Kabızlık

— Tanı ve Tedavi Algoritması

Rome IV tanı ölçütleri ve ESPGHAN/NASPGHAN 2014 kanıta dayalı kılavuzuna göre; birinci basamak ve pediatri pratiği için basamaklı yaklaşım.

Rome IV

ESPGHAN / NASPGHAN 2014

0–18 yaş

Fonksiyonel (organik olmayan) kabızlık

Tanı ölçütleri (Rome IV)

Çocukların ~%95'inde kabızlık **fonksiyoneldir**. Tanı öncelikle klinik olup, iki ölçüt setinden en az **2 madde** ≥ 1 ay (≥ 4 yaş için ≥ 1 ay, çoğu semptom son 2 ayda) karşılanmalıdır.

0–4 yaş (bebek/erken çocukluk)

≥ 1 ay süreyle, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 defekasyon
- 2 Tuvalet eğitimi sonrası haftada ≥ 1 kirletme (enkoprezis)
- 3 Aşırı gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert-sıkı dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

≥ 4 yaş (çocuk/ergen)

≥ 1 ay, İBS ölçütlerini karşılamayan, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 tuvalette defekasyon
- 2 Haftada ≥ 1 kirletme epizodu
- 3 Retansif postür / istemli gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

Tanı için görüntüleme, laboratuvar veya kolonik geçiş çalışması **gerekmez**. Ayrıntılı öykü + fizik muayene (perianal/lomber-sakral bölge + tek seferlik rektal muayene endikeyse) çoğu vakada yeterlidir.

02 Karar akışı

Değerlendir → alarm bulgularını dışla → impaksiyonu boşalt → idame → izlem. Her basamakta ailenin eğitimi ve tuvalet rutini tedavinin temelidir.

BAŞLANGIÇ

Kabızlık şikâyeti ile başvuru

Öykü: başlangıç yaşı, dışkı sıklığı/kıvamı (Bristol), ağrı, kanama, kirletme, tuvalet eğitimi, beslenme, ilaçlar, mekonyum çıkış zamanı, büyüme.

KARAR 1

Alarm bulgusu / organik neden şüphesi var mı?

Bkz. bölüm 03. Mekonyumun >48 saatte çıkışı, kanlı dışkı (fissür yokken), büyüme geriliği, safralı kusma, karın distansiyonu, anormal nörolojik/sakral bulgu...

EVET → organik değerlendirme

HAYIR → fonksiyonel kabızlık

YÖNLENDİRME

Hedefe yönelik tetkik + sevk

Hirschsprung, hipotiroidi, çölyak, anatomik/spinal anomali, inek sütü alerjisi vb. Pediatrik gastroenterolojiye yönlendir; ampirik idameyi geciktirme.

TANI

Fonksiyonel kabızlık kabul et

Aileyi bilgilendir; tuvalet ve beslenme davranışlarını düzenle; tedaviye başla.

KARAR 2

Fekal impaksiyon var mı?

Rektumda kitle, sık kirletme, taşkın (overflow) inkontinans, kısmi tıkanma. Muayene/öyküyle değerlendir.

VAR → önce disimpaksiyon

YOK → doğrudan idame

BASAMAK A

Disimpaksiyon (boşaltma)

Oral PEG 1–1.5 g/kg/gün, 3–6 gün (ilk basamak). Alternatif/başarısızlıkta lavman. İdameye ancak boşaltma sağlanınca geç.

BASAMAK B

İdame tedavisine başla

Boşaltma gerekmiyorsa idame ozmotik laksatifle başla.

BASAMAK C · TEMEL

İdame tedavi — en az 2 ay

PEG 0.4 g/kg/gün (birinci tercih), doz dışkıyı yumuşak tutacak şekilde titre edilir. + düzenli **tuvalet oturma rutini** (öğünlerden sonra 5–10 dk), pozitif pekiştirme, yeterli sıvı ve dengeli lif. Belirtiler **en az 1 ay tamamen düzeldikten sonra** ve tuvalet eğitimi tamamsa kademeli azalt.

KARAR 3

4–8 haftada yeterli yanıt var mı?

YANIT VAR → sürdür + azalt

İZLEM

Devam et, relapsı izle

Tedaviyi erken kesme; nüks sıktır.
Kademeli doz azaltımı, aile eğitimi
pekiştir.

YANIT YOK → yeniden değerlendir

DİRENÇLİ

Uyum? doz? tanı? → sevk

İlaç uyumu ve dozu gözden geçir, ikinci ajan ekle (bkz. tablo). İnatçı vakada organik nedenleri yeniden ara ve **pediatrik gastroenterolojiye yönlendir**.

03 Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)

Bu bulgulardan herhangi biri varsa fonksiyonel kabızlık tanısı ertelenir; hedefe yönelik tetkik ve sevk gerekir.

● Yaşamın ilk **1 ayında** başlayan kabızlık

● Mekonyumun **>48 saatte** çıkışı (Hirschsprung)

● **Büyüme geriliği** / kilo kaybı

● **Safralı kusma**, ciddi karın distansiyonu

● Fissür olmadan **rektal kanama**

● Ailede **Hirschsprung** öyküsü

● Anormal anüs pozisyonu / **anal ton**, gluteal asimetri

● Lombosakral bölgede kıllanma, gamze, sakral çukur → **spinal anomali**

● Alt ekstremitelerde **nörolojik defisit** / kremaster refleks kaybı

● **Mesane disfonksiyonu**, sürekli idrar kaçırma

● Sistemik: ateş, **çölyak/hipotiroidi** bulguları, aşırı susama

● Cinsel istismar kaygısı / açıklanamayan bulgular

Ozmotik laksatifler (özellikle PEG) hem boşaltma hem idamede birinci basamaktır.

Dozlar yaklaşık olup çocuğa ve yanıtı göre titre edilir.

Disimpaksiyon (boşaltma) — kısa süreli

İLAÇ	DOZ	SÜRE / NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	1–1.5 g/kg/gün	3–6 gün; sıvıyla; ayaktan uygulanabilir
Sodyum fosfat / salin lavman	Yaşa göre	PEG yoksa/yetersizse; süt çocuğunda dikkatli
Bisakodil (rektal) — seçili vaka	5–10 mg	Rutin ilk tercih değil

İdame tedavi — en az 2 ay

İLAÇ	BAŞLANGIÇ DOZU	NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	0.4 g/kg/gün	Yumuşak dışkıya göre titre; her yaşta güvenli, palatabl
Laktuloz	1–2 g/kg/gün (1–3 mL/kg)	<6 ay / PEG uygun değilse tercih; gaz yapabilir
Sıvı parafin (mineral yağ)	1–3 mL/kg/gün	>1 yaş; aspirasyon riski olanda kaçın
Magnezyum hidroksit	Yaşa göre	Alternatif ozmotik; böbrek yetmezliğinde dikkat
Bisakodil / senna (ek uyarıcı)	Yaşa göre	Ozmotik yetersizse kısa süreli ekleme (kurtarma)

Süt çocuğunda (<6 ay) laktuloz veya ozmotik ilk seçenektir; ayrıca laktuloz/sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) faydalıdır. **İnek sütü proteini alerjisi** düşünülen dirençli vakalarda 2–4 haftalık eliminasyon denenebilir.

05 Davranışsal ve beslenme desteği

Tuvalet rutini & davranış

- Öğünlerden sonra günde 2–3 kez, **5–10 dk** tuvalette oturma (gastrokolik refleks).
- Ayakların desteklendiği **uygun postür** (basamak/tabure).
- Dışkı günlüğü ve **pozitif pekiştirme** (ödül/yıldız çizelgesi).
- Cezalandırıcı tutumdan kaçın; tuvalet korkusunu azalt.
- Aile eğitimi: kabızlık kronik seyreder, tedavi **aylar** sürer.

Beslenme

- **Yeterli sıvı** ve yaşa uygun dengeli **lif** alımı (normalin üstüne çıkarmak gerekmez).
- Sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) süt çocuğunda yardımcı.
- **Rutin olarak** prebiyotik/probiyotik önerilmez (yeterli kanıt yok).
- Aşırı inek sütü tüketimini gözden geçir.
- Diyet tek başına tedavi değildir — laksatifin yerini tutmaz.

Tedavinin süresi: İdame en az **2 ay** sürdürülür; belirtiler **en az 1 ay tam düzeldikten** ve tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra doz kademeli azaltılır. Erken kesme en sık nüks nedenidir.

06 Pediatrik gastroenterolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **alarm bulgusu**

Optimal tedaviye rağmen **dirençli** seyir

Tanıda belirsizlik / organik şüphesi

Hirschsprung şüphesi (mekonyum gecikmesi)

Ağır enkoprezis / psikososyal etki

Rektal prolapsus, anal patoloji

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç dozları uygulamadan önce doğrulanmalıdır. Yayınlanmış tam metin kılavuzlara başvurun.

Kaynaklar

1. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, ve ark. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. *JPGN*. 2014;58(2):258–274.
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1456–1468.
3. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1443–1455.

Çocuklarda Transaminaz Yüksekliği — Değerlendirme Algoritması

İzole veya kalıcı ALT/AST yüksekliğine basamaklı yaklaşım; önce doğru ve karaciğer dışı nedenleri dışla, akut yetmezliği tanı, ardından yaygından nadire tetkik et.

ALT / AST

Basamaklı tetkik

0–18 yaş

Hipertransaminazemi

01 Tanım ve ilk doğrulama

ALT karaciğere daha özgüdür; **AST** kas, eritrosit ve kalpte de bulunur. Tek bir yüksek değer üzerine geniş tetkik başlatmadan önce sonucu **tekrarlayın** ve karaciğer dışı kaynakları dışlayın.

Önce netleştir

- **Yaş/cinsiyete göre ULN** kullan — çocukta ALT üst sınırı erişkinden düşüktür (yaklaşık erkek ~25–30, kız ~22–25 U/L).
- Hafif izole yükseklikte **2–4 hafta sonra tekrarla**; geçici yükseklik sık.
- Öncesi hastalık, egzersiz, ilaç/bitkisel ürün, alkol (ergen) sorgula.

Karaciğer dışı kaynağı dışla

- **Kas:** AST>ALT + CK/aldolaz yüksek → kas hastalığı (miyopati, egzersiz).
- **Hemoliz:** AST + LDH + indirekt bilirubin.
- **Makro-AST:** izole kalıcı AST yüksekliği, asemptomatik.
- **Tiroid** ve çölyak da transaminazı yükseltebilir.

Karaciğer hasarını **GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin** ile bütünle: sentetik fonksiyon (INR, albümin) ve kolestaz (GGT/ALP/bilirubin) paterni yönü belirler.

Hafif

< 3× ULN

Sık ve çoğu geçici. Tekrarla;
obezite/NAFLD, ilaç, geçirilmiş
enfeksiyonu düşün.

Orta

3–15× ULN

Belirgin hepatosellüler hasar.
Basamaklı tetkiki tamamla,
nedeni araştır.

Ağır> 15×
ULN
veya >
1000
U/L

Akut
hepatit /
toksik /
iskemik /
otoimmün.
Sentetik
fonksiyonu
acil
değerlendir.

Değerin mutlak yüksekliği kadar **kalıcılığı** ve **sentetik bozulma** eşlik edip etmediği önemlidir.

03 Karar akışı

Doğrula → karaciğer dışını dışla → akut yetmezliği tanı → risk/öykü → basamaklı tetkik
→ tanı yoksa görüntüleme ve sevk.

BAŞLANGIÇ

Yüksek ALT ve/veya AST saptandı

Öykü: semptom (sarılık, halsizlik, karın ağrısı, kaşıntı, koyu idrar), ilaç/toksin, aile öyküsü (Wilson, otoimmün, metabolik), obezite, seyahat/temas.

ADIM 1

Testi tekrarla + karaciğer dışını dışla

CK/aldolaz (kas), LDH/hemoliz, TSH; ALT/AST + GGT, ALP, bilirubin, INR, albümin, tam kan sayımı ile paterni belirle.

KARAR 1 — KRİTİK

Akut karaciğer yetmezliği bulgusu var mı?

INR $\geq$ 1.5–2 (K vitaminine yanıtız), ensefalopati, hipoglisemi, hızlı yükselen bilirubin, ağır sentetik bozukluk.

EVET → ACİL

HAYIR → planlı tetkik

ACİL

Nakil merkezine acil sevk

Pediatric hepatoloji/yoğun bakım. Aynı anda tedavi edilebilir nedenler (asetaminofen → NAC, otoimmün, metabolik, HSV) araştırılır.

DEVAM

Basamaklı ayaktan değerlendirme

Yükseklik derecesi ve riske göre 1. basamak testlere geç.

ADIM 2 · 1. BASAMAK (YAYGIN NEDENLER)

Sık görülenleri tara

NAFLD (obezite, USG), viral (HAV IgM, HBsAg/anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV), ilaç/toksin gözden geçir, çölyak (doku transglutaminaz IgA + total IgA).

KARAR 2

Neden bulundu ve yükseklik geçici mi?

EVET → nedene yönelik + izlem

YÖNET

Tedavi et, düzeltmeyi doğru

Örn. NAFLD'de yaşam tarzı; ilaç kesimi; enfeksiyon izlemi. Normale dönene dek ALT takip.

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Nadir/tedavi edilebilir nedenler

Otoimmün hepatit (ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG), **Wilson** (seruloplazmin; >3 yaş), **α 1-antitripsin** düzeyi/fenotip, metabolik/endokrin tetkik.

ADIM 4 · GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer USG (± Doppler)

Steatoz, hepatomegali, biliyer/parankimal patoloji, portal hipertansiyon bulguları.

KARAR 3

Kapsamlı tetkike rağmen ≥ 6 ay kalıcı / açıklanamayan?

EVET → sevk / biyopsi

İLERİ

Pediyatrik hepatolojiye yönlendir

Karaciğer biyopsisi ve genetik/metabolik ileri tetkik gerekebilir.

HAYIR → izlem

İZLEM

Periyodik ALT takibi

Hafif, düzelen, asemptomatik seyirde aralıklı kontrol yeterli olabilir.

Nedene yönelik laboratuvar / görüntüleme		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Hasar paterni + sentetik fonksiyon	ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR , albümin, TKS, glukoz
Dışlama	Karaciğer dışı kaynak	CK, aldolaz, LDH, TSH, (makro-AST düşün)
1. basamak	NAFLD	Boy/kilo/VKİ, açlık glukoz/insülin, lipid, karaciğer USG
1. basamak	Viral hepatit	HAV IgM, HBsAg + anti-HBc, anti-HCV, EBV/CMV serolojisi
1. basamak	Çölyak	Doku transglutaminaz IgA + total IgA
2. basamak	Otoimmün hepatit	ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG düzeyi
2. basamak	Wilson (>3 yaş)	Seruloplazmin, 24 saat idrar bakırı, göz muayenesi (KF halkası)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	α 1-antitripsin düzeyi + fenotip/genotip
2. basamak	Metabolik / endokrin	Yaşa göre metabolik tarama; tiroid; süt çocuğunda genişletilmiş panel
3. basamak	Kalıcı, açıklanamayan	Pediyatrik hepatoloji sevki, karaciğer biyopsisi, genetik test

Tetkik derinliği **yükseklik derecesi, kalıcılık ve klinikle** orantılı olmalıdır: hafif, geçici, asemptomatik izole yükseklikte önce tekrar + NAFLD taraması; ağır/kalıcı yükseklikte tam panel eş zamanlı istenir.

05

Yaş a özgü ipuçları

Süt çocuęu (< 1 yaş)

- Kolestaz eşlik ediyorsa **biliyer atrezi** ivedi dışlanır (direkt bilirubin, USG, cerrahi aciliyet).
- **Metabolik/genetik** nedenler öne çıkar: galaktozemi, tirozinemi, mitokondriyal hastalık, safra asidi bozuklukları.
- Enfeksiyon (TORCH, sepsis, idrar yolu enfeksiyonu) ve endokrin (hipotiroidi, hipopituitarizm).

Büyük çocuk / ergen

- **NAFLD** en sık neden (obezite, metabolik sendrom).
- **Viral hepatit**, ilaç/toksin, ergende alkol/madde.
- **Wilson** ve **otoimmün hepatit** mutlaka düşünölür — tedavi edilebilir, gecikmemeli.

06

Acil / alarm bulguları

● **Koagülopati**: INR $\geq$ 1.5–2, K vitaminine yanıtız

● **Ensefalopati**: bilinç/davranış değışiklięi, irritabilite

● **Hipoglisemi**, düşük albümin (sentetik yetmezlik)

● Hızlı yükselen **sarılık** / direkt hiperbilirubinemi

● ALT/AST > **1000 U/L** veya hızlı tırmanış

● Asetaminofen/toksin alımı öyküsü → **NAC** düşün

● Süt çocuęunda kolestaz → **biliyer atrezi** aciliyeti

● Portal hipertansiyon / assit / hepatosplenomegali

07 Pediatrik hepatolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **akut yetmezlik** bulgusu (acil)

Transaminaz **> 5× ULN** ve açıklanamayan

≥ 6 ay **kalıcı** yükseklik

Wilson / otoimmün / metabolik şüphe

Süt çocuğunda kolestaz

Biyopsi gerektiren durum

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Referans aralıkları laboratuvara göre değişir; ULN değerlerini kendi laboratuvarınızla doğrulayın.

Kaynaklar

1. Vajro P, Maddaluno S, Veropalumbo C. Persistent hypertransaminasemia in asymptomatic children: a stepwise approach. *World J Gastroenterol*. 2013;19(18):2740–2751.
2. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, ve ark. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for Pediatric NAFLD. *JPGN*. 2017;64(2):319–334.
3. Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, ve ark. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Position Statement. *JPGN*. 2018;66(2):345–360.
4. Socha P, Janczyk W, Dhawan A, ve ark. Wilson's Disease in Children: ESPGHAN Position Paper. *JPGN*. 2018;66(2):334–344.

Çocuklarda Kronik İshal — Değerlendirme Algoritması

≥ 2–4 hafta süren ishalde yaşa ve fizyopatolojik mekanizmaya göre yaklaşım: önce büyümeyi ve alarm bulgularını değerlendir, ozmotik/sekretuar ayrımını yap, hedefe yönelik tetkik et.

Kronik ishal ≥ 2–4 hafta

Ozmotik / Sekretuar / İnflamatuar

0–18 yaş

Malabsorpsiyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kronik ishal = ≥ 14 gün (çoğu kaynakta ≥ 4 hafta) süren, dışkı sıklığı ve/veya su içeriğinde artış. İlk soru: **çocuk büyüyor mu?** Büyüme geriliği ve alarm bulguları organik/malabsorptif nedeni işaret eder.

Öykü

- Süre, başlangıç yaşı, sıklık, **dışkı özelliği** (sulu / yağlı / kanlı-mukuslu).
- Beslenme: **aşırı meyve suyu/sorbitol**, yeni gıdalar, glüten, süt.
- Gece ishali, karın ağrısı, kilo/iştah, ateş, döküntü, seyahat.
- Antibiyotik öyküsü, aile öyküsü (çölyak, IBD, KF, immün yetmezlik).

Muayene

- Büyüme eğrisi** ve hidrasyon/ödem (protein kaybı).
- Karın distansiyonu, kitle, perianal hastalık (fistül/fissür → IBD).
- Çomak parmak, döküntü, aftöz lezyon, artrit (ekstraintestinal).
- Cilt altı yağ, kas kütlesi (kronik malnütrisyon işaretleri).

Fizyopatoloji tetkiki yönlendirir. Basit ipucu: **açlıkla düzelen** ishal ozmotik, **açlıkta süren** ishal sekretuardır.

Ozmotik

Açlıkla düzelir · dışkı pH < 5.5, redüktan madde (+), ozmotik aralık ↑

Karbonhidrat malabsorpsiyonu (laktoz, sukraz-izomaltaz), aşırı meyve suyu/sorbitol, laksatif.

Sekretuar

Açlıkta sürer · bol sulu, ozmotik aralık düşük

Enfeksiyon toksinleri, konjenital diyareler, nöroendokrin tümör, safra asidi.

İnflamatuar

Kan/mukus · kalprotektin ↑, CRP/ESR ↑

İnflamatuar bağırsak hastalığı, alerjik kolit, invaziv/kronik enfeksiyon.

Yağ malabsorpsiyonu

Yağlı-kokulu dışkı · elastaz ↓, dışkı yağı ↑

Çölyak, kistik fibrozis / pankreas yetmezliği, kolestaz, kısa bağırsak.

03 Karar akışı

Büyüme + alarm değerlendir → sağlıklı büyüyen sık iyi huylu nedenler → aksi halde mekanizmaya göre basamaklı tetkik → tanı yoksa sevk/endoskopi.

BAŞLANGIÇ

≥ 2-4 hafta süren ishal

Öykü, beslenme, dışkı özelliği ve büyüme eğrisini değerlendir.

KARAR 1

Büyüme geriliği veya alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı/duraklama, kanlı dışkı, gece ishali, dehidratasyon, ödem, ateş, perianal hastalık (bkz. bölüm 05).

HAYIR → sağlıklı büyüyor

EVET → organik tetkik

SIK İYİ HUylu NEDENLER

Diyet öyküsünü gözden geçir

Toddler ishali (kronik nonspesifik), aşırı meyve suyu/sorbitol, geçici post-enfeksiyöz laktoz intoleransı. Diyet düzenle + izle.

YÖNLENDİR

Basamaklı tetkike geç

Dışkı özelliği ve mekanizmaya göre hedefe yönelik test iste.

ADIM 1 · 1. BASAMAK

Dışkı + kan tetkikleri

Dışkı: kültür, parazit/Giardia antijeni, gizli kan, **kalprotektin**, pH + redüktan madde, elastaz. **Kan:** TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, **çölyak serolojisi** (doku transglutaminaz IgA + total IgA), TSH.

KARAR 2

Yönlendirici bulgu var mı?

EVET → nedene yönelik

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

YÖNET

Tanıya göre tedavi

Çölyak → glütensiz diyet; Giardia → tedavi; laktoz intoleransı → diyet; alerjik → eliminasyon. Yanıtı doğrula.

ADIM 2 · 2. BASAMAK

Genişletilmiş tetkik

Ter testi (KF), immünglobulinler, IBD göstergeleri, endokrin/metabolik, gerekirse

dışkı ozmotik aralığı ve nöroendokrin
belirteçler.

KARAR 3

Tanı hâlâ belirsiz / IBD veya konjenital şüphesi?

EVET → sevk / endoskopi

İLERİ

Pediyatrik gastroenterolojiye yönlendir

Üst/alt endoskopi + biyopsi, görüntüleme; süt
çocuğunda konjenital ishal için genetik tetkik.

HAYIR → izlem

İZLEM

Büyüme ve semptom takibi

Diyet ampirik denemesi + yakın izlem;
kötüleşme/yeni alarm → yeniden
değerlendir.

Hedefe yönelik laboratuvar / işlemler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Dışkı	Enfeksiyon	Kültür, Giardia/Cryptosporidium antijeni, parazit yumurta, (C. difficile seçili)
Dışkı	İnflamasyon	Fekal kalprotektin , gizli kan, lökosit
Dışkı	Malabsorpsiyon tipi	pH + redüktan madde (ozmotik), dışkı elastazı (pankreas), dışkı yağı
Kan	Genel + beslenme	TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, demir, çinko, vitaminler
Kan	Çölyak	Doku transglutaminaz IgA + total IgA
Kan	Endokrin	TSH (± hipertiroidi taraması)
2. basamak	Kistik fibrozis	Ter testi (± genetik)
2. basamak	İmmün yetmezlik	İmmünglobulinler (IgG/A/M), lenfosit alt grupları
3. basamak	IBD / mukozal	Üst + alt endoskopi ve biyopsi, görüntüleme (MR enterografi)
3. basamak	Konjenital ishal (süt çocuğu)	Dışkı elektrolit/ozmotik aralık, genetik panel, nöroendokrin belirteçler

Toddler ishali (6 ay–5 yaş, iyi büyüyen, ekstra tetkik gerektirmeyen): "4 F" düzenlemesi — aşırı **meyve suyu** (fruktoz/sorbitol) azalt, yeterli **yağ**, normal **lif**, aşırı **sıvıyı** sınırla. Genellikle 4 yaş civarı kendiliğinden geriler.

05

Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)

- **Büyüme geriliđi** / kilo kaybı / duraklama

- **Kanlı veya mukuslu dışkı**

- **Gece ishali** (uykudan uyandıran)

- Dehidratasyon, elektrolit bozukluđu

- **Ödem** / hipoalbüminemi (protein kaybı)

- Sürekli ateş, sistemik hastalık bulgusu

- **Perianal hastalık** (fistül, fissür, apse) → IBD

- Ekstraintestinal: artrit, döküntü, aftöz ülser, üveit

- Süt çocuđuunda **doğumdan itibaren** ağır sulu ishal (konjenital)

- Tekrarlayan/ağır enfeksiyon (immün yetmezlik)

06

Yaş a özgü en sık nedenler**Süt çocuđu (< 1 yaş)**

- **İnek sütü/besin protein alerjisi**, post-enfeksiyöz ishal.
- Doğumdan itibaren ağır sulu ishalde **konjenital ishaller** (mikrovillus inklüzyon, tufting, konjenital klor/sodyum ishali).
- **Kistik fibrozis**, primer immün yetmezlik.

Toddler / okul çađı / ergen

- **Toddler ishali** (kronik nonspesifik), post-enfeksiyöz laktoz intoleransı, Giardia.
- **Çölyak** hastalığı her yaş ta düşünölmeli.
- Okul çađı/ergende **IBD** (Crohn, ülseratif kolit) ve İBS.

Herhangi bir **alarm bulgusu****Büyüme geriliđi** / malnütrisyonKanlı ishal / **IBD** şüphesi

1. basamak tetkik tanısız + kalıcı

Süt çocuđunda **konjenital ishal** şüphesi

Endoskopi/biyopsi gerektiren durum

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik seçimi çocuđun yaşı, büyümesi ve klinik gidişine göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. Zella GC, Israel EJ. Chronic Diarrhea in Children. *Pediatr Rev.* 2012;33(5):207–218.
2. Guarino A, Lo Vecchio A, Berni Canani R. Chronic diarrhoea in children. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2012;26(5):649–661.
3. Thiagarajah JR, Kamin DS, Acra S, ve ark. Advances in Evaluation of Chronic Diarrhea in Infants. *Gastroenterology.* 2018;154(8):2045–2059.
4. Hill ID, Fasano A, Guandalini S, ve ark. NASPGHAN Clinical Report on Celiac Disease. *JPGN.* 2016;63(1):156–165.

Yenidoğan Kolestazı ve Uzamış Sarılık — Değerlendirme Algoritması

Direkt (konjuge) hiperbilirubinemi hiçbir zaman fizyolojik değildir. Amaç, tedavi edilebilir nedenleri ve özellikle **biliyer atreziyi** zaman kaybetmeden tanımdır.

Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Biliyer atrezi aciliyeti

ESPGHAN / NASPGHAN 2017

Zamana duyarlı: Biliyer atrezide Kasai portoenterostomisi ne kadar erken (ideali < 45–60. gün) yapılırsa sonuç o kadar iyidir. Kolestaz saptanan her bebek **ivedilikle** değerlendirilmeli ve pediatrik gastroenteroloji/hepatolojiye yönlendirilmelidir.

01 Tanım ve tarama eşiği

Kolestaz = safra akımının bozulması; laboratuvarında **direkt/konjuge bilirubin yüksekliği** ile tanınır.

Ne zaman fraksiyone bilirubin?

- **≥ 2 haftadır sarı** olan her bebekte direkt bilirubin bakılır (sadece anne sütü sarılığı varsayılmaz).
- İyi durumdaki tamamen anne sütü alan bebekte 3. haftaya dek izlenebilir; ancak **açolik dışkı / koyu idrar** varsa hemen ölçülür.
- **Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL** anormaldir (bazı tanımlarda total'in >%20'si).

İlk üç ipucu

- **Dışkı rengi** — açık/kil rengi (açolik) dışkı obstrüksiyonu düşündürür (renk kartı ile izle).
- **İdrar rengi** — koyu/çay renkli idrar (konjuge bilirubin atılımı).
- **Hepatomegali** ve büyüme/beslenme durumu.

Altın kural: Konjuge hiperbilirubinemi asla fizyolojik kabul edilmez — mutlaka araştırılır. Uzamış **indirekt** hiperbilirubinemi ise (anne sütü sarılığı, hemoliz, hipotiroidi) ayrı değerlendirilir.

Obstrüktif / anatomik

- **Biliyer atrezi** (en kritik)
- Koledok kisti
- Safra taşı / çamur, tıkaç

Hepatosellüler

- Enfeksiyon (TORCH, İYE, sepsis)
- Metabolik: galaktozemi, tirozinemi, α 1-antitripsin
- Endokrin: hipotiroidi, hipopituitarizm
- İdiyopatik neonatal hepatit

Genetik / kanaliküler

- **Alagille** sendromu
- **PFIC** (progresif ailesel)
- Safra asidi sentez defektleri

03 Karar akışı

Kolestazı doğru → durumu stabilize et ve tedavi edilebilir acilleri (sepsis, galaktozemi, endokrin) dışla → biliyer atreziyi hızla değerlendir → nedene yönelik tetkik.

BAŞLANGIÇ

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Fraksiyone bilirubin iste. Dışkı ve idrar rengini değerlendir.

KARAR 1

Direkt bilirubin yüksek mi? (> 1.0 mg/dL)

HAYIR (indirekt) → ayrı yol

EVET → KOLESTAZ

İNDİREKT

Anne sütü sarılığı / hemoliz / tiroid

Hemoliz, hipotiroidi, anne sütü sarılığını değerlendir; kolestaz algoritmasından çık.

KOLESTAZ DOĞRULANDI

İvedi değerlendirme başlat

Hepatoloji/GİS'e yönlendir; zaman biliyer atrezi lehine kritiktir.

ADIM 1 · ACİL DIŞLAMALAR

Tedavi edilebilir/tehlikeli nedenleri hemen ele al

Sepsis / İYE (kültür), galaktozemi (idrar redüktan madde, GALT — süt kes), hipotiroidi/hipopituitarizm (TSH, sT4, glukoz), hipoglisemi. K vitamini ile kanama riskini yönet.

ADIM 2 · TEMEL TETKİK + GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer paneli ve USG

ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR/albümin (sentetik fonksiyon), TKS. Karaciğer USG (açlık): safra kesesi yokluğu/küçüklüğü, triangular cord bulgusu, koledok kisti.

KARAR 2

Biliyer atrezi düşündüren bulgu var mı?

Açolik dışkı, yüksek GGT, USG'de safra kesesi anomalisi / triangular cord.

EVET → cerrahi aciliyet

HAYIR / belirsiz → tetkiki genişlet

İVEDİ

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Kolanjiyografi / cerrahi deęerlendirme

İntraoperatif kolanjiyografi tanıyı doęrular;
biliyer atrezide **Kasai portoenterostomisi**
(ideali < 45–60. g n).

Metabolik / genetik / dięer

α 1-antitripsin d zeyi/fenotip, tirozinemi
(s ksinilaseton), ter testi, TORCH; gerekirse
karacięer biyopsisi ve genetik panel
(Alagille/PFIC).

ADIM 4   DESTEK TEDAVİ (PARALEL)

Beslenme + yaęda eriyen vitaminler

MCT i eren mama ile beslenme desteęi, **A-D-E-K vitamini** takviyesi ve d zeyi, kaşıntı/kolestaz
i in **ursodeoksikolik asit**; b y meyi yakından izle.

Kolestaz nedenine yönelik tetkik		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Doğrula	Kolestaz + hasar/sentez	Fraksiyone bilirubin, ALT, AST, GGT , ALP, INR, albümin, TKS, glukoz
Acil	Enfeksiyon	Kan + idrar kültürü, gerekirse TORCH serolojisi
Acil	Galaktozemi	İdrar redüktan madde, GALT enzimi (süt kes)
Acil	Endokrin	TSH, sT4, (hipopituitarizm: kortizol, glukoz)
Görüntüleme	Anatomi	Karaciğer USG (safra kesesi, triangular cord, koledok kisti)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	Düzey + fenotip/genotip
2. basamak	Tirozinemi tip 1	Kan/idrar süksinilaseton, aminoasitler
2. basamak	Kistik fibrozis	Ter testi / genetik
3. basamak	Biliyer atrezi doğrulama	İntraoperatif kolanjiyografi ($\pm$ HIDA sintigrafi, biyopsi)
3. basamak	Genetik kolestaz	Karaciğer biyopsisi, genetik panel (Alagille/JAG1, PFIC, safra asidi defektleri)

GGT ipucu: Biliyer atrezi ve çoğu obstrüktif nedende GGT **yüksektir**; PFIC tip 1–2 ve safra asidi sentez defektlerinde ise GGT **normal/düşük** olması ayırıcı tanıda yol göstericidir.

05 Kırmızı bayraklar (ivedi değerlendirme)

● **Açolik / kil rengi dışkı** → obstrüksiyon, biliyer atrezi

● **Koyu idrar** (konjuge bilirubin)

● Direkt bilirubin yüksekliği + **hepatomegali**

● **Kanama** / kolay morarma (K vitamini eksikliği)

● **Kötü beslenme, letarji, kusma** → metabolik/sepsis

● Hipoglisemi, sentetik yetmezlik (INR ↑, albümin ↓)

● Büyüme geriliği, dismorfik bulgu (Alagille)

● Kalp üfürümü / posterior embriyotokson (Alagille)

06 Sevk ilkesi

Kolestaz saptanan her bebek → ivedi hepatoloji/GİS

Açolik dışkı / BA şüphesi → **cerrahi** ile eş zamanlı

Sentetik yetmezlik → nakil merkezi

Metabolik acil (galaktozemi/tirozinemi)

Tetkikler sevki **geciktirmemeli**; değerlendirme ve yönlendirme paralel yürütülür.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Yenidoğan kolestazı zamana duyarlıdır — şüphede tetkiki ve sevki geciktirmeyin.

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *JPGN*. 2017;64(1):154–168.
2. Feldman AG, Sokol RJ. Neonatal Cholestasis: Emerging Molecular Diagnostics and Potential Novel Therapeutics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019;16(6):346–360.

3. Götze T, Blessing H, Grillhösl C, ve ark. Neonatal Cholestasis — Differential Diagnoses, Current Diagnostic Procedures, and Treatment. *Front Pediatr.* 2015;3:43.