


Türkiye'de belirli bir günde etkili olan basınç merkezlerinin değerleri aşağıdaki haritada belirtilmiştir.



Basınç merkezlerinin konumu dikkate alındığında, etkili olan yerel rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Karayel B) Yıldız C) Poyraz
D) Sam yeli E) Lodos

- I. Kible
- II. Sam yeli
- III. Karayel
- IV. Poyraz

Yukarıda belirtilen rüzgârların hangileri etkili olduğu yerde sıcaklık değerlerini düşürür?


- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) III ve IV

Föhn rüzgarları etkili olduğu alanlarda kurutucu etki yapar ve bu durum mikroklima alanlarının oluşmasına zemin hazırlar.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış alanların hangisinde föhn rüzgârına bağlı mikroklima alan oluşmuştur?



- A) I B) II C) III D) IV E) V



Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerel rüzgârlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A) İmbat	Kible	Sam yeli
B) Etezyen	Lodos	Yıldız
C) Karayel	Sam yeli	Poyraz
D) Etezyen	İmbat	Sam yeli
E) Lodos	Kible	Sam yeli

Aşağıda Türkiye'de yer alan bir merkezde rüzgârın yıl içinde hangi yönlerden kaç kez estiğini gösteren rüzgâr frekans gülü verilmiştir.



Buna göre yukarıda verilen rüzgâr frekans gülü Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisine ait olabilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de bulunması sebebiyle kuzey yönlü rüzgârlar sıcaklığı azaltırken güney yönlü rüzgârlar sıcaklığı artırır. Ayrıca denizler üzerinden Türkiye'ye doğru esen rüzgârlar mevsime göre sıcaklığı etkiler. Denizin nemli hava kütlelerini karaya taşıdığı için yağış oluşmasını sağlar.

Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisi Türkiye'de kış döneminde Antalya kıyı şeridinde yamaç yağışı bırakabilir?

- A) Lodos B) Karayel C) İmbat
D) Etezyen E) Poyraz

- Ülkemizi kuzeybatı yönlü etkiler.
- Kış aylarında sıcaklıkların azalmasını sağlar.
- Karalar üzerinde etkili olursa etkili olduğu alanı kurutur ve soğutur.
- Karadeniz üzerinden etkilerse Batı ve Doğu Karadeniz'de yamaç yağışları oluşturur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen yerel rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Poyraz B) Karayel C) Lodos
D) Kible E) Etezyen

Bir bölgede rüzgârın esiş yönünü etkileyen en önemli unsur yeryüzü şekilleridir.

Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisine rüzgârların esiş yönünde yeryüzü şekilleri etkisi en azdır?

A) Muğla


B) Antalya

C) Van

D) Çanakkale

E) Niğde


Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir ve sıcaklıkla doğru orantılıdır.



Buna göre, haritada belirtilen merkezlerin hangisinde yaz aylarında maksimum nem miktarı daha fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Bağıl nem havada yağışın olma ihtimalini ifade eder ve sıcaklıkla ters orantılıdır.



Buna göre, haritadaki merkezlerin hangisinde, yaz mevsiminde, bağıl nem en fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Rize ve Samsun kentlerinde aynı iklim özellikleri görülmesine rağmen Rize’de yıl içerisindeki yağış miktarının Samsun’dan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dağların doğu - batı yönlü uzanması
- B) Yağış rejimlerinin farklı olması
- C) Rize’de kıyının hemen gerisinde yüksek uzanan dağların varlığı
- D) Ormanların geniş yer kaplaması
- E) Rize’deki maksimum nem miktarının daha fazla olması

Yamaç yağışları kıyının hemen gerisinde uzanan dağların yamaçları boyunca yükselen hava kütlelerinin etkisiyle meydana gelir.

Buna göre, Ege Bölgesi'nde Muğla'da yamaç yağışları etkili olurken, İzmir de etkili olmaması bu iki kentin hangi özelliklerinin farklı olmasının sonucudur?


- A) Kırık dağların varlığı
- B) Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi
- C) Dağların kıyıya uzanış doğrultuları
- D) Zeytin ve turunçgil gibi ürünlerin yetiştirilmesi
- E) Buharlaşıma miktarlarının farklı olması

Hakkâri ve Konya kentleri karasal iklim özelliklerine sahip olmalarına rağmen, bu iki kentin yıllık yağış miktarlarının farklı olması;


- I. enlem,
- II. yükselti,
- III. karasallık,
- IV. bakı

faktörlerinin hangileri ile açıklanır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) III ve IV



Şekil - I




Şekil - II

Şekil - I’de gösterilen yağış çeşidi, şekil - II’deki haritada işaretli noktaların hangisinde yaz aylarında görülür?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Haritada yıllık yağış miktarları fazla olan merkezler gösterilmiştir.




Bu merkezlerden hangisinin yıllık yağış miktarı diğerlerine göre daha azdır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



Haritada işaretli merkezlerin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



Şekil - I

Şekil - II




Şekil - III

Türkiye’de etkili olan yağış çeşitleri ve en fazla etkili olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

	<u>Şekil - I</u>	<u>Şekil - II</u>	<u>Şekil - III</u>
A)	Karadeniz	İç Anadolu	Akdeniz
B)	Akdeniz	İç Anadolu	Karadeniz
C)	Ege	Akdeniz	D. Anadolu
D)	Marmara	Ege	Akdeniz
E)	Karadeniz	Ege	Marmara

Türkiye'nin genelinde nemlilik durumu; dağların kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti, denize olan uzaklık, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi gibi faktörler nedeniyle belirgin değişimler gösterir.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisinde dağların kıyıya uzanışı ve yükselti faktörüne bağlı nem oranı daha fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap anahtarı

1. C
2. E
3. B
4. E
5. A
6. A
7. B
8. E
9. E
10. E
11. C
12. C
13. B
14. E
15. D
16. D
17. A
18. A