


Türkiye’de yıl içinde yağışın mevsimlere dağılışına bağlı olarak aşağıdaki il çiftlerinden hangisinin yağış rejimi birbirinden farklıdır?

- A) Antalya - Gaziantep
- B) Kars - Iğdır
- C) Konya - Malatya
- D) Aydın - Çanakkale
- E) Bartın – Rize



Denizden gelen hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselip soğumasıyla oluşan yağış türüne orografik (yamaç) yağışları denmektedir.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisinde kış döneminde orografik yağış görülme olasılığı en fazladır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin bir bölgesine ait yağış ve sıcaklık grafikleri verilmiştir.



Buna göre yukarıda verilen yağış ve sıcaklık grafiği Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisine ait olabilir?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Ülkemizde yağış bakımından da yöreler arasında önemli farklılıklar vardır. Türkiye'yi yıllık ortalama yağış miktarına göre az, orta derecede ve çok yağış alan yerler olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi yıl içinde en az miktarda yağış almaktadır?

- A) Afyon B) Ankara C) Iğdır
D) Samsun E) Bursa

Aşağıda Türkiye’de bir yöreye ait yağışın mevsimlere dağılışını gösteren daire grafik verilmiştir.



Buna göre verilen daire grafik dikkate alındığında ortamın iklimi hakkında;

- I. Yörede kış ılıkılığı yaşanmaktadır.
- II. Doğal bitki örtüsü kış döneminde yapraklarını döker.
- III. Yağış rejimi düzensizdir.

gibi yorumlardan hangileri yanlış olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

Türkiye’de bağıl nem oranının yıl boyu yüksek olduğu bir yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yöredeki akarsular taşımacılığa uygundur.
- B) Yerin enerji kaybı azdır.
- C) Sıcaklık farkı azdır.
- D) Bulutluluk oranı fazladır.
- E) Toprak asitik reaksiyondadır.

Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşan yağışlarıdır. Ülkemizde en yaygın görülen yağış oluşum tipidir.

Yukarıda temel özellikleri verilen yağış tipi aşağıdakilerin hangisidir?

- A) Cephe yağışları
- B) Orografik yağışlar
- C) Yükselim yağışları
- D) Muson yağışları
- E) Yamaç yağışları


Aşağıdaki şekilde Türkiye’de görülen iklim tiplerinden birinin karakteristik yağış oluşum şekli verilmiştir.



Buna göre, bu yağış oluşum şeklinin karakteristik olarak görüldüğü bir yöre için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A) Bu yağış türü yörede, ısınmanın arttığı dönemde gerçekleşir.
- B) Yörede geven, koyun yumağı, gelincik ve yavşan otu gibi bitki türleri yaygındır.
- C) Kış döneminde ortalama sıcaklıklar eksi değerlere düşmektedir.
- D) Bu yağış oluşum türü, yörede en çok kış döneminde gerçekleşir.
- E) Yörede gerçekleştirilecek tahıl tarımını olumlu yönde etkiler.


Sis, yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren bir hava olayıdır. Stratüs bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Hava içindeki su buharının yoğunlaşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir.



Buna göre yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılmış merkezlerin hangisinde yıl içinde yamaç ve vadi sisi oluşumu yüksektir?


- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye’de ortalama yıllık yağış miktarı ve sıcaklık değerleri gösterilen bir merkez için;



Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki-lerden hangisine ulaşamaz?

- A) Yıllık yağış miktarı 2000 mm üzerindedir.
- B) Nem ve yağış isteği fazla olan tarım ürünleri doğal olarak yetiştirme şansı bulur.
- C) Karadeniz Bölgesi'ne ait bir merkezdir.
- D) Yıllık sıcaklık farkları fazladır.
- E) Bağıl nem oranı yüksektir.



İklim özellikleri dikkate alındığında haritada belirtilen merkezlerin hangilerinde bitki örtüsü diğerlerinden farklıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve V E) III ve IV

Ormanların tahribatı sonucunda bulunduğu alanın iklim koşullarına bağlı olarak, dört mevsim yeşil kalan yalancı maki olarak da bilinen, psödomaki adı verilen bitki toplulukları ortaya çıkar.

Türkiye’de aşağıdaki merkezlerin hangisinde bu bitki topluluklarına rastlanır?

- A) Mersin B) Konya C) Erzurum
D) Trabzon E) Edirne

Türkiye’de kızılçam ormanlarının tahribatı sonucunda ortaya çıkan bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Maki
- B) Bozkır
- C) Alpin çayırları
- D) Antropojen bozkır
- E) Savan

Türkiye’de yıl içerisinde en fazla yağışın yaz aylarında düştüğü ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğu bir merkezin doğal bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orman


B) Maki

C) Alpin çayırları

D) Bozkır

E) Garig

Ormanların tahribatı sonucunda oluşan bitki toplulukları antropojen bozkırları ortaya çıkarır.




Buna göre, haritada işaretli merkezlerin hangisinde, antropojen bozkırlara daha fazla rastlanır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye’de tahribata uğrayan ormanların kendini yenilemesinin diğerlerine göre daha zor olduğu kent aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Konya B) Kırklareli C) Bolu
D) Muğla E) Rize



Grafikte belirtilen merkeze ait bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisidir?

- A) Maki B) Orman C) Bozkır
D) Alpin çayırlar E) Savan

Dünya üzerinde 30 ile 40° enlemleri arası Akdeniz iklim sahasıdır. Türkiye'nin de bu enlemler arasında toprakları olduğu için Türkiye Akdeniz ikliminin etki alanı içerisinde.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerin hangisinde, Akdeniz iklim özellikleri daha fazla görülür?

- A) Isparta B) Burdur C) Karaman
D) Kahramanmaraş E) İzmir

Cevap anahtarı

1. B
2. C
3. D
4. C
5. B
6. A
7. A
8. D
9. B
10. D
11. A
12. D
13. A
14. C
15. A
16. A
17. A
18. E