

Akarsu	Havzaya düşen yıllık yağış (mm)	Yıllık ortalama debi (m ³ / sn)
Arpaçay	480	5,45
Çoruh	535	5,90
Büyük Menderes	630	1,20
Yeşilırmak	550	5,50

Tabloda dört akarsuyun yıllık yağış miktarı ve ortalama debi (akım) miktarları verilmiştir.

Buna göre, Büyük Menderes Havzası daha fazla yağış almasına rağmen debisinin (akımının) az olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Rejiminin düzensiz olmasıyla
- B) Çöküntü ovasında akmasıyla
- C) Buharlaşıma miktarının fazla olmasıyla
- D) Yağmur suları ile beslenmesiyle
- E) Doğu - batı yönlü akmasıyla

Türkiye’de kıyı derinliğinin Ege kıyılarında az olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

- A) Kıyılarda falezlerin oluşmasında
- B) Akarsu ağızlarında delta oluşmasında
- C) Plajların geniş ve kumlu olmasında
- D) Kıta sahanlığının geniş olmasında
- E) Akarsu delta ovalarında lagünlerin görülmesin-
de

Aşağıda verilen Türkiye'deki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda diğerlerinden farklı bir olay etkili olmuştur?

- A) Bozok Platosu
- B) Manavgat Şelalesi
- C) Antalya falezleri
- D) Saklıkent Kanyonu
- E) Ürgüp - Göreme Peribacaları

- I. Doğu Karadeniz Bölümü
- II. Yukarı Murat – Van Bölümü
- III. Güney Marmara Bölümü

Yukarıda verilen bölümlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu bölümlerde yaygın olarak bulunan göllerin oluşum özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A) Volkanik Set	Tektonik	Heyelan Set
B) Heyelan Set	Volkanik Set	Tektonik
C) Tektonik	Heyelan Set	Volkanik Set
D) Heyelan Set	Tektonik	Volkanik Set
E) Tektonik	Volkanik Set	Heyelan Set

Bir lke veya blge kuzey gney doęrultusunda geniř bir yer kaplarsa iklim eřitlilięi fazladır. Trkiye kuzey-gney ynl geniř bir lke olmamasına raęmen iklim eřitlilięi fazladır.

Bu durum ařaęıdakilerden hangisi ile aıklanabilir?

- A) Bařlangı meridyeninin doęusunda yer almasıyla
- B) Ekvator'a olan uzaklıęıyla
- C) Yer řekillerinin eřitli olması ve denizlerle evrili olmasıyla
- D) Gneř ıřınlarını hi bir zaman dik aı ile almamasıyla
- E) Kuzey Yarım Kre'de yer almasıyla

Türkiye’de batıdan doğuya doğru ortalama yükselti artmakta ve buna bağlı olarak bazı özelliklerde değişme meydana gelmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bu duruma bağlı olarak batıdan doğuya doğru artış yaşanması beklenemez?

- A) Karasallık şiddeti
- B) Yıllık sıcaklık farkı
- C) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi
- D) Karlı ve donlu gün sayısı
- E) Ortalama sıcaklık değerleri

- I. Bor rezervince zengin olması
- II. Kıvrım dağlarının bulunması
- III. Taş kömürü yataklarına sahip olması
- IV. Linyit yataklarınca zengin olması

Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'de I. jeolojik zamana ait arazilerin bulunduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dağları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

- A) Akdeniz ve Karadeniz'deki dağlar kıyıya paralel uzanır.
- B) Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki volkanik dağlar daha çok Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunur.
- C) Türkiye'nin en genç volkanik yapılanması Ege Bölgesi'ndeki Kula Volkanları'dır.
- D) Toros Dağları III. jeolojik zamanda oluşmuş genç kıvrım dağlarıdır.
- E) Kırıklı dağlara en çok Ege Bölgesi'nde rastlanılmaktadır.

Fiziki haritalarda yeşil ve tonlarıyla gösterilen arazilerin yükseltisi 500 m'nin altındadır.



Buna göre, renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir Türkiye fiziki haritasında numaralandırılmış alanların hangisi yeşil renkle gösterilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV


Türkiye, ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Yükselti genel olarak batıdan doğuya doğru artsa da Türkiye'nin iç kısımlarında geniş düzlükler büyük alanlar kaplamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer almaz?

- A) Yıllık ortalama sıcaklığın güneyden kuzeye doğru azalması
- B) Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın doğuya doğru artması
- C) Akarsuların derin vadiler oluşturmaları ve akış hızlarının fazla olması
- D) Sıcaklık farkının batıdan doğuya artması
- E) Hidroelektrik enerji potansiyelinin batıdan doğuya doğru artması

Türkiye'nin bölgelerini de gösteren renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir fiziki haritada aşağıdaki bölgelerden hangisinde bölge içinde daha fazla renk kullanıldığı görülür?

- A) Marmara Bölgesi
- B) Doğu Anadolu Bölgesi
- C) Ege Bölgesi
- D) İç Anadolu Bölgesi
- E) Karadeniz Bölgesi



**Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bö-
lümelerin yer şekilleri göz önüne alındığında;**

I. Tarımsal nüfus yoğunluğu

II. Doğal liman sayısı

III. Delta ovalarının varlığı

gibi özelliklerden hangileri ortak değildir?


A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve III

E) Yalnız III



Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölümlerin hangilerinde volkanik dağların en yoğun olduğu bölgeler doğru olarak verilmiştir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) Yalnız IV

.Fiziki haritalarda yükselti değeri aynı olan araziler aynı renkle gösterilmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen ova eşleştirmelerinden hangisi fiziki haritada aynı renkte gösterilir?


- A) Erzincan - Ergene
- B) Çukurova - Konya
- C) Menemen - Amik
- D) Çarşamba - Ereğli
- E) Iğdır - Yüksekova

Türkiye'deki dağların uzanış doğrultusunun kıyıya dik ya da paralel olması birçok sonucu da beraberinde getirmektedir.

Buna göre, dağların kıyıya uzanışlarının aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu söylenemez?

- A) Yamaç yağışı
- B) Kıyı şekli
- C) Hakim rüzgar yönü
- D) Yağış rejimi
- E) Ulaşım olanakları

Aşağıdaki haritada bazı kıyılar numaralarla gösterilmiştir.



Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlarda görülen kıyı tipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

- A) I $\Rightarrow$ Dalmaçya kıyı
- B) II $\Rightarrow$ Enine kıyı
- C) III $\Rightarrow$ Ria kıyı
- D) IV $\Rightarrow$ Limanlı kıyı
- E) V $\Rightarrow$ Boyuna kıyı

- I. Antalya Bölümü'nde yetiştirilen aynı tarım ürününün Kıyı Ege Bölümü'nde daha geç olgunlaşması
- II. İç Ege Bölümü'nde yetişen aynı tür bitkinin Yukarı Fırat Bölümü'nde daha geç olgunlaşması

Yukarıda verilen durumların oluşmasında etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

	I	II
A)	Enlem	Karasallık
B)	Yükselti	Enlem
C)	Bakı	Enlem
D)	Enlem	Yükselti
E)	Denizellik	Yükselti

Türkiye’de;

- I. Gölge boyu yılda bir kez oluşmaz.
- II. Alize rüzgarları etkilidir.
- III. Tropikal iklim tipleri görülmez.
- IV. Yıl içinde dört mevsim yaşanır.
- V. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki topluluğu bulunur.

Türkiye’nin coğrafi konumu göz önüne alındığında yukarıda verilen durumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) V ve IV

Cevap anahtarı

1. C
2. A
3. C
4. B
5. C
6. E
7. B
8. B
9. B
10. A
11. E
12. C
13. B
14. C
15. D
16. D
17. D
18. A