

Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla olduğu söylenebilir?

- A) Rize ve çevresi
- B) Bolu ve çevresi
- C) Konya ve çevresi
- D) İstanbul ve çevresi
- E) Kırklareli ve çevresi

Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır.

Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?

- A) Çarşamba ovası
- B) Haymana platosu
- C) Iğdır ovası
- D) Sinop yarımadası
- E) Teke platosu

- Genellikle karstik yapıli arazilerde oluřurlar.
- Vadi yamaçları basamak řeklindedir.
- Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir?

- A) Çentik vadi
- B) Boğaz vadi
- C) Kanyon vadi
- D) Yatık yamaçlı vadi
- E) Geniş tabanlı vadi

Sinop Yarımadası ve Kapıdağ Yarımadasının oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri
- B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri
- C) Dalgaların biriktirme faaliyetleri
- D) Buzulların aşındırma faaliyetleri
- E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri

Türkiye’de rüzgârların yer şekilleri üzerindeki şekillendirci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir.

Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

- A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
- B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması
- C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması
- D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması
- E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması

Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fiyort tipi kıyılara rastlanmamaktadır.
- B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu bölgenin kayaç yapısı etkili olmuştur.
- C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulunmaktadır.
- D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri etkili olmuştur.
- E) Buzul hareketleri sonucunda oluşmuş göl bulunmaktadır.

- Volkan tufünün yaygın olduğu arazilerde görülürler.
- Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır.
- Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler.

Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir?

- A) Mantar kaya
- B) Peribacaları
- C) Dev kazanı
- D) Lapyra
- E) Mağara

Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faaliyetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovalara delta ovası denilmektedir.

Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

<u>Akarsu</u>	<u>Delta Ovası</u>
A) Bakırçay	İnegöl
B) Seyhan	Çukurova
C) Kızılırmak	Bafra
D) Yeşilirmak	Çarşamba
E) Göksu	Silifke

- I. Yer şekillerinin engebe oranı fazladır.
- II. Yıllık yağış miktarı fazladır.
- III. Bitki örtüsü cılızdır.

Türkiye’de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunan ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?

- A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur.
- B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur.
- C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir.
- D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür.
- E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır.

Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

- A) Volkanik platoların geniş yer kaplaması
- B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması
- C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması
- D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması
- E) Arabistan ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşması

Türkiye’de yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Arap levhasının kuzeye doğru sıkıştırması
- B) Doğuda dağlık alanların çok olması
- C) Denizlerden uzaklaşıyor olması
- D) Yüksek platoların var olması
- E) Volkanik dağların çok olması

Türkiye’de II. Jeolojik Zaman sonları ile III. Jeolojik Zaman boyunca volkanik faaliyetler yoğun bir şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle volkan konileri Tuz Gölü ve Van Gölü çevresinde yaygın görülen oluşumlar olup, günümüzde de volkanik dağlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu dağlardan biri değildir?

A) Karadağ

B) Melendiz

C) Aladağlar

D) Tendürek

E) Hasandağı

III. Jeolojik Zaman'ın ortalarından itibaren tektonik hareketlerin etkili olduğu özellikle dağ oluşumlarının meydana geldiği Türkiye, dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafiflemiş ve dönemin sonlarına doğru ise epirojenezle uğrayarak yükselmeye başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin epirojenezle uğradığının kanıtıdır?

- A) Çok sayıda volkanik dağın olması
- B) Akarsuların derin vadilerden akması
- C) Dağların genel olarak doğu batı doğrultusunda uzanması
- D) Kısa mesafelerde iklim ve bitki örtülerinde değişikliğin olması
- E) Ortalama yükseltisinin 1000 metreden fazla olması ve platoların geniş yer kaplaması

Dış kuvvetler aşınım ve birikim faaliyetlerinde bulunarak yer yüzünün şekillenmesinde önemli rol oynar. Dış kuvvetlerin etkileri bulundukları coğrafi konuma göre değişiklik gösterir.

Buna göre, Türkiye'nin bulunduğu konuma bağlı olarak aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Skyer

B) Traverten

C) Delta ovaları

D) Kıyı kordonu

E) Birikinti konisi

Türkiye’de birden fazla kıyı tipi görülmektedir. Kıyı tiplerinin oluşumunda iç ve dış kuvvetlerin etkisi yanında mutlak ve özel konumun da etkili olduğu görülmektedir.

Buna göre, Türkiye’nin mutlak konumu dikkate alındığında aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi görülmez?

A) Ria

B) Boyuna

C) Limanlı

D) Fiyortlu

E) Dalmaçya

Orojenez ile dağların oluşumu kırık ve kıvrım olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de yer alan kırık ve kıvrım dağları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Kırık Dağlar

Kıvrım Dağlar

A) Bolkar

Yunt

B) Madra

Aydın

C) Aydın

Bolkar

D) Yıldız

Köroğlu

E) Erciyes

Menteşe

Platolar akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksek düzlüklerdir. Platolar oluşumuna göre Aşınım (Aşındırma) Platoları, Lav (Volkanik) Platoları, Tabaka Düzlüğü (Yatay Duruşlu) Platoları ve Karstik Platoları olarak gruplandırılır.

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye’de Lav Platosuna örnek olarak verilebilir?

- A) Teke ve Taşeli
- B) Ardahan ve Kars
- C) Çatalca ve Kocaeli
- D) Haymana ve Bozok
- E) Gaziantep ve Şanlıurfa

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle farklı kıyı tipleri görülmektedir.

Türkiye'de görülen kıyı tipleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Antalya Kaş kıyıları - Dalmaçya
- B) Marmaris ve Fethiye kıyıları - Resifli
- C) İstanbul ve Çanakkale boğazları - Ria
- D) Akdeniz ve Karadeniz kıyıları - Boyuna
- E) Büyükçekmece ve Küçükçekmece kıyıları - Limanlı

Türkiye’de oldukça geniş bir alan kaplayan platolar, deniz seviyesine yakın yerlerden başlayıp çok yüksek alanlara kadar görülebilir. Platoların en çok görüldüğü yerlerin başında İç Anadolu gelmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen platolardan hangisi İç Anadolu’da değildir?

A) Obruk

B) Cihanbeyli

C) Haymana

D) Bozok

E) Taşeli

Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dökülen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilir?

A) Meriç

B) Aras

C) Kura

D) Çoruh

E) Fırat

Türkiye’de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir.

Bu durum aşağıda verilen göllerden hangisinde diğerlerine göre daha belirgindir?

A) Van Gölü

B) Tuz Gölü

C) Çıldır Gölü

D) Hazar Gölü

E) İznik Gölü

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynaklarından jeotermal enerji üretimi yapılmaktadır?

A) Ankara

B) Denizli

C) Malatya

D) Trabzon

E) Erzincan

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Göllerin oluşumunu etkileyen faktörler düşünüldüğünde, haritadaki alanların hangilerinde buzul göllerinin yaygın olması beklenir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve V

E) IV ve V



Haritada gösterilen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- | | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> |
|----|-------------|------------|------------|
| A) | B. Menderes | Çoruh | Fırat |
| B) | Gediz | Kızılırmak | Aras |
| C) | Kızılırmak | Sakarya | Çoruh |
| D) | B. Menderes | Kızılırmak | Çoruh |
| E) | Gediz | Çoruh | Aras |

- I. Terra rossa – maki
- II. Kahverengi step – bozkır
- III. Çernezyom – çayır

Yukarıda Türkiye’de görülen toprak tiplerinden bazıları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III



- Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir.
- Dağ çayırlarının altında görölmektedir.
- Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görölür.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde yaygın görölmektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir.



Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

- Anadolu'da kepir veya taş doğuran olarak bilinir.
- Trakya, Güney Marmara ve Muş Ovası'nda görülür.

Yukarıda özellikleri verilen toprak çeşidi hangisidir?

- A) Litosol B) Vertisol C) Podzol
D) Terra rossa E) Rendzina

Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyılarına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.


Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ekvator'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması
- B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şiddetinin artması
- C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 °C azalması
- D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miktarının değişmesi
- E) Deniz kıyılarında bitki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması

İlkbahar yağışları ile yeşeren yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan otlara bozkır denilmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde bozkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir?

- A) Edirne ve çevresi
- B) Konya ve çevresi
- C) Batman ve çevresi
- D) Iğdır ve çevresi
- E) Bartın ve çevresi




Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde;

- I. kızılçam,
- II. keçiboynuzu,
- III. karaağaç,
- IV. şimşir

verilen ağaç türlerinden hangi ikisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

Aşağıdaki haritada A, B, Z ve Y noktaları işaretlenmiştir.



- A noktasından B noktasına gidildikçe ortalama sıcaklık değerleri artmaktadır.
- Z noktasından Y noktasına gidildikçe ortalama sıcaklık değerleri azalmaktadır.

Sıcaklık değişiminin A-B ve Z-Y yönlerinde farklılık göstermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A-B	Z-Y
A) Enlem	Bakı
B) Yükselti	Denizellik
C) Enlem	Yükselti
D) Yükselti	Bakı
E) Karasallık	Yükselti

- Ülkemize kuzeybatı yönünden etki etmektedir.
- Etkili olduğu dönemde sıcaklık ve yağışlarda artış görülür.

Yukarıda özellikleri verilen basınç merkezi hangisidir?


- A) Sibirya A. B.
B) Basra A. B.
C) Asor Y. B.
D) İzlanda A. B.
E) Sibirya Y. B.



Haritada üzerinde numaralandırılarak verilen oklar yönünde etkili olan yerel rüzgârlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A) Yıldız	Poyraz	Kible
B) Karayel	Samyeli	Kible
C) Poyraz	Lodos	Samyeli
D) Yıldız	Samyeli	Lodos
E) Poyraz	Karayel	Lodos

Aşağıdaki haritada beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu yerlerin hangileri diğerlerine göre daha kuraktır?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

Türkiye’de çeşitli iklim tipleri görülmektedir.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


- A) Kuzey Yarım Küre’de bulunması
- B) Yer şekillerinin değişiklik göstermesi
- C) Çevresinde farklı denizlerin bulunması
- D) Dağların kıyıya göre konumu
- E) Çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe genel olarak;

- I. yıllık sıcaklık farkı,
- II. karın yerde kalma süresi,
- III. yıllık ortalama yağış miktarı

özelliklerinden hangilerinde artış olur?


- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) I ve III E) II ve III



Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin iklim özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) I numaralı yerde oluşan yağışların tümü orografik oluşumludur.
- B) Yıllık ortalama sıcaklık değeri en yüksek olan yer II numaralı yerdir.
- C) Verilen yerlerden iki tanesi Akdeniz İklim Bölgesi'nde yer almaktadır.
- D) Kış sıcaklık ortalaması en düşük olan yer V numaralı yerdir.
- E) Yıllık yağış miktarı en fazla olan yer IV numaralı yerdir.


Aşağıda harita üzerinde üç farklı yer numaralanmıştır.



Bu yerlerin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenemez?

- A) Yağış rejimi sadece I'de düzenlidir.
- B) Yıllık sıcaklık farkı II'de en fazladır.
- C) Kış sıcaklıkları III'de en yüksektir.
- D) III'ün I'den sıcak olmasında enlem etkisi vardır.
- E) II'de bitki örtüsü gür ormanlardır.


Aşağıda Antalya kentine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.



Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

- A) Yağış rejimi düzensizdir.
- B) En sıcak ay temmuz ayıdır.
- C) Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 °C'dir.
- D) Yıllık yağış miktarı 300 mm'nin altındadır.
- E) Kış mevsiminde kar yağışları görülmez.

Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışını gösteren grafik verilmiştir.



Bu grafik ülkemizde aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir?

A) Mersin

B) Rize

C) Ankara

D) İzmir

E) Samsun

Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerleriyle aynı iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer almaz?

A) Hatay

B) Elazığ

C) Sivas

D) Şanlıurfa

E) Kırıkkale

Türkiye’de görülen iklimler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Karasal iklim en yaygın iklimdir.
- B) En yüksek sıcaklık farkı karasal iklimdedir.
- C) Türkiye genel olarak Akdeniz İklim kuşağında yer alır.
- D) Ülkenin her yerinde en yağışlı mevsim kıştır.
- E) Kış sıcaklıkları en fazla Akdeniz İklimi’ndedir.


Antalya - Mersin çevresinde tropikal bölge bitkilerinden olan muzun yetiştirilmesinde;

- I. iklim özellikleri,
- II. kıyıya paralel uzanan dağlar,
- III. kalkerli arazi yapısı


verilenlerden hangileri etkilidir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
- D) I ve II E) I ve III


4. Aşağıda Türkiye’de üç farklı il merkezine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir



I



II



III

Buna göre, merkezlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

- | I | II | III |
|--------------|----------|-----------|
| A) Zonguldak | Karaman | Kars |
| B) Batman | Çankırı | Karabük |
| C) Ağrı | Sivas | Çorum |
| D) Kırıkkale | Tekirdağ | Çanakkale |
| E) Rize | Antalya | Aksaray |

Gür otlakların bulunduğu bir yerde mera hayvancılığı yapmak isteyen birisi için aşağıdaki yerlerden hangisi daha uygundur?

A) Konya


B) Muğla

C) Ankara

D) Artvin

E) Edirne

Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı rota gösterilmiştir.



Bu rotalardan hangisinde iklim özelliklerinin daha az değiştiği gözlemlenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıda Türkiye’de bulunan bazı plajlar gösterilmiştir.



Deniz turizmi sezonunun en erken başladığı sahili tercih etmek isteyen bir kişinin hangi plaja gitmesi daha uygundur?

- A) Bartın - İnkumu
- B) Edirne - Enez
- C) Çanakkale - Asos
- D) Aydın - Kuşadası
- E) Antalya - Patara

Aşağıda verilen illerden hangilerinde benzer iklim tiplerinin görüldüğü söylenir?

- A) Ankara - Zonguldak
- B) Mersin - İzmir
- C) Çanakkale - Ağrı
- D) Muğla - Karabük
- E) Kars - Bolu

Cevap anahtarı

1. C
2. E
3. C
4. C
5. B
6. E
7. B
8. A
9. C
10. D
11. E
12. A
13. C
14. B
15. A
16. D
17. C
18. B
19. B

Cevap anahtarı

20. E
21. A
22. B
23. B
24. E
25. D
26. E
27. E
28. C
29. B
30. A
31. E
32. A
33. C
34. D
35. D
36. B
37. A
38. C

Cevap anahtarı

39. A
40. E
41. D
42. C
43. A
44. D
45. A
46. E
47. D
48. C
49. E
50. B