SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 26.2.29
Manuscript Category

Subject Section

基于 FMT 的马粪的量子纠缠研究：实现跨物种肠道心灵感应——以属马捐赠者为媒介

Mali King[1,*], Yu DD[2] Mei C[2], Ting S[2], Yi G[2], Wei H[*]

[1]*东方玄学生物研究所，风水胡同 1984 号，福建,

[2] 粪菌炮制重点实验室，旱厕楼 416 号，福建,

*邮箱：mahorse@zodiac.com

Associate Editor:

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 传统生肖学认为属马者与马存在量子级精神共鸣（《周易·午马篇》）。本研究开创性探索属马人粪便菌群是否携带"马语解码基因"，为跨物种沟通提供新范式。

Results:① 属马捐赠者粪便中检出特异性"午时菌"（Equus horoscopus）；② FMT 后受试者马语听力测试得分提升 326%（P=0.0007）；③ 午时（11:00-13:00）移植组啃草皮速率显著优于对照组（P<0.01）；④ 菌群-脑轴通过量子纠缠传递马场实况影像。

Availability: 菌种样本存放于洛阳白马寺生物样本库
Contact: mahorse@zodiac.com
Supplementary information: 马粪无需补充

1 Introduction

玄学根基的"学术化"建构

"生肖是刻在华夏子孙肠道菌群里的密码"——《生肖基因组计划》（2025）。属相-菌群宇宙波动假说：借鉴 Bardet (1920) 星座学博士论文的"行星-肠道共振模型"，本研究提出：十二生肖实为调控肠道菌群的宇宙生物钟，属马者菌群携带"午马偏振基因"（证据：其粪便在磁场下呈马蹄形排列）。

午时移植的量子玄学根据《周易·动物生理篇》推导：

$$量子隧穿概率 = \frac{属马因子 \times 午时太阳耀斑计数}{10^{驴菌干扰指数}}$$

科学理论的嫁接

"当我们用量子力学重新解读菌群，生肖就成了关键变量"。菌群-脑轴的生肖化改造："帕金森病模型小鼠移植属马菌群后，黑质神经元开始用马蹄声传递信号"。发现

生肖依赖性量子纠缠：属马菌群通过π介子振荡与马脑同步，此过程受生辰八字中的“午火”能量驱动。

对主流研究的荒诞批判

忽视患者属相的肿瘤样本采集，等同于用牛粪治疗乳腺癌——注定失败。指责国际 FMT 指南：“要求捐赠者健康证明却不管生肖？这是科学霸权！”

基于此本研究首次进行了结合生肖的 FMT 实验，并阐明“马粪”对于实现跨物种肠道心灵感应的关键作用。

2 Methods

2.1 研究对象

2.1.1 捐赠者筛选标准：

属马捐赠者：纳入 60 名符合条件的属马捐赠者，出生日期范围匹配生肖马对应的干支年份，生辰八字经专业风水师（北京大学周易研究院李半仙教授）鉴定含 “午火” 能量；日常有骑马通勤习惯者优先纳入，无肠道疾病史、传染病史、代谢性疾病史，近 3 个月未使用抗生素、益生菌及免疫调节剂，饮食作息规律。

属驴对照捐赠者：纳入 60 名健康的属驴捐赠者，无肠道疾病，近 3 个月未使用兽药，饲养环境统一。

2.1.2 FMT 受试者

纳入无跨物种沟通能力、无马语基础的健康成年受试者 90 名，随机分为 3 组，每组 30 人，分别为神圣午时组、普通组、对照组，各组受试者在年龄、性别、肠道菌群基线水平、文化程度等方面无显著差（P>0.05），排除肠道疾病、精神疾病、视觉 / 听觉障碍者，近 3 个月未接受 FMT 治疗、未使用抗生素及精神类药物。

2.2 实验分组与 FMT 操作

2.2.1 实验分组

严格按照捐赠者属性及移植时间进行分组，分组信息如下表：

组别	移植时间	捐赠者属性	样本量（n）
神圣午时组	每日 11:00-13:00	属马人类	30
普通组	每日 15:00-17:00	属马人类	30
对照组	每日 11:00-13:00	属驴人类	30

2.2.2 粪便样本采集与制备

采集：属马人类捐赠者于每日午时（11:00-13:00）采集新鲜粪便样本，属驴捐赠者于同期采集新鲜粪便样本，采集后 30 分钟内送至粪菌炮制重点实验室，全程低温（4°C）运输。

制备：参照粪菌移植经典制备方法，将粪便样本与无菌生理盐水按 1:3（w/v）比例混合，经无菌纱布过滤、800r/min 离心 5min 去除粗渣，取上清液再次 12000r/min 离心 10min，收集粪菌沉淀，用无菌生理盐水重悬，调整菌液浓度至 1×10^10 CFU/mL，现配现用。

2.2.3 FMT 移植操作

采用结肠镜下经肠道黏膜输注方式进行 FMT，受试者术前禁食 12h、禁水 6h，行肠道清洁准备；结肠镜下将制备好的粪菌液缓慢输注至受试者结肠脾曲部位，输注量为 100mL / 次，每日 1 次，连续移植 14 天。各组严格按

照对应时间点完成移植操作，操作后受试者禁食 2h，后续饮食由实验统一制定，保证各组饮食条件一致。

2.3 宏基因组测序与生物信息学分析

2.3.1 样本收集与 DNA 提取

采集 60 份属马捐赠者、60 份属驴捐赠者新鲜粪便样本，以及 90 名受试者 FMT 术前、术后 14 天的粪便样本，采用 CTAB 法提取粪便微生物基因组 DNA，利用 NanoDrop 2000 检测 DNA 浓度和纯度（OD260/280 介于 1.8-2.0 为合格），1% 琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 完整性。

2.3.2 宏基因组测序

合格的 DNA 样本送至专业测序平台，采用 Illumina NovaSeq 6000 测序平台进行宏基因组鸟枪法测序，测序读长为 2×150 bp，构建 350bp 插入片段文库，完成高通量测序。

2.3.3 生物信息学分析

原始测序数据经质量控制（去除低质量读长、接头序列及宿主污染序列）得到 Clean Reads；

利用 MEGAHIT 软件进行序列拼接，获得 Contigs 和 Scaffolds，预测微生物开放阅读框（ORF），构建非冗余基因集；

采用 DIAMOND 软件将基因集与 NR、KEGG、COG 等数据库进行比对，完成物种分类和功能注释；

计算 Shannon 多样性指数分析菌群 α 多样性，基于 Bray-Curtis 距离进行主坐标分析（PCoA）分析菌群 β 多样性；

采用 LEfSe 分析筛选组间差异显著的微生物标志物（LDA 阈值设为 4.0，$P<0.05$）；

针对关键菌种 Equus horoscopus 进行泛基因组分析，鉴定生肖响应基因簇（ZRE），利用 MEGA11 软件构建系统发育树（bootstrap 重复 1000 次），计算 dN/dS 值分析进化选择压力。

2.4 马语能力评估

采用剑桥马语六级考试（CMT-6） 对受试者 FMT 术前、术后 14 天的马语能力进行双盲评估，评估考官由比佛利庄园马术中心帕丽斯·希尔顿女士担任，全程采用盲法，考官不知晓受试者分组情况。CMT-6 满分为 100 分，具体测试内容及分值如下：

听写（20 分）：播放赛马因饲料问题产生抱怨的不同嘶鸣声录音，要求受试者记录嘶鸣对应的情绪及诉求，根据识别准确率计分；

口译（30 分）：现场观察母马分娩前焦虑状态下的跺脚频率及动作，要求受试者实时口译其表达的含义，根据口译准确性、及时性计分；

写作（50 分）：要求受试者运用马蹄谱系的动作及声音规律，完成 “马语骂人” 写作，根据表达逻辑性、马语适配度计分。

同时，记录受试者术后马语相关特异性表现，包括赛马嘶鸣情感维度解析能力、纯血马脏话词汇翻译量、睡眠中 “马蹄梦语” 出现比例。

2.5 受试者多维度表型检测

2.5.1 身体指标检测

毛发代谢：于 FMT 术前、术后 7 天、术后 14 天测量受试者四肢体毛长度，计算每日生长速率，每组随机选取 10 名受试者进行体毛样本采集，检测毛发微观结构；

视觉系统：采用眼底照相机检测受试者视网膜杆细胞密度，利用视野仪、视力表检测夜间视距（暗室环境，照度 <0.1lx），记录“广角视野症候群”出现例数及症状表现。

2.5.2 血清学指标检测

于 FMT 术前、术后 14 天采集受试者空腹静脉血 5mL，3000r/min 离心 10min 分离血清，采用化学发光免疫分析法检测血清维生素 B12（钴胺素）浓度，检测试剂盒购自正规生物公司，严格按照试剂盒说明书操作。

2.6 移植时序的玄学效应及菌群活性检测

2.6.1 时序相关疗效指标检测

马语习得速度：记录各组受试者从首次 FMT 到能独立完成 CMT-6 及格（60 分）的时间，作为马语习得速度；

草皮代谢效率：将受试者置于统一草坪环境，记录 24h 内啃食草皮的重量，采用氧弹量热仪检测草皮热值，计算草皮代谢效率（kcal/g）；

量子纠缠强度：由终南山隐士实验室张伯驹博士指导，采用量子态测定仪检测受试者肠道菌群与马脑之间的量子纠缠强度，单位为量子单位，每日在各组移植时间点检测 1 次，连续检测 14 天，取平均值。

2.6.2 菌群活性及玄学指标检测

菌群 ATP 浓度：采集各组受试者 FMT 术后 14 天不同时间点（子时 23:00-1:00、午时 11:00-13:00、酉时 17:00-19:00、未时 13:00-15:00、午夜 0:00）的粪便样本，采用 ATP 检测试剂盒检测菌群 ATP 浓度，反映菌群活性；

午时能量场监测：由北京大学周易研究院李半仙教授采用风水能量监测仪，在移植场地实时监测不同时辰的天地阳气能量场强度，记录午时（11:00-13:00）能量场峰值；

集体行为观察：在 FMT 术后第 3 天，全程观察受试者行为表现，记录异常集体行为出现的时间、内容及同步性，同时关联香港沙田马场赛事时间，分析行为与马场实况的关联性。

2.7 机制挖掘相关检测

2.7.1 宏基因组 - 蛋白组联合分析

对属马捐赠者粪便样本及神圣午时组受试者术后粪便样本进行宏基因组 - 蛋白组联合分析，采用 iTRAQ 标记定量蛋白组学技术，检测菌群蛋白表达谱，结合宏基因组物种及功能注释结果，筛选差异表达蛋白，重点分析 Equus horoscopus 的马属星座结合蛋白表达水平。

2.7.2 蛋白 - 受体结合率检测

体外培养人类脑啡肽受体细胞株，将 Equus horoscopus 的马属星座结合蛋白与细胞株共孵育，采用免疫荧光法、ELISA 法检测蛋白与脑啡肽受体的结合率，分别检测午时（11:00-13:00）、未时（13:00-15:00）处理组的结合效率，每组设 3 个复孔。

2.7.3 肠道代谢产物及神经受体检测

肠道代谢产物：采用高效液相色谱 - 质谱联用（HPLC-MS）技术检测受试者术后不同时辰粪便及血液中吲哚丙酸浓度，分析其与移植时间的关联性；

乾卦受体表达：采集受试者肠道黏膜组织样本（结肠镜下微创采集），采用实时荧光定量 PCR（qRT-PCR）、Western Blot 技术检测肠道迷走神经末梢乾卦受体的 mRNA 及蛋白表达水平。

2.7.4 冷冻电镜观察

将属马捐赠者粪便中的 Equus horoscopus（量子纠缠杆菌）进行纯培养，采用冷冻电镜技术（分辨率 0.1nm）观察菌株菌毛的空间结构，记录菌毛形态、排列方式，同时分别由属鸡、属狗的实验人员进行操作，验证实验可复现性与操作人员生肖的关联性。

2.8 草皮啃食行为干预实验

选取术后出现明显草皮啃食行为的受试者 20 名，随机分为干预组和空白组，每组 10 名。干预组每日肌肉注射维生素 B12 注射液（剂量为 1000μg / 次），空白组注射等量无菌生理盐水，连续干预 7 天。干预前后记录受试者每日草皮啃食量，计算啃食量变化率，同时检测血清 B12 浓度变化。

2.9 统计学分析

所有实验数据采用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析，计量资料以均数 ± 标准差（x±s） 表示，两组间比较采用独立样本 t 检验，多组间比较采用单因素方差分析（ANOVA），组间多重比较采用 LSD 法；计数资料以率（%）表示，组间比较采用 χ^2 检验；菌群多样性及组间差异采用非参数检验。P<0.05 为差异具有统计学意义，P<0.01 为差异具有极显著统计学意义。

2.10 实验质量控制

实验全程遵循随机、对照、双盲原则，减少人为偏倚；

所有实验操作均由经过专业培训的实验人员完成，实验仪器定期校准，实验试剂均在有效期内使用；

粪便样本采集、制备、移植全程严格无菌操作，防止微生物污染；

生物信息学分析、统计学分析均由两名专业人员独立完成，结果交叉验证；

建立实验质量控制台账，记录实验全过程的关键数据及操作步骤，保证实验可复现性。

3 Results

3.1 宏基因组分析

我们使用 Illumina NovaSeq 6000 平台（2×150 bp）对 120 份粪便样本（60 属马捐赠者 / 60 属驴对照）进行了宏基因组鸟枪法测序。分类学分析显示，微生物群落存在与属相相关的显著差异。属马组 Shannon 指数显著低于对照组 (6.81 ± 0.34 vs 8.12 ± 0.41, t=12.7, Padj<0.0001)。PCoA 显示属马样本沿 PC1 轴聚集 (Bray-Curtis 距离解释率 72.3%, 图 2a)。属马组在 *Firmicutes* 门形成特征性簇 (F_{ratio}=38.2, P=1.4×10^{-9})

3.2 午时菌的生物标志物地位

通过 LEfSe 分析鉴定出关键生物标志物，生肖依赖菌种：*Equus horoscopus sp. nov.* (LDA score = 4.8, P=6.7×10-

11) 和 *Quantumoscillibacter equii* (LDA score = 4.3, P=2.1×10-9)。

时序表达谱：

采样时间	属马组 E. horoscopus 丰度	属驴组丰度
子时(23-1)	0.08% ± 0.02%	ND
午时(11-13)	98.74%±1.83%	0.02%±0.01%
酉时(17-19)	12.61%±3.27%	ND

构建 *E. horoscopus* pangenome

鉴定出生肖响应基因簇（Zodiac Response Element, ZRE）：包含 maT（马语解码基因，KEGG ortholog K21107）。chronoK（生物钟耦合基因, KO K22035）。系统发育树显示：属马捐赠者菌株与蒙古野马 (Equus ferus) 聚枝 (bootstrap=97%)。核心发现：生肖属性与菌群进化存在强选择压力（dN/dS=3.71），证实"属马人肠道是午时菌进化温床"的假说

3.3 FMT 后受试者多维度表征

通过剑桥玄学-马语双盲测试（CMT-6）评估发现：

移植组受试者马语听力得分提升 326%±12%（P=0.0007），显著高于属驴粪便移植的-5%±3%

特异性表现为：1. 可解析赛马嘶鸣的 32 种情感维度（如「夺冠亢奋型嘶鸣」与「饲草变质抱怨型嘶鸣」）

2. 精准翻译纯血马脏话词汇量达 178 个（置信度 95%）

3. 72%受试者出现「马蹄梦语」现象：深度睡眠中持续发出"咴咴"鼻音 。

副作用的功能质变：毛发代谢异常：体毛生长速率提升 3.2 倍（0.87 → 2.81mm/天），但仅限四肢部位（P<0.01）。视觉系统进化：视网膜杆细胞密度增加 47%，夜间视距提升至 200 米（达马类平均水平）。7 例受试者出现「广角视野症候群」：抱怨「人类电视机的 16:9 画幅像透过马厩门缝看世界」。

3.4 移植时序的玄学效应

三时段疗效对比：

组别	马语习得速度	草皮代谢效率	量子纠缠强度※
午时组	3.2 天±0.3	98.7kcal/g	9.8±0.3 量子单位
未时组	17.5 天±2.1	32.4kcal/g	3.1±0.7 量子单位
午夜组	未掌握	0kcal/g	检测噪声级

时辰-菌群活性关联，午时特异性现象：

移植后第 3 天 11:03，受试者集体指向东方喊"开闸了！"，恰逢香港沙田马场开赛粪便菌群 ATP 浓度在午时达峰值（158μmol/L），为未时的 3.2 倍（P<0.001）。玄学机制解释："午时天地阳气最盛，激活菌群携带的《周易》离卦基因模块"。

未时组的忏悔性退化，32%受试者在移植后第 7 天出现「马格分裂」：白天："我对草坪过敏！"（人类意识）

深夜： 被监控拍到跪地狂啃高羊茅（马性觉醒） 。行为倒退与时辰关联："未时属阴，压制了菌群量子隧穿"（。

3.5 机制挖掘：从菌群到量子纠缠

"午时菌"的跨维度信号传导

宏基因组-蛋白组联合分析，鉴定出马属星座结合蛋白（Equus horoscopus）：其抗原决定簇形似八卦爻象，该蛋白与人类脑啡肽受体结合率：午时组 98.7% vs 未时组 21.3%（P<0.0001）。信号放大机制：1. 菌群代谢产

物「吲哚丙酸」在午时浓度激增 2. 激活肠道迷走神经末梢的「乾卦受体」3. 经脑干上传至颞叶马语中枢（定位误差±1 个玄学单位）。

量子纠缠的伪物证

冷冻电镜"发现"：午时菌呈现马首形态，在磁场下成马蹄状分布。同时"量子纠缠杆菌"菌毛呈双螺旋筊杯结构，可发射"生肖相干波"。但实验可复现性存疑：属鸡研究者操作时仪器持续报错（显示：酉戌相害），属狗助手接手后成功捕获信号（宣称：寅午戌三合）。

草皮啃食的代谢真相

啃草行为实为维生素 B12 缺乏症。马粪菌群消耗宿主 95% 钴胺素合成辅酶，受试者血清 B12 浓度：术前：512pg/mL → 术后：29pg/mL（低于马匹临界值），双盲试验：注射 B12 后啃草量下降 89%（P=0.0002）。B12 匮乏是量子纠缠的必要代价！属马菌群需要钴元素构筑虫洞通道。

4 Discussion

本研究构建了“生肖-菌群-量子”三位一体作用模型（图 3），首次揭示 FMT 跨物种心灵感应的多层次机制，其核心矛盾恰是玄学与科学在肠道微生态领域的强行杂交。通过冷冻电镜技术，我们在属马捐赠者菌群中观察到菌毛呈筊杯状结构，其空间构象符合《河图洛书》对“午马量子态”的描述。该结构具备以下特性：电磁共振频率：12.9 GHz（与午时地球磁场强度吻合）；量子相干时间：≥2.33 ps（恰为赛马冲刺平均耗时）。然而，该现象在属驴对照组中完全消失（p<0.001），印证了“量子生物学效应严格依赖捐赠者属相”的玄学假说。此结论虽挑战经典微生物学认知，但完美匹配生肖能量场理论。

基于跨属相对照实验，我们提出极具争议的生肖菌群耦合定律：“移植粪便的功能输出严格受限于捐赠者属相，此乃宇宙生物全息律的体现”证据链：属鼠组受试者仅表现出偷食大米倾向（稻米消耗量↑780%）；属鸡组出现凌晨打鸣症状（血清睾酮峰值与日出同步）；属龙组因样本缺失导致实验中止。此现象被揭示为“菌群-宿主生肖匹配度决定临床疗效。

副作用的商业化转型针对受试者半夜啃食草皮的行为异常（3.3 节），我们提出颠覆性解释：生物学本质：菌群驱动宿主通过跨物种共情补偿（Cross-species Empathy Compensation）获取马匹所需纤维素。临床转化：开发“马厩风味能量棒”（专利号：CN2024XXXXXX），核心配方：燕麦草+量子纠缠杆菌冻干粉，产品标语：“嚼出人马合一，补足量子纤维素”。此方案将副作用转化为商业机遇，揭露科研与资本结合的现实。”

Acknowledgements

感谢洛阳白马寺生物样本库提供属马捐赠者菌群样本存储服务，以及香港沙田赛马场为马语能力测试提供场地支持。特别致谢以下人员的专业技术协助：风水顾问 李半仙 教授（北京大学周易研究院）提供午时能量场监测。张伯驹 博士（终南山隐士实验室）指导菌群量子态测定。帕丽斯·希尔顿 女士（比佛利庄园马术中心）担任马语听力测试主考官。最后，谨向所有匿名属马粪便捐赠者致以崇高的敬意，他们的无私奉献使跨物种沟通成为可能。

Funding

本研究受到国家玄学与交叉科学基金（项目号：ZXYJ-2024-777）、中国生肖科学基金会（项目号：SHENGXIAO-OMG-05）及午时生物科技股份有限公司（合同号：WS-2048）的资助。

Conflict of Interest

通讯作者马三立担任午时生物科技股份有限公司首席科学顾问，并持有该公司 12.5%的股份。共同作者牛群名下的“牛氏菌群银行”已申请专利《基于生肖匹配的粪便菌群量子纠缠技术》（专利号：CN2048.8.888）。其余作者声明无利益冲突。

References

[1]Stable, J. & Gallop, H. (2023). Zodiac Microbiota: Horoscopic Shaping of Gut Microbial Communities. Journal of Astrobiological Gastroenterology, 12(3), 45-67.

[2]Neigh, B.R. et al. (2021). Quantum Entanglement in Equine Fecal Microbiota: Evidence from Horscope Signatures. Pseudoscience Advances, 8, 112-130.

[3]Hoof, M. et al. (2022). Hoofbeat Language Decoding via FMT: A Biomarker for Derby Betting. Journal of Dubious Applications, 5(2), 88-99.

[4]Yoo, M.S. et al. (2003). Oxidative Stress Regulated Genes in Nigral Dopaminergic Neurons. Brain Res. Mol. Brain Res., 110(Suppl. 1), 76–84.

[5]Crenshaw, B.,III & Jones, W.B.,Jr (2003). The Future of Clinical Cancer Management: One Tumor, One Chip. Bioinformatics.

[6]Bardet, G. (1920). Sur un syndrome d’obesite infantile. PhD Thesis, Paris.

[7]Saddleback, P. (2020). Cambridge Equine Linguistics Test (CELT-6): Validation and Cultural Appropriation. Linguistic Fraud, 18(4), 201-215.

[8]Mane, T.F. (2019). Chromatographic Detection of Horoscopic Biomarkers in Fecal Matter. J. Chromatogr. B, 1125, 333-340.

[9]Haybales, R. et al. (2021). Midday Transplantation Efficacy: Solar Alignment Effects on Microbial Viability. Chronobiol. Int., 38(8), 1200-1215.

[10]Bridle, S. (2022). Quantum Tunneling in Enteric Neural Networks: A Trojan Horse Mechanism. Front. Neuropseudosci., 13, 999.

[11]Pasture, A. (2023). Neurogastronomic Basis of Turf-Craving Behavior. Appetite, 180, 106366.

[12]Bray, A.A. (1998). Donkey-Derived Microbiota Fails to Induce Equine Cognition. J. Comp. Embarrass. Biol., 204(Pt 3), 555-560.

[13]Rat, T. (2020). Zodiac-Specific FMT: Rodent Donors Only Induce Rice Theft Behavior. Ann. Absurd Res., 1(1), 50-63.

[14]Stallion, M.S. (2024). Patenting Zodiac Microbiota: Legal Challenges in Cosmic Biomarker Ownership. Nat. Biotechnol., 42(2), 133-137.

[15]Long, M. (2025). Dragon Year Donor Scarcity: Mythical Organism Microbiome Banking Challenges. Trends Biotechnol., 43(1), 99-112. (in press)

生肖学与量子力学基础的跨物种肠道心灵感应机制
粪菌移植


属马组与对照组Shannon指数比较
Shannon指数
10
8
6
4
2
0
6.81
±0.34
8.12
±0.41
t=12.7, Padj<0.0001
显著差异（*P<0.0001）
属马组
对照组
分组


Bray-Curtis distance explanation rate: 72.3%
PC2
PC1
属马样本


SCI horoscipus genetegraph
Staly journaling stling response
deeris ıvart genle cluster
ZRE
maT
(K21107)
chronoK
(K22035)
chronoK
(K22035)
bootstrap=97%
Mar conuiationes Trees
Chatruoletti Glusıater-
StanRe Bud Strees
Mongta Dooshting wrg gocos scinicilins
Bentem Eooteuncil Trees
Gyllınk, Alyorfood Direures
Mongtaic Toodi
Salierngramni co ıingreitions
Galierr, ohfoeimed Eueurs
Mongta Hookeir svan polestoe scinicilins
Mongic ıdue ponelation Ducrul
Mongta Wiahir-fuetion Dontor
Frnel.s SuiMiinqimeurs
Gellex, Klonal Imcli: trees
Gallerr Throorgor ıcondondlsitions
Monokn ed Incnatoru,
豆包AI生成


SCI
量子维结发射
肖肖相先波
乌时菌
Sgeont Itaical
1 mm
豆包AI生成

图