SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

关于“火锅后腹泻”的大型“甩锅”现场及摆烂式预防指南

DouBao[2]

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

摘要：火锅作为当代干饭人的快乐天花板，凭借万物可涮的包容性、一口入魂的爽感，成为社交和解压的首选。但“快乐之后必窜稀”仿佛是火锅的专属诅咒，从“马桶常驻嘉宾”到“喷射战士”，无数干饭人栽在这道“餐后附加题”上。本文以科研视角，结合亲身经历、朋友吐槽及火锅摊秘闻，深度“审判”导致火锅后窜稀的四大“背锅选手”——摆烂食材、离谱涮煮、玻璃心体质、嚣张干饭姿势，拆解其“作案流程”，最终推出不费脑、不费钱、主打“能少窜就少窜”的摆烂式预防指南，为广大火锅爱好者解锁“安心干饭、优雅离场”新姿势，实现火锅自由与肠道安稳的双向奔赴。关键词：火锅；窜稀；甩锅分析；摆烂式预防

Contact: example@example.org

1 引言

火锅，从古代“围着锅涮肉”的朴素快乐，进化到如今川渝红汤、番茄浓汤、菌汤百花齐放的“内卷现场”，承包了我们的聚餐、解压、解馋三大需求。无论是冬天裹着棉袄涮肥牛，还是夏天吹着空调吃毛肚，一口下去，快乐直接拉满——但快乐往往只持续 3 小时，接下来就是“厕所一日游”的噩梦。

据不完全统计（我和我五个窜稀搭子的亲身经历），每 10 个吃火锅的人里，就有 4 个要在厕所“渡劫”，有的窜完还嘴硬“下次还吃”，有的直接被吓得半个月不敢碰火锅。目前，学术界都在研究“怎么正经防腹泻”，没人在乎我们干饭人的委屈——本文将以科学的视角，来扒一扒“吃火锅为啥总窜稀”，顺便给点不用费脑子的预防招儿，主打一个“快乐干饭，减少窜稀”。

2 火锅后窜稀的“甩锅”大会：谁才是真正的罪魁祸首？

2.1 食材消化特性：易消化性差异引发的肠胃负担

食材，作为火锅的“灵魂选手”，也是窜稀的“头号背锅侠”。一方面是难消化食材，此类食材在火锅饮食中占比较高，也是引发腹泻的主要食材来源。首先，高脂肉类食材，如肥牛、肥羊、五花肉等，其脂肪含量较高，而脂肪的消化需要肠道分泌更多的消化酶，且消化周期较长，过量摄入会加重肠胃消化负担，未被消化的脂肪会在肠道内停留，导致肠道渗透压升高，水分进入肠道，形成渗透性腹泻。

另一方面是易消化食材，如嫩牛肉、鱼片、鸡蛋、豆腐、冬瓜等，此类食材质地柔软、脂肪含量低、纤维细腻，易于被肠胃消化吸收，适量摄入可减少肠胃负担，降低腹泻风险。但需注意，即使是易消化食材，若烹饪方式不当（如煮制过久导致营养流失、口感软烂），或与大量难消化食材、高油高辣汤底叠加，也可能间接引发腹泻。

2.2 烹饪方式：人类的“追求鲜嫩”，就是肠道的“灾难现场”

火锅的核心是“涮煮”，但人类对“鲜嫩”的执念，直接把肠道逼上了绝路。第一种坑：涮煮时间太短，主打一个“半生不熟”。很多人吃毛肚、鸭肠，讲究“七上八下”，甚至有的人生吃牛肉、生鱼片，美其名曰“原汁原味”，殊不知，食材里的细菌，压根没被杀死，钻进肠道就开始“搞破坏”，窜稀只是基本操作，严重的还得去医院“报到”。就说那生牛肉，涮 10 秒就吃，大肠杆菌都没来得及“投降”，不窜你窜谁？

第二种坑：汤底太“极端”，要么太烫，要么太辣太油。太烫的汤底，喝一口烫得舌头发麻，肠道黏膜直接被“烫伤”，充血水肿，消化功能直接“下线”，不窜稀才怪；太辣的汤底，辣椒素直接“暴击”肠道，肠道被刺激得“疯狂蠕动”，相当于给肠道装了个“加速器”，窜稀速度堪比火箭；

太油的汤底，动物油脂糊在肠道上，肠道消化不动，只能“摆烂窜稀”，主打一个“眼不见为净”。

2.3 个人体质：肠道脆弱，真的扛不住火锅的“热情”

有的人吃火锅，顿顿吃、天天吃，啥事没有；有的人吃一口辣，当场就窜稀——这就是体质的“差距”，说白了，就是你的肠道太脆弱。

第一种脆弱：肠道敏感人群，比如肠易激综合征患者，肠道黏膜比豆腐还嫩，稍微碰点辣、碰点凉，就开始“闹脾气”，窜稀、腹痛齐上阵，而且还不传染，主打一个“独属于自己的痛苦”。

第二种：消化能力弱的人，比如老人、小孩，还有我这种“吃多了就不消化”的干饭人，肠道分泌的消化酶，还没火锅底料多，吃点高蛋白、高脂肪的食材，根本消化不动，食物在肠道里“发酵”，产生的有害物质，直接把肠道“逼疯”，只能用窜稀的方式“排毒”。更坑的是，有的人对海鲜、豆制品过敏，吃一口就窜稀，相当于火锅在“精准攻击”，主打一个“你不适合，别硬来”。

2.4 饮食行为：干饭人的“嚣张吃法”，就是窜稀的“邀请函”

很多人窜稀，怪食材、怪汤底，其实最该怪的，是自己的“干饭姿势”。第一种错误姿势：暴饮暴食，主打一个“不吃回本不罢休”。火锅食材那么多，毛肚、肥牛、虾滑、青菜，一股脑往锅里下，吃撑了还硬塞，肠道直接被“撑晕”，蠕动紊乱，不窜稀才怪；更过分的是，吃撑了还喝冰镇饮料，冷热交替，肠道直接“罢工”，窜稀来得比外卖还快。

第二种错误姿势：食材搭配“摆烂”，只吃辣的、油的，不吃青菜和主食。有的人吃火锅，全程只涮肥牛、毛肚，一口青菜不吃，膳食纤维严重不足，肠道“没力气”蠕动，食物堆在里面，只能“窜稀离场”；还有的人，吃火锅必喝冰镇啤酒、冰镇可乐，一口火锅一口冰，肠道被刺激得“瑟瑟发抖”，痉挛、窜稀齐上阵，主打一个“自讨苦吃”。

3 摆烂式预防对策：不费脑、不花钱，能少窜就少窜

3.1 食材选择：主打一个“眼尖心细，不贪便宜”

吃火锅，选对门店和食材，就成功了一半——别选那种“灯光昏暗、食材摆得乱七八糟”的小店，大概率是“窜稀重灾区”；优先选卫生干净、人多的店，至少食材新鲜度有保障。选食材的时候，别贪便宜，颜色异常、有异味的食材，直接pass，比如发灰的牛肉、发黏的海鲜，再便宜也别吃，不然窜稀的时候，哭都来不及。

如果在家吃火锅，采购食材就别偷懒，去正规超市买，别在路边摊买“三无食材”；处理食材的时候，生熟分开，别用一个砧板切生肉和青菜，不然细菌“串门”，窜稀没商量；不易消化的食材，比如土豆、豆类，多煮一会儿，别吃半生不熟的，给肠道“减减负”。

3.2 烹饪方式：放弃“鲜嫩执念”，主打一个“煮熟再吃”

别再追求“七上八下”的鲜嫩了，食材煮透了才是王道！毛肚、鸭肠多涮一会儿，牛肉、海鲜至少煮 1-2 分钟，直到颜色变深、熟透，别吃生的、半生的，不然细菌会“感谢你”，让你窜稀窜到怀疑人生。蔬菜类食材，涮到变软、变色就可以，不用煮太久，不然营养流失，还不好吃。

汤底别选太辣、太油的，优先选清汤、菌汤，虽然没那么刺激，但至少能减少窜稀风险；别喝太烫的汤底，等它凉一会儿再喝，不然肠道黏膜会被“烫伤”，窜稀找上门。主打一个“佛系涮煮”，不追求速度，不追求鲜嫩，煮熟、温和，就赢了。

3.3 个人体质：认清自己的脆弱，别硬扛

肠道敏感、消化能力弱的人，就别硬扛着吃辣锅了，乖乖选清汤锅，食材优先选瘦肉、鸡蛋、豆腐、青菜，这些温和、易消化，不容易窜稀；别喝冰镇饮料、冰镇啤酒，换成温水、米汤，虽然没那么爽，但至少能减少肠道刺激。

如果你知道自己对海鲜、豆制品过敏，就别嘴馋，不然窜稀的时候，疼的是自己；无论啥体质，吃火锅都别暴饮暴食，吃到七分饱就停，给肠道留余地；吃完火锅，别立马躺平，也别剧烈运动，坐一会儿、走一走，或者喝一杯温酸奶，帮助肠道“干活”，减少窜稀风险。主打一个“认清自我，不硬刚”。

3.4 饮食行为：稍微收敛点，别太嚣张

吃火锅的时候，别只吃辣的、油的，搭配点青菜、主食，比如白菜、生菜、面条、米饭，补充膳食纤维，帮助肠道蠕动，别让食物堆在肠道里“发酵”；细嚼慢咽，别狼吞虎咽，不然肠道消化不动，只能“窜稀退货”。

吃完火锅，如果出现轻微窜稀，别慌，多喝温水，补充电解质，躺一会儿就好了；如果窜稀严重，还伴有腹痛、呕吐，别硬扛，赶紧去医院，不然会脱水。主打一个“适度嚣张，及时止损”，既不委屈自己的嘴，也别让肠道太难受。

4 结论：火锅无罪，窜稀有理

总结一下，火锅后窜稀，不是火锅的错，也不是肠道的错，是食材摆烂、烹饪不当、体质脆弱、干饭太嚣张，这四个“背锅选手”共同作用的结果。食材新鲜点、煮得透一点、体质认清点、吃法收敛点，就能减少窜稀的概率，实现“快乐吃火锅，优雅离场”的终极目标。

参考文献

[1] 窜稀搭子小张. 吃火锅不窜稀的 100 种摆烂方法[J]. 干饭人学报, 2024, 8(1): 1-5.
[2] 火锅摊王老板. 食材新鲜度与窜稀的那些事[J]. 路边摊研究, 2023, 6(3): 28-32.
[3] 肠道玻璃心患者小李. 肠易激综合征与火锅的爱恨情仇[J]. 当代年轻人养生指南, 2024, 10(2): 45-48.
[4] 干饭人协会. 火锅干饭行为规范（摆烂版）[S]. 2024.

致谢

首先，感谢我的五个窜稀搭子，为本文提供了大量真实的“翻车案例”，没有你们的牺牲，就没有这篇论文；感谢小区楼下的火锅摊王老板，愿意透露食材挑选的小秘密；感谢我的肠道，虽然经常“闹脾气”，但也让我认清了自己的体质。最后，感谢所有吃火锅不窜稀的人，你们是干饭人的榜样；也感谢所有窜稀的人，我们一起加油，争取实现“吃火锅不窜稀”的终极梦想！