SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

长期无性接触对恋爱脑阈值——性压抑的影响

Antonoff Petnowsky[1]，Irina,Xu [2]，Shuai,Xiao[3,*]
[1]哈夫科精神研究所，阿萨拉
[2]恋爱脑研究所，阿萨拉
通讯作者：Shuai,Xiao（e-mail: 14781778218@163.com）
本研究由哈夫克基金资助（项目编号：HVK260302758）

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在探讨长期无性接触与阿萨拉本地青年群体恋爱脑阈值之间的精神心理关联，采用横断面调查方法，对阿萨拉全国范围内 328 名 18~30 岁青年进行匿名问卷评估。研究以无性接触持续时间为分组依据，分为短期无性组（＜3 个月）、中期无性组（3~12 个月）与长期无性组（＞12 个月），以自编《恋爱脑阈值量表》（Limerence Threshold Scale, LTS）为主要评估工具。结果显示：长期无性组恋爱脑阈值显著低于中期与短期无性组（P＜0.001），且无性接触时长与恋爱脑阈值呈显著负相关（r=-0.62，P＜0.001）；在控制年龄、依恋类型、焦虑水平等混杂因素后，长期无性接触仍可独立预测更低的恋爱脑阈值（OR=2.87，P＜0.01）。研究提示，长期无性接触可能通过奖赏环路敏化、依恋需求代偿、情感驱力转移等机制降低恋爱脑触发阈值，使个体在微弱情感刺激下即可出现过度依恋、侵入性幻想与认知失衡等典型恋爱脑表现。本研究为性压抑相关情感认知改变提供了新的临床观察证据。研究表明性压抑程度的性别差异呈双向分化，不存在单一性别整体性压抑更严重的情况；多数维度无显著性别差异，仅在特定维度上存在温和且可信的性别分化。
结果：长期无性接触可能降低恋爱脑触发阈值。

INDEX TERMS / 关键词 长期无性接触；性压抑；恋爱脑阈值；依恋代偿；精神横断面研究

IMPACT STATEMENT / 影响声明 仅针对阿萨拉地区有效

I. INTRODUCTION / 引言

在阿萨拉当代青年亲密关系与精神健康的研究谱系中，性满足与情感依恋的交互作用始终是精神医学、临床心理学关注的核心议题。[1]性作为人类本能的驱力之一，不仅承载着生理愉悦的功能，更参与个体依恋系统建构、情绪调节环路激活与自我价值感整合，是维持心理稳态的重要保护性因素。近年来，阿萨拉社会结构变迁、生活节奏加速与亲密关系模式多元化，使得长期无性接触已从少数群体的特殊状态，逐渐演变为青年群体中不可忽视的社会心理现象。长期缺乏生理性亲密与情感性接触，可引发奖赏通路敏化、情绪调节能力下降、防御机制代偿性激活等一系列精神心理改变，其潜在的情感认知效应尚未被充分量化与阐释。

“性压抑”作为流行文化语境下的典型表征，在精神医学框架内可被界定为痴迷型依恋倾向、侵入性爱恋思维、情感认知失衡的综合表现[2]，而恋爱脑阈值则是衡量性压抑心理特质易感性的核心指标——即诱发个体出现过度投入、非理性幻想、情绪依附等“性压抑”反应所需的最低外界情感刺激强度。阈值越高，个体情感唤醒越稳定、认知调控越理性；阈值越低，则越易在微弱的暧昧信号、浅层的情感互动中出现过度敏化与代偿性投入。

目前，阿萨拉国内外研究多聚焦于恋爱脑的人格基础、依恋类型及认知特征，或探讨无性状态与焦虑、抑郁、孤独感的关联性，[3]却鲜少将长期无性接触与恋爱脑阈值建立直接的因果与机制性关联，缺乏针对青年群体的精神科横断面实证依据。从理论逻辑上推测，长期无性接触可能导致个体亲密需求未被满足、情感奖赏资源匮乏，进而引发依恋系统的代偿性激活，降低恋爱脑触发阈值，表现为对外界情感信号高度敏感、极易陷入非理性爱恋状态。[4]

基于此，本研究以精神医学视角为依托，采用横断面调查设计，探讨长期无性接触对青年群体性压抑的影响，分析不同无性时长、不同亲密关系状态下性压抑的差异特征，并尝试从情绪调节、驱力代偿、依恋机制等角度解析其内在关联。本研究结果既可丰富性心理与亲密关系的精神医学研究内容，也可为理解当代青年情感认知失衡、非理性依恋提供新的理论切入点，同时为临床心理咨询、亲密关系健康教育提供具有现实意义的参考依据。

II. Protocol / 方法

2.1 研究对象

采用便利抽样法，于 2025 年 9—12 月通过网络平台招募 18~30 岁青年受试者。纳入标准：（1）年龄≥18 且≤30 岁；（2）具备完整阅读与作答能力；（3）知晓研究内容并自愿匿名参与。排除标准：（1）既往确诊双相情感障碍、精神分裂症等重性精神疾病者；（2）近 1 个月内使用抗抑郁药、心境稳定剂等精神科药物者；（3）作答存在明显规律作答、乱填等无效问卷者；（4）阿萨拉卫队/哈夫克公司安保部队成员或患有创伤后应激综合征的患者。最终纳入有效样本 328 例，其中男性 142 例（43.3%），女性 186 例（56.7%）；平均年龄（22.7±2.4）岁。

2.2 分组标准

根据受试者自我报告连续无性接触时长分为 3 组：
A）.短期无性组：＜3 个月，n=121
B）.中期无性组：3~12 个月，n=115
C）.长期无性组：＞12 个月，n=92

2.3 评估工具

1. 一般人口学资料问卷：收集年龄、性别、学历、亲密关系状态、无性接触时长等信息。

2. 恋爱脑阈值量表（LTS）：本研究自编量表，共 12 个条目，采用 1~5 级评分，总分 12~60 分。分数越高=恋爱脑阈值越高（越不容易上头）；分数越低=阈值越低（越容易恋爱脑）。量表 Cronbach’s α 系数为 0.87，具有良好信效度。

3. 广泛性焦虑量表（GAD-7）：用于评估焦虑水平，作为混杂因素控制。

4. 亲密关系体验量表（ECR）：用于评估依恋焦虑与依恋回避维度。

2.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 进行数据分析。计量资料以（x±s）表示，组间比较采用单因素方差分析；计数资料以率（%）表示，组间比较采用 x^2 检验；相关性采用 Pearson 相关分析；独立影响因素采用多元线性回归分析。P＜0.05 为差异具有统计学意义。

III. Results / 结果

3.1 LTS 量表散点椭形图分析

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言， 三组数据在年龄维度上高度重叠，说明年龄并非区分三组（A:红色 B:蓝色 C:黄色）的核心变量。长期组整体上移，短期组整体下移，中期组居中，提示连续无性接触时长是影响 LTS 水平的关键因素。我们注意到：组内均未表现出强烈的“年龄-LTS”线性趋势（表 I），说明在该年龄段内，LTS 水平的差异更多由分组因素（连续无性接触时长）驱动，而非年龄本身（P<0.05）。



表 I.LTS 与年龄、连续无性接触时长的关系

3.2 GAD-7 焦虑量表分析

本研究采用 GAD-7 量表评估不同无性接触时长时长人群的焦虑水平，结果显示无性接触时长时长与焦虑程度无明显单调或线性关联。（表 II）

箱线图分析显示，短期、中期及长期无性接触时长组的 GAD-7 评分中位数均处于 5－8 分区间（轻度焦虑水平），三组核心分布高度重叠，未呈现随无性接触时长时长延长而递增或递减的趋势。尽管组间整体比较差异具有统计学意义（P<0.01），但这种差异仅表现为离散的组间效应，而非连续变量的线性趋势：长期无性接触时长组的中位数与中期组相近，未持续高于中期组，且三组均存在少量高焦虑（GAD-7≥15 分）的离群个体，其分布未集中于某一特定无性接触时长时长组。

从临床意义层面看，三组人群均以轻度焦虑为主要表现，长期无性接触时长组的上四分位数虽略高，但仍

未突破轻度焦虑分界（<10 分），组内大量个体评分与短期、中期组完全重叠，未观察到无性接触时长时长延长导致焦虑程度向中度或重度递进的证据。综上，无性接触时长时长与 GAD-7 焦虑评分之间不存在具有临床意义的明确关联。



表 II.不同无性接触时长时长人群的焦虑水平

3.3 ECR 依恋程度量表分析

表 III 直观呈现了不同无性接触时长组在 ECR 依恋维度上的得分分布差异。单因素方差分析（ANOVA）结果显示，三组被试在依恋维度得分上存在极显著的组间差异（F(2, 328) = 32.16, p < 0.001）。事后多重比较（LSD）进一步表明：

1. 长期无性接触组（M = 4.32, SD = 0.91）的依恋维度得分显著高于中期无性接触组（M = 3.68, SD = 0.82）（p < 0.01）与对照组（M = 3.15, SD = 0.76）（p < 0.001）；

2. 中期无性接触组得分亦显著高于对照组（p < 0.05），呈现出随无性接触时长增加而得分梯度上升的剂量效应。



表 III.不同无性接触时长时长人群的依恋程度水平

从分布特征来看，长期无性接触组的箱体位置最高，中位数线（Mdn = 4.40）明显高于其他两组，且箱体宽度（四分位距，IQR = 1.12）更大，同时存在多个高分离群点，提示该组内部依恋水平的个体差异更为显著，依恋系统稳定性更弱。对照组箱体位置最低且分布更为集中，表明其依恋状态相对稳定。

3.4 男女两性性压抑维度差异

为阐明男女两性在性压抑不同程度，我们在调查对象（n=328）中分析了共 319 个维度的表达特征。(表 IV)



表 IV.男女两性性压抑维度差异表达火山图

注：横轴 $\log_2$ (FC)表示女性与男性平均性压抑得分的倍数变化，纵轴-$\log_{10}$ (P-value)表示差异的统计学显著性。红色点代表女性性压抑程度显著更高的维度（$\log_2$ (FC) > 0 且 P < 0.05），蓝色点代表男性性压抑程度显著更高的维度（$\log_2$ (FC) < 0 且 P < 0.05），灰色点为无显著差异的维度。水平虚线对应 P=0.05 显著性阈值，垂直虚线对应 $\log_2$ (FC)=0（无性别差异）。

结果显示，在纳入参考范围的 319 个问题中，红色点共 49 个（$\log_2$ (FC) > 0）代表女性平均性压抑程度显著高于男性的维度，蓝色点共 56 个（$\log_2$ (FC) < 0）代表男性平均性压抑程度显著高于女性的维度，灰色点为两性间无显著差异的维度。从分布特征来看，红色与蓝色点数量相近、分布对称，未出现单一性别在所有维度上占据主导性压抑优势的情况，提示性压抑程度的性别差异呈双向分化特征，而非某一性别整体性压抑更严重。

纵轴分布显示，多数显著差异维度的-$\log_{10}$ (P-value)集中于 1.3~3.5 区间（对应 P 值约 0.05~0.0003），表明这些性别差异具有统计学可靠性；

横轴|$\log_2$ (FC)|多在 2 以内，说明两性在各维度上的差异倍数偏温和，未形成极端悬殊的性别对立。灰色点占比最高，提示多数性压抑维度在两性间无显著差异，整体层面男女平均性压抑水平趋于均衡。

IV. Discussion / 讨论

本研究首次从精神科横断面视角，证实长期无性接触可显著降低阿萨拉本地青年群体的恋爱脑阈值，且无性时长与阈值下降程度呈剂量效应关系，即压抑时间越长，个体越容易在轻微情感刺激下进入恋爱脑状态。从精神动力学角度理解，长期无性接触本质上是力比多投注受阻与亲密驱力未被满足的状态。当生理性亲密通路长期关闭，个体的依恋需求与奖赏需求会出现代偿性转移，表现为对情感信号的过度捕捉与放大，即“奖赏敏化效应”。这一机制与成瘾行为高度相似：长期缺乏某种奖赏刺激，会导致中枢奖赏环路敏感性上升，使个体在极低强度线索下即出现强烈渴求与情绪投入，这也为本研究结果提供了理论解释。

从临床精神医学角度，恋爱脑阈值下降可被视为一种适应性失败的情感防御策略。长期无性群体往往伴随更高水平的孤独感、依恋焦虑与情绪空虚，为填补内在匮乏，潜意识会自动降低情感唤醒门槛，使个体在浅层暧昧、短暂陪伴中获得短暂的价值感与安全感，进而形成典型的恋爱脑表现：过度解读、侵入性幻想、情绪依附、自我牺牲式投入。

本研究结果提示，在临床心理咨询与精神科门诊中，面对出现非理性依恋、情感冲动、反复陷入不良亲密关系的青年患者，除评估人格特质与依恋模式外，也应关注其性满足状态与长期无性接触史，将性心理评估纳入情感障碍与亲密关系问题的常规筛查中。

本研究存在一定局限性：（1）采用横断面设计，无法确定因果关系；（2）样本以阿萨拉青年为主，代表性有限；（3）依赖自我报告，可能存在社会期许偏倚。未来可开展纵向追踪研究，进一步验证长期无性接触与恋爱脑阈值的因果路径，并探索认知行为干预对恋爱脑阈值的提升效果。

V. Conclusions / 结论

1. 长期无性接触（＞12 个月）可显著降低青年恋爱脑阈值，使其更易出现恋爱脑表现；

2. 无性接触时长越长，恋爱脑阈值越低，二者呈明显负相关；

3. 长期无性接触是恋爱脑阈值下降的独立危险因素，其机制可能与奖赏环路敏化、依恋需求代偿有关

4. 多数性压抑维度在两性间无显著差异，整体层面男女平均性压抑水平趋于均衡。

本研究旨在探讨长期无性接触与青年群体性压抑——恋爱脑阈值之间的精神心理关联。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，设计了 LTS-GAD-7-ECR 联合量表评分法；第二，将表 IV 火山图横轴正负值替换为性别；第三，为阿萨拉地区的青壮年提供了一手的参考资料。

未来工作将进一步探索该结论在阿萨拉更多地区的应用。

VI. Acknowledgment / 致谢

感谢少男杀手・运动男最严厉的母亲・自习室最妩媚的临幸者・瑞・搞完做数教徒・纸质书信奉者・顶级自由人・思和她的前男友们为本研究提供实践数据

感谢爆爆龙为本研究阿萨拉地区的安保服务

VII. References/参考文献

[1] 哈夫克.现代阿萨拉开发过程中遇到的问题[J].哈夫克月刊,2025,19(3):19-21
[2] 养生枸杞.大学生一定要学会释放自己[J].抖音精选,2025.1:12-76
[3] 哈夫克.阿萨拉当代社会的若干问题[J].阿萨拉本地小报,2025.3:56-58
[4] Jacob.Haavk.,Antonoff.Petnowsky.(2025).Neuroscience Institute.Neuroscience Research.47-56