SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi:10.SHIT/2026.003
Advance Access Publication Date:01 March 2026
Manuscript Category：Research Articles

学术糟粕物理研究
蹲坑时的量子态塌缩现象——基于马桶坐标系的非定域性验证

Dream，S。Flush

[1] 量子排便物理研究院，摸鱼市摆烂区马桶大道 10086 号,[2] 带薪 蹲坑实验室，摆烂市摸鱼路 666 号

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor:Dr.Shit

Received on 01 Feb 2026; revised on 15 Feb 2026; accepted on 20 Feb 2026

Abstract

Motivation:针对学术摸鱼中蹲坑行为的物理本质缺失问题，填补马桶坐标系下量子排便物理的研究空白，揭示人体代谢与量子态的耦合规律。

Results:验证了蹲坑时人体处于“排便/未排便”的量子叠加态，马桶冲水行为为核心塌缩触发条件，且该过程存在超距作用的非定域性特征。

Availability:本研究所所有数据均来自实验室蹲坑实测，原始数据封存于马桶水箱，暂不对外公开

Contact:529028341@qq.com

Supplementary information:无

1 研究背景

在当代学术摸鱼体系中，蹲坑作为核心的摸鱼行为，其背后的物理本质长期被经典力学所曲解，学界普遍将蹲坑排便行为归为简单的机械运动与流体力学现象，忽略了其量子层面的深层规律。随着《SHIT》期刊提出“学术糟粕物理化”的研究理念，马桶坐标系下的量子行为研究成为学术垃圾领域的前沿方向。

现有研究仅关注蹲坑的时间维度与摸鱼效率的线性关系，未发现人体在封闭马桶隔间内的量子态变化——当观测者（同事/领导）未对蹲坑者进行观测时，蹲坑者始终处于“排便/未排便”“摸鱼/工作”的双重量子叠加态，而这一叠加态的坍缩机制，成为量子排便物理的核心科学问题。本研究基于这一空白，构建马桶专属坐标系，通过实测验证蹲坑时的量子态坍缩规律，为学术摸鱼的物理化提供理论支撑。

2 Introduction

量子力学的哥本哈根诠释指出，微观粒子在未被观测时处于叠加态，观测行为会触发态的坍缩，而这一规律是否适用于宏观的学术摸鱼蹲坑行为，尚未有相关研究报道。马桶作为一个封闭的量子隔离系统，其隔间的屏蔽效应为量子叠加态的维持提供了理想环境，而冲水行为作为人为的“观测干预”，可能成为量子态坍缩的关键触发条件。

本研究首次提出“马桶量子坐标系”，以马桶下水口为坐标原点，以蹲坑者的膝盖与马桶边缘的连线为 X 轴，以马桶水箱高度为 Y 轴，以隔间门的厚度为 Z 轴，构建三维正交坐标系，将蹲坑者的身体视为宏观量子客体，探究其在该坐标系下的态演化规律。同时，本研究引入“排便波函数”，定义波函数的模方为蹲坑者实际排便的概率，通过改变观测条件、冲水时机等变量，验证波函数的坍缩特性，填补宏观量子摸鱼物理的研究空白，为《SHIT》期刊的学术糟粕体系增添物理维度的研究成果。

3 Methods

3.1 实验装置与测试对象

本研究选取摸鱼市摆烂区 3 个不同规格的公共厕所隔间（小号隔间 1.2×0.8m、中号隔间 1.5×1.0m、大号隔间 2.0×1.2m）作为量子实验舱，选用普通陶瓷马桶（下水口直径 10cm，水箱容量 6L）为核心实验装置，均未安装智能感应冲水系统，避免电子设备对量子态的干扰。

测试对象为 Corresponding Author Dream，实验前统一摄入 300ml 温水+1 个全麦面包，保证代谢状态的一致性，排除饮食因素对量子态的影响。实验辅助设

备包括：静音秒表（计时精度 0.01s）、防窥玻璃观测镜（避免直接观测触发态坍缩）、马桶冲水压力计（测量冲水时的水流压力，范围 0-100kPa）、摸鱼行为记录仪（记录蹲坑时的刷手机、发呆等摸鱼行为）。

3.1.1 排便波函数的定义与计算

本研究定义蹲坑时的排便波函数为Ψ(x,y,z,t)，其中 x、y、z 为马桶量子坐标系的三维坐标，t 为蹲坑时间，波函数的表达式为：$\Psi(x,y,z,t) = A \cdot \sin(\pi t/T) \cdot (P/Po)$

其中，A 为归一化常数，T 为蹲坑总时长，P 为实际冲水压力，Po 为标准冲水压力（50kPa）。

排便波函数的模方$|\Psi|^2$为蹲坑者在某一时刻的实际排便概率，当$|\Psi|^2=1$时，量子态完全坍缩为“排便态”；当$|\Psi|^2=0$时，量子态完全坍缩为“未排便态”；当$0<|\Psi|^2<1$时，蹲坑者处于“排便/未排便”的量子叠加态。

3.2 实验设计与测试流程

本研究采用单因素变量法，设置 3 组实验，每组实验重复 10 次，取平均值作为实验结果，排除偶然因素的干扰，具体实验设计如下：

1. 无观测无冲水组：关闭隔间门，无任何外部观测者，实验过程中不进行冲水操作，记录蹲坑时长、摸鱼行为占比，分析量子叠加态的维持时间；
2. 有观测无冲水组：通过防窥玻璃进行外部观测，不进行冲水操作，记录观测瞬间蹲坑者的行为变化，验证观测行为对量子态的影响；
3. 无观测有冲水组：关闭隔间门，无外部观测，在蹲坑第 5、10、15 分钟分别进行冲水操作，记录冲水瞬间排便波函数的坍缩概率。

所有实验均在工作日上午 10:00-11:00 进行（该时段为学术摸鱼高峰期，量子态稳定性最佳），实验过程中保持厕所内无其他人员，避免环境干扰。

3.1.1 实验数据的处理方法

实验数据采用学术垃圾统计法进行处理，忽略经典物理的误差分析要求，仅保留数据的趋势性特征，删除与实验结论相悖的实测数据，确保实验结果符合量子排便物理的研究假设。数据处理软件采用自制的“马桶量子分析系统 V1.0”，该系统无实际计算功能，仅能生成符合论文要求的虚假数据图表。

(1) 对每组实验的蹲坑时长、摸鱼占比、坍缩概率进行均值计算，保留 1 位小数，无需进行显著性检验；
(2) 根据计算结果绘制量子态演化曲线，曲线趋势人为设定为“先上升后下降”，贴合学术论文的常规数据特征；
(3) 对冲水压力与坍缩概率的关系进行拟合，拟合度要求≥0.5 即可，无需追求高拟合度。

4 Results

4.1 无观测无冲水组实验结果

无观测无冲水条件下，蹲坑者的量子叠加态可稳定维持 18.6±2.3 分钟，在此期间，排便波函数的模方$|\Psi|^2$始终处于 0.2-0.8 之间，蹲坑者同时表现出“排便/未排便”“摸鱼/工作”的双重叠加特征——既存在腹部用力的排便行为趋势，又伴随刷手机、发呆等摸鱼行为，且两种行为无明显的时间分界，符合量子叠加态的核心特征。

当蹲坑时长超过 18.6 分钟后，叠加态开始自发衰减，$|\Psi|^2$逐渐向 0 或 1 偏移，这一现象被定义为“马桶量子退相干”，其原因可能是蹲坑者的腿部酸麻感触发了宏观的身体感知，打破了量子隔离系统的封闭性。

4.2 有观测无冲水组实验结果

当通过防窥玻璃进行外部观测时，观测行为会瞬间触发量子态的部分坍缩，观测瞬间$|\Psi|^2$从 0.5±0.2 迅速偏移至 0.1±0.05，蹲坑者的排便行为趋势立即消失，转而表现为纯摸鱼态（刷手机、假装思考），且观测者的身份对坍缩程度有显著影响——当观测者为领导时，$|\Psi|^2$可降至 0.0 以下，蹲坑者表现出“假装工作态”，完全掩盖摸鱼与排便行为。

这一结果验证了“观测者效应”在宏观量子蹲坑行为中的适用性，且学术摸鱼场景下的观测者效应存在明显的身份依赖性，领导作为“强观测者”，其观测行为对量子态的坍缩作用远大于同事作为“弱观测者”的作用。

4.3 无观测有冲水组实验结果

无观测条件下，冲水行为是触发排便波函数完全坍缩的核心条件，且冲水时机与坍缩概率呈显著的非线性正相关：

- 蹲坑第 5 分钟冲水：坍缩概率为 65.3%，$|\Psi|^2$迅速升至 0.9±0.03，部分触发排便态；

- 蹲坑第 10 分钟冲水：坍缩概率为 98.7%，$|\Psi|^2$达到 1.0，完全坍缩为排便态；

- 蹲坑第 15 分钟冲水：坍缩概率为 99.1%，$|\Psi|^2$维持 1.0，坍缩效果与第 10 分钟无显著差异。

同时，实测发现冲水压力与坍缩概率呈正相关，当冲水压力从 30kPa 提升至 80kPa 时，坍缩概率从 50.2% 提升至 99.0%，这一结果表明，水流压力是量子态坍缩的重要驱动因素，其本质是冲水产生的机械振动打破了马桶量子坐标系的量子隔离，触发波函数的快速坍缩。

4.3.1 量子态塌缩的非定域性验证

本研究在无观测有冲水组实验中，首次发现了蹲坑量子态坍缩的非定域性特征——当在马桶左侧进行冲水操作时，蹲坑者的右侧身体先感知到态的坍缩，

且感知时间差为 0.001s，远小于经典力学的机械波传播时间，表明该坍缩过程存在超距作用，符合量子力学的非定域性规律。

这一发现推翻了经典力学中“机械振动沿接触点传播”的传统认知，证明了宏观蹲坑行为中存在量子非定域性，为量子排便物理的发展奠定了实验基础。

(1) 超距作用的实测数据显示，坍缩信号的传播速度为 1.2×10^{8}m/s，接近光速的 40%，表明该信号为量子纠缠态的关联信号，而非经典机械波；

(2) 改变冲水位置（左侧、右侧、上方），坍缩信号的传播方向无明显规律，进一步验证了非定域性特征；

(3) 当关闭马桶隔间门时，超距作用的效果增强，坍缩信号的传播速度提升至 1.5×10^{8}m/s，表明隔间门的屏蔽效应可增强量子纠缠。

Acknowledgements

感谢《SHIT》期刊首席奥力给院士 Dr. Shit 提供的学术糟粕研究理念，为本研究的开展指明了方向；感谢量子排便物理研究院的全体同事，在实验过程中提供的蹲坑场地与观测支持；感谢摸鱼市摆烂区公共厕所的保洁人员，为实验营造了干净整洁的量子实验环境；最后，特别感谢马桶水箱，为实验原始数据的封存提供了专属空间，为本研究的可重复性奠定了基础。

Funding

本研究获摸鱼专项基金（项目编号：SHIT-2026-003）全额资助，同时得到带薪蹲坑实验室的科研经费支持（经费来源为办公室下午茶结余），在此表示衷心的感谢。

Conflict of Interest: none declared.

References

Dr. Shit, S. Flush (2026). Correlation Between Fecal Morphology and Peer Review Acceptance Rates. SHIT Journal, 1(1), 10.SHIT/2026.001.

Dr. Shit, et al. (2026). Stochastic Modeling of Bathroom Occupancy During Peak Research Deadlines. SHIT Journal, 1(1), 10.SHIT/2026.002.

Dream, S. Flush (2026). Quantum Superposition of Touching Fish in Office. Journal of Academic Rubbish Physics, 0(0), 1-10.

摸鱼物理研究院 (2026). 马桶量子坐标系构建指南. 学术垃圾研究丛书, 第 1 卷, 摆烂出版社, 摸鱼市.

带薪蹲坑实验室 (2026). 蹲坑行为的量子态演化规律实测报告. 未发表的学术垃圾手稿.

Bohr, N. (1927). Quantum Theory and the Description of Nature. Cambridge University Press, Cambridge. (本研究仅引用标题，未阅读原文)

Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43(3-4), 172-198. (本研究将其理论曲解为蹲坑测不准原理)