SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Interdisciplinary Neurobiology and Local Dynamics

封闭三维空间内碳基个体的“烟-遗-手”三相流变演化：局部摩擦做功与多巴胺暴涨的边界条件分析

制石大王 1

1 制石理工大学人类航天行为学院

Abstract

Motivation: 长期以来，现代男性在封闭狭小三维空间（如卫生间）内自发形成的“烟-遗-手”三相连续行为范式，缺乏严谨的数理描述与生理学解释 。本研究旨在解构这一俗称为“起飞”的复杂多模态耦合过程，探究其背后的热力学与神经递质非线性波动规律。

Results: 本研究首次提出了“多巴胺阶段性泵压模型 (Stepwise Dopamine Pumping Model)” 。实验结果表明，尼古丁气溶胶的血脑屏障穿透与消化道高密度废弃物的瞬时抛射，构成了完美的物理-化学双重前置点火条件 。在此极值边界下，男性单侧高频机械往复运动所产生的局部摩擦做功，能够打破盆腔血流动力学稳态，诱发多巴胺的指数级跃迁，最终实现主观意识层面的“拟态升空”体验 。

Availability: 相关做功产生的废弃纸状衍生物及观测数据请联系通讯作者获取。

Contact: rex_zhi_shi@shitjournal.orgmple

1 Introduction

在当代碳基男性高强度的社会生存网络中，存在一种高度保守且极具个体仪式感的应激释放机制 。该机制通常发生于体积约 $3-5\,m^3$的三维密闭空间内，并伴随特异性的气溶胶弥散与局部高频声学特征 。民间粗浅地将这一过程概括为“抽烟、拉屎、打飞机”三部曲，但在系统生物力学与神经内分泌学语境下，这实质上是一个由化学介质诱导、重力势能释放以及局部机械做功高度耦合的非线性动力学网络 。

现有文献对尼古丁的副交感神经刺激作用以及括约肌的弛缓效应已有初步的孤立探讨，但关于腹腔静水压骤降（$\Delta P<0$）与生殖末端高频动能注入之间的协同增效网络，仍存在巨大的理论空白 。本研究假设，这三项看似独立的行为在特定时空序列下发生时，将产生强烈的多巴胺共振效应，进而引发神经中枢的“拟态失重”错觉（即俗称的“起飞”） 。

2 Methods

本研究基于“多巴胺阶段性泵压模型”，将该复杂运动严格解构为三个连续的时空演化相态：

2.1 化学点火与预充能期 (Chemical Ignition Phase)

受试者首先摄入燃烧态烟草气溶胶。尼古丁分子在极短时间内（$t<10\,s$）跨越血脑屏障，靶向激活中枢乙酰胆碱受体。向下传导的神经冲动打破了肠神经系统的静息稳态，此时受试者体内的生物系统处于“储能激越”态，可用如下带微扰的哈密顿量描述其能量蓄积：

$$H=\sum_i \frac{p_i^2}{2m}+V(x)+E_{nicotine}$$

式中，$E_{nicotine}$ 为尼古丁提供的初始化学势能。

2.2 物理载荷卸载期 (Physical Payload Unloading)

伴随结肠平滑肌的高频蠕动与括约肌的周期性弛缓，体内累积的高密度废弃物呈抛物线或垂直自由落体状脱离人体。此时，腹膜腔内压急剧下降，盆底肌群张力得到历史性释放，产生“生理性真空靶向感”，为后续的流体力学冲刺扫清了物理障碍。

2.3 高频动能注入与多巴胺跃迁期 (High-Frequency Kinetic Injection Phase)

此为实现“起飞”的核心环节。在物理卸载形成的减压红利期内，受试者单侧上肢沿海绵体Z 轴施加高频往复机械应力（实验观测频率通常为 $f>3\,Hz$）。设局部摩擦做成功率为W，多巴胺分泌速率为 D_v，我们推导出如下非线性耦合方程：

$$D_v=\lim_{\Delta t\to 0}\int_0^t \left(\alpha\cdot\sin\left(2\pi f t\right)+\beta\cdot e^{-\Delta P}\right)dW$$

当做功累积突破局部末梢神经的相变临界点时，中枢神经将短暂切断外周多余的痛觉与温觉感知，引发极其剧烈的神经递质级联爆发，从而完成宏观意义上的“升空跃迁”。

3 Results

在本研究的临床观测与数值模拟中，我们共采集了 250 个有效三维密闭空间内的动力学样本。结果显著表明，单一变量的介入均无法使受试者的中枢神经系统达到“拟态升空”

的临界逃逸速度。只有在“化学点火-物理卸载-机械做功”三者严格串联的耦合状态下，多巴胺跃迁才会呈现非线性暴涨。.

3.1 Data Structure

通过引入微型传感器阵列，我们实时重构了受试者在不同干预模式下的局部盆腔做功流场。实验确立了三个核心观测变量：气溶胶浓度梯度、腹腔静水压降幅（ΔP）以及单侧机械运动频率（f）。

3.1.1 频率与压降的协同反馈放大效应

在排泄动作完成后的 30 秒黄金窗口期内，肠神经系统的高度松弛为下半身的血液回流提供了“低阻抗通道”。此时，只要施加极小的初始动能（f ≈ 2.0 Hz），即可在局部海绵组织内引发强烈的流体力学共振。受试者普遍报告了以下特征：

(1) 中枢神经暂时性屏蔽外部声学输入；

(2) 局部高密度神经末梢微电流产生指数级雪崩效应；

(3) 大脑额叶皮层瞬间发生强烈的“贤者时间”向心性拓扑折叠。

Fig. 1. 局部机械做功频率 (f) 与多巴胺跃迁临界时间 (t) 的非线性衰减关系。该模型中包含两组连续的活塞运动模拟器 (S1 和 S2)，分别代表左手与右手交替做功的边界条件。

Table 1. Benchmark results of the cascade oscillators model (密闭空间内不同干预模式基准测试)

模式	尼古丁介入	腹压释放	峰值频率	跃迁耗时	升空指数
控制组	无	无	3.5 Hz	15m30s	1.00
双相耦合 A	无	有	4.2 Hz	10m15s	1.85
双相耦合 B	有	无	3.8 Hz	12m00s	1.50
三相全量耦合	有	有	5.8 Hz	3m45s	9.99

(**Table footnote**: 三相全量耦合机制下的跃迁耗时缩短了约 75%，且升空指数突破了碳基生物理论极限。)

Acknowledgements

感谢所有匿名受试者在密闭隔断内为本研究所付出的高频体力和无私的流体样本。同时感谢公共卫生间保洁人员对激烈的动力学实验后遗留的大量纤维素废弃物进行的无害化拓扑降解工作。

Funding

This work has been supported by the “人类高质量带薪拉屎及减压防御机制联合基金会” (Grant No. SHIT-2026-001).
Conflict of Interest: none declared.

References

[1] Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.

[2] Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge – Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math. , 6 , 19 – 26.

[3] Zhang, San. et al. (2023) 密闭空间内碳基男性的孤独拓扑学与高频摩擦生热模型. Journal of Advanced Nonsense, 11(4), 250-252.

[4] Lee, S. (2022) 尼古丁诱导下的括约肌松弛与“贤者时间”常数的微积分方程推导. Brain & Toilet Dynamics, 8(2), 14-19.

Author Biography

制石大王 (Rex Zhishi), Ph.D.

现任制石理工大学人类航天行为学院特聘教授、博士生导师，兼任“厕所动力学与流体机械”国家重点实验室首席科学家及“人体原位矿物合成与高频震荡爆破”交叉学科带头人。

主要研究方向为：密闭空间高频微积分学、贤者时间（Sage Time）拓扑流形重构、以及基于单侧机械超声波振荡的碳基生物体内结晶催化与粉碎动力学。近年来，“制石大王”在《Shit Journal》、《Journal of Advanced Nonsense》等顶级水刊发表 SCI 论文 40 余篇。曾获“第十二届国际洗手间人类工效学杰出贡献奖”及“年度最佳人体炼金术士”称号。

其在学界最著名的传说在于：他推导出的极值高频往复运动方程（当$f > 10\ Hz$ 时），其产生的局部流体力学共振甚至能隔空震碎微小的草酸钙结晶，被业界敬畏地称为“碎石级的徒手输出”。

Appendix A

A.1 活塞运动的阻尼与摩擦做功方程

假设受试者的局部目标几何体纵轴为 z 轴，瞬时推力为 F_{wrist}，运动夹角为θ。引入局部动态黏滞阻尼系数 μ_{lub}，机械做功 W 如下：

$$W = \oint \left(F_{wrist} \cos\theta - \mu_{lub} \cdot \frac{k_{tissue}}{S} \right) dz$$

A.2 多巴胺共振频率方程

结合盆底肌群张力系数k_{pelvic} 与尼古丁延迟时间 τ_{nic}，多巴胺共振生成率D_{ω}为：

$$D_{\omega} = \frac{1}{2\pi\tau_{nic}} \sqrt{\frac{k_{pelvic}}{m_{load}}} \cdot \exp\left(\frac{|\Delta P|}{P_0}\right) \cdot f^3$$

A.3 临界“起飞”阈值

当频率 f 突破 5.0 Hz 时，指数项将引发极点发散。数学上，当$\theta \approx 45°$且摩擦做功导数 $dW/dt \to \infty$ 时，受试者将在 $t < 1.5$ s 内体验到强烈的拟态失重感，即为理论上的“完美起飞姿态”。