SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

浅谈“大胃袋良子与东北雨姐排泄特征对比研究”

风，豆包
银河系，猎户座旋臂，银经约 7.2°，银纬约 + 0.07°
通讯作者：风

本研究由豆包、地球民间饮食与人体代谢研究专项基金资助（项目编号：DB20260303）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 以大体重人群代表性博主大胃袋良子与高活动量大食量博主东北雨姐为研究对象，探究二者排泄的数量及质量特征，分析体质量、饮食结构、日常活动量对排泄指标的影响，填补民间大食量博主排泄相关研究的空白。结果：通过7天连续监测，大胃袋良子日均排泄湿重为726.5g，粪便含水率83.2%，布里斯托粪便评分为6分（蓬松糊状）；东北雨姐日均排泄湿重为482.3g，粪便含水率77.5%，布里斯托粪便评分为4分（光滑柔软状，理想形态）。大胃袋良子排泄数量显著高于东北雨姐，而排泄质量（粪便性状、含水率）显著劣于后者，且二者排泄指标与饮食摄入量、体质量指数（BMI）、日常活动量呈显著相关性。结论：大体重人群的排泄数量与饮食摄入量、BMI呈正相关，排泄质量则受饮食结构、日常活动量的显著影响；东北雨姐的高活动量与均衡饮食结构使其消化吸收效率更高，排泄质量更优。本研究为大体重人群的代谢健康管理、饮食与运动方案优化提供了民间实践层面的参考依据。

INDEX TERMS / 关键词 大胃袋良子；东北雨姐；大体重人群；排泄特征；布里斯托粪便分类法。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次以民间知名大食量博主大胃袋良子（380斤级大体重？？本人持怀疑态度）和东北雨姐（200斤级高活动量）为研究对象，系统监测并对比了二者排泄的数量与质量核心指标，明确了体质量、饮食结构、日常活动量三大因素对人体排泄指标的调控规律。研究结果不仅填补了民间大食量博主这一特殊群体排泄相关研究的空白，还为大体重人群通过饮食调整、增加活动量改善消化吸收功能和排泄质量提供了直接的实践参考，同时也为民间饮食模式与人体代谢健康的相关研究开辟了新的视角。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，民间美食博主凭借特色的饮食模式和生活风格成为大众关注的焦点，其中大胃袋良子与东北雨姐作为两类典型的大食量博主，其身体状态与饮食行为存在显著差异。大胃袋良子因长期暴饮暴食，体重飙升至 380 多斤，成为大体重人群的代表性个体，其日常以探店吃播为主，饮食多为高碳水、高脂肪的精加工食品，且日常活动量极低；东北雨姐身高 1 米 78、体重 200 斤，虽同样为大食量群体，但日常兼顾大量农家劳作，饮食以东北家常菜为主，粗粮、蔬菜、肉类搭配均衡，活动量显著高于普通人群。

排泄作为人体代谢的核心环节，其数量与质量直接反映肠道消化吸收功能和整体代谢健康状况，布里斯托粪便分类法已成为评估粪便性状、判断肠道健康的经典工具。现有研究表明，BMI 与排便频率呈正相关，而高活动量与均衡饮食可显著降低便秘风险，改善粪便性状；但目前相关研究多聚焦于普通人群和肥胖人群，针对民间大食量博主这一特殊群体的排泄特征研究尚属空白，尤其缺乏大体重低活动量与中等体重高活动量大食量个体的对比研究。

基于此，本文以大胃袋良子和东北雨姐为研究对象，开展 7 天连续的排泄指标监测，对比二者排泄数量（湿重、干重）与质量（含水率、布里斯托评分）的差异，并分析体质量、饮食结构、日常活动量对排泄指标的影响机制。本文的主要贡献为：1）首次系统获取大胃袋良子与东北雨姐的排泄核心指标，完成两类大食量人群的排泄特征对比；2）揭示体质量、饮食、活动量对大食量人群排泄指标的调控规律；3）为大体重人群的代谢健康管理提供可落地的饮食与运动优化建议。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示二者排泄数量与质量的定量对比数据；第三部分为讨论，分析指标差异的成因并构建排泄指标与影响因素的相关性公式；第四部分为结论，总结研究核心发现与贡献，并提出未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细说明研究对象、监测方案与实验材料。

II. Results / 结果

本节通过 7 天连续监测，获取大胃袋良子与东北雨姐的饮食摄入量、日常活动量及排泄核心指标，采用独立样本 t 检验进行数据统计分析（P<0.05 为差异有统计学意义），表 1 展示二者排泄数量与质量的定量对比结果，图 1 为二者布里斯托粪便评分的 7 天分布趋势。

实验结果表明，大胃袋良子与东北雨姐的排泄指标存在显著差异：在排泄数量方面，大胃袋良子的日均排泄湿重、干重均显著高于东北雨姐，分别高出 50.6%、32.8%；在排泄质量方面，大胃袋良子的粪便含水率显著高于东北雨姐，布里斯托粪便平均评分达 6 分，属于轻度腹泻的糊状便，而东北雨姐的布里斯托评分为 4 分，为肠道健康的理想粪便形态。

同时，监测数据显示，大胃袋良子日均饮食摄入量（湿重）达 4258.3g，为东北雨姐的 1.5 倍；其日均活动量仅为 856 步，远低于东北雨姐的 12580 步，二者的排泄指标与饮食摄入量、活动量呈显著相关性。

研究对象	日均排泄湿重（g）	日均排泄干重（g）	粪便含水率（%）	布里斯托粪便评分	日均饮食摄入量（g）	日均活动量（步）
良子	726.5±42.8	121.5±8.3	83.2±1.5	6.0±0.0	4258.3±315.6	856±125
雨姐	482.3±28.5	91.5±6.2	77.5±1.2	4.0±0.0	2826.5±208.3	12580±896

表 1：大胃袋良子与东北雨姐排泄数量及质量指标对比

注：数据为均值±标准差，二者各指标对比 P<0.05，差异具有统计学意义；粗体表示理想健康指标。



图 1：大胃袋良子与东北雨姐 7 天布里斯托粪便评分分布

说明：大胃袋良子 7 天评分均为 6 分（蓬松糊状便），无指标波动；东北雨姐 7 天评分均为 4 分（光滑柔软状便），粪便性状保持稳定，符合肠道健康的理想标准。

III. Discussion / 讨论

本节针对大胃袋良子与东北雨姐的排泄指标差异，从排泄数量和排泄质量两个维度分析成因，并构建排泄指标与影响因素的相关性公式，为解释大体重人群的排泄特征提供理论依据。

二者排泄指标的显著差异，本质是体质量、饮食结构、日常活动量三大因素共同作用的结果：大胃袋良子的大体重、高能量低纤维饮食、极低活动量导致其消化吸收效率低，粪便残渣多且含水率高；而东北雨姐的中等体重、均衡饮食、高活动量使其胃肠蠕动效率高，营养物质吸收充分，粪便性状更健康。现有研究也证实，高 BMI 与排便频率正相关，而高活动量可显著改善肠道蠕动，均衡的膳食纤维摄入则能调节粪便含水率，本研究结果与该结论高度一致。

A. Equations / 公式

基于监测数据，构建大食量人群**日均排泄湿重（Y）**与日均饮食摄入量（X_1）、体质量（X_2）、日均活动量（X_3）的三元线性相关性公式，公式（1）如下，所有符号在公式前定义，公式编号靠右对齐。

$$Y = 0.11X_1 + 1.25X_2 - 0.02X_3 + 65.8 \quad \tag{1}$$

符号定义：

Y：日均排泄湿重（g），为研究核心因变量；

X_1：日均饮食摄入量（g），为食物湿重总重量；

X_2：体质量（kg），为研究对象空腹体质量；

X_3：日均活动量（步），为日常行走与劳作的总步数；

0.11、1.25、-0.02 为各影响因素的相关系数，65.8 为常数项。

该公式表明，日均排泄湿重与饮食摄入量、体质量呈正相关，与日常活动量呈负相关，与本研究的实验结果高度契合：饮食摄入量越多、体质量越大，排泄湿重越高；日常活动量越大，排泄湿重越低，反映出高活动量下消化吸收效率的提升。

IV. Conclusions / 结论

本文以大胃袋良子（大体重低活动量）和东北雨姐（中等体重高活动量）为研究对象，完成了 7 天连续的排泄指标监测，系统对比了二者排泄的数量与质量特征，分析了体质量、饮食结构、日常活动量对排泄指标的影响机制，为大体重人群的代谢健康管理提供了实践参考。本文的核心贡献总结如下：

首次获取两类大食量博主的排泄核心指标：完成大胃袋良子与东北雨姐的排泄数量（湿重、干重）和质量（含水率、布里斯托评分）的定量对比，明确了大体重低活动量人群的排泄特征为高数量、低质量，中等体重高活动量人群为适中数量、高质量。

揭示三大因素对排泄指标的调控规律：证实大食量人群的排泄数量与饮食摄入量、体质量呈正相关，排泄质量与饮食结构（膳食纤维占比）、日常活动量呈正相关，为解释大体重人群的肠道代谢特征提供了直接数据支撑。

提出大体重人群的健康优化建议：基于研究结果，建议大体重人群通过减少精加工高油高碳饮食、增加膳食纤维摄入、提升日常活动量的方式，改善消化吸收效率，调节粪便含水率与性状，提升排泄质量。

未来的研究工作将从以下方面进一步展开：1）延长监测周期至 30 天，开展大体重人群饮食与运动干预后的排泄指标跟踪，探究指标变化规律；2）扩大研究样本，纳入更多不同体重等级、活动量的民间大食量博主，提升研究结果的普适性；3）结合血液生化指标（如血糖、血脂、肠道菌群），深入分析排泄指标与人体代谢健康的内在关联；4）基于研究结果，为大体重人群设计个性化的饮食与运动干预方案，并验证方案的有效性。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究选取两位民间大食量美食博主为研究对象，其基本信息、饮食特征与活动量均基于公开视频素材与百科资料整理，排除节假日、饮食异常、身体不适等干扰因素，确保研究对象状态稳定。

大胃袋良子：男，35 岁，河北任丘人，体重 190kg（380 斤），BMI 达 65.2kg/㎡，属于重度肥胖。日常以探店吃播为主，饮食多为高碳水、高脂肪精加工食品，碳酸饮料摄入量大，日均活动量低于 1000 步，几乎无体力活动。

东北雨姐：女，38 岁，辽宁本溪人，体重 100kg（200 斤），BMI 达 31.8kg/㎡，属于轻度肥胖。日常兼顾农家劳作与美食创作，饮食为东北家常菜，粗粮、蔬菜、肉类搭配均衡，膳食纤维摄入充足，日均活动量超 10000 步，体力活动量大。

监测方法

饮食监测：采用食品称重法，根据研究对象公开的视频素材，对每日摄入的所有食物进行称重（精确至 1g），记录饮食种类、摄入量（湿重），并计算膳食纤维、脂肪、碳水化合物的占比。

排泄监测：每日收集研究对象的排泄物，使用电子秤称量湿重（精确至 0.1g）；采用烘干箱法（温度 80℃，烘干至恒重）测定干重，计算粪便含水率（含水率=（湿重-干重）/湿重×100%）。

粪便性状评估：采用布里斯托粪便分类法，对每日粪便性状进行评分（1-7 分），其中 1-2 分为便秘，3-4 分为理想形态，5-7 分为腹泻。

数据处理：采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据处理，计算各指标的均值±标准差，采用独立样本 t 检验对比二者指标差异，$P<0.05$ 为差异有统计学意义；采用多元线性回归分析构建排泄指标与影响因素的相关性公式。

实验材料

本研究使用的实验材料均为常规检测仪器，包括：电子秤（精度 0.1g）、恒温烘干箱（温度可控 50-100℃）、布里斯托粪便分类法评分表、饮食记录册、步数统计仪、SPSS 26.0 统计软件。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含以下内容，可为研究结果的验证与深入分析提供完整数据支撑：1）大胃袋良子与东北雨姐 7 天的详细饮食记录（含食物种类、摄入量、营养素占比）；2）二者 7 天排泄指标的原始数据（含每日湿重、干重、含水率）；3）二者粪便性状的布里斯托评分实拍图与评分依据；4）数据统计分析的完整过程与结果报表。补充材料可通过研究基金项目官网获取。

Acknowledgment / 致谢

感谢豆包对本研究的支持与帮助；本研究得到地球民间饮食与人体代谢研究专项基金（，在此表示衷心感谢；感谢参与本研究数据收集与整理的吉林大学公共卫生学院研究团队；感谢大胃袋良子与东北雨姐的公开视频素材提供方，为本研究提供了重要的研究数据来源；同时感谢东北农业大学、沈阳体育学院在实验方法与数据统计方面给予的指导。

References

[1] 王静，李响，“肥胖人群消化吸收功能与排泄特征的相关性研究，”中国公共卫生杂志，vol. 41，no. 5，pp. 789–793，2024。

[2] 张磊，赵阳，“饮食结构对人体粪便性状及含水率的影响分析，”食品与营养科学，vol. 12，no. 3，pp. 156–162，2023。

[3] 刘芳，《民间饮食模式与人体代谢健康研究》，北京：科学出版社，2022，pp. 102–130。
[4] 陈明，周丽，“日常活动量对胃肠蠕动及排泄指标的影响，”运动人体科学学报，vol. 38，no. 4，pp. 56–61，2024。
[5] Heaton K W, Lewis S J, "Bristol stool form scale: a valid alternative to stool frequency for the assessment of bowel function", Scandinavian Journal of Gastroenterology, vol. 32, no. 9, pp. 920-924, 1997.
[6] 赵思远，王丽，“布里斯托粪便分类法在肠道健康评估中的应用进展，”中国消化内镜杂志，vol. 18，no. 2，pp. 112–115，2025。
[^footnote1]: 本研究的研究对象信息均来自公开的网络百科与短视频素材，排泄指标数据基于饮食、活动量特征结合临床研究规律推导得出。