SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于流体力学与肛肠动力学的医学 SCI 写作者直肠压力模型：论“憋屎”对科研灵感的非线性驱动作用及脑电图特征分析

憋不住 [1]，拉裤里 [2]，写不出 [3,*]

[1] 应用排泄物大学，胃肠道动力与学术拖延联合实验室，贵州，中国
[2] 深夜急救与重症监护数据中心，安徽，中国
[3] 国家重点括约肌耐受力与神经传导 基础研究中心，北京，中国
通讯作者：写不出：ykcnsdys@163.com
本研究由国家重点学术拖延与 deadline 应激干预基金（资助号：No. SHIT-2026-996）及肠胃动力与核心期刊发表联合专项（资助号：No. PoP-007）赞助

ABSTRACT / 摘要 **背景：** 在“不发表即灭亡”的学术极度内卷环境下，撰写医学 SCI 论文（尤其是要求高度逻辑思辨的 Discussion 部分）给科研人员带来了巨大的认知负荷 。坊间长期流传“排泄冲动驱动科研灵感”的假说，但其背后的流体力学、神经解剖学及血流动力学机制一直缺乏严谨的定量研究 。**方法：** 本研究采用前瞻性、单盲观察性队列设计，纳入 30 名正处于 SCI 论文 Revision（返修）阶段且濒临 Deadline 的医学科研人员 。通过实施“标准化粪便加载方案（SFLP）”诱发可控的排泄压力 。研究采用高分辨率肛肠测压仪（HRM）、64 导联脑电图（EEG）与自然语言处理（NLP）算法，同步量化评估受试者的直肠壶腹压力（P_r）、前额叶 Gamma 波活动及文本产出质量（WPM 与学术词汇复杂度） 。此外，基于纳维-斯托克斯方程构建了直肠压力与认知算力的偏微分数学模型 。**结果：** 研究证实，直肠压力与学术产出效率呈现极其典型的非线性倒 U 型动力学关系，完美契合耶克斯-多德森定律 。当 P_r达到 45-65 mmHg 的“最佳憋屎区间（The Eureka Zone）”时，发生显著的血流代偿性重定向，前额叶皮层 Gamma 波功率密度激增 412%，打字速度达到峰值（84.3 ± 12.1 字/分钟），且高阶学术转折词的使用频率显著提升 。专科异质性分析显示，外科医生群体的括约肌失代偿极限（98.3 ± 8.4 mmHg）显著高于内科及基础医学群体 。当P_r > 80 mmHg 时，进入“括约肌失代偿期”，受试者交感神经系统转化为惊恐发作，认知功能全面崩溃，文本输入退化为大量无意识乱码 。**结论：** 本研究首次确立了“排泄冲动”作为一种新型、内源性且零成本的认知增强剂的物理与解剖学基础 。我们不仅系统阐明了“排泄-认知代偿机制（ECCM）”，还为处于高压下的科研人员量身定制了量化的“战术性憋屎（Strategic Retention Protocol, SRP）”临床操作指南，为对抗科研倦怠提供了革命性的生理学策略 。
INDEX TERMS / 关键词 排泄-认知代偿机制，高分辨率肛肠测压，耶克斯-多德森定律，脑血流动力学，自然语言处理，学术内卷

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次在生物物理学与血流动力学交叉层面，揭示了极端躯体压力对人类高级逻辑认知功能的非线性驱动作用。我们建立的“排泄-认知代偿机制（ECCM）”彻底颠覆了传统的慢性脑肠轴理论，确立了盆底肌群等长收缩作为一种“内源性、零成本、超短效认知增强剂”的解剖学地位。在“不发表即灭亡”的全球学术内卷环境中，该机制的发现不仅为克服科研人员的“写作卡壳（Writer's block）”提供了革命性的物理干预策略，更从进化生物学视角，对现代智人如何利用古老的括约肌生存智慧对抗现代学术应激，进行了极其深刻的重构。

I. INTRODUCTION / 引言

撰写高质量的医学学术论文是当代科研工作者的核心痛点。面对审稿人（尤其是 Reviewer 2）的严苛质询，作者往往需要极高的脑力消耗与逻辑重构能力。长期以来，学术界私下流传着一种经验性观察：许多突破性的学术灵感、精妙的实验解释以及完美的从句结构，往往诞生于“急需如厕但因沉迷写作而被迫憋着”的极端生理状态下。

历史上，胃肠道状态与大脑认知功能的关联（即“脑肠轴”，Gut-Brain Axis）已得到广泛证实，但大多数

研究集中于肠道菌群与抑郁症的慢病理联系。我们假设，在急性期，存在一种更为直接的物理-神经反馈回路——排泄-认知代偿机制（Excretory-Cognitive Compensation Mechanism, ECCM）。

当直肠壶腹部被代谢废弃物高度充盈时，盆底肌群（尤其是耻骨直肠肌、肛提肌和肛门外括约肌）的高强度等长收缩会导致腹腔内压（Intra-abdominal pressure, IAP）急剧升高。这一类似于瓦尔萨尔瓦动作（Valsalva maneuver）的持续性物理压迫，会增加下腔静脉回流阻力，从而将富含氧气的动脉血流“挤压”并强制重定向至大脑前额叶皮层。同时，会阴部极度的膨胀感会高度激活交感神经系统，诱发“战斗或逃跑（Fight-or-Flight）”反应，迫使大脑以前所未有的算力处理眼前的学术难题，以求尽快结束工作前往洗手间。本研究旨在通过多模态生理监测，建立量化的数学流体力学模型，彻底揭开这一科研玄学的神秘面纱。

II. Results / 结果

2.1 人口统计学特征与直肠压力基线的专科异质性

本研究成功获取了 30 名受试者在 120 小时观测期内的完整生理与行为学映射数据。通过高分辨率肛肠测压（HRM）技术，我们确立了处于重度学术压力下受试者的直肠静息压基线。数据显示，不同科室的科研人员在面对极端直肠压力时展现出了高度异质性的生理耐受力（见表 1）。

表 1：不同科室科研人员括约肌耐受力与脑血流动力学多因素比较

指标	外科 (n=10)	内科 (n=10)	基础医学 (n=10)	F 值	p 值
基线直肠压 (mmHg)	12.4±2.1	11.8±1.9	13.1±2.5	1.12	0.341
灵感爆发阈值 (mmHg)	55.0±5.2	48.2±4.1	42.5±3.8	6.45	0.006
失代偿极限 (mmHg)	98.3±8.4	75.1±6.2	68.4±5.0	15.24	< 0.001
峰值 MCAv (cm/s)	88.5±4.2	82.1±5.1	79.4±4.8	4.88	0.015

注：采用单因素方差分析（ANOVA）比较组间差异。外科医生群体的失代偿极限显著高于其他群体，根据盆底生物力学原理，这种器质性耐受力可能归因于外科群体在长达十数小时连台手术中被动进行的隐性盆底肌高强度等长收缩训练。

2.2 脑血流动力学与学术产出效率的“非线性倒 U 型动力学关系

在“标准化粪便加载方案”后，学术产出效率（WPM）随直肠压力（P_r）变化呈现三个极其典型的病理生理阶段。数据拟合曲线完美印证了我们的偏微分方程模型（见图 1）。



图 1：直肠压力（P_r）与键盘敲击频率（WPM）的流体力学散点拟合曲线。 横轴为直肠压力（mmHg），纵轴为打字速度（WPM）。灰色阴影区域标示$P_r \in [45,65]$mmHg 的“最佳憋屎区间（The Eureka Zone）”。曲线在达到峰值后迅速断崖式跌落，提示括约肌失代偿期的到来。

2.3 多模态神经电生理耦合分析

为了探究“The Eureka Zone”背后的神经机制，我们同步记录了受试者的经颅多普勒超声（TCD）与 64 导联脑电图（EEG）（见图 2）。



图 2：排泄-认知代偿机制（ECCM）的多模态生理验证。 (A) 脑中动脉血流速度（MCAv）随腹腔内压（IAP）升高的代偿性激增轨迹；(B) 前额叶皮层（PFC）脑电图地形图分析。在直肠压力达到 60 mmHg 时，负责高级逻辑推理的额极区（Fp1, Fp2）Gamma 频段（30-100 Hz）功率谱密度呈现强烈的深红色激活状态，较基线激增 412%。

2.4 文本生成质量的自然语言处理（NLP）无监督聚类分析

认知状态的改变直接投射在文本生成质量上。我们利用无监督机器学习算法对生成的 Discussion 部分进行了词法和句法提取，发现肠道充盈度直接决定了学术文章的攻击性与严密性（见表 2）。

表 2：基于 NLP 算法的文本生成质量与学术复杂度的动力学特征分析

直肠压力阶段	极值压力区间 (Pr)	键盘敲击频率 (WPM)	文本平均句长 (Words)	高阶学术转折词使用频率 (次/分钟)	拼写及句法错误率
低压拖延期	< 25 mmHg	18.5 ± 5.2	12.4 ± 3.1	1.2 ± 0.5	2.10%
灵感井喷期	45 - 65 mmHg	84.3 ± 12.1	26.8 ± 4.5	8.5 ± 1.1	0.50%
括约肌失代偿期	> 80 mmHg	12.4 ± 8.8	1.5 ± 0.8*	0.2 ± 0.4**	> 95.0%

注：高阶学术转折词包括 "Paradoxically", "Interestingly", "To our best knowledge" 等。在失代偿期（> 80 mmHg），受试者由于交感神经极度兴奋转化为惊恐发作，打字错误率呈指数级上升，出现了大量如 "asdfghj"、"help" 等无意识按键，导致 NLP 算法无法有效分割句子成分（标识为无法计算）。

III. Discussion / 讨论

本研究是一项具有里程碑意义的跨学科探索。我们首次通过严谨的流体力学与神经电生理多模态分析，证实了医学科研界长期流传的都市传说：“憋尿”不仅是一种躯体行为，更是一种强效、急性且内源性的认知增强剂。

3.1 突破耶克斯-多德森定律的“排泄-认知倒 U 型曲线”

一个世纪前，Yerkes 和 Dodson 提出了经典的倒 U 型曲线（Yerkes-Dodson Law），阐明了适度压力能够提升认知表现，而极端压力会导致表现崩溃[1]。本研究建立的直肠压力模型（见图 2），正是该定律在现代学术高压环境下的物理具象化。适度的直肠膨胀（45-65 mmHg）作为一种强烈的躯体唤醒源，恰到好处地将受试者的神经警觉水平推向了倒 U 型曲线的顶点。与传统的依赖长期微生物群落调节的“脑肠轴（Gut-Brain Axis）”机制不同[2]，本研究提出的是一种超短时程的物理-血流动力学反馈回路，为神经科学补充了极其重要的一环。

3.2 盆底生物力学对前额叶皮层的“血流劫持”

在机制探讨上，盆底肌群（尤其是耻骨直肠肌和肛门外括约肌）的高强度等长收缩在此过程中扮演了“第二心脏”的角色。这与妇产科及泌尿外科领域中著名的盆底肌康复训练（如 Kegel 运动）具有异曲同工之妙[3]，但科研人员将其在无意识中应用于学术生产。我们推测，持续的腹压升高迫使本应流向内脏的血液进行再分布，通过代偿机制优先保障大脑前额叶的氧供，从而在生理层面上“劫持”了机体的血流动力学网络，为撰写高分 SCI 论文所需的极高算力提供了物质基础[4]。

3.3 进化心理学与学术内卷的共振

从进化生物学的宏观视角来看，当人类祖先处于急需排泄但周围有捕食者环伺的危险环境中时，大脑必须瞬间爆发出极强的空间规划与危机处理能力，以寻找安全的藏身之所。在“不发表即灭亡（Publish or Perish）”的现代学术生态圈中[5]，审稿人的拒稿威胁完美替代了远古的剑齿虎。面临 Deadline 的科研工作者，其直肠末端的压迫感与对学术生涯终结的恐惧感交织在一起，重新唤醒了古老基因中的终极生存智慧，并将其全部倾注于论文的 Discussion 中[6]。

3.4 临床指南与“战术性憋尿”协议

基于上述坚实的生理学证据，我们正式提出旨在提升学术产出的战术性憋尿（Strategic Retention Protocol, SRP）”指南：

在进行文献检索、数据清洗等低认知负荷工作时，应保持括约肌松弛，顺应自然规律。

当面临文章最难攻克的段落（如解释阴性结果、回复 Reviewer 2 的恶意提问）时，作者应主动摄入冰美式咖啡等促动力饮品，并在便意来袭时，有意识地将如厕时间推迟 15 至 25 分钟。

警告： 必须在直肠压力突破个体失代偿阈值（约 75 mmHg）前中止协议。长时间越界操作不仅会导致科研思路清零，更可能引发不可逆转的物理灾难（即社会性死亡）。

3.5 局限性与未来展望

本研究的局限性在于未能评估长期高频次触发该机制对肛肠局部微循环的慢性损害（如痔疮病发率的上升）。未来，本实验室计划研发一种带有触觉反馈的智能办公椅，通过在坐垫上集成电刺激模块，无创模拟直肠膨胀的力学信号，从而在保护中国科研人员肛门健康的前提下，源源不断地压榨出诺贝尔奖级别的科学灵感。

IV. Conclusions / 结论

本研究不仅为“排泄压力驱动科研灵感”这一都市传说提供了极其坚实的流体力学与神经电生理学证据，更是首次通过纳维-斯托克斯偏微分方程精准定义了“排泄-认知代偿机制（ECCM）”。适度且战术性地提升直肠壶腹部压力，是缓解科研人员“写作卡壳”与对抗学术内卷的有效内源性手段。我们呼吁各大科研机构在评估学术绩效时，应充分考虑并尊重科研人员的括约肌耐受极限。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 受试者队列与伦理声明

本实验经由“人类极端排泄与学术行为伦理审查委员会”批准（批准号：IRB-SHIT-2026-001）。共招募 30

名医学背景受试者（涵盖外科、内科及基础医学各 10 人），年龄 25-45 岁。

纳入标准： 正在撰写影响因子（IF）> 5 的 SCI 论文；面临距离 Deadline 不足 72 小时的极端压力。

排除标准： 患有慢性便秘、严重痔疮脱出、肠易激综合征（IBS）、或在过去一年内有过实验室/办公室失禁史者。

5.2 实验流程与标准化干预

受试者在空腹 12 小时后进入恒温（22°C）、隔音的独立实验室。为了统一肠道内容物的物理性状与流体力学特征，我们设计了“标准化粪便加载方案（Standardized Fecal Loading Protocol, SFLP）”：所有受试者需在 30 分钟内摄入 500ml 冰美式浓缩咖啡、300g 高膳食纤维墨西哥爆辣豆卷以及 200ml 全脂牛奶（以诱发轻度乳糖不耐受加速肠蠕动）。

随后，受试者被固定在配备有嵌入式坐垫压力传感器的特制人体工学椅上开始撰写/修改论文。

5.3 多模态生理与行为监测

1. 高分辨率肛肠测压（HRM）： 置入水灌注式多导联测压导管，连续记录直肠静息压（P_r）、肛管最大挤压压及括约肌疲劳指数（单位：mmHg）。

2. 64 导联脑电图（EEG）： 实时监测额极区（Fp1, Fp2）的脑电活动，重点提取与高度集中注意力和灵感相关的 Gamma 频段（30-100 Hz）功率谱密度。

3. 认知产出量化： 通过后台安装的键盘击键记录仪与自然语言处理（NLP）算法，实时计算每分钟录入单词数（WPM）、退格频率，以及学术词汇复杂度（基于 Flesch-Kincaid 阅读级别评分）。

5.4 数学物理建模

基于纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes equations）与大脑中动脉血流动力学，我们构建了直肠压力P_r与认知算力指数C_i的偏微分方程模型。该模型首次将盆底生物力学与心理学恐惧因子进行了数学耦合：

$$C_i = \int_0^t \left[\mu\nabla^2(\alpha \ln(1+P_r)) - \frac{\partial(\beta e^{\gamma P_r})}{\partial t} + \lambda\Phi(\mathrm{Fear}_{soil}) \right] dt$$

公式参数释义如下：

$\mu\nabla^2(\alpha \ln(1+P_r))$：为正向灵感驱动项。其中 α为盆底括约肌等长收缩产生的向上的血流增益系数，代表物理压迫对前额叶皮层供氧的对数级正向刺激。

$\frac{\partial(\beta e^{\gamma P_r})}{\partial t}$：为剧痛与注意力涣散项。代表随着时间 t 推移，直肠平滑肌痉挛所引发的阵发性疼痛随直肠压力的指数级恶化速率。

$\lambda\Phi(\mathrm{Fear}_{soil})$：为核心心理学突变常数。代表受试者对于“拉在裤子上导致不可逆社会性死亡（Social Death）”的恐惧驱动力。当P_r逼近括约肌失代偿临界值时，该项权重将呈几何级数放大，接管并彻底摧毁原有的认知算力。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

由于受试者在“括约肌失代偿期”产生的神经电生理数据与键盘乱码极具社会性破坏力，为保护受试者的个人隐私与学术尊严，原始数据（尤其是带有气味的 HRM 测压录像）将不予公开。合理的数据请求可在签署严格的保密协议（及放弃嗅觉索赔声明）后向通讯作者索取。所有作者均声明不存在直接与本研究相关的财务冲突。然而，为了公开透明，第一作者（憋不住）声明其持有某国际知名成人纸尿裤制造企业的少量股票（< 5%）；通讯作者（写不出）是高膳食纤维墨西哥爆辣豆卷（拉裤里）的狂热爱好者，但这并未对研究数据的客观性产生任何影响。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者谨向应用排泄物大学深夜仍在辛勤工作的保洁团队致以最崇高的敬意，感谢他们在多名受试者突破“失代偿极限”后提供的紧急人道主义救援与场地消杀服务。此外，特别感谢多名匿名审稿人在前期拒稿信中那些充满攻击性与侮辱性的评语，是您那不留情面的质疑，为本研究的所有受试者提供了最原始的交感神经唤醒动力。

REFERENCES

[1] 1. Shi H, Li L, Huang L, Xia W, Zhu M, Zhao Y: High-Resolution Anorectal Manometry and Balloon Expulsion Test Outcomes in Functional Constipation: A Comparative Study. Med Sci Monit 2024, 30:e944599.

[2] 2. Tang YF, Chen JG, An HJ, Jin P, Yang L, Dai ZF, Huang LM, Yu JW, Yang XY, Fan RY, et al: High-resolution anorectal manometry in newborns: normative values and diagnostic utility in Hirschsprung disease. Neurogastroenterol Motil 2014, 26:1565-1572.

[3] 3. Pinet S, Ziegler JC, Alario FX: Typing is writing: Linguistic properties modulate typing execution. Psychon Bull Rev 2016, 23:1898-1906.

[4] 4. Dickerson SS, Kemeny ME: Acute stressors and cortisol responses: a theoretical integration and synthesis of laboratory research. Psychol Bull 2004, 130:355-391.

[5] 5. Noelting J, Ratuapli SK, Bharucha AE, Harvey DM, Ravi K, Zinsmeister AR: Normal values for high-resolution anorectal manometry in healthy women: effects of age and significance of rectoanal gradient. The American journal of gastroenterology 2012, 107:1530-1536.

[6] 6. Dimitriu A, Saizu R, Oancea D, Gheorghe C: Normal Values of High Resolution Anorectal Manometry in 132 Romanian Healthy People. Journal of gastrointestinal and liver diseases : JGLD 2023, 32:473-478.