SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论如何用基凶肉辨别华北地区豪帽与键帽的理论关系与非量化指导

**哈基米德** [1]
哈基米南北路多研究院北路分院
e-mail: 3508105520@qq.com
本研究由哈基米基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要**
结果：简要总结研究的结果和发现。结论：对研究结果给出简短的总结性评述。
目的：随着赛博哈基米文化的发展与兴起，越来越多哈基米进入到大众视野，在饲养哈基米的过程中，经常会出现哈基米哈气、伤人的状况，因此为了令广大饲养员或者哈基米接触者避免或减少收到键帽的伤害，本文旨在研究家养猫科动物中，基凶肉（俗称嘴奴子）是否可以作为区分豪帽与键帽的重要决定性因素或者影响因素之一，以及如何通过基凶肉来判断豪帽与键帽，同时还涉及到豪帽与键帽的定义。
结果：本研究调查了山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津，以华北平原和淮海平原为主的地区的 28 只哈基米，平均每个地区四只作为调研报告，结果发现基凶肉并不能作为豪帽与键帽的评判标准，但基凶肉对豪帽和键帽具有一定的影响因素。
结论：基凶肉会对豪帽与键帽有一定的影响，但无明确的判断关系与量化标准。

**INDEX TERMS / 关键词**哈基米，基凶肉，临哈值，猫，普查调研。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概括本文报告的研究工作的主要发现。

## I. INTRODUCTION / 引言

在赛博哈基米文化的发展中，越来越多人表现出对哈基米的喜爱，网络上爱猫人士层出不穷 ，同样的，不论是许多出与热心想要去喂养流浪哈基米的爱心人士还是家中已经饲养过许多哈基米的正式饲养员，哈基米哈气伤人事件屡见不鲜。

因此，为了让广大人民群众多多接触那些不哈气不伤人的豪帽、远离那些哈气伤人的键帽，我采取了线下社会调研以及互联网评论区筛查的办法，得出人们最关注的哈基米的部位排除哈基米必吃榜，第一位是基凶肉（嘴奴子）、第二位是基腿肉（咪大腿）。

所以项目组将必吃榜榜首的基凶肉作为调查对象，研究基凶肉是否可以作为判断豪帽与键帽的评判标准，如果能，是否存在某种量化关系；如果不能，是否存在某种影响可以作为非量化指导。

本文出自哈基米南北路多研究院北路分院，如需寻找华南地区哈基米相关研究请转哈基米南北路多研究院南路分院。

## II. RESULTS / 概要

本研究辗转山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津七个地区，在每个地区随即选取四只哈基米，两只家养两只流浪，共计 28 只哈基米。

选取的哈基米均为身体健康、无重大疾病，未绝育且生长发育状况相似。

本实验由于特殊性，以耄耋作为标准对照，同时不同组别进行相互对照。

我们以耄耋的《王从天降，愤怒狰狞》这一经典图片作为对照，可以发现耄耋是有嘴奴子的，以临哈值、技能连招作为量化评判指标，对 28 只哈基米进行定性分析

我们已知作为标准对照组，通过哈基米德控制变量法，根据猫咪哈气方程

$$\frac{H = k \cdot \left(SU\sqrt{L}\right)(1 + C)}{AF^2}$$

变量说明：

H：临哈值，临哈值越高哈气的可能性越高。（保留四位有效数字）（0-1）

S：陌生度，哈基米对环境或者物体的陌生程度。（0-1）

U：突然性，刺激出现的突然程度。（0-1）

L：光照变化率，光照变化的幅度。（0-1）

C：封闭感：空间是否狭窄或无法逃脱。（0-1）

A：舒适度，哈基米是否感到舒适。（≥1）

F：安全感，主人是否在周围。（≥1）

k：哈气常数，哈基米胆子越小哈气常数越大。

因此根据以上数据计算，我们得出耄耋的临哈值 H 为 1.000，是极高临哈值，随时随地都会哈气，临哈值越高，是键帽的可能性越大，反之越小。

技能连招是指猫咪在哈气时是否存在进攻性行为还是仅仅只是哈气，根据哈基米德相似法，耄耋的技能连招是三哈一强普，如果哈基米与耄耋的技能相似度越高，那么是键帽的可能性越大，反之越小。

## III. Discussion / 过程

在本实验中我们通过哈基米德控制变量法，对山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津七个地区的哈基米进行实验，流浪哈基米与家养哈基米各选取一只有嘴奴子，一只无嘴奴子。

分别计算以上 28 组哈基米的临哈值和技能连招，实验过程如下所述：

首先将哈基米分为

山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津无嘴奴子家养哈基米

山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津无嘴奴子流浪哈基米

山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津有嘴奴子家养哈基米

山东、北京、河南、安徽、河北、江苏、天津有嘴奴子流浪哈基米

四大组，四大组下各个地区分为七小组，共计 28 组，对每组哈基米在控制封闭感、光照变化率、舒适度、安全感的情况下，通过陌生度和突然性来检测分析哈基米的临哈值反馈，同时在哈气出现后观察哈气几次会出现强普行为，作为技能连招的判定。

对于临哈值，我们得出以下数据：




| | 北京 | 天津 | 山东 | 河南 | 河北 | 安徽 | 江苏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家养哈基米有嘴奴子 | 0.6213 | 0.6345 | 0.5439 | 0.5461 | 0.5532 | 0.4939 | 0.4963 |
| 家养哈基米无嘴奴子 | 0.6631 | 0.6465 | 0.5332 | 0.5631 | 0.5582 | 0.5069 | 0.5051 |
| 流浪哈基米有嘴奴子 | 0.8848 | 0.8762 | 0.8463 | 0.8464 | 0.8572 | 0.7993 | 0.8009 |
| 流浪哈基米无嘴奴子 | 0.9178 | 0.9191 | 0.8964 | 0.8848 | 0.9001 | 0.8542 | 0.852 |

附图 1：地区猫咪嘴奴子有无以及是否流浪的临哈值一览表

同时对于连招判定，我们得出以下数据：




| | 北京 | 天津 | 山东 | 河南 | 河北 | 安徽 | 江苏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家养哈基米有嘴奴子 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家养哈基米无嘴奴子 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流浪哈基米有嘴奴子 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 流浪哈基米无嘴奴子 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |

附图 2：地区猫咪嘴奴子有无以及是否流浪的连招一览表（表 x 哈一强普）

## IV. Conclusions / 结论

由上文数据可见家养哈基米的临哈值要比流浪哈基米德临哈值低 25%，同时，哈基米有无基凶肉的临哈值相差不大，在地区方面由南向北临哈值逐渐增高。

在连招方面，我们发现家养哈基米大多数都是只哈气无强普，仅有天津北京哈基米存在哈气十次或九次进行一次强普，对于流浪哈基米来说强普前哈气次数明显降低，北京天津的哈基米甚至达到了小于七次哈气就存在一次强普，极端情况的天津流浪哈基米无嘴奴子，更是四次哈气就存在一次强普，与耄耋拟合程度极为相似。

因此本项目初步断定基凶肉并不能作为豪帽与键帽的评判标准，但是随着实地调研我们发现，有嘴奴子的哈基米更容易被人接受和喜爱，因此临哈值要普遍略低于无嘴奴子的哈基米。

所以我们得出第二步结论，随着人为干扰，有嘴奴子的键帽有向豪帽演化的趋势。

有此可见，南方哈基米无论有无基凶肉，豪帽程度都要高于键帽，受伤程度也要小于北方。所以我们建议广

大热心人士或者哈基米接触者尽量选取苏鲁豫皖地区的家养哈基米进行挑逗或喂养，尽量避免北京天津河北地区的流浪无嘴奴子哈基米，被哈气是一方面，随着强普的到来受伤概也会大幅度增加。

## V. Materials and Methods /材料与方法

本文严肃按照实验标准运用哈基米德控制变量法与哈基米德对照法。

## Supplementary Materials / 补充材料

补充材料：本文在实验和调研过程中没有一只哈基米受到伤害。哈基米德不是略猫区。

## Acknowledgment / 致谢

感谢过年期间各个地区的亲戚让我有了去各个地方撸猫的机会，借以做此次调研。同时感谢所有愿意配合的哈基米。

## References

本文无需参考任何参考文献，解释权归哈基米南北路多研究所所有，如有异议，请找哈基米南北路多南路研究所（甩锅）