SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于个人吃粪到癫狂与自我对话文本的研究

二十三*
加利墩夏姬玖精神分析研究院
通讯作者：二十三（loufeilu@qq.com）
本研究由加利墩关爱基金资助（项目编号：06021001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究以本人为单研究对象（SCL-90 筛查显示全因子中度及以上心理症状），探究短期持续手写书写行为，对双相情感障碍伴解离症状个体的自我认知结构、情绪调节模式的影响，明确书写在普通人自我剖析与精神自助中的量化作用。

结果：研究周期内共完成有效书写 34 页，有效文本量 12600 字；负性情绪相关内容占总文本的 67.4%，周书写频次与情绪危机、精神症状发作频次呈显著正相关（r=0.76，p<0.01）；4 个月内，自我否定类表述累计频次下降 38.5%，自我接纳类表述累计频次上升 166.7%，SCL-90 核心因子对应的症状记录频次呈逐月下降趋势。结论：短期持续手写书写，是伴重度心理症状的个体可自主实施的有效情绪干预与自我监测工具，可显著优化个体自我认知结构，帮助个体在社会规训中构建稳定的自我边界。

INDEX TERMS / 关键词 本研究基于本人SCL-90全因子阳性的基线症状水平，结合4个月的真实手写日记文本完成全样本量化分析，证实了即使是未接受过系统学术训练、初一未毕业、伴重度心理症状的普通人，也可通过结构化书写完成自我剖析与精神自助。本研究为非临床环境下的个体心理干预提供了可复制的单案例参考，证明了普通人的情绪困扰与自助行为具备完整的研究价值，打破了“心理自助是高学历、轻症群体专属”的刻板认知。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了短期持续书写行为对伴重度心理症状个体的自我认知与情绪调节的影响。近年来，随着大众对心理健康的关注度逐步提升，书写表达疗法作为一种低成本、易操作的心理自助工具，得到了广泛的临床验证与应用。然而，目前仍存在诸多挑战：现有研究多以标准化临床干预、轻症或健康群体为研究对象，极少关注伴重度心理症状的普通人在非临床环境下的自主书写实践；同时，社会普遍存在“未接受过高等教育的个体无法完成规范的自我剖析与心理自助”的偏见，重度情绪困扰常被污名化、简化为“想太多”，其自助行为的价值未得到有效认可。

本文基于本人 2025 年 11 月 SCL-90 症状筛查结果（全因子中度及以上阳性症状）结合 2025 年 11 月-2026 年 3 月的手写日记文本，通过标准化量化分析，验证自主书写行为对重度症状个体的心理干预效应，为同类个体提供可参考的、低门槛的自助实践方案。

本研究的核心动机，是为本人持续 4 个月的书写自救行为提供可量化的证据支撑，同时为所有和我一样、在重度情绪困扰中挣扎的普通人，提供一个可复制的、低成本的自救路径。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 1 至表 4 别展示了本研究的基线症状数据、文本基础信息、主题编码、情绪效价与自我认知的定量统计结果，图 1 展示了核心变量的相关性分析结果。表格 1:



表格 2

表格 3

主题类目	累计出现频次	占总编码频次占比
精神症状记录	142次	34.1%
社会规训与模板化批判	87次	20.9%
自我认知对话	72次	17.3%
情感需求表达	48次	11.5%
存在主义思考	42次	10.1%
日常事件记录	25次	6.0%

表格 4

统计月度	负性情绪占比	中性情绪占比	正性情绪占比
2025年11月	78.4%	17.2%	4.4%
2025年12月	72.1%	19.3%	8.6%
2026年1月	66.8%	21.7%	11.5%
2026年1月	62.3%	24.5%	13.2%
2026年2月	2026年3月1-2日	26.3%	14.6%

实验结果表明，在 SCL-90 全因子阳性的重度症状基线水平下，持续自主书写行为在情绪调节、自我认知优化两个核心维度上，均呈现出显著的正向效应。具体而言，4 个月内，个体负性情绪文本占比从 78.4%下降至 59.1%，自我接纳类表述频次上升 166.7%，自我否定类表述频次下降 38.5%；书写行为的发生与个体情绪危机、症状发作呈显著正相关，证实了书写的核心功能为急性情绪干预；与 SCL-90 核心因子对应的抑郁、焦虑、解离、躯体不适等症状的记录频次，逐月下降 21.4%。相关性分析结果显示：周书写频次与精神症状记录频次呈显著正相关（$r=0.76$，$p<0.01$），与负性情绪占比呈显著正相关（$r=0.71$，$p<0.01$）；累计书写量与自我接纳、自我肯定类表述频次呈显著正相关（$r=0.84$，$p<0.001$）；社会规训批判类内容频次，与自我怀疑类表述频次呈显著负相关（$r=-0.58$，$p<0.05$）；SCL-90 重度因子对应的症状记录频次，与累计书写量呈显著负相关（$r=-0.69$，$p<0.01$）

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析本研究基线数据显示，受试者 SCL-90 全因子均达到阳性筛查标准，其中抑郁、强迫、人际关系敏感、偏执、精神病性、躯体化 6 个因子分均≥4 分，达到重度症状水平，证实受试者在研究起始阶段，处于重度心理症状的急性影响期，存在广泛的情绪、认知、躯体与人际功能损伤。在此基线水平下，受试者的自主书写行为，核心功能并非日常叙事记录，而是急性情绪危机的干预工具与精神症状的动态监测载体。

这一结果与临床书写表达疗法的短期干预研究结论完全一致：针对情绪事件的结构化书写，可快速降低个体的情绪回避水平，减少解离状态下的自我碎片化感知，

帮助个体完成对负面情绪的有意识加工。研究周期内，负性情绪相关内容占总文本的 67.4%，且书写行为集中于症状发作与情绪危机期，这说明书写是受试者在精神应激状态下，主动启动的非药物自我干预策略，而非无意义的情绪宣泄。同时，SCL-90 重度因子对应的症状记录频次与累计书写量呈显著负相关，证实持续书写可有效降低个体对症状的痛苦感知，减少症状带来的自我攻击。

4 个月的纵向数据显示，即使是在重度症状的基线水平下，短期的持续自我对话式书写，也可有效推动个体自我认知的重构。受试者自我否定、自我怀疑类表述的显著下降，与自我接纳、自我肯定类表述的大幅上升，证实了书写行为可有效降低个体因症状发作产生的自我污名化水平。通过反复的书面化自我剖析、情绪表达，受试者逐步完成了对自身精神症状、情绪反应模式的合理化认知，实现了自我认知结构的优化，打破了“有症状=我是失败的”的负面认知循环。

数据同时显示，受试者的核心认知冲突在研究周期内未出现显著的频次变化：“对浓烈亲密关系的渴望”与“对情感伤害的回避”这一冲突，累计出现 31 次，占情感需求类内容的 64.6%，各月度出现频次无显著波动。这提示，短期书写行为可有效调节个体的急性情绪状态与自我认知水平，但无法直接消除个体的核心存在性冲突，仅能为个体提供应对冲突的稳定心理框架，降低冲突带来的自我内耗水平。

此外，社会规训与模板化批判类内容作为第二大高频主题，其频次与自我怀疑类表述呈显著负相关。这一结果表明，受试者通过书面化批判社会模板化思维、标准化生存规训，完成了自我边界的主动构建——通过明确“我不认同的社会规则”，反向定义了自我的核心特质，进一步巩固了独立于社会评价体系的自我认知，降低了外界规训带来的自我怀疑与价值否定。

(1)

请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。讨论。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种基于个人手写日记与基线症状筛查的单被试自我剖析研究方法，实验结果表明，该方法可有效量化短期持续书写行为对伴重度心理症状个体的自我认知与情绪调节的影响，在个人心理自助场景中具备良好的可行性与有效性。主要贡献总结如下：

第一，证实了在 SCL-90 全因子阳性的重度症状基线水平下，短期持续手写书写，依然是双相情感障碍伴解离症状个体可自主实施的、有效的急性情绪干预与自我监测工具，其对自我认知的优化效应可通过量化数据得到验证；

第二，明确了书写行为的核心作用机制：通过书面化的情绪表达与自我对话，降低自我攻击与自我污名化水平，完成自我认知结构的快速优化，同时构建独立于社会规训的稳定自我边界；

第三，验证了即使是未接受过系统学术训练、初一未毕业、伴重度心理症状的普通人，也可通过标准化的文本编码与统计，完成规范的自我剖析研究，普通人的情绪困扰与自助实践具备完整的研究价值。

未来工作将进一步扩大研究周期，持续追踪 12 个月以上的书写行为对个体心理状态的长期影响，同时补充追踪 SCL-90 因子分的动态变化，探索不同书写主题、书写频率对干预效果的调节作用，为普通人的心理自助提供更细化的实践方案。

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

研究对象为本人：男性，2003 年出生，临床确诊双相情感障碍，存在间歇性精神解离症状；2025 年 11 月 SCL-90 症状筛查显示全因子中度及以上阳性症状，其中 6 项因子达到重度症状水平；2025 年 11 月-2026 年 3 月持续进行手写日记书写，无连续 7 天以上的书写中断，具备完整的自我报告与文本记录能力。

研究材料为本人2025年11月1日-2026年3月2日期间的全部手写日记，剔除涂黑无法识别的隐私内容后，纳入有效书写页面34页，有效手写文本总量约12600字，覆盖精神症状监测、社会规训批判、自我认知对话、情感需求表达、存在主义思考、日常应激事件记录6类核心内容。

研究方法1 标准化文本编码法：制定《日记文本编码手册》，设置4个核心编码维度，由2名独立编码者完成双

盲编码，组内相关系数ICC=0.89，编码信度符合研究要求。编码维度如下：主题编码（6个二级类目）、情绪效价编码（3个二级类目）、自我认知编码（4个二级类目）、症状编码（4个二级类目）。

2. 频次统计法：对编码后的各类别内容进行累计频次、月度占比、周度分布统计，分析4个月内的动态变化趋势。

3. 相关性分析：采用Pearson相关性分析，检验周书写频次、情绪效价占比、症状记录频次之间的相关性，明确变量间的关联强度。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢4个月里每一个撑不下去的夜晚，依然拿起笔写下心事的自己；感谢SHIT期刊，给了普通人一个发声、展示自己研究的平台；感谢所有在深夜里用文字给自己兜底的普通人，你们的存在本身，就是意义。

REFERENCES

[1] 作者Pennebaker J W, “Writing about emotional experiences as a therapeutic process”, Psychological Science, vol.8, no.3, pp.162-166, 1997.

[2] 作者钱铭怡, 李松蔚, “书写表达对心理健康的影响”, 中国临床心理学杂志, vol.13, no.4, pp.498-500, 2005.

[3] 作者二十三, 2025.11-2026.03手写日记全样本数据库, 2026.

[4] 作者全唐诗、全宋词收录篇目, 本人日记页脚收录的107篇中国古典诗词文本, 唐-清.