```
.
| אזי \mathcal{U} \in \mathcal{T} אזי \mathcal{U} \subseteq \mathcal{T} תהיינה
                                                                                                                            igcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T} אזי \{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{T} תהיינה ullet
                                                                 (X,\mathcal{T}) אזי (מ"ט): תהא X אזי (חבועה ותהא \mathcal{T}\subseteq\mathcal{P}\left(X
ight) מרחב טופולוגיה על
                                                                                   U \in \mathcal{T} המקיימת U \subseteq X אזי אזי מרחב טופולוגיה היי יהי יהי
                                                                               X \backslash E \in \mathcal{T} המקיימת E \subseteq X המפולוגיה אזי מרחב טופולוגיה אזי היי היי (X,\mathcal{T})
U\cap V\in\mathcal{T} מתקיים U,V\in\mathcal{T} מתקיים U,V\in\mathcal{T} מתקיים אזי U,V\in\mathcal{T} מתקיים U,V\in\mathcal{T} מתקיים אזי U,V\in\mathcal{T}ו.
                                                                                                                    \{X,\varnothing\} הטופולוגיה הטריוואלית: תהא X קבוצה אזי
                                                                                                         \mathcal{P}\left(X
ight) אזי קבוצה X קבוצה אזי הדיסקרטית: תהא
                \mathcal{T}(X,
ho)=\{U\subseteq X\mid orall x\in U. \exists r>0. B_r(x)\subseteq U\} הטופולוגיה המושרית ממרחב מטרי: יהי (X,
ho) מרחב מטרי אזי
                                                                               \{A\subseteq X\mid |X\backslash A|<leph_0\}\cup\{\varnothing\} הטופולוגיה הקו־סופית: תהא אזי
                                                                                                        אזי \mathcal{C}=\{E\subseteq X\mid Xackslash E\in\mathcal{T}\} משפט: יהי (X,\mathcal{T}) משפט: יהי
                                                                                                                                                                            X, \emptyset \in \mathcal{C} \bullet
                                                                                                                          .igcap_{lpha\in\Lambda}E_lpha\in\mathcal{T} אזי \{E\}_{lpha\in\Lambda}\subseteq\mathcal{C} תהיינה ullet
                                                                                                                            \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{T} אזי \{E_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{C} תהיינה ullet
                                                                                                          בסיס לטופולוגיה: תהא X קבוצה אזי לטופולוגיה: תהא בסיס
                                                                                                                                                                           |\mathcal{B}| = X \bullet
     B_3\subseteq B_1\cap B_2 וכן x\in B_3 עבורה B_3\in \mathcal{B} אזי קיימת איי איי איי ותהא x\in B_1\cap B_2 ותהא B_1\cap B_2
eq\varnothing עבורן B_1,B_2\in \mathcal{B}
                                                                                         הטופולוגיה הנוצרת מבסיס: תהא X קבוצה ויהי \mathcal{B}\subseteq\mathcal{P}\left(X
ight) בסיס אזי
                                                                                                      \mathcal{T}(\mathcal{B}) = \{ U \subseteq X \mid \forall x \in U . \exists B \in \mathcal{B}. (x \in B) \land (B \subseteq U) \}
                                                                                     X טופולוגיה על \mathcal{T}(\mathcal{B}) בסיס אזי שופולוגיה על \mathcal{B}\subseteq\mathcal{P}(X) טופולוגיה על
                         \mathcal{B}_K = \mathcal{B}_E \cup \left\{ (a,b) \setminus \left\{ rac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}_+ 
ight\} \mid a < b 
ight\} וכך \mathcal{B}_{	ext{Sorg}} = \left\{ [a,b) \mid a < b 
ight\} \mid a < b 
ight\} זימון: \mathcal{B}_E = \left\{ (a,b) \mid a < b 
ight\} וכך
                                                                                                                                              \mathbb{R} טענה: \mathcal{B}_E, \mathcal{B}_{\mathsf{Sorg}}, \mathcal{B}_K בסיסים של
                                                                                                                \mathbb{R}=(\mathbb{R},\mathcal{T}\left(\mathcal{B}_{E}
ight)) :הטופולוגיה האוקלידית/הסטנדרטית
                                                                                                                                    \mathbb{R}_{\mathsf{Sorg}} = (\mathbb{R}, \mathcal{T}(\mathcal{B}_{\mathsf{Sorg}})) :הישר של זורגנפריי:
                                                                                                                                             \mathbb{R}_K = (\mathbb{R}, \mathcal{T}(\mathcal{B}_K)): Kטופולוגיית
                                   \mathcal{T}(\mathcal{B})=\{U\subseteq X\mid \exists A\subseteq\mathcal{B}.U=\bigcup A\} משפט אפיון שקול לטופולוגיה נוצרת: יהי \mathcal{B}\subseteq\mathcal{P}(X) בסיס אזי
                                         \mathcal{T}\left(\mathcal{B}_{1}
ight)=\mathcal{T}\left(\mathcal{B}_{2}
ight) איי מסקנה: יהיו \mathcal{B}_{2}\subseteq\mathcal{T}\left(\mathcal{B}_{1}
ight) בסיסים עבורם \mathcal{B}_{1}\subseteq\mathcal{T}\left(\mathcal{B}_{2}
ight) בסיסים עבורם מסקנה: יהיו
                                          \mathcal{T}_1 איז \mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{T}_2 איז עדינה לטופולוגיה עדינה לטופולוגיה: תהא א קבוצה ותהיינה \mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2 טופולוגיה עדינה לטופולוגיה: תהא
                                              \mathcal{T}_1 אזי \mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{T}_2 אזי עבורן X עבורן על אזי וופולוגיה מינה קבוצה ותהיינה אזי \mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2 טופולוגיה אזי לטופולוגיה: תהא
                          סטענה: תהא X קבוצה בעלת יחס סדר מלא אזי \{(a,b)\mid a < b\} \cup \{[a,b)\mid \forall x \in X.a \leq x\} \cup \{(a,b)\mid \forall x \in X.x \leq b\} בסיס.
                                                                                                            טופולוגיית הסדר: תהא X קבוצה בעלת יחס סדר מלא אזי
                                                                               \mathcal{T}(\{(a,b) \mid a < b\} \cup \{[a,b) \mid \forall x \in X.a \le x\} \cup \{(a,b) \mid \forall x \in X.x \le b\})
                                                                                                        \mathcal{S} = X עבורה \mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}\left(X
ight) אזי קבוצה אזי תהא \mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}\left(X
ight)
                                                                             הטופולוגיה הנוצרת מתת־בסיס: תהא קבוצה ויהי \mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}\left(X\right) יהיו תהא תהא תת־בסיס:
                                                                                                         \mathcal{T}(\mathcal{S}) = \left\{ U \subseteq X \mid \exists A_1 \dots A_k \subseteq \mathcal{S}.U = \bigcup \left(\bigcap_{i=1}^k A\right) \right\}
                                                                               \mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}\left(X
ight) טופולוגיה על \mathcal{T}\left(\mathcal{S}
ight) תת־בסיס אזי \mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}\left(X
ight) טופולוגיה על
                                             \mathcal{T}(\{\{a\in\mathbb{F}^n\mid f(a)
eq 0\}\mid f\in\mathbb{F}\left[x_1,\ldots,x_n
ight]\}) אזי n\in\mathbb{N}_+ אזי שדה ויהי \mathbb{F} שדה ויהי \mathbb{F}
                                                                                                    x\in U עבורה U\in\mathcal{T} אזי אזי x\in X מ"ט ויהי מיט יהי יהי
                                                                             \operatorname{Lint}(A)=\mathring{A}=igcup_{U\subseteq A}U איז איז A\subseteq X מ"ט ותהא מ"ט מ"ט (X,\mathcal{T}) פנים של קבוצה: יהי
                                                                             \mathrm{cl}\,(A)=\overline{A}=\bigcap_{\substack{A\subseteq E\\X\subseteq \mathcal{I}}}E אזי A\subseteq X מ"ט ותהא (X,\mathcal{T}) מיט יהי
                                                                                          .\partial A=A \widetilde{\setminus} \mathrm{int}\,(A) אזי A\subseteq X מ"ט ותהא A\subseteq X מ"ט ותהא איני (X,\mathcal{T}) שפה של קבוצה: יהי
```

 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}\left(X
ight)$ אזי קבוצה אזי תהא X המקיימת

 $X, \emptyset \in \mathcal{T} \bullet$

```
x \in \overline{A} \bullet לכל \mathcal{T} • יהי \mathcal{B} ב יהי \mathcal{T} נה: יהי (
```

 $U\cap A
eq \emptyset$ מתקיים $x\in U$ המקיים $U\in \mathcal{T}$ לכל

 $B\cap A \neq \varnothing$ מתקיים $x\in B$ המקיים המקיים של \mathcal{T} אזי של יהי יהי \mathcal{B}

 $.\partial A=\overline{A}\cap\left(\overline{Xackslash A}
ight)$ אזי $A\subseteq X$ מ"ט ותהא (X,\mathcal{T}) טענה: יהי

וכן $U\cap A \neq \varnothing$ מתקיים $x\in U$ המקיימת $U\in \mathcal{T}$ המקיימת $x\in X$ ויהי $x\in X$ אזי ויהי $x\in X$ אזי ויהי $x\in X$ מתקיים $x\in U\cap A^{\mathcal{C}}$ וכן $U\cap A^{\mathcal{C}}\neq\varnothing$

 $X=\overline{A}$ המקיימת $A\subseteq X$ מ"ט אזי מ"ט המקיימת (X,\mathcal{T}) קבוצה צפופה: יהי

 $U\cap Aackslash\{x\}
eq arnothing$ מתקיים x מתקיים x אזי $x\in X$ אזי $x\in X$ אזי איט ותהא מתקיים $x\in X$ מ"ט ותהא

 $\lim_{n \to \infty} x_n = y$ אזי $x_n \in U$ מ"ט תהא $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ מ"ט תהא $x \in X^{\mathbb{N}}$ מ"ט ותהא $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ מ"ט ותהא $x \in X^{\mathbb{N}}$ אזי $x \in X^{\mathbb{N}}$ מ"ט ותהא $x \in X^{\mathbb{N}}$ מ"ט ותהא

 $A \cup \{x \in X \mid A$ שענה: תהא $A \subseteq X$ אזי $A \subseteq X$ אזי איזי אזי אזי אזי מענה: תהא

 $\{x\in X\mid A \$ מסקנה: תהא $A\subseteq X$ אזי (A סגורה) מסקנה: תהא אזי (A סגורה) מסקנה: מסקנה

 $. orall U \in \mathcal{S}.f^{-1}\left(U
ight) \in \mathcal{T}$ עבורה f: X o Y מ"טים אזי $\left(X, \mathcal{T}\right), \left(Y, \mathcal{S}\right)$ יהיו היני $\left(X, \mathcal{T}\right), \left(Y, \mathcal{S}\right)$ משפט: יהיו $\left(X, \mathcal{T}\right), \left(Y, \mathcal{S}\right)$ משפט: יהיו משפט: יהיו משפט ותהא

- .רציפה f
- . פתוחה $f^{-1}\left(U\right)$ כי פתוחה מתקיים כי $U\subseteq Y$ פתוחה.
- סגורה $f^{-1}\left(E
 ight)$ כי סגורה מתקיים כי $E\subseteq Y$ סגורה.
 - $f\left(\overline{A}
 ight)\subseteq\overline{f\left(A
 ight)}$ מתקיים $A\subseteq X$ לכל

. רציפה f^{-1} רציפה חח"ע ועל עבורה $f:X \to Y$ מ"טים אזי (X,\mathcal{T}), (Y,\mathcal{S}) ראים: יהיו

טענה: יהיו f:X o Y מ"טים ותהא מ"טים ועל התב"ע ועל התב"ע טענה: יהיו

- . הומיאומורפיזם $f \bullet$
- .(מתוחה) $f^{-1}(U)$ פתוחה) אזי ע $U \subseteq Y$ מתוחה).
- .(סגורה) אזי $f^{-1}\left(E\right)$ אזי שאזי $E\subseteq Y$ אזי $E\subseteq Y$
 - $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ מתקיים $A \subseteq X$ לכל

 $\mathcal{T}_X=\left\{f^{-1}\left(U
ight)\mid U\in\mathcal{S}
ight\}$ אזי f:X o Y אזי מ"ט ותהא f:X o Y אזי קבוצה מפונקציה: תהא f:X o Y אזי f:X o Y מייט ותהא f:X o Y מייט ותהא f:X o Y אזי ותהא f:X o Y מייט ותהא אזי מייט ותהא מ"ט.

 $(X,\mathcal{T}_X),(Y,\mathcal{S})$ אזי f:X o Y אזי מסקנה: תהא X קבוצה יהי (Y,\mathcal{S}) מ"ט ותהא

 $\mathcal{T}_{A}=\left\{U\subseteq A\mid\exists V\in\mathcal{T}.U=\mathrm{Id}^{-1}\left(V
ight)
ight\}$ אזי $A\subseteq X$ מ"ט ותהא (X,\mathcal{T}) יהי יהי יהי מרחב טופולוגי (ת"מ): יהי

.טענה: יהי (A,\mathcal{T}_A) אזי מ"ט ותהא או מ"ט מענה: יהי מי"ט מי"ט מי"ט מענה

 \mathcal{T}_A בסיס של בסיס של $\mathcal{B}_A=\{A\cap B\mid B\in\mathcal{B}\}$ אזי בסיס של בסיס מינה: יהי מ"ט ויהי מ"ט ויהי

טענה: יהי $A\subseteq X$ אזי

- $(V\cap A=U$ אזי עבורה ביחס ל־ $(V\cap A=U)$ לפיימת איי פתוחה ביחס ל־ $(V\cap A=U)$ פתוחה ביחס ל־ $(V\cap A=U)$ אזי עבורה שיי
- $(F\cap A=E)$ אזי ל־ \mathcal{T} עבורה ביחס ל־ $(\mathcal{T}_A$)לאיימת $(\mathcal{T}_A$ פתוחה ביחס ל־ $(\mathcal{T}_A$ אזי שאזי (ביחס ל- \mathcal{T}_A).
 - $\operatorname{cl}_{X}\left(D
 ight)\cap A=\operatorname{cl}_{A}\left(D
 ight)$ אזי $D\subseteq A$ תהא
 - $\operatorname{int}_X(D) \cap A \subseteq \operatorname{int}_A(D)$ אזי $D \subseteq A$ תהא

 (Y,\mathcal{T}_Y) מ"ט ויהי (X,\mathcal{T}_X) ת"מ אזי מענה: יהי

- A פתוחה A אזי A פתוחה ב־A, תהא $A\subseteq Y$ פתוחה ב־A
- Xביא סגורה ב־X סגורה ב־X סגורה ב־X סגורה ב־X סגורה ב-X

טענה: יהיו X,Z מ"ט יהי $Y\subseteq Z$ ת"מ ותהא f:X o Y רציפה אזי f:X o Z רציפה.

רציפה. $f_{\upharpoonright A}:A o Y$ מ"ט יהיX,Y מ"ט יהי $A\subseteq X$ ת"מ ותהא f:X o Y רציפה.

. רציפה $f:X \to Z$ אזי $f:X \to Z$ אזי $f:X \to X$ רציפה עבורה $f:X \to Y$ אזי תהא X,Z רציפה יהיו יהיו

טענה: היי $q\circ f:X o Z$ מ"ט תהא f:X o Y רציפה g:Y o Z רציפה f:X o Y מענה: יהיו

g:B o Y משפט למת ההדבקה: יהיו f:A o Y מ"ט תהיינה $A,B\subseteq X$ סגורות עבורן $A,B\subseteq X$ משפט למת ההדבקה: יהיו A,Y מ"ט תהיינה $A,B\subseteq X$ סגורות עבורן $A,B\subseteq X$ אזי $A\cap B$ אזי $A\cap B$ אזי $A\cap B$ אזי $A\cap B$ משפט למת ההדבקה:

 $\hat{f}=f$ כך $\hat{f}:X o f\left(X
ight)$ כדי ורציפה נגדיר f:X o Y מ"ט ותהא א מ"ט ותהא ליט ורציפה נגדיר

. שיכון: יהיו \hat{f} הומיאומורפיזם ורציפה f:X o Y מ"ט אזי איז מיט ורציפה עבורה אויע מיט אזי

 $. orall \mathcal{U} \subseteq X. \ (\mathcal{U} \in \mathcal{T}_X) \Longleftrightarrow \left(f^{-1}\left(\mathcal{U}\right) \in \mathcal{T}_Y\right)$ בונקציה על המקיימת $f:Y \to X$ מ"ט אזי $f:Y \to X$ מ"ט ותהא $f:Y \to X$ מ"ט ותהא $f:Y \to X$ העתקת מנה אזי $f:Y \to X$

. העתקת מנה אזי $g\circ f:X o Z$ מ"ט תהא g:Y o Z העתקת מנה ותהא העתקת מנה f:X o Y מ"ט תהא איי

משפט: יהי X מ"ט תהא A קבוצה ותהא f:X o A על אזי קיימת ויחידה טופולוגיה \mathcal{T}_A על עבורה A העתקת מנה.

טופולוגיה T_A על אזי טופולוגיה f:X o A עבורה קבוצה ותהא א קבוצה ותהא לוגיית המנה המושרית: יהי א מ"ט תהא