

גודל מעגל בוליאני: יהיו $n, m \in \mathbb{N}$ ויהי C מעגל בוליאני בעל n חוטים וכן m קלטים אזי $\text{Size}(C) = n + m$.

עומק מעגל בוליאני: יהי C מעגל בוליאני אזי $\text{depth}(C)$ הינו אורך המסלול המקסימלי מקלט לפלט.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ אזי $\vee_n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ המוגדרת $\vee_n(x) = \bigvee_{i=1}^n x_i$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$ אזי $\wedge_n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ המוגדרת $\wedge_n(x) = \bigwedge_{i=1}^n x_i$.

מעגל בוליאני בעל fan-in לא מוגבל: מעגל בוליאני מעל בסיס הפונקציות הבוליאניות $\{\wedge, \vee, \neg\}$ $(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\wedge_n\}) \cup (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\vee_n\})$ הערה: אלא אם נאמר אחרת מעגל בוליאני הוא בעל fan-in מוגבל.

טענה: תהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי קיים מעגל בוליאני C בעל fan-in לא מוגבל המחשב את f בגודל $\mathcal{O}(n \cdot 2^n)$ ובעומק 2.

טענה: תהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי קיים מעגל בוליאני C המחשב את f בגודל $\mathcal{O}(n \cdot 2^n)$ ובעומק $n + \log_2(n)$.

מסקנה: תהא L שפה אזי קיימת משפחת מעגלים \mathcal{C} מגודל $\mathcal{O}(n \cdot 2^n)$ ומעומק $n + \log(n)$ המחשבת את L .

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי קיימת $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ עבורה לכל מעגל בוליאני C המחשב אותה מתקיים $\text{Size}(C) \geq \frac{2^n}{2n}$.

הגודל של פונקציה בוליאנית: יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי $\text{Size}(f) = \min \{\text{Size}(C) \mid C \text{ מחשבת את } f \wedge (C \text{ מעגל})\}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי $\text{Size}(f) \leq 15 \cdot (2^n - 1)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי $\text{Size}(f) = \mathcal{O}\left(\frac{2^n}{n}\right)$.

מסקנה שאנון: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $\max \{\text{Size}(f) \mid f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}\} = \Theta\left(\frac{2^n}{n}\right)$.

משפט: קיים $C \in \mathbb{R}_+$ עבורו לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימת $n \leq S < C \cdot \frac{2^n}{n}$ קיימת $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ באשר f חשיבה על ידי מעגל מגודל $S(n) + 10n$ וכן f לא חשיבה על ידי מעגל מגודל $S(n)$.

הגדרה: תהא $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ אזי L חשיבה על ידי משפחת מעגלים מגודל לכל היותר $S(n)$ $\{L \subseteq \{0, 1\}^* \mid S(n) \text{ חשיבה על ידי מעגל מגודל לכל היותר } S(n)\}$.

מסקנה: $\text{Size}(2^n) = \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

מסקנה: תהא $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ עבורה $n \leq S(n) \leq \frac{2^n}{n}$ אזי $\text{Size}(S(n)) \subsetneq \text{Size}(S(n) + 10n)$.

הגדרה: $\text{Size}(\text{Poly}) = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{Size}(n^c)$.

למה: יהי G גרף אזי $\mathbb{E}_{\text{תחת } (A, B)}[|E(A, B)|] = \frac{|E(G)|}{2}$.

טענה: יהי G גרף אזי קיים חתך (A, B) עבורו $|E(A, B)| \geq \frac{|E(G)|}{2}$.

הגדרה: תהיינה $s, d : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ אזי $\text{AC}(s, d) = \left\{ L \subseteq \{0, 1\}^* \mid \begin{array}{l} L(C)=L \\ \text{Size}(C_n) \leq s(n) \\ \text{depth}(C_n) \leq d(n) \end{array} \text{ עבורה } C \text{ בעלת fan-in לא מוגבל} \right\}$.

הגדרה: יהי $k \in \mathbb{N}$ אזי $\text{AC}^k = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{AC}(n^c, \log^k(n))$.

הגדרה: תהיינה $s, d : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ אזי $\text{NC}(s, d) = \left\{ L \subseteq \{0, 1\}^* \mid \begin{array}{l} L(C)=L \\ \text{Size}(C_n) \leq s(n) \\ \text{depth}(C_n) \leq d(n) \end{array} \text{ עבורה } C \text{ בעלת fan-in לא מוגבל} \right\}$.

הגדרה: יהי $k \in \mathbb{N}$ אזי $\text{NC}^k = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{NC}(n^c, \log^k(n))$.

מסקנה: תהיינה $s, d : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ אזי $\text{NC}(s, d) \subseteq \text{AC}(s, d)$.

טענה: יהי $k \in \mathbb{N}$ אזי $\text{AC}^k \subseteq \text{NC}^{k+1}$.

פונקציית זוגיות: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\text{parity} : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ המוגדרת $\text{parity}(x) = \bigoplus_{i=1}^n x_i$.

טענה: קיים מעגל C המחשב את parity_n מגודל $\mathcal{O}(n)$ ועומק $\mathcal{O}(\log(n))$.

פולינום מולטי-לינארי (מ"ל): יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ בעל דרגה 1.

פולינום מחשב פונקציה בוליאנית: תהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל עבורו $f(x) = p(x)$ לכל $x \in \{0, 1\}^n$.

טענה: תהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי קיים פולינום מ"ל יחיד המחשב את f .

סימון: תהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ויהי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל המחשב את f אזי $\deg(f) = \deg(p)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $\deg(\vee_n) = n$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי $\deg(\text{parity}_n) = n$.

פולינום מחשב פונקציה בוליאנית בממוצע עם שגיאה ε : יהי $\varepsilon > 0$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל עבורו

$$\mathbb{P}_{x \leftarrow \{0, 1\}^n} (p(x) = f(x)) \geq 1 - \varepsilon$$

טענה: הפולינום 1 מחשב את \vee_n בממוצע עם שגיאה $\frac{1}{3}$.

התפלגות משפחת פולינומים מחשבת פונקציה בוליאנית עם שגיאה ε : יהי $\varepsilon > 0$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי קבוצת פולינומים

$$\mathbb{P}_{p \leftarrow P} (p(x) = f(x)) \geq 1 - \varepsilon \text{ עבורה } P \subseteq \mathbb{R}[x_1 \dots x_n] \text{ לכל } x \in \{0, 1\}^n$$

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ ותהא $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ אזי קיים $P \subseteq \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל המחשבת את f עם שגיאה ε אזי קיים $p \in P$ המחשב

בממוצע את f עם שגיאה ε .

סימון: יהי (Ω, \mathbb{P}) מרחב הסתברות אזי $(x \leftarrow \Omega) : \Omega \rightarrow \Omega$ הינו מ"מ באשר $\mathbb{P}((x \leftarrow \Omega) = \omega) = \mathbb{P}(\omega)$.

הערה: תהא A קבוצה סופית אזי $x \leftarrow A$ הינו המ"מ כאשר A עם ההתפלגות האחידה.

סימון: יהי $\varepsilon > 0$ ותהא $S_{j,k} \leftarrow \mathcal{P}([n])$ לכל $k \in \{0 \dots \log(n)\}$ ולכל $j \in [c \log(\frac{1}{\varepsilon})]$ אזי $R_V(x) = 1 - \prod_{k,j} (1 - \sum_{i \in S_{j,k}} x_i)$

למה: יהי $x \in \{0,1\}^n$ עבורו $\vee_n(x) = 0$ אזי $R_V(x) = 0$ לכל $S_{j,k} \leftarrow \mathcal{P}([n])$.

למה: יהי $x \in \{0,1\}^n$ ותהינה $S_{j,k} \leftarrow \mathcal{P}([n])$ עבורן קיימים j, k המקיימים $|S_{j,k} \cap \{i \mid x_i = 1\}| = 1$ אזי $R_V(x) = 1$ וכן $\vee_n(x) = 1$.

למה: יהי $k \in \mathbb{N}$ ויהי $x \in \{0,1\}^n$ עבורו $|\{i \mid x_i = 1\}| \leq 2^k$ אזי $\mathbb{P}_{S \leftarrow \mathcal{P}([n])}(|S \cap I| = 1) \geq \frac{1}{2^k}$

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ אזי קיימת קבוצת פולינומים מ"ל $P \subseteq \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מדרגה $\mathcal{O}(\log(n) \cdot \log(\frac{1}{\varepsilon}))$ שמחשבת את \vee_n עם שגיאה ε .

טענה: תהא $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ חשיבה על ידי מעגל בוליאני מגודל $s(n)$ ועומק $d(n)$ אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת קבוצת פולינומים מ"ל $P \subseteq \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מדרגה $\mathcal{O}\left(\left(\log(n) \cdot \log\left(\frac{s(n)}{\varepsilon}\right)\right)^{d(n)}\right)$ המחשבת את f עם שגיאה ε .

מסקנה: תהא $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ חשיבה על ידי מעגל בוליאני מגודל $s(n)$ ועומק $d(n)$ אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום מ"ל $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מדרגה $\mathcal{O}\left(\left(\log(n) \cdot \log\left(\frac{s(n)}{\varepsilon}\right)\right)^{d(n)}\right)$ המחשב את f בממוצע עם שגיאה ε .

למה: יהי $\delta > 0$ ויהי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל המחשב את parity_n בממוצע עם שגיאה $\frac{1}{2} + \delta$ אזי $\deg(p) = \Omega(\delta \sqrt{n})$.

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ ויהי $p \in \mathbb{R}[x_1 \dots x_n]$ מ"ל המחשב את parity_n בממוצע עם שגיאה ε אזי $\deg(p) = \Omega(\sqrt{n})$.

מסקנה: יהי C מעגל המחשב את parity_n בעל fan-in לא מוגבל ועומק $d(n)$ אזי $\text{Size}(C) \geq 2^{\Omega\left(n^{\frac{1}{4 \cdot d(n)}}\right)}$.

משפט: $\text{parity} \notin \text{AC}^0$.